

جدید رہنمائے ادویہ مکمل

NEW COMPLETE MEDICINE GUIDE



ڈاکٹر عبدالجبار

NEW COMPLETE MEDICINE GUIDE

جدید رہنمائے ادویہ (مکمل)

پینٹ دواؤں پر تے طرز کی وہ کتاب جس کا ہر ڈاکٹر کے پاس رہنا ضروری ہے۔
انگریزی آیوریدک اور یونانی مرکب دواؤں کے بارے میں مکمل معلومات، فوائد،
مقدار، معر اثرات، رد عمل، قیمت، کمپنیوں کے پتے وغیرہ۔ غرض دواؤں پر ایسی
مکمل جامع اور معلوماتی کتاب اردو زبان میں آج تک شائع نہیں ہوئی۔

مصنف :

ڈاکٹر عبدالجبار ایف ایم بی ایس
(ڈانگ، پبلی بھیت، یو پی)

ناشر

گلوبل میڈیا اینڈ پبلیکیشنز

H-7, C، گراؤنڈ فلور، آزاد روڈ، ابوالفضل انکلیو، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۲۵

فون: 91-11-26323985

E-mail : gmpublications@rediffmail.com

انتساب-----

وقت کے قدردانوں کے نام جو ایک ایک لمحے کو خدا کی یاد،
حصول علم، نیکی و بھلائی کے کاموں پر صرف کرتے ہیں۔

© جملہ حقوق محفوظ

بلا تحریری اجازت اس کتاب کے کسی حصہ کو پورا یا جز کسی بھی صورت میں
شائع کرنا، سی ڈی یا کسی دوسرے الیکٹرونک ذریعہ سے محفوظ کرنا سنگین
جرم ہے۔ اس کا سختی سے قانونی نوٹس لیا جائے گا۔

نئے انداز سے مرتب، اضافہ و ترمیم شدہ چھٹا ایڈیشن 2003ء

نام کتاب :	جدید رہنمائے ادویہ مکمل
مصنف :	ڈاکٹر عبدالجبار ایف ایم بی ایس
تعداد :	گیارہ سو (1100)
صفحات :	800
قیمت :	160 روپے

ملنے کے دیگر پتے:


ڈاکٹر عبدالجبار، پوسٹ ڈانگ، ضلع پیل بھیت (یو پی) - 262001

Dr. Abdul Jabbar, P.O. Dang, Distt. Pilibhit (U.P.)-262001

مدھر سندیش سنگم E-20، ابوالفضل انکلیو، جامعہ مگر، نئی دہلی-25

Madhur Sandesh Sangam

E-20, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-25 Tel : 26229959



ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے

علم الادویہ میں بردن نئی نئی دواؤں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے کچھ دوائیں متروک اور منسوخ ہوتی رہتی ہیں اس لئے اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ نئی دواؤں کی مکمل معلومات پیش کی جائیں۔ ہماری پچھلی کتاب جدید رہنمائے ادویہ میں یہ کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی اس لئے قارئین اور کرم فرماؤں کے اصرار پر نئی دواؤں پر ایک الگ کتاب منفرد انداز میں پیش کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے قارئین کو نہ صرف یہ کتاب پسند آئے گی بلکہ جدید دواؤں کے بارے میں مکمل اور اپ نوڈیٹ معلومات ان کو مل سکے گی۔ اس میں امراض کے تحت الگ الگ نظام جسمانی میں کام آنے والی دواؤں کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے دوا کا اصلی نام GENERIC NAME پھر اس کے افعال INDICATION مقدار و ترکیب استعمال DOSAGE مختلف امراض میں ہونے والے منفی افعال CONTRA INDICATION - مضر اثرات SIDE EFFECT احتیاط PRECAUTIONS دواؤں کے ساتھ اس کا رد عمل DRUG INTERACTION تجارتی مرکبات TRADE NAME پیکنگ PACKING اور قیمت PRICE درج کی گئی ہے ساتھ ہی آئیور ویدک اور یونانی کی پٹنٹ دواؤں کا ذکر کیا گیا ہے ہم نے ہر ممکن طریقے سے اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ مفید، معلوماتی اور اپ نوڈیٹ بنانے کی کوشش کی ہے ہم اس میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں اس کا فیصلہ قارئین کریں گے اور اپنی رائے اور مشوروں سے آگاہ فرمائیں گے۔ فن کی اور آپ کی خدمت ہمارا مقصد ہے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

عبدالجبار


فہرست مضامین

- (۱) ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے 3
- (۲) ایلو پیتھک دواؤں کی نظام جسمانی، افعال اعضاء کے لحاظ سے ترتیب 5
- (۳) ایوروڈک دواؤں کی نظام جسمانی، افعال اعضاء کے لحاظ سے ترتیب 574
- (۴) یونانی مرکب ادویہ کی امراض کے لحاظ سے ترتیب 624
- (۵) نسخوں میں لکھے جانے والے اشارات ان کی تشریح 701
- (۶) بچوں کی مقدار خوراک 702
- (۷) ادویہ کاری ایکشن، علاج و تدابیر Reaction 703
- (۸) ایام حمل میں دواؤں کے اثرات 704
- (۹) کئی دوائیں ایک ساتھ دینے کے اثرات D/1- 717
- (۱۰) غذاؤں کے ساتھ دواؤں کے اثرات 735
- (۱۱) آکسیجن تھیراپی Oxygen Therapy 741
- (۱۲) میڈیکل آلات۔ ان کے ملنے کے پتے Medical Equipment 742
- (۱۳) دواساز کمپنیوں کے پتے Manufacturers 746
- (۱۴) انگریزی فہرست اصلی (سالت) ایلو پیتھک ادویہ Generic Index 752
- (۱۵) انگریزی فہرست ایلو پیتھک تجارتی مرکبات Trade Index 757
- (۱۶) انگریزی فہرست ایوروڈک پینٹ ادویہ Ayurvedic Index 782
- (۱۷) دودوائیں جو بند ہو چکی ہیں De-listed Products 784
- (۱۸) نئی دوائیں چھپتے چھپتے New Products 785
- (۱۹) ایک خوراک میں علاج کی ادویہ Single Dose Treatment 789
- (۲۰) طبی کتابیں میں کام آنے والی مفید کتابیں و دوائیں Medical Books 790

ایلوپیتھک دواؤں کی نظام جسمانی افعال اعضاء کے لحاظ سے ترتیب

نظام ہضم میں کام آنے والی دوائیں	8	خون میں پروٹین کم کرنے والے مرکبات	106
دافع تیزابیت ادویہ	8	وجع القلب (ہارٹ ایک) روکنے والی ادویہ	110
دافع امی بک ڈسٹری (پچش) ادویہ	16	کیلشیم چینل بلاکر	121
دافع بیکٹریا اور دافع پروٹوزوا ادویہ	23	ناٹریٹ کے مرکبات	130
آنتوں کی حرکات کو مست کرنے والی ادویہ	28	حرکات قلب کی بے ترتیبی دور کرنے والی دوائیں	132
دافع بواسیر مراہم	30	ہائی بلڈ پریشر روکنے والی ادویہ	137
دافع درد شکم ادویہ	33	کیلشیم چینل بلاکنگ ایجنٹ	143
زخم معده میں کام آنے والی ادویہ	37	سنٹرل ایڈری نرجک ان ہی بی ٹری	145
رطوبات معده روکنے والی ادویہ	42	پیری فیمل ایڈری نرجک ان ہی بی ٹری	148
انزائم اور ہاضم دوائیں	46	پیشاب آور (مدربول) ادویہ	149
جگر پتہ بانقرا اس کی ادویہ	53	قلبی حرکات کو کنٹرول کرنے والے مرکبات	156
حرکات معده کو کنٹرول کرنے والی ادویہ	56	عروق کو کشادہ کرنے والی ادویہ	159
ملین امعاء اور مسهل ادویہ	59	عروق کو تنگ کرنے درد شقیہ روکنے والی ادویہ	166
مرخی و مسکن دوائیں	62	سن اور بیہوش کرنے والی دوائیں	169
نظام دوران خون پر اثر انداز ہونے والی ادویہ	70	سوگھا کر بیہوش کرنے والی دوائیں	171
انجماد خون روکنے والی ادویہ	70	نیند آور بیہوشی طاری کرنے والے انجکشن	173
خون محفوظ رکھنے والے سلوشن	72	دافع الرجی (حساسیت) ادویہ	176
جریان خون روکنے والی ادویہ	80	دور دور روکنے والی ادویہ	191
پلازمہ (ماء الدم) کی کمی دور کرنے والی ادویہ	89	دافع قے و چکر روکنے والی ادویہ	199
ویکسین و سیرم تھیراپی	91	دافع پارکن سنز ڈیزیز ادویہ	207
تریاتی مرکبات	103	دافع بخار و مسکن درد ادویہ	215

- 390 ----- خوردنی دافع ذیابیطس ادویہ -----
 397 ----- کارئی سون کے مرکبات -----
 404 ----- غدہ ورقیہ اور انٹی غدہ ورقیہ والی ادویہ -----
 407 ----- ورم تھج دور کرنے۔ جراثیم کش مہربول مرکبات -----
 422 ----- آلات بول (گردہ مشانہ) کی مسکن ادویہ -----
 427 ----- جسم میں پانی نمکیات کی کمی دور کرنے والی ادویہ -----
 434 ----- دافع وجع المفاصل (گٹھیا) ادویہ -----
 436 ----- مرخی عضلات (پٹھوں کو نرم کرنے والی ادویہ -----
 445 ----- محرک اعصاب و عضلات ادویہ -----
 446 ----- غیر کارئی سون والی دافع درد دور NSAID ادویہ -----
 464 ----- طاقت بخش مرکبات -----
 465 ----- مشہی (بھوک بڑھانے والی) ادویہ -----
 466 ----- مولد خون، فولاد کے مرکبات -----
 470 ----- پروٹین و خلاصہ جگر کے مرکبات -----
 471 ----- وٹامن کے مرکبات -----
 477 ----- کیمائیم کے مرکبات -----
 480 ----- دافع فربہ (موہنا دور کرنے والی) مرکبات -----
 481 ----- شکر کے متبادل مرکبات -----
 482 ----- مصنوعی جنسی ہارمون -----
 498 ----- قاتل کرم منی ادویہ -----
 499 ----- محرک و مسکن رحم ادویہ -----
 507 ----- خوردنی مانع حمل ادویہ -----
 508 ----- دافع مہلیی انتقالشن ادویہ -----
 216 ----- ایفون والے دافع درد مرکبات -----
 223 ----- مرکزی نظام عصبی کو متحرک کرنے والی ادویہ -----
 226 ----- نشہ کی عادت چھڑانے والی ادویہ -----
 229 ----- نفسیاتی الجھن دور کرنے والی ادویہ -----
 231 ----- گھبراہٹ دور کرنے والی ادویہ -----
 241 ----- مسکن دماغ و اعصاب دوائیں -----
 252 ----- مسکنات منومات (نیند آور) ادویہ -----
 258 ----- جراثیم کش انٹی بائیوٹک دوائیں -----
 307 ----- پینی سیلین کے مرکبات -----
 313 ----- سلفونامائیڈ کے مرکبات -----
 318 ----- دافع کینسر ادویہ -----
 335 ----- مدافعتی نظام پر اثر کرنے والی ادویہ -----
 337 ----- دافع فاسیلیریا اور دافع ویدان امعاء ادویہ -----
 345 ----- دافع فٹلس دوائیں -----
 351 ----- دافع جذام مرکبات -----
 353 ----- دافع ملیریا ادویہ -----
 359 ----- دافع پروٹوزوا (اجسام طفلیہ) ادویہ -----
 364 ----- دافع ٹی بی مرکبات -----
 373 ----- دافع وائرس ادویہ -----
 376 ----- دافع زہر تریاقی مرکبات -----
 379 ----- معاون تشخیص مرکبات -----
 383 ----- اندرونی غدہ کو تحریک دینے والے ادویہ -----
 387 ----- دافع ذیابیطس ادویہ -----



- 518 --- پیچہڑوں کی عروق کو کشادہ کرنے والی ادویہ ---
- 527 کھانسی نزلہ زکام (حساسیت کے سبب) کی ادویہ
- 534 --- محرک اعضائے تنفس ادویہ ---
- 536 --- سرجری میں کام آنے والی ادویہ ---
- 537 ڈرینج میں کام آنے والے مرکبات -
- 539 دانتوں کے امراض میں کام آنے والے ادویہ -
- 540 --- ناک کے امراض کی دوائیں ---
- 541 --- حلق کے امراض کی دوائیں ---
- 542 --- امراض کان کی دوائیں ---
- 544 آنکھوں میں کام آنے والے مرکبات -
- 546 --- دافع گلو کو مائیلی سکیڑنے والی ادویہ ---
- 547 پتلی پھیلائے اور حرکت روکنے والی ادویہ
- 551 --- بیرونی امراض جلد کی دوائیں ---
- 554 --- دافع قنقس (بیرونی) دوائیں ---
- 567 جلد کو ملائم اور تسکین دینے والے مرکبات -
- 567 اسٹیرائڈ والے بیرونی مرکبات ---
- مرکب ایورویڈک دواؤں کی نظام جسمانی افعال
- اعضاء کے لحاظ سے ترتیب --- 574
- مرکب یونانی دواؤں کی نظام جسمانی افعال اعضاء
- کے لحاظ سے ترتیب --- 624

نظام ہضم میں کام آنے والی دوائیں

ALIMENTARY SYSTEM

دافع تیزابیت PLAIN ANTACID

SODIUM BI CARBONATE

سوڈیم بائی کاربونیٹ

MAGNESIUM TRISILICATE

میکنیشیم ٹرائی سیلیکیٹ

ALUMINUM HYDROXIDE

الومینیم ہائیڈروکسائیڈ

ALGINIC ACID

الگیک ایسڈ

افعال و منافع INDICATION: یہ دوائیں معدہ میں تیزابیت کی زیادتی، معدہ میں خراش جلن زخم اور نفخ شکم میں مفید ہیں۔

مقدار و ترکیب استعمال DOSAGE: اسے ۲ گولی یا ۲ چمچے پانی میں ملا کر دن میں ۳-۵ بار

منفی افعال مختلف امراض میں CONTRA INDICATION: ورم زائدہ اعور۔ گردوں کی خرابی خون میں فاسفیٹ کی زیادتی میں۔

مضر اثرات SIDE EFFECT: قبض پیدا کرتے ہیں خصوصاً میکنیشیم ٹرائی سیلیکیٹ۔

احتیاط PRECAUTION: گردوں کی کمزوری۔ گردے فیل ہو جانے میں میکنیشیم کے مرکبات استعمال نہ کریں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل DRUG INTER ACTION: ٹراسا نکلین۔ فولاد کے مرکبات کے جذب و ہضم میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ ڈیجاکسن۔ آئی سو نیازائیڈ اور فینوتھیازائیڈ کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

ACIDIN

(EAST INDIA)

ایسی ڈین

Mag.carb. 165 mg, dried alum. hydrox. gel 232 mg, cal. carb. 165 mg, sod. bicarb. 82 mg, light kaolin 105 mg, belladonna herb 0.03 mg; tabs. 10
Rs. 1.16

ACIGON

(BOEHRINGER)

ایسی گون

Alginate acid 0.2 g, dried Aluminium Hydroxide gel 80 mg, Magnesium trisilicate 40 mg, Sodium bicarbonate 70 mg, chewable Tabs: 10; Rs. 3.25

ACIGON SUSP

(BOEHRINGER)

ایسی گون سیرپ

Sod. alginate 0.44g, Dried alum. hydrox gel 0.16g, mag. trisilicate 80mg, sod. bicarb 0.14 per 10 ml, susp. 150ml Rs. 13.90

ALUDROX

(WYETH)

الوڈروکس

Dried alum. hydrox gel 840mg, tabs 50: Rs. 10.33 180:
Rs. 28.83 Alum. hydrox. 610 mg/10ml 200ml: Rs. 14.80

ALUDROX-GEL

(WYETH)

الوڈروکس جیل

Dried alum. hydrox gel 300mg, Mag. hydrox 83mg, tabs 50: Rs. 8.41 300:
Rs. 34.44

ALUDROX-MH GEL (WYETH)

الوڈروکس ایم ایچ جیل

Alum. hydrox. 610mg, mag. hydrox 200mg/10ml, 200ml: Rs. 10.62

GAVISCON

(RECKITT COLMAN)

گیوی کان

Alginate acid 500mg, mag. trisilicate 25mg, Dried alum. hydrox gel 100mg, Sod. bicarb. 170mg, 8 tabs: Rs. 10.53

KLARCID

(KLAR SEHEN)

کلار سیڈ

Dried alum. hydrox gel I.P. 250 mg, mag. hydrox B.P. 250 mg, activated dimethicone I.P. 50 mg, tabs strip of 10's Rs. 2.70

MAGININE

(J&J DECHANE)

مگ نین

Dried alum. hydrox. gel I.P. 125 mg, mag. hydrox B. P. 250 mg, ext. Belladonna Dry IP 5mg tabs; strip of 10's Rs. 15.10; 500 tabs Rs. 46.40

RAFTACE LIQUID

(MERIND)

رافٹیس

Sodium Aliginate 200mg, Magnesium Trisilicate 125mg, Dried alum. hydrox. gel 300mg per 10ml; Bottle 180mg Rs. 19.71

RAFTACE TABS (MERIND)

Alginic acid 500mg, Dried alum. hydrox gel 100mg, magnesium trisilicate 25mg, Sod. bicarbonate 170mg tabs; 10 Rs. 13.50

RIFLUX LIQUID (SOL)

Sod. alginate 200mg, dried Alum.hydrox gel 300mg, mag. trisilicate 125mg per 10ml, 200ml, Rs. 16.60; 400ml, Rs. 29.90

RIFLUX FORTE (SOL)

Alginic acid 200mg, Mag. hydrox 150mg, dried alum. hydrox gel 300mg, sod bicarb 70mg, tabs 20x6 Rs. 66.00

RIFLUX (SOL)

Alginic acid 200mg, Dried alum. hydrox gel 80mg, sod. bicarb 70mg Mag. trisilicate 20mg, tabs 20x12, Rs.96.00

ANTACID With ANTIFLATULENTS

DIMETHICONE

METHYL POLYSILOXANE

SIMETHICONE

ڈائی میتھیسی کون
میتھائل پالی سیلوکسین
سی میٹھی کون

افعال و منافع: تیزابیت کی زیادتی معدہ میں خراش جلن، زخم معدہ، نفخ شکم، درد شکم معدہ کا زیادہ پھیل

جائنا اور ACIDITY میں مفید و موثر ہیں۔

مقدار خوراک: ۱ سے ۲ گولی یا ۵ سے ۱۰ ملی لٹر دن میں ۳-۴ بار استعمال کرائیں۔

مضر اثرات: قبض ہو سکتا ہے۔

تجارتی مرکبات**ACIDIN-MPS (EAST INDIA)**

ایسی ڈین ایم پی ایس

Dried alum. hydrox gel 250 mg, mag. hydrox, 225mg, cal. carb 200mg, activated dimethicone 75mg; tabs, 10 Rs. 1.71

ACIDIN-MPS GEL (EAST INDIA)

ایسی ڈین ایم پی ایس جیل

Dried alum.hydrox. gel 250 mg, mag, hydrox. 250mg, activated dimethicone 125 mg per 10 ml : 175ml, Rs. 12.73

- ALLUJEL DF** (UNICHILM) الوجل ڈی ایف
Dried alum hydrox. gel 400 mg, mag hydrox 400 mg, methyl polysilox 30 mg per 10 ml susp. 210 ml. Rs. 8.10
- ALMACARB** (GLAXO) الماکارب
Dried alum hydrox. gel 325mg, mag carb 50mg, methylpolysilox 40mg, deglycyrrhizinated liquorice 380 mg, tabs. 10. Rs 2.77
- ALMAGEL** (IDPL) الما جیل
Dried Alum hydrox gel 250mg. Mag hydroxide 250mg Methyl polysiloxane 10mg. Tabs. 10; Rs. 150
- ALUCINOL** (FRANCO INDIAN) الوسی نال
Dried Alum Hydrox gel 300mg. Mag hydroxide 300mg. Activated methyl polysiloxane 25mg. Tabs. 10 Rs. 2.48
- ALUCINOL SUSP** (FRANCO INDIAN) الوسی نول سرپ
Alum hydrox. gel 600mg, Mag hydrox 50mg/10ml 170 ml Rs 12.35
- ALUPROGEL** (RELI DIES INDIA) الوپرو جیل گولی سرپ
FORT/SUSP/TABS
Dried Alum hydrox Gel 400mg, Mag hydrox 400mg, simethicone 50mg per 10ml. 200ml Rs. 14.95; 10 tabs Rs. 3.39
- CENOLCID GEL** (CARMNOL LABS) سی نول سڈ جیل
Dried aluminium hydroxide IP 300mg, magnesium hydroxide NF 300mg, activated dimethicone 25mg, sorbitol soln 70% IP 200mg, per 10ml, 200ml Rs. 14.40.
- DIMOL** (WALLACE) ڈائی مول
Activated dimethicone 40mg, Tabs 10. Rs. 3.50 500. Rs 60.00
- DIMOL SUSP** (WALLACE) ڈائی مول سرپ
Activated dimethicone 200 mg per 5ml, 60ml: Rs 12.96
- DIOVOL FORTE DGL**(WALLACE) ڈائی وول
Dried alum. hydrox gel 300mg mag. hydrox 250mg Activated dimethicone 40mg deglycyrrhizinated liquorice 400mg /5ml susp 175ml. Rs.17.80
- DIOVOL FORTE SUSP** (WALLACE) ڈائی وول فورٹ سرپ
Dried alum hydrox. gel 300mg Mag. hydrox 250mg Activated dimethicone 40mg per 5ml 175ml: Rs. 19.20 450ml: 28.20

DIOVOL FORTE TABS (WALLACE)

ڈائی وول فورٹ ٹبلٹ

Dried alum. hydrox gel 300mg Maghydrox 250mg activated dimethicone 40mg. Tabs 10: Rs. 2.65.

DISILOX MPS

(STADMED)

ڈائی سی لاکس ایم پی ایس ٹبلٹ

Dried Alum. hydrox. gel 250mg, Mag. hydroxide 250mg, Methyl polysiloxane 50mg Tabss; 10. Rs. 1.44 1000. Rs.65.38

DISILOX MPS SUSP (STADMED)

ڈائی سی لاکس ایم پی ایس سرپ

Dried Alum. hydrox. gel 250mg, mag. hydroxide 250mg, methyl polysiloxane 50mg per 5ml. 170ml Rs. 10.50, 400ml Rs 21.75

DISOGEL SUSP

(CONCEPT)

ڈائی سو جیل سرپ

Alum. hydrox. gel 250mg, mag. hydroxide 250mg liquorice (deglycyrrhizinated 400mg dimethyl polysiloxane 40mg per 5ml susp 175ml Rs. 18.95, 450ml: Rs. 43.00

DISOGEL TABS

(CONCEPT)

ڈائی سو جیل ٹبلٹ

Alum. hydrox. gel 250mg, mag. hydroxide 250mg liquorice (deglycyrrhizinated 400mg dimethyl polysiloxane 40mg Tabs 10 tabs Rs.3.40

DISTENIL

(SUN PHARMA)

ڈسٹیل

Simethicone 80mg Activated charcoal 400mg dual coated tabs; 6 tabs Rs.9.00

EMBESIL GEL

(RHONE-POULENC)

ایم بی سیل

Dried alum hydrox 250mg Mag. hydrox 250mg activated polydimethylsiloxane 50mg/5ml 170ml: Rs 9.74

GETOSIL PLUS SUSP (FALMA LABS)

گیتو سیل پلس سرپ

Dried alum hydrox gel 600mg, Mag. trisilicate 300mg, mag. hydroxide 200mg, dimethyl polysiloxane 50mg/10ml susp; 110ml Rs.12.85

LOGASCID

(ASTRA-IDL)

لوگاسڈ

Dried alum. hydrox. gel 200mg mag. hydrox 200mg Methyl polysiloxane 20mg 10tabs: Rs.1.52: 500tabs; Rs.48.57

LOGASCID SUSP

(ASTRA-IDL)

لوگاسڈ سرپ

Dried alum hydrox gel 200mg, Mag. hydrox 200mg, Activated dimethicone 20mg/5ml 200ml: Rs.15.21 400ml: Rs.21.44

LOGASCID FORTE ASTRA IDL

لوگاسڈ فورٹ

Dried alum hydrox gel 400mg mag. hydrox 400mg, methyl polysiloxane 50mg 10tabs; Rs.2.00

MAGEL-MPS (EUPHORIC)

مے جل

Simethicone 60mg & magaldrate 400mg tabs; 150ml & 450ml suspension
Price N/A.

ORBITS (PHARMED)

آربٹ

Activated methylpolysilox 30 mg, mag. hydrox 200mg, alum hydrox gel per 10ml; Gel 200ml : Rs. 15.69

PARACTAL (GERMAN REMEDIES)

پراکٹال

Polymethyl silox 250mg, Dried Alum. hydrox gel 500mg tabs 6 tabs Rs 3 17

PEPTICA (GENO)

پپٹیکا

Dried Alum. hydrox. gel 300mg, Mag. Trisilicate 200mg Dimethyl polysilox 20mg Diazepam 2mg tabs; 10 Rs.3.00; 500 Rs.80 00

PFT (NICHOLAS)

پی۔ ایف۔ ٹی

Activated dimethicone 125mg, Mag hydrox 400mg, Tabs 10, Rs. 4.46

pH4 (BIOLOGICAL E)

پی۔ ایچ۔ فور

Magaldrate 800mg, activated dimethicone 50mg, tabs: 10. Rs.5.45

pH4 SUSP (BIOLOGICAL E.)

پی۔ ایچ۔ فور

Magaldrate 480mg, activated simethicone IP 20mg colour tartrazine per 5ml susp. 230ml syrup Rs.21.50

POLYCROL FORTE GEL (NICHOLAS)

پولی سرال

Activated dimethicone 125mg, Mag, hydrox 100mg, Alum. hydrox gel 5g per 5ml, syrup 200ml, Rs. 18,20; 450ml: Rs.33 50

POLYCROL FORTE (NICHOLAS)

پولی سرال فورٹ

Activated dimethicone 125mg, Mag, hydrox 400mg, Dried alum. hydrox gel 400mg, tabs 10, Rs.4.02

PROPAMID-MPS (CFL)

پروپامڈ

Activated dimethicone 125mg, Metoclopramide 5mg, Chewable Tabs 10, Rs.7,55

ROLAC PLUS (WYETH)

رولیک پلس

Magaldrate 480mg simethicone 20mg tabs 10 tabs Rs. 5.70

- ROLAC** (WYETH) رولیک
Magaldrate 480 mg Tabs 10, Rs.5.35
- RELCER GEL** (GLENMARK) ریلیر
Alum hydrox gel 6G. Mag hydroxide 80mg, activated dimethicone 100mg, deglycyrrhizinated liquorice equi to liquorice equi to liquorice 400mg per 5ml gel 180ml Rs. 16.69
- SANZYME DS TABS** (UNI-SANKYO) سن زائم ڈی ایس
Dried alum hydroxide gel 250mg, mag hydroxide 150mg, sodium bicarbonate 150mg, simethicone 30mg, fungal diastase (1:1000) 25mg tabs 10 Rs 7.42
- SILOX FORTE GEL** (SIFARL) سی لاکس فورٹ جیل
Dried alum hydrox gel 300mg Mag hydrox 150mg simethicone 125mg per 5ml, susp gel 200ml, Rs. 13.68
- SILOXOGENE** (SIFARL) سی لاکسو جین
Dried alum hydrox gel 300mg, mag hydrox 150mg, activated dimethylpolysilox 40 mg, tabs 10 Rs 179, 500 Rs 46.64
- SIMECO SUSP** (WYETH) سی می کو سرپ
Alum. hydrox. gel 215 mg, mag hydrox 80mg, Dimethyl polysilox 25mg per 5ml susp; 200ml Rs. 13.37
- SIMECO TABS** (WYETH) سی می کو ٹبلیٹ
Dried Alum. hydrox. gel 300mg, mag hydrox 83 mg, Dimethyl poly silox 25mg tabs; 10 Rs. 2.13
- SOLACID SUSP/TABS** (DEYS) سولاسٹ
Dried alum. hydrox. gel 300mg, mag trisilicate 150 mg, mag hydrox 100mg simethicone 25mg per 5ml susp. 170ml Rs. 14.05, 340ml Rs 25.00, tabs 10, Rs 2.80
- SOLACID-O-SUSP** (DEYS) سولاسٹ او سرپ
Dried alum hydroxide gel 300mg, mag trisilicate 150mg, mag hydroxide 100mg, simethicone 25mg, oxethazone 10mg per 5ml susp 170ml Rs.24.75
- SORBACID** (ALKEM) سوربائیڈ
Dried alum hydrox gel 500mg, Dimethicone 25mg, sorbitol (70%) 125mg tabs 10, Rs.3.00

- SORBACID GEL** (AL.KEM) سوربائیڈ جیل
Magnesium hydrox 200mg, Dimethicone 25mg, sorbitol soln (70%) 125mg.
per 5ml susp 200ml, Rs. 16 50
- ULGEL SUSP/TABS** (DABUR) آل جیل سرپ ٹبلٹ
Magaldrate 400mg, simethicone 20mg/5ml susp 170ml. Rs 20 50. 450ml
Rs 39 95, tabs: 10: Rs 4 25
- ULTRACAIN GEL** (BLUE CROSS) الٹراکین
Dried Alum hydrox gel 400mg, mag hydrox 400mg, simethicone 50mg
lidocaine 10mg per 5ml susp 200ml Rs 22 50
- VISCID** (INIXCO) ویس کڈ
Dried alum. hydrox. gel 250mg, mag. hydrox. 250mg, dimethyl polysilox
40mg, deglycyrrhizinated liquorice 400mg per 5ml susp. 200ml Rs 17.23

آکسائی تھازین OXYTHAZINE

افعال مواقع: زخم معدہ، ورم معدہ، ورم مری، معدہ کا منہ پھیل جانا، فم معدہ کی جلن حامد کی شکمی
تکالیف میں مفید ہے۔

مقدار خوارک: ۵ سے ۱۰ ملی لٹر دن میں ۴ بار کھانے سے پہلے اور سوتے وقت۔

منفی افعال: ورم زائدہ اور خون میں فاسفیٹ کی کمی میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: چکر آنا، خشکی، منہ خشک ہو جاتا ہے۔

احتیاط: حمل کے پہلے ہفتہ اور کیسرس کی تشخیص کے دوران احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

- CATOXYMAG-O-GEL** (RAPTAKOS) کیٹوکسائی میگو جیل
Dried alum hydrox gel 400mg, mag trisilicate 400mg, mag. hydrox
150mg, simethicone 25mg, oxethazine 10mg, per 5ml gel; 200ml Rs 11 50
- MUCAIN** (WYETH) میو کین
Oxethazine 10mg, alum. hydrox 0.291gm, mag. hydrox 98mg/5ml, 200ml
Rs 26 21

PEPTICAINE

(PARKE DAVIS)

ہیپٹی کین

Oxethazine 10mg, mag. hydrox 250mg, dried alum hydrox gel 250mg, activated methyl poly siloxane 50mg per 5ml, Liq. 120ml Rs 20,91

TRICAINE MPS

(SEARLE)

ٹرائی کین

Oxethazine 10mg, polysiloxane 125mg, alum hydrox equiv to dried alum hydrox gel 300mg, mag hydrox gel 150mg per 5ml, susp 200ml Rs. 25 75

ANTIAMOEBIAC**دافع امیبک ادویہ****METRINIDAZOLE**

میٹری نائیڈازول

افعال و منافع: امیبا اور گیارڈا کے سبب ہونے والی ہیچس اور دستوں کے لئے مانی ہوئی دوا ہے۔ انٹی می باسٹوئیکا سے پیدا ہونے والے امراض امیبائی ہیچس، ورم جگر، جگر کے پھوڑے (دبیلہ) میں مفید ہے۔ مقدار و ترکیب: امیبائی امراض میں ۴۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۵ سے ۷ دن تک گیارڈا انفکشن میں ۴۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ایک ہفتہ کھلائیں۔ ۲ سے ۷ سال کے بچوں کو ۵ ملی لٹر دن میں ۳ بار ۸ سے ۱۰ سال کے بچوں کو ۱۰ ملی لٹر دن میں ۳ بار۔

منفی اثرات: نظام عصبی کے امراض میں، حساسیت رکھنے والوں میں حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں، خون کی خرابی، میں استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

معترض اثرات: معدہ امحاک حرکات دودیدہ میں خلل، زبان میلی، ذائقہ خراب، خون کے سفید ذرات میں کمی۔ پتی اچھلانا (شرئی) جلد پر تھج ورم Oedema ہونا، نظام عصبی میں خلل پیشاب سیاہ، طویل علاج سے مرگی جیسے دورے پڑنا۔

احتیاط: ایام حمل اور ہائی بلڈ پریشر میں مقدار خوراک کم رکھیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، خوردنی مانع انجماد خون ادویہ، فینو باربی ٹون، سی می ٹی ڈین، فین ٹائن، اور ڈائی سلفی ریم کے ساتھ خراب رد عمل ہو سکتا ہے۔

تجارتی مرکبات

ABDOGYL-N	(BIDDLE-SAWYER)	ابڈو جیل
Metronidazole 200mg, nalidixic acid 300mg: tabs: 6. Rs.25.50		
ABDOGYL-N SUSP	(BIDDLE SAWYER)	ابڈو جیل سرپ
Metronidazole 200mg, nalidixic acid 300mg per 5ml susp: 30ml. Rs.23.50		
ALDEZOLE I.V.	(ALBERT DAVID)	الڈی زول وریدی
Metronidazole 500mg per 100ml inj 100ml: Rs. 13.33		
ALDIAMYCIN	(ALKEM)	الڈیامائی سین
Metronidazole 100mg, furazolidone 30mg per 5ml susp: 60ml. Rs.15.90		
ALFUMET	(ALBERT DAVID)	الفومٹ
Metronidazole 200mg, furazolidone 100 mg, methylpolysiloxane 50mg, tabs 10 Rs.4.10 Susp Metronidazole 100mg, furazolidone 30mg, light kaolin 1g, pectin 50mg, per 5ml susp: 60ml: Rs 8.78		
ANGYL	(EUPHORIC)	این جیل
Metronidazole 200mg & 400mg tabs; Price N/A.		
ARISTOGYL PLUS	(ARISTO)	ارسٹو جیل پلس
Metronidazole 400mg diloxanide furoate 500mg simethicone 100mg tabs 10: Rs.15.33		
BACIGYL TABS	(ARISTO)	بے سی جیل ٹبلٹ
Metronidazole 200mg, nalidixic acid 300mg: tabs:10: Rs.33.37		
BACIGYL SUSP	(ARISTO)	بے سی جیل سرپ
Metronidazole 100mg, nalidixic acid 100mg per 5ml susp. 40ml : Rs 22.75		
Dependol	Metronidazole 200mg	ڈی پنڈال
DINITE SUSP	(SEARLE)	ڈائی نائٹ سرپ
Diloxanide furoate 100mg metronidazole benzoyloxylate equiv: to metronidazole 300mg per 5ml susp 50ml: Rs9.91		
DYSFUR-M SUSP	(BIOLOGICAL E)	ڈائی سٹر سرپ
Furazolidine IP 30mg, metronidazole IP 100mg per 5ml susp: 50ml Rs.6.67		
DYSFUR-M	(BIOLOGICAL E)	ڈائی سٹر ٹبلٹ
Furazolidine IP 100mg, metronidazole IP 300mg tabs 10, Rs.6.91		
ENDAR SUSP	(MAGNACHEM)	انڈار سرپ
Metronidazole Benzoate 160mg, furazolidone 30mg per 5ml susp, 60ml Rs 13 00		

ENDAR TABS	(MAGNACHEM)	انڈار ٹبلٹ
Metronidazole 100mg, furazolidone 30mg tabs; 10 tabs	Rs.12.00	
ENTAMIZOLE	(BOOTS)	انٹامی زول
Diloxanide furoate 250mg, Metronidazole 250mg tabs 6:	Rs.3.84	
FALMOGYL TABS	(FALMA LABS)	فالمو جیل ٹبلٹ
Metronidazole 200mg & 400mg tabs; 200mg: 10	Rs.4.00; 400mg 10	Rx.6.44
FALMOGYL SUSP	(FALMA LABS)	فالمو جیل سرپ
Metronidazole (as benzoate) 200mg/5ml susp 60ml:	Rs. 12.85	
FLAGYL	(RHONE-POULENC)	فلے جیل
Metronidazole 200mg, 400mg tabs 200mg: 10:	Rs.3.94 500: Rs.117.34	
400mg: 10: Rs. 6.57 500: Rs. 211.22		
FLAGYL SUSP	(RHONE-POULENC)	فلے جیل سرپ
Benzoyl metronidazole equiv to metronidazole 200mg per 5ml susp 30ml:	Rs.7.61 60ml: Rs.11.98	
FLAGYL I.V INJ	(RHONE-POULENC)	فلے جیل یو ایل
Metronidazole 500mg per ml inj. 100ml bottle:	Rs.16.18	
FLAGYL-DF	(RHONE-POULENC)	فلے جیل ڈی ایف
Metronidazole 400mg diloxanide furoate 500mg tabs 15:	Rs.20.99	
FLAGYL-F SUSP	(RHONE-POULENC)	فلے جیل ایف سرپ
Metronidazole 100mg furazolidone 30mg per 5ml :	Rs.9.60	
FLAGYL F TABS	(RHONE-POULENC)	فلے جیل ایف ٹبلٹ
Metronidazole 400mg furazolidone 100mg: tabs 10:	Rs9.33	
FORTEZOLE MF	(PFIMEX)	فورٹی زول
Metronidazole (as benzoate) 400mg, furazolidone 100mg; tabs; 10 x 10:		
Rs.107		
FORTEZOLE MF SUSP	(PFIMEX)	فورٹی زول سرپ
Metronidazole 100mg, furazolidone 30mg per 5ml susp: 60ml:	Rs.10 50	
IVEMETRO INFUSION	(TORRENT)	آئی وی میٹرو
Metronidazole 5mg per ml inj. 100ml:	Rs. 14.31	
KENTROQUIN	(KENT)	کین ٹرو کوئن
Metronidazole 200mg, Diiodohydroxy quinoline IP 250mg tabs, Price N/A.		
LUMIGARD	(SIGMA LABS)	لومی گارڈ
500mg tabs: 6	Rs. 5.80	

LUMIGARD FORTE	(SIGMA LABS)	لومی گارڈ فورٹ
Diloxanide furoate 500mg, metronidazole 400mg: tabs: 6: Rs.9.00		
MEGYL-F	(INDOCO)	مے جیل
Furazolidone 30mg, metronidazole 100mg per 5ml surup: 60ml: Rs.12.00		
METRINA TABS	(LIFE)	میٹرینا
Metronidazole I.P. 200mg 7 400mg tabs; 200mg: 10, Rs.5.68; 400mg. 10, 10 08		
METRINA PLUS TABS	(LIFE)	میٹرینا پلس
Metronidazole I.P. 200mg, Diloxanide furoate 250mg tabs; 10tabs Rs. 10.15		
METROGYL	(UNIQUE)	میٹرو جیل
Metronidazole benzoylozylate equib to metronidazole 200mg per 5ml susp 30ml : Rs 7.74 60ml: 12.28		
METROGYL COMP.	(UNIQUE)	میٹرو جیل کمپوٹ
Metronidazole 400mg diloxanide furoate 500mg tabs 15: Rs.18.34; 100: Rs.120.49		
METROGYL-F TABS	(UNIQUE)	میٹرو جیل فلیٹ
Metronidazole 400mg, furazolidone 100mg, tabs. 10. Rs.6.99		
METTOGYL-F SUSP	(UNIQUE)	میٹرو جیل سرپ
Metronidazole 200mg, furazolidone 40mg per 5ml susp: 30ml: Rs.7.77, 60ml: Rs.12.34		
METRON	(ALKEM)	میٹرون
Metronidazole 200mg tabs 10: Rs. 4.65		
METRON FORT	(ALKEM)	میٹرون فورٹ
Metronidazole 400mg tabs 10: Rs.8.05		
METRON SUSP	(ALKEM)	میٹرون سرپ
Metronidazole (as benzoyloxylate) 100mg per 5ml susp 60ml: Rs.10.45		
METRON-DF	(ALKEM)	میٹرون ڈی ایف
Metronidazole 400mg diloxanide furoate 500mg tabs 10: Rs.16.20		
MEXOGIL-F SUSP	(KANPHA)	مکسو جیل ایف سرپ
Metronidazole benzoate I.P equi. to Metronidazole 100mg, furazolidone I P. 25mg, flavoure vehicle q.s. per 5ml: 60ml: Rs.11.95		

PAKDIA SUSP

(PREM PHARMA)

Metronidazole 100mg, furazolidone 30mg per 5ml susp. 50ml bottle;
Rs.12.30

پکڈیا سرپ

PREMEZOL INJ

(PREM PHARMA)

Metronidazole 2mg, Dextrose 5% per ml; 500ml Rs. 35 00

پری می زول انجکشن

PREMOGYL INJ

(PREM PHARMA)

Metronidazole 5mg per ml; 100ml Rs.16.50

پری موجل انجکشن

TWINDIX KID TABS

(MAYO)

Metronidazole 100mg Nalidixic acid 150mg dispersible kid tabs 10;
Rs 26.00

ٹون ڈکس

TWINDIX SUSP

(MAYO)

Metronidazole 100mg Nalidixic acid 150mg per 5ml susp 30ml: Rs 21.00

ٹون ڈیکس سرپ

TWINDIX TABS

(MAYO)

Metronidazole 200mg nalidixic acid 300mg: tabs10: Rs.36.00

ٹون ڈکس ٹیبلٹ

TINIDAZOL**ٹنائی ڈازول**

افعال و منافع: امیبا انفکشن سے ہونے والے امراض، امیبا کی پیچش، امیبا کی ورم جگر آپریشن سے ہونے والے اثرات، سے محفوظ رہنے کے لیے مفید موثر ہے۔

مقدار و ترکیب استعمال: ۲ گرام پہلی خوراک پھر ایک گرام یا ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۵ سے ۷ دن تک حفظ مائتھرم کے لیے ۲ گرام پہلی خوراک آپریشن سے ۱۲ گھنٹہ پہلے۔ مہلکی انفکشن میں ۲ گرام پہلی خوراک دی جائے۔ ڈلوکسامائیڈ اور نارفلکساسین کے ساتھ یہ عمدہ کام کرتی ہے۔

منفی افعال: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں، ایام رضاعت میں، خون کی خرابی میں، عصبی خرابیوں میں۔

مضر اثرات: متلی، تھک، زبان میل، ذائقہ خراب، ہضم کی خرابیاں، خون کے مفید ذرات میں کمی جلد، داغ پڑنا، ہتی اچھلنا (شرئی) چکے پڑنا، عصبی خلل، پیشاب سیاہ آنا، طویل مدت تک علاج میں مرگی جیسے دورے پڑنا۔

احتیاط: حمل اور جگر کی خرابی میں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، مانع انجماد خون ادویہ، دافع مرگی ادویہ، ڈائی سلفورم سی می ٹی ڈین، لیجیم کے ساتھ استعمال خراب اثرات پیدا کرتا ہے۔

تجارتی مرکبات

AMEBIS FORTE	(RECON)	ایس بی فورٹ
Tinidazole 300mg, diloxanide furoate BP 500mg tabs; Price N/A		
AMIBICTIN-BD	(CFL)	ای بی کیمین
Diloxanide furoate I.P. 750mg, tinidazole 600mg tabs; 10tabs Rs.24.10		
DIAFLOX	(AGLOWMED)	ڈیافلاکس
Tinidazole 600mg, norfloxacin 400mg: f-c tabs: 10 Price: N/A		
DIALOX	(AGLOWMED)	ڈیالوکس
Tinidazole 300mg, diloxanide furoate 375mg, methyl polysiloxane 25mg: tabs: 10: Rs.17.47		
ENIDAZOL	(EAST INDIA)	انی ڈازول
Tinidazole 300mg, tabs: 10, Rs.12.78		
ENTROLATE TABS	(STADMED)	انٹرولیت
Tinidazole 500mg, diloxanide furoate 500mg; tabs 4. Rs.10.00		
FABIZOL	(UNICHEM)	فے بی زول
Tinidazole 300mg, 500mg; tabs: 300mg; 10: Rs.8.91, 500mg; 4. Rs. 5.74		
FASIGYN-500/DS	(PFIZER)	فیس گائن
Tinidazole 300mg diloxanide furoate 250mg tabs; 10, Rs 14.15		
NIDAGYL	(P&B LABS)	نڈا جیل
Tinidazole 300mg diloxanide furoate 250mg tabs; 10, Rs.14.15		
NORBID T	(ALEMBIC)	نار بی ڈی
Tinidazole 600mg, norfloxacin 400mg; tabs: 10: Rs. 67.00		
NORFOX-TZ	(CIPLA)	نار فلاکس ٹی زیڈ
Tinidazole 600mg, norfloxacin 400mg: tabs: 10: Rs.70.00		
NOXTIN	(wave)	نکس ٹن
Tinidazole 600mg, norfloxacin 400mg: tabs: 10: Rs.70.00		

TAGRID	(CORE)	ٹگرید
Tinidazole 300mg, Diloxanide furoate 500mg tabs; 10 Rs.20.00		
TINIBA INFUSION	(ALIDAC)	ٹینی باورس
Tinidazole 800mg per 400ml inj. 400ml vial: Rs.39.50		
TINI-300 - 500	(KOPRAN)	ٹائی نی ۳۰۰/۵۰۰
Tinidazole 300mg & 500mg tabs . 300mg: 10 : Rs.11.29 500mg: 10 : Rs.19.60		
TINI 75/150 SUSP	(KOPRAN)	ٹائی نی ۷۵/۱۵۰ سیرپ
Tinidazole 75mg & 150mg per 5ml susp 75mg 60ml: Rs.17.30, 150mg. 50ml: Rs.22.50; 60ml: Rs.27.00		
TINIBID-DS	(CROSLANDS)	ٹائی نی بیڈ
TINOR	(JENBURKT)	ٹینی نار
TINICIDE	(BLUE CROSS)	ٹائی نی سائیڈ
Tinidazole 300mg & 500mg tabs 300mg: 10: Rs.9.00 500mg: 10: Rs.15.00		
TINICIDE-DS	(BLUE CROSS)	ٹائی نی سائیڈ ڈی ایس
Tinidazole 1000mg tabs 6, Rs. 21.40		
TINICIDE FORTE	(BLUE CROSS)	ٹائی نی سائیڈ فورٹ
Tinidazole 300mg, Diloxanide furoate 250mg, Simethicone 25mg tabs 10: Rs.14.80		
TINIDAFYL	(JAGSONPAL)	ٹائی ڈی اے فیل
TINI-F SUSP	(KOPRAN)	ٹائی نی ایف سیرپ
Tinidazole 300mg Furazolidone 100mg Tabs 10 Rs.13.00		
TINI-F TABS	(KOPRAN)	ٹائی نی ایف ٹیبلٹ
Tinidazole 300mg Furazolidone 100mg Tabs 10: Rs. 13.00		
TINIFLOX	(CROSLANDS)	ٹائی نی فلاکس
Tinidazole 600mg, norfloxacin 400mg tabs 10: Rs.75.00		
TINOXIN	(KANPHA)	ٹینی نوکسن
Tinidazole I.P. 600mg, norfloxacin USP 400mg tabs: 10: Rs.5.95		
TRIDAZOLE	(FRANCO-INDIAN)	ٹریڈی ڈی اے زول
Tinidazole 300mg 500mg tabs 300mg: 10: Rs.9.03; 500mg: 4, Rs.6.19		
ZIL	(SARABHAI)	زیل
Tinidazole 300mg, 600mg & 1000 tabs; 300mg: 10, Rs.13.97; 600mg: 10,		

Rs.27.57; 1000mg: 4, Rs.21.33

ZOA FORTE (TATA PHARMA)

ZOACIDE DS (TATA PHARMA)

Tinidazole 1000mg tabs 6: Rs. 26.94

ZOACIDE -500 (TATA PHARMA)

Tinidazole 500mg tabs 4: Rs.10.00

زو آفورت

زو آسائیڈ ڈی ایس

زو آسائیڈ ہلپٹ ۵۰۰

دافع بکٹیریا اور دافع پروٹوزوا ادویہ

ANTI BACTERIAL ANTI PROTOZOAL

BERBERINE HCL

بربیرین ہائیڈروکلورائیڈ

CHLORAMPHENICOL

کلورم فینی کال

CHLOROQUINE PHOSPHATE

کلورو کوئن فاسفیٹ

COLISTIN SULPHATE

کولسٹین سلفیٹ

DI-iodo HYDROXYQUIN

ڈائی آئی ڈو ہائیڈروکسائی کوئن

FURAZOLIDON

فیورازولیڈون

NALIDIXIC ACID.

نالیڈک سک ایسڈ

NEOMYCIN

نیومائی سین

PHTHALYL SULPHATHAZOLE

پتھالائل سلفا تھازول

QUINODOCHLORE

کیوڈوڈوکلور

STREPTOMYCIN SULPHATE

سٹرپٹومیسن سلفیٹ

SULPHAGUANIDINE

سلفا گواناڈین

افعال و منافع: یہ تمام دوائیں کبھی تھما اور کبھی دو یا زیادہ دواؤں کے ساتھ مرکب شکل میں دستیاب ہوتی ہیں اس سے یہ زیادہ موثر ہو جاتی ہیں۔

یہ مرکبات، دبائی اور موسمی اسہال جراثیمی ہیچس موسم گرما کے اسہال، عراش اسہال کے سبب آنے

والے دست، تعفنی و متعدی اسہال میں مفید و موثر ثابت ہوتے ہیں۔

مقدار و ترکیب: ہر دوا کی الگ الگ ہے۔ مقدار خوراک کا تعین مرض اور حالات، دوا کے ساتھ پرچے کے مطابق کیا جائے۔

منفی افعال: حساس مریضوں میں، آیوڈین کے مرکبات کے دوران جگر کی خرابی اور آنتوں کی رکاوٹ میں ان کا استعمال مناسب نہیں۔

مضر اثرات: قے، متلی، ابکائی، درد سر، مع العظام میں خرابی، ہو سکتی ہے۔

احتیاط: خون کی خرابی، خون کی کمی، کلورم یعنی کال سے ہونے والے اہتمیا میں احتیاط لازم ہے۔

تجارتی مرکبات

ALDIAGRAM

(ALKEM)

الڈیاگرام

Nalidixic 150mg, metronidazole (as benzoate) 100mg per 5ml susp, 60ml
Rs. 28.90

AMIBEX NA

(SWIFT)

ایمیکس این اے

Nalidixic acid 300mg, metronidazole 100mg tabs 10 tabs Rx. 39.80

AMIBEX NA SYRUP

(SWIFT)

ایمیکس این اے سیرپ

Nalidixic acid 150mg, Metronidazole 100mg per 5ml liquid 30ml Rs. 23.98;
60ml Rs. 33.98

AMICLINE PLUP

(FRANCO-INDIAN)

امائی کلین پلس

Di-iodohydroxyquin 325mg chloroquine phos 85mg oxytetracycline Hcl 170
mg tabs 10: Rs. 16.53

AMICLINE

(FRANCO-INDIAN)

امائی کلین

Di-iodohydroxyquin 325mg chloroquine phos 85mg tabs 10: Rs. 11.91

BACTOMET TABS

(WIN MEDICARE)

بکٹومت

Nalidixic acid 500mg, Metronidazole 200mg tabs; 10x4 Rs. 25.00

BACTOMET SUSP

(WIN MEDICARE)

بکٹومیٹ سیرپ

Nalidixic acid 300mg, Metronidazole 200mg susp; 30ml Rs. 35.65

BACTOMET 'C' TABS (WIN MEDICARE)	بیکٹومیٹ سی ٹیبلٹ
Nalidixic acid 250mg, Metronidazole 100mg tabs, 10x6 Rs.224.00	
BACTOMET 'C' SUSP (WIN MEDICARE)	بیکٹومیٹ سی سیرپ
ENTERODIX (ALBERT DAVID)	انٹروڈیکس
Nalidixic acid 500mg tabs 10. Rs.37.43	
ENTERODIX SUSP (ALBERT DAVID)	انٹروڈیکس سیرپ
Nalidixic acid 300mg per 5ml susp 30ml Rs 17.83	
ENTROFURAN-M CAPS (DAYS)	انٹروفوران ایم
Furazolidone 100mg metronidazole 300mg caps: caps 10: Rs.7.92	
ENTROFURAN-M-SUSP (DAYS)	انٹروفوران ایم سیرپ
Furazolidone 33mg metronidazole benzoate equal to metronidazole 100mg simethicone 25mg per 5ml susp: 60ml : Rs.9.45	
ENTERO QUINOL (EAST INDIA)	انٹروکیوٹال
Quiniodochlor, 250mg: tabs: 20: Rs 6 57	
ENTEROZYME SUSP (STADMED)	انٹروزائم سیرپ
Metronidazole benzoate equiv to metronidazole 100mg, nalidixic acid 150mg: 30ml syrup: Rs.21 50	
ENTEROZYME TABS (STADMED)	انٹروزائم ٹیبلٹ
Iodochlorohydroxyquin. 250mg diastase (amylolytic activity) 1.800 derived from asperglus oryza) 45mg. 10 tabs: Rs. 7.50	
FALMENDAL TABS (FALMA)	فال مینڈل ٹیبلٹ
Metronidazole 300mg, Furazolidone 100mg; Dimethyl polysiloxane 25mg tabs; 10 Rs.6.96	
FORTENAL (PFIMEX)	فورٹی نال
Metronidazole 200mg, Nalidixic acid 300mg tabs Price N/A.	
FUDONE/FUDONE-M (EUPHORIC)	فوڈون / فوڈون ایم
Furazolidone 100mg tabs, SUSP Furazolidone 50mg per 5ml susp. 60ml & 450ml; metronidazole 200mg & furazolidone 50mg per 5ml susp. 60ml & 450ml; metronidazole 400mg & furazolidone 100mg tabs; Price N/A	
FUMEDIL (ETHNOR)	فیو میڈل
Furazolidone 50mg Metronidazole 200mg Dicyclomine Hcl 10mg caps 10, Rs 17 71	

FURANOL-M SUSP	(CARMINOL)	فیورانول ایم
Furazolidone 25 mg, Metronidazole Benzoate Eq. to Metronidazole 75mg		
60ml: Rs. 12.96		
FUROXONE	(SMITHKLINE)	فیوراکسون
Furazolidone 100mg tabs 10. Rs.2.34		
FUROXONE SUSP	(SMITHKLINE)	فیوراکسون سیرپ
Furazolidone I.P. 250 mg per 5 ml susp: 60ml: Rs 6.58		
GRAMOGYL	(STANCARE)	گراموجل
Nalidixic acid 300mg metronidazole 200mg: tabs 6: Rs.23.85		
GRAMOGYL SUSP	(STANCARE)	گراموجل سیرپ
Nalidixic acid 150 mg, metronidazole 100mg per 5ml susp Price N/A		
GRAMONEG	(RANBAXY)	گرامونیک
Nalidixic acid 500mg tabs; 4 tabs Rs.18.46		
GRAMONEG SUSP	(RANBAXY)	گرامونیک سیرپ
Nalidixic acid 300mg per 5ml; 30ml Rs. 18.50; 60ml Rs 32.00		
IMOSEC-S	(ETHNOR)	آئی موسیک۔ ایس
Streptomycin sulph, 500mg Loperamide Hcl 2mg caps; 4 cps Rs. 11.89		
INSEPTIN	(IDPL)	انسپٹین
Strptomycin suph 125 mg, sulphadimidine 250mg, berberine Hcl 150mg, pectin 25mg, cps: 10: Rs.10.71		
NADIX ACUTAB	(TROIKAA)	ناڈیکس ایکوٹیپ
Nalidixic acid 300mg: dispersible tabs: 6: Rs. 16.50		
NALIDYS	(BIOLOGICAL E)	نالیڈیس
Nalidixic acid 300mg, Metronidazole I.P. 200mg tabs; 10: Rs 45.18		
NALIDYS SUSP	(BIOLOGICAL E)	نالیڈیس سیرپ
Nalidixic acid 150mg, Metronidazole benzoate equib. to metronidazole 100mg per 5ml susp: 60ml: Rs.31.81		
NEGADIX M	(CFL PHARMA)	نی گاڈکس ایم
Nalidixic acid 300mg, Metronidazole 200mg tabs; 6 Rs. 21.00		
NEGADIX M SUSP	(CFL PHARMA)	نی گاڈکس ایم سیرپ
Nalidixic acid 150mg, Metronidazole 100mg per 5ml susp: 60ml: Rs.28.00		
NOVONIDAGYL SUSP	(P&B LABS)	نوونڈا جیل سیرپ
Furazolidone 50mg, metronidazole benzyloxalate 200mg,		

di-iodohydroxyquinoline 250mg per 10ml susp, 60ml Rs 15.74

NOVONIDAGYL TABS (P&B LABS)

نوونڈا جل ٹیبلٹ

Furazolidone 50mg, metronidazole 200mg, di-iodohydroxyquinoline 250mg, tabs; 10: Rs.12 03

PESULINE-O

(CADILA)

پیسولن او

Phthalyl sulphathiazole 1G, Pectin 150mg Kaolin 3G Tinc opium 0 08ml per 15ml susp, 60ml Rs 26 40, 450ml Rs 65 20

QUGYL

(SEARLE)

کوئی جل

Di-iodohydroxyquin 250mg metronidazole 250mg tabs 10 Rs 11 12

QUGYL SYRUP

(SEARLE)

کوئی جل سیرپ

Di-iodohydroxyquin 200mg metronidazole 200mg per 5ml susp 50ml Rs.17 35

SARIL

(RALLS)

سارل

Streptomycin sulph. 240mg, Phthalyl sulphathiazole 200mg Di-iodohydroxyquin 125mg tannic acid 50mg pectin 10mg tabs. 10tabs Rs.9 51

SPAGYL SUSP

(INDOCO)

اسپا جل سیرپ

Nalidixic acid 150mg, metronidazole 100mg per 5ml susp 30ml: Rs 20 50

STREPTOMAGMA

(WYETH)

سٹریپٹوماگما

Streptomycin 150mg, attapulgit 350mg Pectin 45mg Dried alum hydrox gel 70mg tabs; 10tabs Rs.8.72

STREPTOMAGMA GEL (WYETH)

سٹریپٹوماگما جل

Streptomycin 150mg Kaolin I. 5G Pectin 135mg, Alum, hydrox 200mg per 15 ml; 100ml Rs. 11.74; 450ml Rs.42 94

TINIFLOX

(CROSLANDS)

ٹینی فلاکس

Tinidazole 600mg, norfloxacin 400mg; tabs 10: Rs 75 00



NORTIZOLE

Action

(Norfloxacin + Tinidazole)

Diarrhoea and Dysentery of Amoebic / Bacterial / Mixed origin

Manufactured in India



Maxcare

DRUGS & PHARMACEUTICALS LTD.

G-1/566-568, RKCO IND AREA, BHIMADI AT A-1126, GICD Ind Area, Phase-II, (Gurgaon-201012)

INDIAN PHARMACEUTICALS

آنتوں کی حرکات دودویہ کو ست کرنے والی ادویہ

ANTIMOTILITY

DIPHENOXYLATE

والی فینوکسائی لیٹ

افعال و منافع: دست آنا (اسہال)، جراثیمی اسہال، پانی جیسے دست آنا آنتوں کی حرکات میں تیزی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد شدید حالت میں ۱۰ ملی گرام پہلی خوراک بچوں کو آدمی ملی گرام رنی کلو گرام وزن کے حساب سے دینا چاہیے۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو اور ایک سال سے کم عمر کے بچوں کو نہیں دینا چاہئے۔

مضر اثرات: تے، متلی ابکائی، بھوک کی کمی، خلل شکم، سستی خشکی، الجھن بے چینی یو فوریا، پتی اچھلنا (شرعی) الرجی، کھجلی پیدا ہو سکتی ہے۔

احتیاط: چھوٹے بچوں کو اور جسم میں پانی کی شدید کمی میں احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے

تجارتی مرکبات

LOMOFEN

(SEARLE)

لوموفن

Diphenoxylate Hcl 2.mg, atropine sulph 0.05gm furazolidone 50mg tabs.10:

Rs.2.02

LOMOTIL

(SEARLE)

لوموتیل

Diphenoxylate Hcl 2.25mg, atropine sulph.0.025mg: tabs 10: Rs.2.40

لوپیرامائیڈ LOPERAMIDE

افعال و منافع: یہ ایک مصنوعی تیار کردہ دافع اسہال دوا ہے اپنے مخصوص اثرات سے آنتوں کی حرکات و دود یہ کے فعل میں سستی پیدا کرتی ہے۔ شدید اسہال و روم اور نفکشن سے ہونے والے دست میں مفید ہے پیراسائیٹ مثلاً سالمونیلہ۔ شگبیلہ سے ہونے والے دستوں اور آنتوں میں خراب فاسد مادوں کی موجودگی میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

مقدار و ترکیب: پہلی خوراک ۴ ملی گرام بعد کو ہر دست کے بعد ۲ ملی گرام دینا چاہیے۔

منفی اثرات: قبض میں اور لوپیرامائیڈ سے حساس مریضوں کو دینا مناسب نہیں۔

مضر اثرات: درد شکم، بے چینی، قبض خشکی، سستی، منہ خشک ہونا، متلی تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔

احتیاط: آنتوں کے زخم، ورم اور ۲ سال سے کم عمر بچوں میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

DIARLOP	(JAGSONPAL)	ڈائرلوپ
Loperamide Hcl 2mg. caps 10.	Rs.6 25	
DIARLOP SOLN	(JAGSONPAL)	ڈائرلوپ سرپ
Loperamide Hcl 0.2mg per ml liquid; 30ml	Rs.5 90	
DIARLOP PLUS	(JAGSONPAL)	ڈائرلوپ پلس
Loperamide Hcl 2mg, furazolidone 100mg caps, 10 caps	Rs 11 50	
DIARLOP PLUS SUSP	(JAGSONPAL)	ڈائرلوپ پلس سرپ
Loperamide hcl 1mg. Furazolidone 35mg per 5ml. 50ml	Rs 19 00	
IMODIUM	(JAGSONPAL)	اموڈیم ٹیبلٹ
Loperamide Hcl 2mg Tabs 4	Rs.3 57	
IMODIUM LIQUID	(ETHNOR)	اموڈیم سرپ
Loperamide Hcl 0 2mg per ml Liq 30ml:	Rs. 5.15	
IMOSEC-F	(ETHNOR)	اموسیک
Loperamide 2mg, furazolidone 100mg. caps: 4	Rs 10 90	

LOPAMIDE (TORRENT)

Loperamide Hcl 2mg tabs 10: Rs. 5.02 100: Rs. 30.50

لوپامائیڈ

NILAMIDE (LA PHARMA)

loperamide Hcl 2mg tabs 10: Rs. 3.20

نلامائیڈ

RIDOL SOLN (GUFIC)

Loperamide Hcl 0.2mg per ml soln 30ml: Rs.5.40

ریڈول

TYLOX-2 (DEEPHARMA)

Loperamide Hcl 2mg, per 5ml; 30ml: Rs.6.20

ٹائی لوکس

Also capsules Loperamide hcl 2mg, caps 6 Rs. 2.28

ANTI HAEMORRHOIDAL

دافع بواسیر مراہم

TOPICAL PREPARATION**Betamethasone VELERATE**

بٹامیٹھاسون ویلیریت

HYDRO CORTISONE ACETATE

ہائیڈروکارٹی سون ایسیٹیٹ

افعال و منافع: معدے کے درم، درد اور جلن میں مفید ہے، مقعد سے خون آنے مقعد کے پھٹ جانے، اندرونی اور بیرونی بواسیری مسوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے مفید و مجرب ہے۔

متقی اثرات: بٹامیٹھاسون اور کارٹی سون کے مرکبات انفکشن کی حالت میں اسی وقت استعمال کرائے جائیں جب خصوصی انفکشن کی دوا بھی چل رہی ہو۔

مضر اثرات: طویل عرصہ تک استعمال سے مقامی جلد میں خرابی آسکتی ہے۔

احتیات: یہ مرکبات حاملہ کو اور لمبی مدت تک استعمال سے پرہیز کریں۔

تجارتی مرکبات**ANOVATE**

(GLAXO)

انوویٹ

Betametthosone valerate 0.05% Phenyl ephirine Hcl 0.1% lignocaine hcl
2.5% oint; 15G Rs.8.62

MEDITHANE

(EYETH)

میڈی تھین

Hydrocortisone acetate 0.25% skin resp. factor derived from yeast cells 70.55 in shark liver vit equiv. to vit-A 180 in Bit-A 570 in phenil mercuric nitrate 0.01% per G oint 12 G Rs. 6.77

PROCTO SEDYL

(ROUSSEL)

پراکٹوسیدائل

Hydrocortisone acetate 5.58mg sodium heparinate 100 im soframycin 10mg Esculoxide 10mg Ethoform 10mg Butoform 10mg per G oint 10G Rs 20.77

PROCTO SEDYL-M

(ROUSSEL)

پراکٹوسیدائل-ایم

Framycetin sulph. 5mg Hydrocortisone acetate 2.79mg Esculoxide 5mg Ethyl aminobenzote 5mg butylaminobenzoate 5mg ointmet base to 500mg rectal caps; 20 caps Rs. 21.84

DIOSMIN

ڈایوسمین

افعال و منافع: یہ دوا عضلات کو سکڑتی (انقباض) پیدا کرتی ہے معدہ کی دیواروں کو مضبوط کرتی ہے رگوں کا پھولنا (انورسما) میں مفید ہے۔ آلات منع حمل سے ہونے جریان میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۴۰۰ سے ۶۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار کھانے کے ساتھ کم از کم ۴ ہفتہ دوا جاری رکھنا چاہیے۔

منفی اثرات: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

مضر اثرات: معدہ اور آنتوں میں خلل، پتی اچھلنا، سرخ دانے لگانا۔

تجارتی مرکبات**VENEX 300/500**

(ELDER)

دے نکس ۵۰۰/۳۰۰

Pure synthetic diosmin 300mg & 500mg tabs: 300mg: 10: Rs.79.50, 500mg :10: Rs.129.25

VENUSMIN

(MARTIN & HARRIS)

دے نس مین

Pure synthetic diosmin 150mg, 300mg, tabs. Haemorrhoids. Varicose veins Menorrhaga, metrorrhagia. IUD intolerances, fuctional venous disorderr. 150mg : 8, Rs. 42.95; 300mg: 8, Rs.85.00

FLUORO CORTOLONE فلورو کارٹولون

افعال و منافع: بواسیر، درم مقعد، غشاء مخاطی کا متورم ہونا، درد و کھجلی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اجابت سے فارغ ہو کر اور سوتے وقت ایک سپازیٹری (پتی) مقعد میں رکھیں یا مرہم لگائیں۔

منفی اثرات: ٹی بی اور آتشک کی موجودگی میں وائرس سے پیدا ہونے والے امراض اور حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: طویل عرصہ استعمال سے مقامی ساختوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔

تجارتی مرکبات

ULTRAPROCT SUPPOSITORIES (GERMAN REMEDIES) الزاپراکٹ (پتی)

Fluocortolone pivalate 0.61 mg Fluocortolone caproate 0.63mg cinchocaine Hcl 1mg suppos 5: Rs 30.76

ULTRAPROCT OINT (GERMAN REMEDIES) الزاپراکٹ مرہم

Fluocortolone pivalate 0.92mg Fluocortolone caproate 0.95mg cinchocaine Hcl 5mg per g ointment 5g: Rs 30.50

Poli CRESULEN پالی سری سولین

افعال و منافع: بواسیر کے خون کور دکتی ہے معدہ کے عضلات کے ریشوں میں سختی پیدا کرتی ہے ہوا سیر کے درم کو فائدہ پہنچاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: دن میں ۲ بار اجابت کے بعد استعمال کریں۔

مضر اثرات: مقامی طور سے جلن محسوس ہوتی ہے لیکن جلد ختم ہو جاتی ہے۔

تجارتی نام:

فاکٹو

FACTU (CROSLANDS)

Policresulen 50mg, cinchocaine 10mg per g oint: 15g: Rs.40.00

QUINIDOCHELOR

کوئی نی ڈوکلور

افعال و منافع: بواسیر کے لئے مفید ہے مسوں پر لگانے سے کھجلی، بے چینی دور کرتی ہے دافع جراثیم اور فنگس کے انفکشن میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: دن میں ۳-۴ بار یہ دوا مسوں پر لگائیں۔

مضر اثرات: جلد پر دھبے دھاریاں پڑنا، حساسیت، کھجلی، ہو سکتی ہے۔

احتیاط: حساس مریضوں پر برے اثرات نمودار ہونے پر دوا روک دینا چاہیے۔

تجارتی مرکب

PROCTO QUINOL

(EAST INDIA)

پراکٹو کیونال

Quiniodochlor I.P. 4% w/w Benzocaine I.P. 5% w/w in an emollient base ointment 25g Price N/A

ANTI SPASMODICS

دافع درد شکم ادویہ

DICYCLOMIN H.C.L.

ڈائی سائیکلومین ہائیڈروکلور

افعال و منافع: شکم کے عضلات کی اسپٹھمن (تشنج) میں مفید ہے۔ پتہ (مرارہ) آنتوں اور آلات بول کے شدید دروں کو سکون پہونچاتی ہے۔ حیض کا درد معدہ، آنتوں کے درد زخم اور تیزابیت کو دور کرنے کے لئے دوسری دواؤں کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے اور مفید ثابت ہوتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

منفی رد عمل: جگر کی کمزوری (ہزال الکبد) شراب کے ساتھ، پیشاب کے رکاوٹ میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، آنتوں کی حرکات کو اور عضلات کے طبعی افعال میں خلل پیدا ہوتا ہے۔

احتیاط: گلوکوما، غده قدامیہ بڑھ جانے جگر اور گردوں کے امراض میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

COLIMEX DROPS	(WALLACE)	کولی مکس ڈراپس
Dicyclomine Hcl 10mg Activated dimethicone 40mg per ml drops 30ml		
Rs.10.00		
COLIMEX TABS	(WALLACE)	کولی مکس ٹبلیٹ
Dicyclomine Hcl 20mg; Paracetamol 500mg tabs; 10: Rs.5.55		
CYCLOMINOL	(NOEL)	سائیکلومینال
Dicyclomine Hcl 20mg; tabs; 10: Rs.4.00		
CYCLOPAM TABS	(INDOCO)	سائیکلوپام ٹبلیٹ
Dicyclomine Hcl 20mg paracetamol 500mg tabs 10: Rs. 7.30		
CYCLOPAM DROPS	(INDOCO)	سائیکلوپام ڈراپس
Dicyclomine Hcl 10mg, dimethyl polysiloxane 40mg per ml liquid. 10ml:		
Rs.9.50		
CYCLOPAM INJ	(INDOCO)	سائیکلوپام انجکشن
Dicyclomine Hcl 10mg per ml inj 2ml amp: Rs.2.37		
CYCLOPAM SUSP	(INDOCO)	سائیکلوپام سیرپ
Dicyclomine Hcl 10mg, dimethyl polysiloxane 40mg per 5ml susp 30ml:		
Rs.8.00		
DYSMEN INJ	(SIGMA LABS)	ڈائی سمن انجکشن
Dicyclomine Hcl 10mg per ml inj. 10ml vial. Rs.8.89		
FALMASPAS	(FALMA)	فال ماسپاس
Dicyclomine Hcl 10mg paracetamol 500mg tabs 10: Rs 4.99		
MEFTAL SPAS	(BLUE CROSS)	میفتال اسپاس
Dicyclomine Hcl 10mg mefenamic acid 250mg tabs 10: Rs.11.75		
NEUROSPAS	(SWIFT)	نیورو اسپاس
Dicyclomine Hcl 10mg, acetaminophen 400mg caps; 10: Rs. 11 72		
NEUROSPAS FORT	(SWIFT)	نیورو اسپاس فورٹ
Dicyclomine Hcl 20mg, acetaminophen 500mg caps; 10: Rs. 15.35		
NEUROSPAS DROPS	(SWIFT)	نیورو اسپاس ڈراپ
Dicyclomine 10mg, activated dimethicone 40mg per ml liquid; 15ml		
Rs.14.92		

NORMAXIN

(SYSTOPIC)

تارکسین

Cidinium bromide 2.5mg chlordiazepoxide 5mg Dicyclomine Hcl 10mg;
tabs; 10: Rs.9.00

PARVON-SPAS

(JAGSONPAL)

پارون اسپاس

Dextropropoxyphene Hcl 6.5mg-Dicyclomine Hcl 10mg Paracetamol 400mg
caps; 10caps Rs.12.30

REZIPENN

(CONCEPT)

رے زی پن

Dicyclomine Hcl 10mg, dextropropoxyphene Hcl 65mg, paracetamol 500mg;
10 tabs: Rs. 16.50

SPASMO-PROXYVON

(WOCKHARDT)

اسپازموپراکسیون

Dicyclomine Hcl 10mg, dextropropoxyphene Hcl 65 mg, acetaminophen
400mg; caps; 8 : Rs.9.70

ZE-SPAS

(KEE-PHARMA)

زی اسپاس

Dicyclomine Hcl 10mg, mefenamic acid 250 mg; tabs: 10: Rs.11.50

PROPAN THELENE پروپان تھی لین

افعال و منافع: معدہ آنتوں میں درد دور م بے چینی درد گردہ و مثانہ، پسینہ کی زیادتی پتہ کے درد دور م میں مفید ہے۔ آنتوں کے امراض کی جانچ اور زخم معدہ میں دیگر دواؤں کے ساتھ مفید رہتی ہے۔
مقدار ترکیب: زخم معدہ میں ۱۵ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے سے آدھے گھنٹہ قبل، ۳۰ ملی گرام سوتے وقت۔

منفی اثرات: گلوکوما، معدہ اور آلات بول میں رکاوٹ، شدید زخم قولون میں اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔
مضر اثرات: خشکی آنکھ کی پتلی کا پھیل جانا۔ بصارت میں فرق۔ آنکھوں میں تناؤ اور عضلات العین میں خلل۔ گرمی کا احساس، منہ خشک، پسینہ کی کمی، قبض، دودھ کی کمی، ضعف ہاہ الرجی، پتی اچھلانا۔
احتیاط: دوا کے استعمال کے دوران ڈرائیوری اور مشینوں کا استعمال ممنوع ہے۔

تجارتی مرکبات

PROBANTHINE

(SEARLE)

پروبان تھین

Propantheline bromide 15 mg Tabs 10: Rs. 9.35

SEREBANTHINE

(SEARLE)

Propantheline bromide 15mg haloperidol caps 0.2mg 10. Rs 17.50

سیری بن حصین

SPASTHELENE

(SUN PHARMA)

Propantheline bromide 15mg: tabs; 10: Rs.3 98

اسپاس تھیلین

ATROPINE SULPHATE اٹروپین سلفیٹ

افعال و منافع: یہ درد کو دور کرنے، فم معده کے درد، بچوں کے قونج کے درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بچوں کو 0.05 ملی گرام سے 0.01 ملی گرام دودھ پلانے سے ۱۵ منٹ پہلے دن میں

۳-۴ بار۔

منفی افعال: بخار کی تیزی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: منہ خشک، وجع القلب، پیشاب تکلیف سے آنا پیاس لگنا، تپلی پھیلنا قبض قے، چکر آنا۔

احتیاط: ۲ سال سے کم عمر بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں لہذا ان کو استعمال نہ کرائیں۔

CAMYLOFIN-DI-HCL کے مائی لوفین ڈائی ہائیڈرو کلورائیڈ

افعال و منافع: آنسو، پیشاب کی نالی پتہ کی نالی میں شدید درد، حیض کا درد، عضلات کے تشنج سے ہونے والے درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام ۲-۳ بار روزانہ۔

منفی اثرات: حسیت، گلوکوما، غدہ قدامیہ کے بڑھ جانے قنات غذائی کا تنگ ہونا فم معده یا بواب کے تنگ ہونے میں استعمال کرنا مضر ہے۔

مضر اثرات: جلد پر دھبے پڑنا، حسیت، الرجی، اٹروپین کی طرح مضر اثرات

احتیاط: غدہ درقیہ کا بڑھنا، ہوائی نالیوں میں تسد، دل کے آپریشن، بڑھاپے تیز بخار اور غدہ قدامیہ کے بڑھ جانے میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

AVACAN

(KHANDELWAL)

اے واکان

Camylofin (as dihydrochloride) 50 mg tabs: 10: Rs.10.;94

ANAFORTAN

انافورٹان

زخم معدہ میں کام آنے والی ادویہ

ANTI ULCER DRUGS

ان کو ایچ ٹوری سپر H₂ RECEPTOR بھی کہتے ہیں یہ معدہ میں پیدا ہونے والے تیزابی مادے GASTRIC ACID پیپسین وغیرہ کی افزائش کو روکتے ہیں ان میں درج ذیل دوائیں شامل ہیں۔

CIMETIDINE

سائی می ٹی ڈین

FAMO TIDINE

فاموٹی ڈین

RANI TIDINE

رینی ٹی ڈین

افعال و منافع: آنتوں کے زخم آپریشن کے بعد کے زخم، خراش معدہ اور اس سے بچاؤ حفظ ماتقدم کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: سائی می ٹی ڈین ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار یا ۴۰۰ ملی گرام دن میں ایک بار آنتوں کے زخم میں ۲۰۰ ملی گرام صرف سوتے وقت ۴ سے ۶ ہفتہ تک استعمال کرائیں۔ زخم کی حالت میں ۶ ماہ سے ۱ سال تک استعمال کرائیں۔

رینی ٹی ڈین: ۱۵۰ ملی گرام دن میں ۲ بار یا ۳۰۰ ملی گرام دن میں اپار آنتوں کے زخم اور احتیاطی تدابیر کے لئے ۱۵۰ ملی گرام سوتے وقت ۶ ماہ سے ۱ سال تک کھلائیں۔

فاموٹی ڈین: ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار یا ۴۰۰ ملی گرام صرف اپار آنتوں معدہ کے زخم اور مکمل علاج کے لئے ۶ ماہ سے ۱ سال تک کھلائیں۔

مضرات: جلد پر داغ دھبے پڑنا، سر درد، چکر آنا، اسہال، ٹکان، کبھی ذہنی الجھن ہونا۔

احتیاط: جگر اور گردے کی خرابی میں حمل اور دودھ پلانے کے ایام میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

ACILOC	(CADILA)	ایسی لاک
Ranitidine Hcl 150 mg & 300 mg Tabs 150 mg: 10; Rs. 10.06 300 mg: 10; Rs. 18.76		
ACILOC INJECTION	(CADILA)	ایسی لاک انجکشن
Ranitidine Hcl 50 mg/2 ml inj 2ml: Rs. 3.40		
ACIPEP	(SARABHAI)	ایسی پپ
Famotidine 20 mg & 40 mg Tabs: 20 mg : 10x10: Rs. 268.80 40 mg: 10x10: Rs. 526.40		
ACREDIN	(SARABHAI)	ایکریڈن
Famotidine 20 mg & 40 mg Tabs: 20 mg: 10 : Rs. 3.80, 40 mg 10: Rs. 6.40		
ADVANTAC	(WIN-MEDICARE)	ایڈوانٹیک
Famotidine 20 mg, 40 mg; tabs; 20 mg; 10: Rs. 21.96, 40mg: 10: Rs. 36.68		
ADVENE	(BOOTS)	ایڈوین
Ranitidine 150 mg & 300 mg Tabs 150 mg: 10 Rs. 19.47 300 mg : 10. Rs. 37.78		
ALPRODINE 150/300	(REMEDIES)	ال پروڈین
Ranitidine 150 mg & 300 mg tabs; 150 mg 10 Rs. 11.90; 300 mg 10 Rs. 22.90		
BLOCACID	(IPCA)	بلو کا سڈ
Famotidine 20, 40 mg tabs 20 mg: 14 : Rs. 18.90; 40 mg: 14: 34.00		
CONSEC	(JAGSONPAL)	کن سیک
Ranitidine Hcl 150 mg, 300mg; tabs: 150 mg; 10: Rs. 18.84, 300 mg: 10: Rs. 36.58		
FACID	(INTAS)	فاسڈ
famotidine 20 mg & 40 mg Tabs 20 mg 14: Rs. 13.80; 40 mg 14: Rs. 27.00		
FACID AC	(INTAS)	فاسڈ ایک
Famotidine USP 10 mg : tabs: 14: Rs. 8.20		
FACID INJECTION	(INTAS)	فاسڈ انجکشن
Famotidine 20 mg/ml inj 2 ml amp. Rs. 9.20		
FADINE	(ARISTO)	فائین
Famotidine 20 & 40 mg Tabs 20 mg: 10 : Rs. 10.00 40 mg : 109. Rs. 20.00		

FALTIDIN	(ALKEM)	قالٹی ڈین
Famotidine 20 mg & 40 mg tabs 20 mg: 10 : Rs. 24.00 mg: 10: Rs.46.10		
FAMOCID	(SUN PHARMA)	قاموسڈ
Famotidine 20 & 40 mg Tabs 20 mg: 10 : Rs.15.40; 40 mg : 10: Rs.28.10		
FAMOFAST	(FDC)	قاموفاست
Famotidine 20 mg & 40 mg Tabs 20 mg: 14: Rs. 19.45 40 mg : 14: Rs.35.65		
FAMONITE	(ALIDAC)	قامونائٹ
Famotidine 20 mg & 40 mg Tabs 20 mg: 14: Rs. 551; 40 mg : 14: Rs.9.86		
FAMOPRIL20/40	(RECON)	قاموپرل
Famotidine 20 mg/40 mg, film coated tabs. 20 mg 14 Rs. 18.20: 40 mg 14 Rs.22 60		
FAMORILA	(GLENMARK)	قاموریل
Famotidine 20 mg/40 mg , tabs 20 mg 14: Rs. 25.50; 40 mg 14: Rs. 45 50		
FAMOTIN 20	(U.S.V.R.P)	قاموٹین
Famotidine 20 mg 40 mg , tabs 20 mg 10: Rs.26.05 40 mg . 10: Rs. 51 35		
FAMOTIN SUSP	(U.S.V.R.P)	قاموٹین سیرپ
Famotidine 40 mg/5ml powder 30 ml: Rs. 37.35		
FAMOWAL	(WALLACE)	قامووال
Famotidine 20 mg /40mg , tabs 20 mg 10: Rs. 15.40; 40 mg 10: Rs. 28.00		
FAMTAC	(NICHOLAS)	قام ٹیک
Famotidine 20 mg & 40 mg Tabs 20 mg: 14: Rs. 14.00, 40 mg. 14: Rs. 28 00		
FUDONE	(WOCKHARDT)	فموڈین
Famotidine 20 mg/40 mg tabs, tabs 20 mg 10 Rs.12.80; 40mg 10 Rs.26.15		
HISTAC	(RANBAXY)	ہس ٹیک
Ranitidine (as Hcl) 150 mg & 300 mg: tabs 150 mg . 10 tabs Rs. 18 62, 300mg: 10: Rs.36.12		
HISTAC INJ	(RANBAXY)	ہس ٹیک انجکشن
Ranitidine Hcl 25mg per ml inj. 2ml amp: Rs.2.96		
LYDIN	(LYKA)	لائی ڈین
Ranitidine as Hcl 150 mg & 300 mg Tabs 150 mg: 10: Rs. 18.61 300 mg: 10: Rs.36.23		

PEPGARD FORT	(RALLS)	ہیپ گارڈ
Famotidine 20mg Tabs: 10: Rs.28.14		
RANIAL	(ALBERT DAVID)	رے نیال
Ranitidine Hcl 150 mg and 300mg tabs 150 mg 10 Rs. 18.99, 300 mg 10 Rs 36.86		
RANTAC	(UNIQUE)	رین ٹیک
Ranitidine 150 mg & 300mg tabs 150 mg, 10, Rs. 10.09 300mg, 10, Rs.18.57		
RANTAC INJECTION	(UNIQUE)	رین ٹیک انجکشن
Ranitidine Hcl 150 mg per 2ml inj 1x2 ml, Rs.1.79		
RANTIDINE	(GLAXO)	رین ٹی ڈین
Ranitidine 50 mg/2ml inj 2 ml Rs.4.17		
RANITIDINE INJ	(PREM PHARMA)	رین ٹی ڈین انجکشن
Ranitidine 50 mg/2ml inj. 2ml amp. Rs.4.25		
RANITIN	(TORRENT)	رین ٹن
Ranitidine Hcl 150 mg & 300 mg tabs 150 mg 10, Rs 10.00; 300 mg 10, Rs.18.53		
RANITIN INJ	(TORRENT)	رین ٹن انجکشن
Ranitidine Hcl 25 mg per ml. inj. 2ml. amp Rs. 2.22		
RANTI TABS 150	(MICRO LABS)	رن ٹی
Ranitidine 150 mg and 300 mg tabs 150 mg 10 tabs Rs. 18.80, 300 mg 10 tabs price N/A		
RIDCER	(GUFIC)	رڈسر
Ranitidine (as Hcl) 150 & 300mg tabs 150 mg, 10, Rs.19.10; 300 mg, 10, Rs.37.15		
RIDCER INJ.	(GUFIC)	رڈسر
Ranitidine (as Hcl) 25 mg per ml; inj 2ml amp Rs.3.40		
RINTID	(KOPRAN)	رن ٹیڈ
Ranitidine Hcl 150 mg & 300mg tabs 150 mg: 10, Rs.19.00 300mg : 10, Rs.36.86		
TACUL 20/40	(SYSTOPIC)	ٹاکل
Famotidine 20 & 40 mg, tabs: 20 mg: 10: Rs. 20.52, 40 mg: 10: Rs.39.90		

TOBUR	(THEMS PHARMA)	ٹا بر
Famotidine 20 & 40 mg tabs 20 mg 10 Rs 22 72 40 mg 10 Rs. 45.41		
TOPCID	(TORRENT)	ٹاپ سڈ
Famotidine 20 mg/40 mg, tabs 20 mg 10. Rs.23 60 40 mg 10 Rs 46 94		
ULCEREX 150/300	(DEE PHARMA)	السی ریکس
Ranitidine (as Hcl) 150 mg and 300 mg tabs, 150 mg : 10 Rs. 19.00, 300mg 10 Rs 36 50.		
ULCIBAN	(TORRENT)	السی بان
Cimitidine 200mg & 400mg tabs 200mg . 10 Rs. 12 95 400mg . 10. Rs 25 80		
ULCIMAX	(PROTEC)	السی میکس
Famotidine 20 mg & 40 mg tabs 20 mg 14: Rs 30 40, 40 mg 10 00. Rs 41.37		
ULCINIL-F	(INGA)	السی فل
Famotidine U.S P 20 mg/40 mg tabs, 20 mg: 10, Rs.22.00; 40 mg 10, Rs.43.00		
ULCITAB	(THEMIS PHARMA)	السی ٹیب
Ranitidine (as Hcl) 150 mg & 300 mg Tabs 150 mg: 10: Rs.14.22 300 mg 10 Rs 18 76		
ULTAC	(CIPLA)	الٹیک
Ranitidine Hcl 150 mg & 300mg 150 mg . 10 Rs 18.92 300mg : 10: Rs 36 72		
ULTIDIN	(MALLADI)	الٹی ڈین
Ranitidine Hcl 150 mg & 300 gm tabs 150 mg 10x10 Rs. 189.00; 300mg 10x10 Rs.366.80		
ZACTANE	(WYETH)	زاک ٹین
Famotidine 20 & 40 mg tabs 20 mg : 14: Rs.31.10 40 mg : 14: Rs. 60.10		
ZINETAC	(GLAXO)	زن ٹیک
Ranitidine as Hcl 150 mg and 300 mg tabs 150 mg. 10. Rs. 18 78; 300 gm : 10. Rs.36.43		
ZORAN	(STANGEN)	زوران
Ranitidine (as Hcl) 150 mg & 300 mg tabs; 150 mg: 10 Rs. 10.09; 300 mg Price N/A.		

رطوبات معدہ کی زیادتی کو روکنے والی ادویہ

PROTON PUMP INHIBITOR

لن سوپرازول LANSOPRAZOL

افعال و منافع: معدہ و آنتوں کے زخم کو مندمل کرنے، غذائی نالی کی سوجن ورم، پرانے زخم معدہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: آنتوں کے زخم میں ۳۰ ملی گرام روزانہ ۳ ہفتے کھلائیں، معدہ کے زخم میں ۳۰ ملی گرام ۸ ہفتے کھلائیں۔ معدہ اور آنتوں میں تیزابی مادے کی زیادتی میں ۶۰ ملی گرام دن میں ۱ بار کھانے سے پہلے دینا چاہیے۔

منفی اثرات: ایام حمل اور رضاعت میں، معدہ کے کینسر میں۔ دواسے حساسیت کی صورت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: اسہال، درد شکم، قبض، درد سر، چکر آنا، ناک و حلق کی جھلی میں ورم، جلد پر داغ پڑنا۔ احتیاط: جگر کے امراض میں طویل عرصہ تک استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈایازپام، فین ٹائٹن اور وٹامن بی ۱۲ کے انجذاب اور انہضام میں خلل پڑتا ہے۔

تجارتی مرکبات

LANPRO

Lansoprazole 30mg caps

LANSOL 30 - Lanprazol 30 mg

cap 10 Rs.58.00

SYLANS - Lansoprazol 30 mg 10

Rs.58.00

لین پرو

لین سول ۳۰

سائی لان

اومی پرازول OMIPRAZOL

افعال و منافع: آنتوں اور معدہ کے زخم کو مندمل کرتی ہے۔ معدہ میں تیزابیت کی پیدائش کو روکتی ہے، دواؤں کے اثرات سے ہونے والے زخم معدہ کو فائدہ پہنچاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: معدہ و آنتوں کے زخم میں ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام دن میں ابار صبح کو ۲ ماہ تک کھلائیں۔

منفی رد عمل: حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں اور بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: درد سر، چکر آنا، جی متلانا، اسہال آنا، درد شکم اور جلد پر داغ پڑنا۔

احتیاط: معدہ کے کینسر میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈایازی پام، فین ٹائن، وارفین، سائی ٹوکروم کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

HYKATAPASE	(MEDLEY)	ہائی کانا پیس
Opmeprazole 20 mg 4 caps: Rs. 34.40		
LOKIT	(KOPRAN)	لوکٹ
Omeprazole 20mg as e-c granules caps 7x4 : Rs. 110.60		
LOMAC	(CIPLA)	لو-یک
Enteric coated pellets equivalent to omeprazole 20 mg caps 10, Rs. 29.00		
LORESS	(BIOLOGICALE)	لوریس
Opemprazole 20mg e-c granules caps 10: Rs. 49.85		
NILSEC	(MAX)	نیل سیک
Omeprazole 20 mg e-c granules caps 10: Rs. 49.85		
OCID	(CADILA)	اوسڈ
Omeprazole 20 mg e-c granules caps 10: Rs. 47.50		
OMALCER	(WOCKHARDT)	او مل سر
Omeprazole 20 mg: e-c granules caps 10: Rs. 69		
OME-10/20	(DEYS)	اومی ۱۰/۲۰
Omeprazole 10mg & 20 mg tabs 10 mg: 10: Rs. 19.00, 20 mg : 10: Rs. 27.00		
OMEPRAL 10/20	(FDC)	اومی پرال
Omeprazole 10 mg & 20 mg e-c granules caps 10 mg 10 : Rs. 17.50 20 mg 10 Rs. 30.10		

OMEPREN 10/20

(BLUE CROSS)

Omeprazole 10 mg & 20 mg ; caps: 10 mg : 10: Rs. 17.00, 20 mg : 10: Rs.30.00

OMEPRAZ 10/20

(ALKEM)

Omeprazole 10 mg & 20 mg : caps: 10 mg: 10: Rs. 20.00, 20 mg : 10: Rs.30.00

OMEZ

(STANGEN)

Omeprazole 20 mg caps 10: Rs.39.00

OMEZOL

(ALEMBIC)

Omeprazole (e.c.granules) 20 mg caps: 10: Rs.19.

OMIZAC

(TORRENT)

Omeprazole 20 mg e-c granules caps: 10: Rs.38.90.

PEPTILCER

(BIOCHEM)

Omeprazole 20 mg grans; 4: Rs. 34.40

PROTODID

(TIDE)

Omeprazole 20 mg e-c granules) caps: 10: Rs.45

RESEC

(MERIND)

Omeprazole 20 mg caps; 10, Rs. 42.75

ULZOL

(DABUR)

Omeprazole 20 mg e-c granules caps 4: Rs.20.00

اومی پرن

اومی پراز

اومیز

اومی زول

اومی زیکن

پپ ٹل سر

پروٹوسڈ

ری سیک

ال زول

OXY PHEN NO NIUM BROMIDE اوكسى فین نو نیم برومائیڈ

افعال و منافع: زخم معده، ورم معده اور تیزابیت کی زیادتی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ سے ۱۰ ملی گرام دن میں ۳ بار کھلائیں۔

منفی افعال: گلوکوما، معده کے نچلے سرے بواب کا بند ہونا، غدہ قدامیہ کا بڑھنا۔ غذائی نالی کا تسد، وجع القلب، ضعف الامعاء اور عضلات میں مضرب ہے۔

مضرب اثرات: وجع القلب، آنکھوں میں دھندلاہٹ، خشکی، درد سر، قبض، پیشاب رکنا، منہ خشک رہتا ہے۔ احتیاط: آنٹوں کی رکاوٹ میں کمزور و ناتواں مریضوں میں پھیپھڑوں کے امراض میں۔

تجارتی مرکبات

ALUPROMATE TABS (REMEDIES INDIA)

الوپرومیٹ

Oxyphenonium bromide 10 mg, Dried Alum. hydrox. gel 300 mg, Mag, hydrox. 100 mg tabs; 10 Rs. 12.08;

ALUPROMATE-D TABS (REMEDIES INDIA)

الوپرومیٹ ڈی

Oxyphenonium bromide 10 mg, Diazepam 2.5 mg, Dried Alum hydrox. gel 300, mg, Alum, glycinate 100mg tabs, 10 rs. 13.30; 500 Rs 525.10

ANTRENYL (HIND. CIBA-GEIGY)

انٹرنل

Oxyphenonium bromide 5 mg tabs 10 Rs 6 00

ANTRENYL DUPLEX (HIND. CIBA-GEIGY)

این ٹرنل ڈپلکس

Oxyphenonium bromide 10 mg tabs 10 Rs. 11 00

سکرال فیٹ SUCRAL FATE

افعال و منافع: یہ زخم معده کو مندمل کرنے میں تیزابیت کو رکنے میں مدد دیتی ہے زخم معده کے درد و روم کو سکون دیتی ہے معده آنتوں کے زخم، بد ہضمی اور خراش معده میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ گرام دن میں ۲ بار کھانے سے پہلے اور سوتے وقت ۲ ماہ تک کھلائیں۔

مضر اثرات: قبض پیدا کرتی ہے۔

احتیاط: گردوں کی خرابی اور ہائپو فاسفیٹ کی کمی میں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: نٹراسائیکلین H₂ Blocker، ڈیپاکسن، فین ٹائین، تھیوفائی لین،

خون رکنے والی دواؤں اور کوئی لولون کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

SUCRACE

(ALIDAC)

سکرلین

sucralfate 1g tabs 4, Rs. 6.24

UL-CEKON

(FDC)

السی کون

Sucralfate 1g : tabs; 10: Rs. 13.68

ULCERFATE

(SUN PHARMA)

السرفیٹ

Sucralfate Tabs 1g 6: Rs. 12.00

ٹرائی پوٹاشیم بسمتھ سالٹ TRI POTASSIUM BISMUTH SALT

افعال و منافع: یہ دوا معدہ اور آنتوں کے زخم کو مندمل کرتی ہے۔ تیزابی مادے کو معتدل کرتی اور اندمال کے عمل کو تیز کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۳ ملی گرام دن میں ۲ بار کھانے سے آدھ گھنٹہ پہلے اسے ۳ ماہ کھلائیں۔

منفی اثرات: گردوں کی خرابی، حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: زبان اور پاخانے کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے۔

احتیاط: دافع تیزابیت دوائیں، دودھ، اور بچوں سے احتیاط برتیں کھانے کے آدھ گھنٹہ بعد تک نہ کھلائیں

تجارتی مرکبات

DE-NOL	(ELDER)	ڈی نول
Colloidal bismuch subcitrate 120 mg; tabs 15x8's : Rs.39.65		
PYLOCID	(MERC)	پائی لوسڈ
Colloidal bismuth subcitrate equiv. 120mg B/203 tabs 10: Rs. 16.79		
TRYMO	(RAPTAKO)	ٹرائی مو
Tripotssium dicitrato bismuthate equiv. to 120 mg B/203 tabs: 8: Rs.13.60		

انزائم اور ہاضم ادویہ

ENZYMES & DIGESTIVES

AMYLASE

BILE EXTRACT

FUNGAL DIASTASE

ایمانی لیس
بائل ایکسٹریکٹ
فنگل ڈایاسٹیس

CUMIN OIL

LACTO BACILLUS

PANCREATIN

PAPAIN

PEPSIN

کیومن آئل

لکھو بے سی لس

پین کریاٹین

پاپین

پپسین

افعال و منافع: یہ تمام دوائیں، ہاضمے کی خرابی، بد ہضمی میں مفید ہیں۔ ایمائی لیس اسٹارچ کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پے پین آدھ گھنٹہ میں اپنے سے ڈھائی ہزار گنا پروٹین کو ہضم کر سکتا ہے۔ بائل سالٹ روغنی وچرے ایچ ایزاء FATS کو ہضم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ فنکٹل ڈیاسٹیس عام غذا کے ہضم میں معاونت کرتے ہیں۔ پرانے اسہال سگرہنی سوء ہضم، نفخ شکم درد معدہ تھے متلی، بھوک کی کمی، بیماریوں اور دواؤں کے سبب ہونے والی سوء ہضم میں یہ دوائیں مفید رہتی ہیں۔

مقدار و ترکیب: ہر دوا کی مقدار خوراک اور ترکیب استعمال مریض کے حالات کے لحاظ سے اور پیکنگ پر درج ہدایات کے مطابق دینا چاہیے۔

مضر اثرات: زیادہ مقدار میں دینے سے دست اور متلی کی شکایت ہو سکتی ہے۔

دوسری دواؤں کے ساتھ رد عمل: ٹیلیٹیم کارب، میگنیشیم ہائیڈرو آکسائیڈ اور فولاد کے مرکبات کے ساتھ ان کے فعل میں خلل واقع ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

AMINOZYME

(STADMED)

امینوزائم سرپ

Protein hydrolysate 720 mg Bit B1, 5 mg B2 0.75 mg B6 0.25 mg Vit C 7.1 mg niacinamide 6 mb diastase 13.2 mg per 5 ml liquid. 200 ml Rs.32.00

AMINOZYME TABS

(STADMED)

امینوزائم ٹیبلٹ

Protein hydrolysate 720 mg diastase 150 mg tabs 10 Rs.6.30

BECOPLUS

(UNI-SANKYO)

بیو پلس

Lactic acid bacillus 1000 lac spores zinc sulph. 53 mg, ascorbic acid 150 mg, thiamine mononitrate 10 mg, riboflavin 10 mg, pyridoxine 3 mg nicotinamide 50 mg, calcium pantothenate 12.5 mg cyanocobalmin 5 mg, folic acid 1000 mg : caps: 10 : Rs. 15.00

BESTOZYME PAED

(BIOLOGICAL E)

بیستو زائم (بچوں کے لیے)

Alpha Amylase IP 125 mg Papain I.P 15 mg, Anise Oil 1 mg, Caraway Oil 1 mg, Dil Oil 1 mg, flavoured syrup 30 ml Rs 12 75

BESTOZYME SYRUP

(BIOLOGICAL E)

بیستو زائم سیرپ

Alpha Amylase IP 75 mg Papain IP 60 mg, per 5 ml flavoured syrup 230 ml Rs.29.90

BESTOZYME CAPS

(BIOLOGICAL E)

بیستو زائم کپسول

Alpah amylase IP 100mg Papain IP 60 mg, activated dimethicone 40 mg 10 caps Rs.11.00

B-LACT CAP

(PREM PHARMA)

بی لیکٹ کپسول

Lactobacillus acidophilus 1000 lacs, vit. B1 10mg, vit B2 10mg, vit B6 3mg, vit. B12 15 mg, folic acid 1500 mg, niacinamide 100 mg, ca pantothenate 20 mg, vit. c 75 mg: caps: 10 · Rs. 16.00

CARMICIDE

(INDOCO)

کاری سائیڈ

Sod. cit. 70 mg, citric acid 35 mg, tinc. zing b mitis 0.04 ml, tinc. cardam aromaticus 0.04 ml, tinc, cinnamon 0.04 ml alcohol 0.125 ml per 5 ml syrup 100ml: Rs.12.00

CARMICIDE ADULT

(INDOCO)

کاری سائیڈ (بالغوں کے لیے)

Sod. cit. 200 mg, citric acid 40 mg, tinc. zingib mit 0 12 ml, tinc. cardam aromaticus 0 12 ml, tinc. cinnamon 0.12 ml, alcohol 0.25 per 5 ml liquid 100ml bottle: Rs.14.00

CARMIZYME SYRUP

(CARMINOL)

کاری زائم سیرپ

Fungal diastase 1.50 IP 300mg, liquifies 15 gm of cooked starch), papain IP 150 mg, 1-lysine monohydrochloride IP 50 mg, thimine Hcl IP 2 5 mg, riboflavine Hcl IP 2,5 mg, pyridoxine Hcl IP 1 mg, macinamide IP 25 mg glycerine IP 1 g, 200gm, 200ml, Rs.33 60, 100 ml. Rs.18 00

- CARMIZYME-A** (CARMINOL LABS) کارمی زائم۔ اے
Diastase (1:2000) 50mg, pepsin (1:3000) 10 mg per 5 ml syrup : 200ml
bottle Rs. 31.20
- CATAZYME SYRUP** (STADMED) کیٹا زائم سرپ
Fungal diastase (1:800) 40 mg activated polymethyl siloxane 20 mg, pepsin
20 mg per 5 ml syrup: 100 ml: Rs. 18 00
- CENOLZYME SYRUP** (CARMINOL) کیول زائم سرپ
vit. B1 3mg, vit. B2 3 mg, vit. B6 1.5 mg, niacinamide 45 mg, pepsin 60 mg
per 15 ml, 200 ml Rs. 32.20, 100 ml: Rs.18.00
- DIGEPLEX** (RALLIS) ڈیجی پلکس
Diastase (1:2500) 20 mg pepsin 20 mg per 10 ml: liquid 100 ml Rs 24 30
170 ml Rs.30.40 450 ml Rs. 62.45
- DIGEPLEX DROPS** (RALLIS) ڈیجی پلکس ڈراپس
Diastase 31.25 mg Pepsin 10 mg Cardomon oil 0.4 mg Cinnamon oil 0.4
mg per ml drops 15 ml Rs.21.45
- DIGEPLEX-T** (RALLIS) ڈیجی پلکس ٹی
Pancreatin 0.15 g Bile ext 25 mg Pepsin 5 mg Diastase (1:2000) 10 mg
Dimethylsiloxane 25 mg dragees 10x10: Rs. 140.95
- DISPEPTAL** (BOEHRINGER) ڈس پیتال
Pancreatin 150 mg Vegetable enzymes (equiv to cellulases & hemicellulases
Activity of 6 Grassmann Units) 33 mg, bile salts 25 mg tabs 10: Rs 20.0
- DIZYTONE** (UNICHEMO) ڈائی زی ٹون
Fungal diastase 900mg, vit.B1 6mg, vit.B2 5mg, B6 1.5mg, B12 5mg,
nicinamide 48mg, d-panthenol 5mg per 75ml syrup: 110ml: Rs.10 26, 220ml.
Rs.17 75
- ENDOS** (GENO) ان ڈوس
Fungal diastase 50 mg, pepsin 10mg, sod. tauroglycocholate 60mg,
simethicone 60mg, dioctyl sod. sulpho succinate 100mg; caps: 10: Rs.10.72
- ENZAR FORTE** (ELDER) ان زار فورٹ
Pancreatin (eq: 15000 units amylase activity 4000 units lipase activity
15000 units protease activity) malt diastase (1.50) 130mg Sod
tauroglycocholate 65mg; e-c tabs. 10: Rs.19.50

FESTAL

(HOECHST)

فیصل

Pancreatin 192mg Bile constituents 25mg Hemicellulase 50mg tabs 10

Rs.25.10

GENOZYME

(GENO)

جینوزائم

Aspergillus oryzae 50mg, pepsin 10mg, vit B1 0.5mg, B2 0.5mg, B6 0.25mg, d-panthenol 1mg, nacinamide 5mg per 5ml susp : 100ml: Rs. 11 76, 200ml: Rs.19.54

LACTISYN

(FRANCO-INDIAN)

لکٹی سائن

Lactobacillus lactis 490 million, lactobacillus acidophilus 490 million, streptococcus thermophilus 10 million, streptococcus lactis 10 million, per amp. 6amps: Rs.30.90

LACTOBACIL

(INFAR)

لکٹوباسیل

Lyophilized lactobacillus acidophilus not less than 10 million living organism per capsule and 1g sachet. 10 caps: Rs.24.20, 10 sachets: Rs 26 90

LUPIZYME

(LUPIN)

لوپی زائم

Pepsin (1:3000) 12.5mg Fungal diastase (1:2000) 18.75 mg Vit B1 2mg, B2 1mg, B6 1.5 mg B12 (anhydrous) 1mg, D-panthenol 1.5 mg nicotinamide 1.5 mg, per 5ml liquid 210ml: Rs.26.00

LUPIZYME CAPS

(LUPIN)

لوپی زائم کپسول

Pepsin (1:3000) 12.5mg Fungal diastase (1:2000) 18.75 Vit. B1 2mg, B2 1mg, B6 1.5mg, B12 (anhydrous) 1mg, cal panthothenate 2.5mg, Nicotinamide 15mg, Dimethylpolysioxane 25 mg, Bile salts 40mg caps 5x10;s Rs.26.65

MERIZYME ELIXIR

(MERCURY)

میری زائم الیکٹر

Fungal diastase 1:8400 1.p. 12mg, Pepsin 80mg, Thiamine Hcl 4.5mg, Riboflavin Phosphate Sod. 4.5mg, Pyridoxine Hcl 1.5mg, Niacinamide 45mg, panthenol 5mg, 200ml: Rs.29.50

MERIZYME DROPS

(MERCURY)

میری زائم ڈراپس

Fungal diastase (1:8400) 6mg, Pepsin 5mg, Thiamine hcl 1mg, Riboflavin Phos. Sod 1mg, Pyridoxin Hcl 1mg, cyanacobalamine 1mg, Niacinamide 10mg, cyprohepatadine 0.5mg, 15ml: Rs 15 90

MERIZYME TABS (MERCURY)

میری زائم ٹبلٹ

Fungal diastase (1:8400) 12mg, Pepsin 30mg, Simethicone 25mg activated wood charcoal 5mg tabs 20x6: Rs 120 00

MOLZYME (FDC)

مولزائم

Papain 60mg diastase (1:1500) 3 75mg Cumin oil 0.05ml, ajowan oil 0 015ml Activated wood charcoal 100mg, methyl polysiloxane (activated 25mg, belladonna dry extract 8mg tabs 30. Rs.29.00

NEOPEPTINE CAP (PAPTAKOS)

نیو پپ ٹین

Alpha amylase 200mg, Papain 100mg vit.B1 5mg, B2 3mg, B6 1mg, B12 5mg, nicotinamide 25mg Simethicone 30mg caps 30: Rs.18.43 100. Rs 57 25 250 Rs 122 80

NEOPEPTINE DROPS (RAPTAKOS)

نیو پپ ٹین ڈراپ

Alpha amylase (bacterial 1:800) 20mg, Papain 10mg, Dil oil 2mg, anise oil 2mg, caraway oil 2mg per ml drops. 15ml. Rs.20.75

NORMOZYME (UNILIDS)

نار موزائم

Fungal diastase 300mg, papain 25mg, methyl polysilox 20mg, bile ext. 25mg: caps: 30: Rs.11.20, 100: Rs.34.24

NORMOZYME SYRUP (UNILIDS)

نار موزائم سیرپ

Fungal diastase 500mg, papain 10mg, yeast ext. 25 mg per 5ml syrup 100ml: Rs 9.50, 200ml: Rs.16.50

PANKREOFLAT (DUPHAR)

پنکریو فلیٹ

Pancreatin 170mg, activated dimethicone 80 mg, tabs 10: Rs 42 20

PANKREON (DUPHAR)

پن کریون

Pancreatin 121.5mg tabs: 25: Rs. 28 00, 100: 96.11

PANKREON COMP (DUPHAR)

پن کریون کمپوٹ

Pancreatin 121 5mg, bile ext. 50mg: tabs: 25; Rs.34 99

PANKREON PEAD (DUPHAR)

پن کریون (بچوں کے لیے)

Pancreatin 250mg, vit. B12 0.5mg, bil A 100 i.u., folic acid 0 2mg per 2 5g granules: 2.5g: Rs.3 21

PANOLASE (DUPHAR)

پنولیس

Pancreatin 192mg, hemicellulase 50mg, purified bile extract 25mg tabs 10

PANZYNORM

(GERMAN REMEDIES)

پن زائی نارم

Pancreatin 100mg, bile ext. 40mg, dry stomach ext. 110mg: tabs: 10, Rs.36.09

PANZYNORM-N

(GERMAN REMEDIES)

پن زائیم نارم این

Pancreatin 125mg (equiv. to lipase 1000 units, amylase 9000 units, protease 500 units) e-c tabs. 10: Rs. 52.00

PHARMA LIQUID

(P&B LABS)

فارما لکوڈ

Iron choline cit. 20mg, papain 20mg, manganese cit. 15mg, guaiacol glyceryl ether 50mg, creasote 0.4ml, malt extract 0.5mg, vit. B1 2.5mg, vit. B2 2.5mg, niacinamide 22.5mg, vit. B6 0.75mg, d-panthenol 3mg, alcohol 1.7ml, alcohol content 11% v/v per 15ml liquid; 450ml Rs.37.54

PIBIZYME LIQUID

(P&B LABS)

پی بی زائیم لکوڈ

Fungal diastase (1:400) 0.2gm, pepsin 25mg, vit. B1 5mg, vit. B2 2.5mg, vit. B12 7.5mg, niacinamide 22.5mg, d-panthenol 5mg, flavoured sweetened base q.s. ; 110ml Rs 18.21; 220ml Rs.26.33

RALCRIZYME

(RALLIS)

رال کری زائیم

Pancreatin 150mg, bile ext. 25mg, pepsin 5mg, diastase 10mg, dimethyl polysilox 25mg: dragees: 10: Rs. 5.60

SANZYME

(UNI-SANKYO)

سن زائیم

Fungal diastase 50mg, pepsin 10mg per 5ml syrup: 100ml: Rs. 16.30 200ml Rs.30.50

UNIENZYME MPS

(UNICHEM)

یونی انزائیم ایم پی ایس

Fungal diastase 20mg, papain 30mg, simethicone 50mg, nicotinamide 25mg, activated charcoal 75mg: tabs: 10: Rs. 9.00, 100: Rs.69.95

UNIENZYME SYRUP

(UNICHEM)

یونی انزائیم سیرپ

Fungal diastase (1:800) 50mg, papain 60mg per 5ml syrup: 200ml bottle

VITAZYME

(EAST INDIA)

ویٹا زائیم

Fungal diastase (1:2000) 20mg, cinnamon oil 0.125mg, caraway oil 0.25mg, cardamom oil 0.25mg, per 5ml; liq. 110ml, Rs.14.79; 225ml Rs.27.82; 450ml Rs.43.10

VITAZYME DROPS

(EAST INDIA)

ویٹا زائیم ڈراپس

Fungal diastase (1:2000) 20mg, cinnamon oil 0.2 mg, caraway oil 0.4mg, cardamom oil 0.4mg, per ml; 15ml, Rs.14.41

- VIZYLAC** (UNICHEM) وزائی لیک
Lactobacillus sporogenes 40 million spores, vit. B1 2.5mg, B2 2.5mg, B6 0.75mg, nicotinamide 22.5mg, folic acid 500mg, d-panthenol 2.5mg caps: 10: Rs.8.58
- VIZYLAC SYRUP** (UNICHEM) وزائی لیک سرب
Lactic acid bacillus 40×10^6 thiamine Hcl 2mg, riboflavin 2.5mg, pyridoxine Hcl 1mg, nicotinamide 15mg, folic acid 100mg, d-panthenol 2.5mg, per 5ml syrup: 30ml bottle
- XYMEX** (MEDLEY) زائی میکس
Pepsin (1:3000) 20mg, diastase (1:50) 40mg, vit. B1 2.5mg, B2 2.5mg, B6 1mg, D-painthenol 2.5mg, Niacinamide 23mg, per 10ml liquid 170ml: Rs.24 80
- XYMEX DROPS** (MEDLEY) زائی میکس ڈراپس
Pepsin 5mg, papain 3mg sod citrate 20mg, citric acid 4mg, tinct zing mitis 0.012ml, cimmanon oil 0.0012ml per 0.5ml sys 15ml: 10 50

جگر، پتہ اور بانقرا اس کی ادویہ

PANCREATIC & HEPATO BILIARY DRUGS

- BILE SALTS** بائل سالٹ
- CHOLINE CHLORIDE** کولین کلورائیڈ
- HYDROXY METHYL NICOTINAMIDE** ہائیڈروکسائیڈ میٹھائل نکوئی ٹامائیڈ
- KALMEG LIQUID EXTRACT** کال میگ
- TRICHOLINE CITRATE** ٹرائی کولین سائٹریٹ
- TRITHO PARAMETHOXY-** ٹرائی تھیو پیرامیٹھوآکسی-
- PHENYLPROPENE** - فینائل پروپین
- URSO DESOXY CHOLIC ACID** ارسو ڈی سائکسی کولک ایسڈ

افعال و منافع: یہ تمام دوائیں جگر میں تحریک پیدا کرتی ہیں صفرا کی پیدائش کو بڑھاتی ہیں جگر کی صفائی اور چربیے مادوں کو جمع ہونے نہیں دیتی ہیں۔ قبض، ورم جگر، ورم اور سنگ مرارہ کو دور کرتی ہیں بچوں کی نشوونما کے زمانے میں مفید رہتی ہیں۔

مقدار و ترکیب: عمر و حالات کے لحاظ سے مقدار کا تعین کیا جائے دواؤں کے پیکنگ پر درج ہدایات کے مطابق خوراک دی جائے۔

احتیاط: یوروڈی سوکسی کو لک ایسڈ کو جگر کے امراض مزمنہ، آنتوں کے ورم اور ایام حمل میں استعمال سے احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

BILAMIDE

(ETHNOR)

پلامائیڈ

Pyridine-3- Carboxylic acid N-Hydroxymethyl- nicotinamide 500mg Tabs
20; Rs. 47 45

DELPHICOL

(LEDERLE)

ڈلفی کال

Tricholine citrate 1 44g, acetyl Dimethionine 1 22g, inositol 0 24g, vit B12.
12mcg/15ml syrup 100ml; Rs 22.00

ELSORBIN

(LIFE)

ایل سوربین

Tricholine citrate 275mg, sorbital solution 3gm per 5ml syrup; 100ml
Rs 14.70; 225ml Rs. 25.07

ENZYSTAL

(TORRENT)

ان زائی اسٹال

Pancreatin 192mg, hemicellulase 50mg, extract felis bovis 25mg tabs: 10:
Rs.16.00

ESSENTIALE

(RHONE-POULENC)

اے سن ٹیل

Essential phospholipids (active principle; diglyceride esters of
cholinephosphoric acid containing an excess of unsaturated fatty acids,
predominantly linoleic acid & oleic acid) 175mg; caps: 10: Rs.54 35

FARIZYM FORTE

(INFAR)

قاری زائم فورٹ

Lipase not less than 6000 fip u, protease not less than 350 fip u, amylase not
less than 4000 fip u, cellulase to an activity of 2.5 w.u., cholic acid (as bile
ext.) 30 mg; tabs; 10: Rs.28.75

HEPASULFOL

(FRANCO-INDIAN)

ہیپاسلفول

Trithioparamethoxyphenyl propene (containing 40% organic sulphur)
12.5mg 30: Rs.29.60

LIVOCOL LIQ.

(KLAR SEHEN)

لووکل لکوڈ

Tricholine citrate 550mg, kalmegh I.P. 300mg, (equiv. to 3mg of andrographolids), sorbitol soln. I.P. 6mg/10ml liq. 200ml. Rs.26 87

LIVOTONE LIQUID

(EAST INDIA)

لووٹون لکوڈ

Sodium Benzoate I.P. 140mg, Sod. Phosphate I.P. 350mg, Cascara Dry Extract B.P. 90mg, Bile salts B.P.C. 54 90mg, kalmegh liq ext. I.P. '66 0.5ml, Alkaloids of Kurchi I.P. '66 2 0mg, Ethyl Alcohol I.P. 9.5 % v/v 10 Rs 11 15

LIVOTONE CAPS

(EAST INDIA)

لووٹون کپسول

Bile salts 90mg, kalmegh liq, ext.) cascara dry ext, 90 mg, total alkaloids of kuchi 2mg; caps 10 Rs.11.12

JETOSITOL

(ETHNOR)

جٹوسی ٹول

Hydroxymethyl nicotinamide 500mg inositol 240mg, Vit B12 12mg tabs 10: Rs 21 00

MECOLIN

(STADMED)

میکولن

Tricholine citrate 0.55g, sorbitol soln 7.15gm/10ml Liq 200ml Rs 29.96

NEOKIM SYRUP

(DEYS)

نیو کم سیرپ

Acetyl methionine 177mg, tricholine citrate 600mg, inositol 36mg, sorbitol solution q.s malt extract q.s per 10ml syrup 110ml. Rs 12 00

SORBILINE

(FRANCO-INDIAN)

ساربین

Tricholine citrate 550mg, sorbitol soln 7.15g/10ml soln. 100ml. Rs. 19.55; 200ml. 29 75

STIMULIV

(FRANCO-INDIAN)

اسٹی مولو

Kalmegh (andrographic paniculate) 62.5mg bhringaraj (achipta alba) 200mg pittapapda (fumaria perviiflora) 100mg/5ml Syrup 100ml. Rs.19.25 200ml: Rs 28 43

STIMULIV TABS

(FRANCO-INDIAN)

اسٹی مولو ٹیبٹ

Kalmegh 60mg, bringaraj 100mg pittapapda 100mg, boldo 60mg hathichoke 100mg tabs 60: Rs.21.13

UDCA

(DUPHARZ)

یو ڈی سی اے

Ursodeoxycholic acid 150mg, tabs: 30: Rs. 152.00

SILYMARIN سلائی مارن

افعال و منافع: کثرت سے نوشی کے سبب ورم جگر، مزمن ورم جگر جگر کا سکڑ جانا cirrhosis جگر کا متعدی ورم HEPATITIS-A میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۷۰ ملی گرام دن میں ۳-۲ بار شدید حالتوں میں ۱۳۰ ملی گرام دن میں ۳-۲ بار ۶ ہفتہ تک۔

منفی افعال: حساسیت والے مریضوں کو نہ دینا چاہیے۔
مضر اثرات: ہلکے دست آسکتے ہیں۔

احتیاط: حاملہ، دودھ پلانے والی اور بچوں میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکب

SILYBON-70

(MICRO LABS)

سلائی بون ۷۰

Silymarin 70mg: tabs: 10: Rs.38.00

حرکات معدہ کو کنٹرول کرنے اور تھوڑے روکنے والی ادویہ

PROMOTILITY/ANTIEMETIC

CISAPRIDE

سساپرائیڈ

افعال و منافع: معدہ سے خراب مادوں کو خارج کرنا، تھوڑے، ہلکی، ابھانکی اور عادی قبض میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: تھوڑے و ہلکی میں ۱۰ ملی گرام دن میں ۲ بار قبض کے لیے ۱۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔
منفی افعال: قات غذائی میں رکاوٹ سے پیدا ہونے والے امراض میں دینا نقصان دہ ہے۔
مضر اثرات: آنسو کی حرکات میں تیزی لاتی ہے۔

تجارتی مرکبات

CISADE	(UNICHEM)	سی سیڈ
CISADE MPS	(UNICHEM)	سی سیڈ ایم پی ایس
CISANORM	(GUFIC)	سی سائورم
Cisapride monohydrate 10mg tabs, 10 tabs Rs 39.90		
CISAPID	(KOPRAN)	سیساپڈ
Cisapride 10mg, 10tabs Rs.31.90		
CISAPID-MPS	(KOPRAN)	سیساپڈ ایم پی ایس
Cisapride monohydrate 10mg, simethicone 125mg chewable tabs; 10x10 Rs.380.10		
CISAPID-MPS SUSP	(KOPRAN)	سیساپڈ ایم پی ایس لکڑ
Cisapride (monohydrate) 5mg, simethicone 125mg per 5ml susp, 60ml Rs.39 10		
CISAPRO	ZELTA(CADILA)	سیساپرو
Cisapride 100mg : tabs: 100; Rs.370 00		
CISPEL	(PANACEA)	سیس پل
Cisapride (as monohydrate) 5mg & 10mg: tabs: 5mg: 10. Rs.19.00, 10mg: 10: Rs.34.00		
CISPEL SUSP	(PANACEA)	سیس پل لکڑ
Cisapride (as monohydrate) 10mg per 5ml susp.: 60ml Rs.24.00		
CIZA-5	(INTAS)	سی ز ا 5
Cizapride 5mg: tabs: 10: Rs.19 50		
CIZA	(INTAS)	سی ز ا
Ciza is available as 10mg double score dispersible tablets containing 10mg of cizapride in strips of 10. Rs.35.00		
CIZA SUSP	(INTAS)	سی ز ا لکڑ
Cisapride 1mg per ml liquid: 30ml: Rs15.50 : 60ml: Rs.29.00		
CIZA MPS	(INTAS)	سی ز ا ایم پی ایس
Cisapride (as mono Hcl) 10mg methyl polysiloxane 125mg: chewable tabs; 10: Rs.36.00		
ESORID	(SUN PHARMA)	ای سورڈ
Cisapride 10mg (as monohyd.)10: Rs.38.00		

GUTPRO	(DEE PHARMA)	گٹ پرو
Cisapride 10mg: tabs: 10: 38.00		
GUTPRO SUSP	(DEE PHARMA)	گٹ پرو لکوڈ
Cisapride 1mg per ml susp: 60ml bottle: Rs.27.80		
MOTILAX	(USV)	موٹی لکس
PREPULSID	(ETHNOR)	پری پل سڈ
Cisapride 5mg, 10mg & 20mg: tabs: 5mg: 10: Rs.25.72, 10mg: 10: Rs.38.00		
20mg 10: Rs.68.00		
PROKINE	(SEARLE)	پرو کائین
PROCISA	(JENBURKT)	پرو سی سا
Cisapride (as monohydrate) 10mg: tabs: 10: Rs.30.95		
PULSID	(MAX)	پل سڈ
Cisapride (as monohyd.) 5mg, 10mg; tabs: 5mg : 10: Rs.16, 10mg: 10: Rs.29.50		
PULSID SUSP	(MAX)	پل سڈ لکوڈ
Cisapride (as monohyd) 5mg per 5ml susp: 60 ml: Rs.29.80		
SYSPRIDE	(SYSTOPIC)	سکس پرائیڈ
Cisapride 10mg; tabs: 10: Rs. 38.00		
SYSPRIDE MPS	(SYSTOPIC)	سکس پرائیڈ ایم پی ایس
Cisapride 10mg, methyl polysiloxane 125mg, chewable tabw: 10: Rs.39.00		
UNIPRIDE	(TORRENT)	یونی پرائیڈ
Cisapride (as monohydrate) 10mg, tabs: 10: Rs.39.00		
ZINAMIDE	(SOL PHARMA)	زی نامائیڈ



REGLAN®
(Metoclopramide HCL) Tablets, Syrup, Injection.

Targeted treatment aimed at

**HEARTBURN
REFLUX**



► **NAUSEA
VOMITING**



ملین امعاء، مسہل اور آنتوں کو چکنا کرنے والی ادویہ

PURGATIVES/LAXATIVES/LUBRICANTS

AGAR GEL

اگار جیل

BISACODYL

بسکوڈائل

DIOCTYLSODIUM

ڈاکٹائل سوڈیم

SULPHOSUCCINATE

سلفو سکسی نیٹ

GUM KARAYA AND CORTEX

گم کاریا اینڈ کورٹکس

ISPAGHOL

اسپیغول

LEVULOSE

لی وولوز

LIQUID PARAFIN,

لیکوڈ پیرافین

MAGNESIUM HYDROXIDE

مگنیشیم ہائیڈروکسائیڈ

PHENOLPHTHALEIN

فینال افٹھالین

SENNOSIDES

سینو سائیڈ

افعال و منافع: مذکورہ بالا ادویہ عادی قبض، بیماری اور دواؤں سے ہونے والے قبض پریشن سے قبل و بعد آنتوں کی صفائی آلات ہضم کی کمزوری سے فضلات کی رکاوٹ کو دور کرتی ہیں۔

مقدار و ترکیب: ہر دوا کی الگ الگ ہے، مزاج و حالات کے لحاظ سے، دوا کے ساتھ پیکنگ پر لکھی مقدار کے مطابق دی جائے۔

منفی افعال: ملک اف میگنیشیا گردوں کے امراض میں نہیں دینا چاہیے لکوڈ پیرافین کا زیادہ دنوں استعمال و نامن K کے جذب ہونے میں مانع ہے۔ فینال فٹھالین الرجی والوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: نفع، شکم، پیٹ میں گرگزائٹ، شدید اسہال، تھک، کمزوری چکر آنا پسینہ کی کثرت پیٹ میں اینٹھن ہو سکتی ہے۔

احتیاط: شدید قبض میں آنتوں کی جانچ پہلے کرائیں، حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں احتیاط برتیں

تجارتی مرکبات

AGAROL	(PARKE DAVIS)	اگارول
Liq. paraffin 9.5ml Phenolphthalein 400mg agar 60mg per 30ml		
120ml. Rs.23.35 400ml: Rs.61.80		
BIDLAX-5	(BIDDLE SAWYER)	بڈا لیکس ۵
Bisacodyl 5mg tabs 4. Rs.2.40		
CELLUBRIL	(ASTRA-EDL)	سیلوبرل
Dioctyl sod. sulphosuccinate 100mg: caps: 30: Rs.22.00		
CREMAFFIN	(BOOTS)	کریما فین
Milk of magnesia 11.25ml Liq. paraffin 3.75ml per 15ml 210ml		
Rs.23.10		
CREMAFFIN PINK	(BOOTS)	کریما فین پینک
Milk of magnesia 11.25ml Liq. paraffin 3.75ml Phenolphthalein 50mg		
per 15ml 200ml: Rs.23.00		
CREMAFFIN-FS	(BOOTS)	کریما فین ایف ایس
Ispagol husk 3.5g per 14.25g powder: 100g: Rs.30.00		
DULCOLAX	(GERMAN REMEDIES)	ڈکولیکس
Bisacodyl 5mg tabs 10x10 Rs.65.00 1000 : Rs.405.00		
DULCOLAX SUPPOSITORIES		ڈکولیکس سپوزٹری
Bisacodyl 5mg 10mg suppos 5: Rs.24.55 50: Rs.195.40 5mg . 5		
Rs 21.0		
DUPHALAC	(DUPHAR)	ڈوفالیک
Levulose 667mg per ml liq.: 300ml: Rs.273.00		
EVACUOL	(FRANCO-INDIAN)	ایواکوال
Karraya gum 3.1g Sennosides A&B (As cal salts) 5mg per 5g granules		
75g: Rs.25.00		
EXITAL POWDER	(KLAR SEHEN)	ایک زری ٹال پوڈر
Ispaghula husk I.P. 3.5 gms/5.6 gms 100gm jar Rs.25.31		
FYBOGEL	(RECKITT & COLMAN)	فائی بوجل
Ispaghula husk 3.5gm per 5.4 g powder. 100g Rs.28.70		

ISO GEL GRANULES	(GLAXO ALLEN)	آئی سو جیل گرینول
Ispaghula husk 27g per 30g granules: 100g: Rs. 30.00		
ISOVAC	(HINDUSTAN ANTIBIOTICS)	آئی سو ویک
Psylum hydrophilic mucilloid 65% granules 5g: Rs. 1.76, 80g: Rs.22.00 100g: Rs.29.50		
JULAX	(RALLIS)	جو لیکس
Bisacodyl 10mg casanthranol 10mg tabs 10: Rs.11.60		
KANORMAL	(GERMAN REMEDIES)	کانورمل
Gum karaya and cortex franulae granules: 5g: Rs. 3.08, 100g: Rs.41.06		
LAXICON	(STADMED)	لکسی کان
Dioctyl sod. sulpho succinate 100mg: tabs: 10: Rs. 7.50		
LAXICON ENEMA	(STADMED)	لکسی کان انما :
Dioctyl sod. sulpho succinate 0.25% soln. 50ml : Rs. 12.50		
NATUROLAX	(INFAR)	نٹرو لیکس
Isapghula husk 3.5g, excipients 2.1gm per 5.6g powder. 1 sachet: 5.6g: Rs.2.25, 100gm jar: Rs. 33.00, 250g jar: Rs.87.00		
NATUROLAX FORTE	(INFAR)	نٹرو لیکس فورٹ
isapghula husk 3g, senna extract powder 100mg per 6g powder, 1 sachet: 6g: Rs.3 00, 50g jar: Rs.16.00		
NATUROLAX SF	(INFAR)	نٹرو لیکس ایس ایف
Isapghual husk 3.5gm, excipients 0.1g per 3.6g sugar free powder: 100g jar: Rs.35.00		
NEOTOMIC ENEMA	(NEO PHARMA)	نیو ٹومک انما
Glycerin 15%, sod. chlor. 15% enema 20ml : Rs.25.00		
PURSENNID	(SANDOZ)	پرسے نائیڈ
Senna glycosides 18mg, dioctyl sodium sulfosuccinate 50mg: tabs: 10: Rs.5.86		
TAXINE	(J&K DECHANE)	ٹاکسین
Ext. Cascara Sagrada (rhamnus pur shianus) 48.6mg, phenolphthalein IP1995 100mg, sana (Cassia angustifolia) IP 81mg, kaladana (Ipomoea hederacea) IPC 16.2 mg tabs; Strips of 10's Rs.31.00; 500 Rs.115.00		

لوولیوک Livoluk

افعال و منافع: یہ لکٹولوز Lactulose کا مرکب ہے۔ دائمی اور عادی قبض، گردوں کی خرابی، یرقان سدھی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۰ سے ۵۰ ملی لیٹر دن میں ۲ بار اور سوتے وقت پلائیں۔

مضر اثرات: نفخ شکم، آنتوں میں آٹھن درد پیدا ہو سکتا ہے۔

احتیاط: ذیابیطس کے مریضوں میں، بوڑھے، کمزور، حاملہ اور بچوں میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: نیومائی سین، دافع، تیزابیت ادویہ مانع انفلکشن خوردنی ادویہ۔

تجارتی مرکب

LACTULOSE

لکٹولوز

3.325gm per 5ml 60ml Rs. 32.40 200ml Rs.108.00

مرخی و مسکن عضلات ادویہ

SMOOTH MUSCLE

RELAXANT/SEDATIVES

CHLORDIAZEPOXIDE

کلورڈیازپکسائیڈ

افعال و منافع: عضلات کو نرم کرنے (مرخی) کے لئے عام طور سے مستعمل ہے دافع تشنج اور مسکن دافع TRANQUILIZER ہے۔ آنتوں کی سوزش اور تیزابیت میں دیگر دواؤں کے ساتھ نفع بخش ہے بعضی بد ہضمی، الجھن، پریشانی کے سبب ہونے والی تکالیف میں مفید ہے۔

مقدار و استعمال: ۱۰ سے ۳۰ ملی گرام یومیہ، بچوں کو ۱۰ سے ۳۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔

منفی افعال: گردوں اور جگر کے امراض میں مضر ہے۔

مضر اثرات: وزن میں اضافہ، بوڑھوں میں خلل دماغی، جلد پر دھبے پڑنا متلی ابکائی، درد سر، جنسی افعال میں رکاوٹ، قبض ہو سکتا ہے۔

احتیاط: سگریٹ کی کثرت دوا کے اثر کو کم کرتی ہے۔ دوا کے دوران ڈرائیوری اور مشنری چلانا نہیں چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دوسری مسکن ادویہ کے ساتھ دینے سے مریض کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔

تجارتی مرکبات

EQUILIBRIUM

(JAGSON PAL)

ایکولی بریم

Chlordiazepoxide 10mg; tabs.

Short-term treatment of severe or disabling anxiety with or without insomnia, symptoms of acute alcohol withdrawal.

10, Rs.8

EQUIREX

(JAGSONPAL)

ایکوریس

Chlordiazepoxide 5mg, clidinium bromide 2.5mg; tabs: 10: Rs. 9.50

NORMAXIN

(SYSTOPIC)

نار میکسن

Clidinium bromide 2.5mg dicyclomine hcl 10mg chlordiazepoxide 5mg Tabs 10: Rs.9.00

CLIDINIUM BROMIDE

کلانی ڈی نیم برومائیڈ

افعال و منافع: یہ سالٹ دافع تشنج اور منع افراز ہے۔ آنتوں کی سوزش معدہ و آنتوں کے عضلات کے تشنج، آنتوں کے زخم اور انفکشن کے علاج میں معاون ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ سے ۳۰ ملی گرام یومیہ۔

منفی افعال: گلوکوما، پیشاب کی نالیوں میں رکاوٹ اور غدہ قدامیہ کے درم میں اثرات بد پیدا ہوتے ہیں۔

مضر اثرات: منہ خشک، آنکھوں میں خشکی، پیشاب میں کمی قبض ہو سکتا ہے۔

احتیاط: شراب نوشی، مسکن دماغ ادویہ، کے ساتھ، حاملہ اور ڈرائیوری کرنے والوں کو احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

NORMAXIN

(SYSTOPIC)

نارماکسن

Clidinium bromide 2.5mg, dicyclomine Hcl 10mg, chlordiazepoxide 5mg: tabs: 10: Rs. 8.20

NORMOSPAS

(SYSTOPIC)

نارموسپاس

Clidinium bromide 2.5mg acetaminophen 325mg dicyclomine Hcl 10mg tabs 10: Rs.7.00

SPASRIL

(STANCARE)

سپاسرل

Clidinium bromide 2.5mg, chlordiazepoxide 5mg: tabs 10: Rs.8.00

Hyoscymine Sulphate ہائیوسائینی مین سلفیٹ

افعال و منافع: یہ دوا آنٹوں کی حرکات دودیہ کوست کرتی، تیزابی مادے میں کمی کرتی ہے۔ زخم امعاء، عضلات کی اسپاسمز، تشنج، عصبی سوء ہضم میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بڑوں کو ۵۰ ملی گرام

منفی افعال: گلوکوما، میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: منہ میں خشکی، پسینہ میں کمی نکلنے میں تکلیف، درد سر پیشاب میں تنگی بصارت میں فرق ہو سکتا ہے۔

احتیاط: آنکھوں کی تکلیف میں، حرکات نبض سریع ہونے میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

BARDASE	(PARKE DAVIS)	بارڈیس
Phenobarb. 16mg, hyoscyamine sulph. 0.1mg, hyoscine hydrobrom 7mg, atropine sulph. 20mg, 20 tabs (tadadiastase 1:450) Rs. 3.52		
BELLADENAL-IN	(SANDOZ)	بلاڈینال ان
Hyoscyamine 0.2292mg, hyoscine 0.0208mg, phenobarbitone 50mg tabs: 20: Rs. 3.38		
BUSCOPAN	(GERMAN REMEDIES)	بسوپان
Hyoscine N.hydrobromide 10mg: tabs: 10: Rs. 8.47		
BUSCOPAN INJ	(GERMAN REMEDIES)	بسوپان انجکشن
Hyoscine N.hydrobromide 20mg per ml: 1ml: Rs. 3.41		

ISO PRO PAMIDE

آئی سو پرو پامائیڈ

افعال و منافع: معدہ کی تیزابیت، آلات ہضم کے تشنج، بڑھی ہوئی حساسیت اور آنتوں کی حرکات کو درست کرتی ہے۔ زخم معدہ، حاد و مزمن سوزش معدہ، عصبی سوء ہضم، اسہال سوزش امعاء میں مفید ہے۔
مقدار خوراک: ۵ سے ۱۰ ملی گرام روزانہ۔
منفی افعال: گلوکوما، بواب کانجک ہونا، خون کی کمی جگر کی خرابی، قونج شدید غدہ قد امیہ کے بڑھ جانے میں خراب اثر پیدا کرتی ہے۔

مضر اثرات: منہ خشک رہنا، بصارت میں خلل، نیند نہ آنا، قبض پیشاب میں تنگی۔
احتیاط: قلبی امراض کے علاج کے دوران، ضعیف، رونا توں لوگوں میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

GASTABID-1	(TORRENT)	گیسٹائیڈ۔۱
Isopropamide iodide 5mg trifluoperazine Hcl 1mg tabs 10, Rs. 4.50 100: Rs. 45.00		

GASTABID-2

(TORREN1)

کیسٹا بڈ-۲

Isopropamide iodide 5mg trifluoperazine Hcl 2mg 10, Rs 4 99

MEBEVERIN

مے بی ورین

افعال و منافع: عضلات شکم کو مسترخ کرتی ہے، آنتوں کی سوزش، آنتوں میں بل پڑنا پتہ اور اس کی نالی میں تسد و تشنج، معدہ و امعاء کے زخم، پیمپش، اینٹھ ورم میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے کھانے سے ۲۰ منٹ قبل کھلا میں۔

منفی افعال: پراسٹیٹ گلینڈ غدہ تھامیہ بڑھ جانے اور گلوکوما میں استعمال مناسب نہیں۔

احتیاط: حمل کے ایام میں اس کے استعمال سے احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکب

COLOSPA

(DUPHAR)

کولوسپا

Mebeverine Hcl 135mg tabs 10 Rs 75 00

پائی پین زولیت می تھائل برومائیڈ PIPEN ZOLATE METHYL BROMIDE

افعال و منافع: بچوں کے قولنج درد، نفخ شکم۔ بد ہضمی، غذائی آلات کے تشنج میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵ سے ۱۰ ابوند کھانے سے ۱۵ منٹ پہلے۔

منفی افعال: نرم معدہ کی تنگی، حمل ایام رضاعت، وجع القلب، آلات ہضم میں رکاوٹ جگر اور گردوں کی خرابی قولون آنت میں زخم اور ورم ضعف عضلات میں استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

مضر اثرات: خشکی، قبض، متلی، ابکائی، پیشاب میں رکاوٹ، بصارت میں فرق وجع القلب، خفقان قلب، جلد پر داغ پڑنا، چکر آنا، کمزوری، نیند نہ آنا۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع حساسیت دواؤں، انٹی ڈپریشن اور بنز و ڈیازول پائن کے ساتھ رد عمل خراب ہوتا ہے۔

تجارتی مرکب

PIPCOL

(GENO)

پپ کال

Pipenzolate methyl bromide 4mg, dimethyl polysiloxane (activated)
40mg per ml drops. 10ml bottle : Rs. 9.97

PROPANTHELENE BROMIDE پروپان تھیلین برومائید

افعال و منافع: زخم معدہ، ورم معدہ، آنتوں کی سوزش اور ورم قولون میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: زخم معدہ میں ۱۵ ملی گرام دن میں ۲ یا ۳ بار کھانے سے پہلے ۳۰ ملی گرام سوتے وقت دوسری تکلیف میں ۱۵ ملی گرام دن میں ۲ بار۔

منفی افعال: گلوکوما، آلات ہضم میں رکاوٹ آلات بول اور اسحاق کا ناکارہ ہونا ضعف عضلات، زخم قولون وغیرہ میں استعمال مناسب نہیں۔

مضر اثرات: خشکی، بصارت میں فرق۔

احتیاط: ورم غدہ قدامیہ، نم معدہ کی خشکی، وجع القلب، حمل ایام رضاعت، قلب کے شدید امراض، غدہ در قیہ کا بڑھنا، ڈیجاکسن کے علاج کے دوران جگر اور گردوں کے امراض میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

PEPCER

(SUN PHARMA)

پپ سر

Propantheline bromide 15mg diazepam 2.5mg dihydroxy alum
aminoacetate 100mg tabs 10x10: Rs. 52.00

PROBANTHINE

(SAERLE)

پروبن تھین

Probanthiline bromide 15mg, haloperidol 0.2mg: caps. 10: Rs. 17.50

SEREBANTHINE

(SAERLE)

سیری بن تھین

Probanthiline bromide 15mg, haloperidol 0.2mg: caps: 10: Rs. 17.50

SPASTHELINE

(SUN PHARMA)

اسپاس تھیلین

Probanthiline bromide 15mg: tabs: 10: Rs. 3.98

VALE THAMATE BROMIDE

وے تھامیٹ برومائیڈ

افعال و منافع: زخم معده کے سبب قات غذائی میں تشنج، ورم معده، درد شکم اور چھوٹے عضلات کے تشنج میں مفید ہے۔ زچگی کے وقت رحم کے منہ کھلنے میں تاخیر ہونے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار

منفی افعال: گلوکوما ورم غدہ قدامیہ فم معده کی تنگی التساع قولون میں استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔

تجارتی مرکبات

EPIDOSIN

(TTK PHARMA)

اے پی ڈوسن

Valethanmate brom. 10mg; dragees 10, Rs.9.53

EPIDOSIN INJ

(TTK PHARMA)

اے پی ڈوسن انجکشن

Valethanmate brom. 8mg/ml; inj. 5x1ml Rs.26.35

OSDIL

(TROIKAA)

اوس ڈیل

Valethanmate brom. 8mg per ml inj. 5x1ml amps: Rs.36.75

VALOSIN

(SHUMA LABS)

والوسن

Valethanmate bromide 8mg per ml inj. 10x1ml: Rs.46.40

MESALAZINE

می سالازائن

افعال و منافع: آنتوں کے قولنجی درد، زخم معده، و امعاء کے علاج اور حفظ ماتقدم کے لیے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲-۳ گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے حفظ ماتقدم کے لیے ۲-۳ گرام یومیہ۔

منفی افعال: سیلی سیلیٹ کے مرکبات سے حساس مریضوں کو مضر ہے

مضر اثرات: معده و آنتوں کے فعل میں خرابی اور درد سر لاحق ہو سکتا ہے۔

احتیاط: گردوں کی خرابی، خون یوریا اور پروٹین کے اخراج کی زیادتی اور حمل میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: لکٹولوز کے مرکبات جس سے پاخانے میں تیز آہیت کی کمی ہو جائے۔

تجارتی مرکب

TIDOCOL

(TORRENT)

ٹی ڈوکول

Mesalazine 400mg: tabs: 10: Rs 57.90

SULPHA SALAZINE

سلفا سالازین

افعال و منافع: آنتوں کی سوزش آنتوں کے معمولی اور شدید زخم کے علاج اور حفاظت کے لیے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: مختلف حالتوں میں الگ الگ ہے علاج کے لیے ۴۰۰ ملی گرام پو میہ کئی خوراکوں میں۔
منفی افعال: اس دوا سے حساس مریضوں کو، ۲ سال سے کم عمر بچوں کو، آنتوں اور آلات بول کی رکاوٹ میں اس کا استعمال مناسب نہیں۔

احتیاط: خون کی جانچ کراتے رہیں۔ گردوں اور جگر کے افعال پر نگاہ رکھیں۔
مضر اثرات: مردوں میں فقدان حویات منویہ ہو سکتا ہے

تجارتی مرکبات

SALAZOPYRIN

(WALLACE)

سالازوپائی رین

Sulphasalazine 500mg tabs 10: Rs. 51.00

SALAZOPYRIN EN

(WALLACE)

سالازوپائی رین ای۔ این

Sulphasalazine 500mg e-c tabs: 10: Rs.75.50

AMINOSALICYLIC ACID اے می نو سیلی سائی لک ایسڈ

افعال: بڑی آنتوں کے زخم و ورم میں مفید ہے۔ ۲ سے ۴ گرام کئی خوراکوں میں تقسیم کر کے۔

تجارتی مرکب

MESACOL TAB

10 Rs. 52.60

تجارتی مرکب

نظام دوران خون میں کام آنے والی ادویہ

BLOOD SYSTEM

انجماد خون روکنے والی ادویہ **ANTI COAGULANT**

ANTI THROMBOLYTICS

ایسی نو کو مارول **ACENO COUMAROL**

افعال و منافع: یہ دوا خون میں وٹامن K کے موثر اجزاء ۲-۳-۴-۵-۹-۱۰ کے فعل میں رکاوٹ پیدا کر کے انجماد خون کو روکتی ہے۔ وریدوں میں خون جمنے۔ ٹھکے CLOT بننے، پیچیدوں میں قلبی اور دماغی عروق میں خون کی رکاوٹ قلب میں شدید رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: مرض کے حالات ٹسٹ رپورٹ کے بعد دوا کے ساتھ پرچے کے مطابق مقدار کا تعین کیا جائے۔

منفی افعال: دوا کے استعمال کے دوران ۱۰ دن تک آپریشن یا بائیو پسی (جسم کا ریشہ نکالنے) عروق کے پھٹنے، شدید چوٹ لگنے، غذائی نالی میں جریان خون، ہائی بلڈ پریشر حادثاتی یا صدہاتی جریان خون، اور حمل کے حالت میں اس کا استعمال خطرناک ہے۔

مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، بخار، تھکی، اسہال جلد میں خرابی پیدا ہونا۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: باربیٹون کے مرکبات، ریفام پی سین، فین ٹائٹن، شراب فینال پیوٹا زون، سیٹی ڈین کے ساتھ اس کا خراب اثر ہوتا ہے۔

تجارتی مرکب

ACITROM

(S G PHARMA)

ایسی ٹرام

Acenocoumarol 1mg & 4mg tabs 1mg: 10: Rs.22.00

ASPIRIN

ایسپرین

الحال و منافع قلبی عروق میں خون کے الجھد کو روکتی ہے۔ عروق میں جھد CLOT نہیں بننے دیتی۔ سرخ دانوں کے الحال میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ قمر ہو کسن کے فضل پر اثر انداز ہوتی ہے اس طرح اخلاط خون سے پیدا ہونے والے عوارض میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب ۱۰۰ ملی گرام روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔ صحت مانتھہ کے لیے ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام ہر صبح کھلائیں۔

منفی افعال زخم معدہ، ایسپرین سے حساس مریضوں میں استعمال نہیں کرتا چاہیے۔

احتیاط جریان خون کی حالت میں، دردوں کی ساخت خراب ہونے پر فور چائے کے ساتھ نہ کھلائیں۔

تجارتی مرکبات

ASA 50 GR (GERMAN REMEDIES) اے ایس اے ۵۰ جی آر

Acetyl Salicylic Acid 50mg tabs 14 tabs Rs 7 10

ASPICOT (CONCEPT) ایس پی کاٹ

Acetyl Salicylic Acid 80mg tabs 10 tabs Rs 2 20

CARDIWELL-PLUS (TORRENT) کارڈی ویل

Aspirin (enteric coated) 40mg Dipyridamole 75mg 10 tabs Rs 13 80

DISPIRIN C V 100 (PILSKILL & COLEMAN) ڈسپرین

Acetyl Salicylic Acid 100mg Cal carbonate 30mg Anhydrous citric acid 10mg Solution, tablets 10 tabs Rs 1 82

DYNASPRIN ENCO (U.S. VITAMIN) ڈائنا اسپرین

Aspirin 60mg dipyridamole 75mg, e-c tabs 10 Rs 17 02

E-PRIN (ELDER) ای پرین

Aspirin 325mg (enteric coated) 10 Rs 2 46

LODOSPRIN (ASTRA-BL) لوڈا اسپرین

Acetyl salicylic acid 75mg (uncoated) tabs 14 Rs 7 00

LOPRIN-75

(UNISEARCH)

لوپرین ۷۵

Low dose aspirin 75mg tabs 14 Rs. 4 50

THROMBOSPRIN

(SUN PHARMA)

تھرومبواسپرین

Enteric coated aspirin 100mg Dipyridamole 75mg tabs. 10 tabs. Rs. 13.30

خون کو محفوظ رکھنے والے سلوشن

BLOOD BANKING SOLUTION

A C D SOLUTION 'A'

(PREM PHARMA)

اے سی ڈی سلوشن اے

Dextrose 2.4gms, sodium citrate 2.20gm, citric acid anhydrous 0.73 gm per 100ml. 500ml bottle: Rs. 30.00

A C D SOLUTION 'B'

(PREM PHARMA)

اے سی ڈی سلوشن بی

Dextrose 1.47gms, sodium citrate 1.32 gms, citric acid anhydrous 0.44gms per 100ml : 375ml bottle : Rs.30 00

ANTICOAGULANT CITRATE SOLUTION -A**(ACD SOLUTION**

(TABLETS INDIA)

انٹی کوآگولینٹ سائٹریٹ سلوشن

Citric acid 7.3mg, sodium citrate 22mg, dextrose 24.5mg per ml solution. 75ml in 540ml bottle

CPD SOLUTION

(PREM PHARMA)

سی پی ڈی سلوشن

Dextrose 2.55gms, sodium citrate (dihydrate) 2.63gm, citric acid (mono hydrate) 0.327gms, sodium acid phosphate 0.251gm, CPD solution A 70ml for storing 500ml of blood: Rs. 30 00, CPD solution B 42ml for storing 375ml of blood: Rs. 30.00, CPD solution 14ml for storing 100ml of blood Rs. 17.00

افعال و منافع: یہ سلوشن خون کو ہڈ تک میں محفوظ رکھنے کے لیے اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔

DIPYRADAMOL

ڈائی پائی راڈامول

افعال و منافع: یہ عروق کو پھیلانے والی دوا ہے۔ عروق قلبیہ کی تنگی، وجع القلب ہائی پاس سرجری کے دوران بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دارفارین اور اسپرین کے ساتھ ملا کر استعمال کرائی جاتی ہے۔

مقدار و خوراک: ۲۵ سے ۷۵ ملی گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔
منفی افعال: زخم معدہ میں مضر ہے۔

مضر اثرات: درد سر، چکر، آنا، ہضم کی خرابیاں جلد پر دھاریاں پڑنا۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع تیزابیت Antacid کے ساتھ دینا نقصان دہ ہے۔

تجارتی مرکبات

CARDIWELL	(TORRENT)	کارڈی ویل
Dipyridamole 25mg, 75mg & 100mg dragees	25mg 10 Rs 3 31	
75mg. 10; Rs.7.30 100mg 10. Rs.9 76		
DYNACARD	(U S VITAMIN)	ڈائی ناکارڈ
Dipyridamole 25mg & 100mg tabs	25mg: 10, Rs 2.74 100mg: 10	
Rs.7 82		
INFARTIN 60	(JENBURKT)	انفارٹن ۶۰
Aspirin 60mg, dipyridamole 75mg tabs:	30 Rs 47.50	
PERSANTIN	(GERMAN REMEDIES)	پرسن ٹین
Dipyridamole 25mg & 100mg tabs	25mg 10 Rs 3.57 100mg 10	
Rs.12 09		
THROMBONIL	(SUN PHARMA)	تھرومبونیل
Enteric coated aspirin 100mg Dipyridamole 75mg tabs.	10 tabs	
Rs.13.30		

HEPARIN

ہپارین

افعال و منفع: مانع انجماد خون دوا ہے۔ خون جمانے والے مادے تھرومبین کے فعل کو روکتی ہے وریڈوں میں اور پھیپھڑوں میں انجماد خون، تھکے CLOT بننے کو روکتی ہے۔

مقدار و ترکیب: حفظ ماقدم کے لیے ۵۰۰۰ یونٹ پھیپھڑوں میں خون جمنے کی شدید حالتوں میں ۱۰۰۰ یونٹ براوانٹیوٹن انہزار سے ۲ انہزار یونٹ فی گھنٹہ کے حساب سے یا زیر جلد انجکشن لگائیں۔

منفی افعال: زخم معده، گروے اور جگر کے امراض میں، جریان خون میں، عادتى نزف الدم کے مریضوں میں شدید ہائی بلڈ پریشر میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: جریان خون، الرجى، خون میں تھرومبین کی کمی، غمغ، سلفہ، ہڈیوں کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ احتیاط: اس کے ساتھ اسپرین کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

BEPARINE INJ

(BIOLOGICAL E)

ہپارین انجکشن

Heparin sodium 100 iu; 5000 iu per ml inj 1000 iu 5ml Rs. 12.27 5000 iu 5ml Rs.69.80

BEPARINE CREAM

(BIOLOGICAL E)

ہپارین کریم

Heparin sodium I.P. 50 iu Benzyl Nicotinate 0.2% w/w 15g tube Rs. 6.75

BIOPARIN

(BIOGENICS)

بایوپارین

Heparin sodium 1000 u.u and 5000 i.u 1000 i.u 5ml vial : Rs 17m25. 5000 i.u 5ml vial: Rs.74.50

DECLOT

(RECON)

ڈی کلاٹ

Heparin sod. 5000 and 25,000 i.u inj 5000 i.u 5ml: Rs. 15.50, 25,000 i.u 5ml: Rs.63.00

THROMBOPHOB

(GERMAN REMEDIES)

تھرومبوفوب

Heparin 5000 iu, benzyl nicotinate 0.2g per 100g oint: 20g: Rs.17.45

THROMBOPHOB GEL (GERMAN REMEDIES)

تھرومبوفوب جیل

Heparin 20,000 iu per 100g. 20g. Rs 15 10

PHENINDIONE

فے نین ڈی یون

افعال و منافع: انجماد خون اور تھکے CLOT بننے کو روکتی ہے۔

منفی افعال: ورم جگر حاد، گردوں کی نرابی، جریان خون کے امراض، آپریشن سے ۲۴ گھنٹہ قبل یا بعد، زچگی کے دوران، حمل اور ایام رضاعت میں شدید نقصان کا خطرہ ہے۔

مضر اثرات: جلد پر دھبے پڑنا، بخار، سفید ذرات W.B.C. کی کمی ہونا، اسہال ورم جگر گردوں کی کمزوری، پیشاب کی رنگت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: لو بلڈ پریشر، گردوں کے علاج کے دوران، وٹامن K کی کمی۔ طویل علالت اور بڑھاپے میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع درد و ورم دواویہ (NSAID) دافع ذیابیطس خوردنی دوائیں سلفا گرد پ، کوئینی ڈین، انٹی بائیوٹک، فین فارین، سی می ٹی ڈین، کارٹی سون کے مرکبات منقی جگر دواویہ کے ساتھ اس کو دینا نقصان دہ ہے۔

تجارتی مرکب

DINDEVAN

(BIOLOGICAL E)

ڈن ڈی وان

Phenindione 50mg. tabs 25: Rs.8,39, 100. Rs 52 40

STREPTO KINASE

اسٹرپٹوکائی نیس

افعال و منافع: یہ انجماد خون کو روکنے کی بہترین دوا ہے چوٹ موج زخموں کے اندمال کے لیے مستعمل

ہے۔ چوٹ لگنے کے ۳ دن کے اندر ہی استعمال کرنا چاہیے پھیپھڑوں میں خون جمنا و ریدوں میں لو تھڑا

clot بننے کو روکتی ہے قلب کے شدید درد ہارٹ اینک میں زندگی بخش دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ڈھائی لاکھ سے ۱۵ لاکھ یونٹ شدید وجع القلب تسد دی میں ساڑھے سات لاکھ یونٹ دریدی راہ سے اکھنڈہ میں ۲۰ ہزار یونٹ کے حساب سے دینا چاہیے گہری وریدوں کے انجماد میں ڈیڑھ لاکھ یونٹ ہر گھنٹہ میں دینا چاہیے۔

متقی افعال: شدید جریان خون میں، اسٹرپٹوکاکس انفکشن میں، شدید ہائی بلڈ پریشر دماغی جریان خون، جگر و گردوں کے امراض ورم ہانترا اس حاد، ذیابیطس شکرى، آلات ہضم کے جریان خون، قولون میں زخم، اور استخاضہ میں اس کا استعمال خطرناک ہے۔

مضر اثرات: بلڈ پریشر میں کمی، نبض غیر منتظم اور نرف الدم ہو سکتا ہے۔

احتیاط: حمل کے دوران اور بچوں کو استعمال نہ کرائیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: وہ دوائیں جو خون کے سرخ ذرات R.B.C. کو متاثر کرتی ہیں۔ اسپرین اور انڈومیتھاسین کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

EMBOKINASE (MODI-MUNDIPHARMA) ایبو کائی نیس

1.5 Million iu vial: Rs. 3734 00

KABIKNASE (PHARMACIA) کابی کائی نیس

Streptokinase i.u 750000 i.u, 1.5 million i.u. I.V. injection 750000 i.u.

Rs. 1739.00 1.5million i.u. : Rs. 3088.10

STREPTASE (HOECHST) اسٹریپ ٹیس

Pure stabilised streptokinase 750,000 i.u & 15,00,000 i.u vials:

750,000 iu: Rs. 1961.00, 15,00,000 iu: Rs.3497.00

لائسین اے سی ٹائل سیلی سائی لیٹ

LYSINE ACETYL SALICYLATE

افعال و منافع: رگوں میں خون جمناء، خون کے سرخ ذرات کا مردہ ہونا، جسم کے شدید درد میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۰.۹۹ سے ۲.۲۵ گرام یومیہ وریڈی راہ سے۔

تجارتی مرکب

BIOSPIRIN

(BIOCHEM)

بایوسپورین

Lysine acetylasalicylate 0.9g, glycine 0.1g per vial/ inj 1 vial Rs 10.11

TIKLO PIDINE

ٹیکلو پائیڈین

افعال و منافع: انجماد خون کی تکالیف حادثات، وجع القلب، ذیابیطس، ضعف بصری، پائس سرجری میں مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۲ بار، ۱۰ سال سے کم عمر بچوں کو دینا درست نہیں۔

متفی افعال: جریان خون کے عوارض، غذائی نالی کے زخم، جگر کے حاد امراض، خون کی غیر طبعی حالت شدید جریان خون حمل و ایام رضاعت، جگر و گردوں کی خرابی، اور بڑھاپے میں استعمال کرنا مضر ہے۔

مضر اثرات: اسہال، متلی تے ابکائی، درد شکم، جلد پر دھاریاں، نیوٹروفیل کی کمی، غذائی نالی میں نرف الدم سردرد، کان بچنا، چکر آنا، یرقان جیسی علامات ہو سکتی ہیں۔

احتیاط: دوران علاج، آپریشن سے، جگر و گردوں کی خرابی میں، بوڑھوں و بچوں کو احتیاط لازم ہے خون کے سفید و سرخ ذرات جگر کے فعل اور کولیسٹرول کی جانچ کراتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

TICLOP

ZELTA (CADII A)

ٹیک لوب

Ticlopidine Hcl 250mg: tabs: 50. Rs 475.00

TICLOPIDINE

(CONCEPT)

Ticlopidine 250mg tabs: 10: Rs. 94 00

ٹیک لاپی ڈین

TICLOVAS

(USV)

Ticlopidine Hcl 250mg. tabs: 10: Rs 109.50

ٹیک لوواس

TYKLID

(TORRIENT)

Ticlopidine Hcl. 250mg: Tabs: 10 Rs. 169.70

ٹائی کلڈ

UROKINASE

یوروکائی نیس

افعال و منافع: یہ دوا جے ہوئے خون کو تحلیل کرتی ہے، چوٹ لگنے کے سون کے اندر یہ دوا اثر کرتی ہے، وجع القلب، پھیپھڑوں میں خون جمن، گہری وریدوں میں خون جمن، عروق و مویہ میں ٹھکے clot بنا، بیرونی وریدوں میں گانٹھیں پڑ جانے پر یہ دوا بہت موثر رہتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰۰ سے ۴۵۰۰ ہزار یونٹ / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ڈیکسٹروز کے ساتھ ملا کر وریدی چڑھائی جاتی ہے۔

منفی افعال: اپریشن کے بعد دس دن تک، پھٹے ہوئے زخم کی حالت میں، قنات غذائی آلات بول میں زف الدم، ہائی بلڈ پریشر، حمل، زچگی کے بعد ۱۰ دن تک اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: جریان خون، ری ایکشن الرجی کی شکایت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: دوران حمل، بچوں کو استعمال کرانے میں احتیاط برتیں۔

نوٹوں کے ساتھ رد عمل: گلوکوزائیسم، اور انڈوسیتھائین کے ساتھ خراب رد عمل ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

UROKINASE

(MODI-MUNDI PHARMA)

یوروکائی نیس

Urokinase 2.5 lakhs iu and 5 lakhs iu inj. 2.5 lakhs vial: Rs 2062 00

5 lakhs vial: Rs 4011.00

UROKINASE

(WIN-MEDICARE)

یوروکائی نیس

per vial inj. 50,000 iu Rs. 650.50, 250,000 iu Rs 1920, 500,000 iu

Rs. 3640 00

UKIDAN

(SERUM INSTITUTE)

۱۰۰۰

per vial inj 100,000 iu Rs. 1159 21 500,000 iu Rs. 4077 87

WARFARIN SODIUM

وارفارین سوڈیم

افعال و منافع: انجنادنوں کو روکتی ہے وٹامن K کے اثر کو ختم کرتی ہے۔ وریدوں میں خون کا جمناؤ
 ریسہروں کی حروق و شرائین میں رکاوٹ، وجع القلب، سرطان الریہ میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۵۰ ملی گرام پیمے۔

منفی افعال: زخم معدہ و امعاء، زنی رجحان رکھنے والوں، آپریشن اور ولادت کے ۲۴ گھنٹے تک، جگر اور
 ترووں کی خرابی میں استعمال نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: گھٹ (سودہ) جلد پر دھبے پڑنا، اسہال کی شکایت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: رضاعت، ہائی بلڈ پریشر میں، بڑھاپے، شدید علالت میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع ذیابیطس خوردنی ادویہ، سلفاڈرگس، کوئی نی ڈین فین فارین، سائی می
 نی ڈین، کارٹی سون کے مرکبات، دافع فنگس اور دافع درد ادویہ۔

تجارتی مرکب

UNIWARFIN

(UNICHEM)

یونی وار فین

Warfarin sodium 5mg tabs. 25 tabs Rs. 13.25

جریان خون روکنے والی ادویہ

COAGULANT

ADRINOCHROME-MONO (۱) ایڈی ری نوکرم مونو سکی کاربازون

SEMICARBAZONE

CARBAZO CHROME (۲) کاربازو کروم سلی سیلیٹ

SALICYLATE

افعال و منافع: انجماد خون میں معاون ہے۔ منہ سے خون آنا آنکھ کے طبقہ ر۔ ٹیٹا میں نزلہ دم،

تکسیر کثرت حیض، ٹائسلز کے آپریشن سے قبل و بعد، دیگر جریان خون کی حالتوں میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اسے ۲ گولی دن میں دو بار انجکشن وریڈی ۲ ملی لیٹر، دن میں ۲ بار۔

متفی افعال: ان مریضوں میں جو سلی سیلیٹ سے حساسیت رکھتے ہیں۔

احتیاط: انجکشن وریڈی لگانا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

CHROMOSTAT INJ (LIFE) کروموسٹایٹ انجکشن

Adrenochrome monosemicarbazone 1mg inj; 25x2ml Rs.87.15;

25x10ml Rs.180.94

CHROMOSTAT TABS (LIFE) کروموسٹایٹ ٹیبلٹ

Adrenochrome monosemicarbazone 0.5mg, menaphthone sod.

bisulphite (vit.K3) 10mg, ascorbic acid (vit C) 150mg, rutin 50mg,

calcium dibasic phosphate 132 mg tabs 10, Rs.12.94

K-STAT INJ (MERCURY) کے اسٹیت انجکشن

Adrenochrome monosemicarbozone 1mg 2ml Rs. 3 60

SIOCHROME (ALBERT DAVID) سالیو کروم

Adrenochrome mono semi carbazone 0.75mg Menodione sodium

bisulphate 20mg, Rutin 50mg, vit-C 150mg Calcium dibasic

phosphate 200mg tabs. 10 tabs Rs.6.74

STYPTOCHROME INJECTION I.M

ایمپرو کروم انجکشن ای ایم

(DOLPHIN)

Adrenochrome monosemicarbazone 1.5mg per 2ml amp Rs 4.24

STYPTOMET

(DOLPHIN)

ایمپرو مٹ

Ergometrine maleate 0.5mg adrenochrome monosemicarbazone 1mg
rutin 50mg menadione sod bisulphite 5mg dibasic cal phos 200mg tabs
10 Rs.19.52**SYPTOVIT**

(DOLPHIN)

ایمپرو وٹ

Adrenochrome monosemicarbazone 0.33mg, menadione sod bisulphite
10mg, ascorbic acid 100mg cal dibasic phos 125mg tabs 10 Rs 15.02**STYPTOCID**

(STADMED)

ایمپرو سڈ

Adrenochrome monosemicarbazone 0.5mg, menadione sod bisulphite
10mg Rutin 50mg, Vit C. 37.5mg, vit D 200 i.u, cal dibasic phos
125mg 10 tabs: 14.75**STYPTOCID INJ**

(STADMED)

ایمپرو سڈ انجکشن

Adrenochrome monosemicarbazone 0.75mg/2ml. Rs 3.60

STYPTOCID FORTE INJ (STADMED)

ایمپرو سڈ فورٹ انجکشن

Adrenochrome monosemicarbazone 5mg, phenol (as preservative)
0.5% w/v/ml 10ml vial: Rs.16.50**AMINOCARPROIC ACID** امینوکارپرو ایک ایسڈ

افعال و منافع: ایک سریع الاثر مانع جریان خون دوا ہے۔ جریان کی اکثر حالتوں میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۵ گرام نارمل سیلان یا ۵ فیصدی گلوکوز سیلوشن میں ملا کر دریدی طور سے دی جاتی
 ہے۔ اکھنڈ میں ایک گرام کے حساب سے دی جائے یہاں تک کہ خون بند ہو جائے ۲۴ گھنٹہ میں ۳۰
 گرام سے زیادہ نہیں دینا چاہیے۔

منفی افعال: خون کی رگوں میں خون جمنے Clotting کی شکایت ہو تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
 مضر اثرات: تیز ڈرپ دینے سے، لو بلڈ پریشر، سینہ میں درد، نبض غیر منتظم عروق شعریہ میں انجماد

خون کی شکایت ہو سکتی ہے۔

احتیاد: ڈرپ بہت بہت دینا چاہیے۔ مریض قلب جھر اور گردوں میں حمل کی حالت میں احتیاد رہنا۔

تجارتی مرکبات

CAPROSTAT INJ

(LIFE)

کیپروستات

Aminocaproic acid LP 400mg inj. 10x10 Rs 129 46

HEMOCID INJ

(SIDDLE SAWYER)

ہیموسا

Aminocaproic acid 250mg /ml 20ml vial Rs 54 10

CALCIUM GLUCONATE

کیلشیم گلوکونیت

متعلقہ افعال: کیلشیم خون کی رگوں سے اخراج خون کی صلاحیت کو کم کر کے خون روکنے میں مدد دیتا ہے۔
بے پروسیرو سکوں سے اخراج خون، خون تھوکتا (فٹلہ دم) خون کی قے آہ، آفات منع حمل کے
سبب جریان خون، استخوانوں سے زائد اخراج خون میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: 500 ملی گرام سے 1000 ملی گرام تک۔

پینٹ: 10 ملٹر کے انجکشن کیلشیم گلوکونیت 10 سے 15 مختلف کمپنیاں تیار کرتی ہیں۔

کنجوگیٹڈ ایسٹروجن CONJUGATED ESTROGENS

افعال و نتائج: یہ دو خون کی ہارمونوں سے اخراج خون کو کم کرتا ہے۔

مقدار و ترکیب: 20 ملی گرام مصنوعی بہت بہت بہت دریدی 6 سے 12 گھنٹہ کے وقفے سے لگاتا
چاہیے۔

متعلقہ افعال: حمل، خرابی جگر، سینہ میں کینسر، عروق میں انجماد خون کی تکالیف میں نہیں دینا چاہیے۔

مضمر اثرات: سکتا ہے کہ خرابیوں، چھاتیوں کا بہت حد تک متاثر ہو۔

احتیاط: مریض اور مہلتان، پستانوں کا غیر معمولی بڑا ہونا جسم میں پانی اور نمکیات کا غیر طبعی ہونا، مرگی، آدھائی (شقیقہ)، دم، قلب اور گردوں کے امراض، رحم میں غیر طبعی ساخت کا بننا، نوجوانوں میں اور ایام رخصت میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

PREMARIN

(WYETH)

پری مارین

Conjugated estrogens 25mg, per vial with 5ml amp of sterile diluent (2.0% benzyl alcohol). 25mg: Rs.70.92

PREMARIN TABS

(WYETH)

پری مارین ٹبلیٹ

1.25mg: 20 tabs: Rs.113.00

E THAM SYLATE

ای تھم سائی لیٹ

افعال و منافع: عروق شعریہ سے جریان خون، کثرت حیض، رحمی جریان خون آلات منع حمل کے سبب جریان خون، میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام ہر ۴ گھنٹہ بعد، جب تک خون بند نہ ہو۔

متقی افعال: حمل کی حالت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: درد سر، جلد پر دودڑے پڑنا، حملی آنا۔

تجارتی مرکبات

DICYNENE

(DOLPHIN)

ڈائی سائی نین

Ethamsylate 250 & 500mg tabs 250mg 10, Rs 52.59 500mg 10, Rs.103.19

DICYNENE INJECTION (DOLPHIN)

ڈائی سائی نین انجکشن

Ethamsylate 250mg, per 2ml i.v, i.m. inj 2ml, Rs.22.60

ETHAMSYL

(MEJDA)

ای تھم سائل

Ethamsylate 250 & 500mg Tabs 250mg: 10: Rs. 40.75 500mg: 10: Rs.75.25

HAEMO COAGULASE

ہیمو کوگولیس

افعال و منافع: جسم کے کسی عضو سے جریان ہو اور کسی سبب سے ہو، خون روکنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ایونٹ زیر جلد یا عضلاتی انجکشن، آپریشن سے آدھ گھنٹہ قبل بطور حفظہ مقدم لگا سکتے ہیں۔ اگر آپریشن کے دوران اخراج خون ہو رہا ہو تو فوراً ایک ملی لٹر لگائیں بچوں کو عمر کے مطابق آدھ یونٹ سے ایک تہائی یونٹ دینا چاہیے۔

منفی افعال: انجماد خون کی ہسٹری میں نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: زیادہ مقدار میں اور دوسری خوراک ۸ گھنٹہ سے قبل نہ دی جائے۔

تجارتی مرکب**REPTILASE**

(TROIKAA)

ریپ ٹی لیس

Haemocoagulase 1 NH unit per ml inj. 1ml amp: Rs.40.00

BOTRO PACE

(JUGGAT)

بوٹرو پیس انجکشن

1ml 35.75

FERACRYLUM

فیرا کرائی لم

افعال و منافع: عروق شریہ کے پھٹنے کٹنے سے اخراج خون آپریشن کے بعد ہونے والے جریان خون میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: فیصدی سلوشن اخراج خون کے مقام پر لگائیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ایپسی لان (APSILAN)، امینو کار پروٹیک ایسڈ کے ساتھ اس کا استعمال مضر ہے۔

05

تجارتی مرکب

HEMOLOK

(THEMS CHEMICALS)

ہیمولوک

Feracrylum % solution 5ml amp Rs. 13.17; 10ml amp Rs. 18 90, 20ml amp Rs. 26.70

میناڈیون سوڈیم بائی فاسفیٹ

MENADIONE SODIUM BI PHOSPHATE

افعال و منافع: منہ سے خون آنا، کثرت حیض، پیشاب میں خون آنا، آنکھوں میں خون چھلکنا تکسیرد و دیگر جریان خون کی حالتوں میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

متقی افعال: انٹی ہٹامین دواؤں کے ساتھ دینا معتر ہے جگر کی خرابی میں بھی نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: دوران حمل، اور رضاعت کے دوران منع ہے۔

تجارتی مرکبات

CADISPER.C

(CADILA)

کڈ سپر۔ سی

100mg tabs. 10 Rs. 10.34 1000 Rs. 869.70

STYPTOCID

(STADMED)

اسٹپٹوسڈ

125mg tabs 10 tabs Rs. 13.50

Kerutin-C

Injection / Tablet

Reduces
Blood loss

In

Menorrhagia
Metrorrhagia
Haemoptysis


LAMINATED LYS

MENADION SODIUM ڈائی فاسفیہٹ DIPHOSPHATE

افعال و منافع: خون میں پروتھر مبین کی کمی کے سبب ہونے والے جریان خون کو روکتی ہے جسم کے کسی بھی حصہ سے کسی سبب سے جریان خون کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ سے ۱۵ ملی گرام۔

احتیاط: نو مولود بچوں میں، حفاظت کے لیے، جریان خون کے خطرہ کے پیش نظر اس کا استعمال مناسب نہیں۔

RUTIN

ریوٹن

افعال و منافع: مختلف اسباب سے ہونے والے جریان خون، پیشاب میں خون آنا، خون تھوکنا، استساضہ، خطرہ اسقاط، آنکھوں میں خون چھلکنا مسوڑھوں سے خون آنا، نو مولود کا جریان خون وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

احتیاط: حمل ایام رضاعت، اور جگر کی خرابی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: انٹی ہسٹامین دواؤں کے ساتھ۔

تجارتی مرکبات

C.K.P. TABS

(BELI)

Ascorbic acid (vitC) 75mg, menadione sod bisulphite (vitK) 10mg, rutin (vitP) 0.1mg, calcium divasic phosphate 0.1g, chrbazochrome salicylate 2.5mg tabs; 10 Rs.4 55

KALPASTIC

(BDII)

Rutin 20mg vit C 100mg Acetomenaphthone 2mg Calcium gluconate 200mg tabs. 10 tabs Rs.15.80

سی، کے، پی ٹبلیٹ

کال پاسٹک

KERUTIN-C

(MERCURY)

کیروٹین۔ سی

12 Rs 18 00

STYPTOCID

(STADMED)

اسٹیپٹوسڈ

10 tabs Rs 13 50

METHYL ERGONOVINE

میٹھائل ارگونوون

METHYL HESPERIDIN

میٹھائل ہسپریڈین

افعال و منافع: خون تھوکنا، پیشاب میں خون آنا، کثرت حیض، ہار بار حیض آنا عذتی اور خطرہ اسقاط کے پیش نظر خون آنا، آنکھ میں خون آنا، مسوڑھوں سے خون آنا، کسی بھی جگہ سے کسی بھی سبب سے خون آنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۴۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

احتیاط: حمل رودھ پلانے کے ایام اور جگر کی خرابی میں مضر ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: انٹی ہشامین کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

METHERONE INJ

(MEJDA)

میتھیرون انجکشن

Each ml contains: Methyl ergonocine Maleate I P 0.2mg per ml inj,
50amps Rs 222 57

CADISPER C

(CADILA)

کیڈ سپر مہلیٹ

10 tab. Rs. 10 34 1000. Rs.869 70

COSKLOT 250 500 1000

(Ethersylate)

- Menorrhagia / IUCD Menorrhagia
- Epistaxis
- Surgery
- Haematemesis / Melena
- Haemoptysis

VITAMIN K

وٹامن کے

افعال و منافع: وٹامن K پلازما میں خون جمنے کی صلاحیت والے فیکٹر کا ضروری جز ہے اس کی کمی سے جریان خون کی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ بچوں کو خون جمنے کی صلاحیت میں کمی ہیموفیلیا اور وٹامن K کی کمی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اعلیٰ گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ۲-۳ خواراکوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی افعال: جگر کی خرابی اور زیادہ مقدار میں نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: جلد پر خراش، سانس کی نالی میں خراش، خون کی کمی، پیشاب میں بلی روہین میں اضافہ۔

تجارتی مرکب

GYNAEC V P

(U S VITAMIN)

گائنی سی وی پی

Vit K 0.66mg citrous biflavonoid comp 150mg vit C 75mg, ferrous gluconate 67mg, menadione 0.66mg, cal. lact 300mg caps. 10 caps. Rs.10.57

SOMATOSTATIN

سوماتو سٹاٹین

افعال و منافع: یہ رطوبات معدہ گیسٹرک ایسڈ وغیرہ کی پیدائش کو روکتی ہے۔ قات غذائی سے ہونے والے جریان خون کو روکتی ہے معدہ و آنتوں کے شدید جریان خون اور زخم کو روکتی ہے۔ آنتوں پتہ اور ہانقراس کے آپریشن اور ناسور کو دوسری دواؤں کے ساتھ استعمال کرانے پر بہترین نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰۰ مائکرو گرام وریڈی انجکشن بہت آہستہ ۵ منٹ میں لگائیں یا ۳ ملی گرام ڈیکسٹروز ۵ فیصدی سلان میں ملا کر ۱۲ گھنٹہ میں ڈرپ سے چڑھائیں۔

منفی افعال: حساس مریضوں، حمل، ایام رضاعت، ولادت کے فوراً بعد نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: حلی، تے، پھر آنا، چہرہ سرخ ہوتا۔



احتیاط: انسولین لینے والے ذیابیطس کے مریضوں کو۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: ہکسوباربی ٹول، پٹی ٹرازدول کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکب

STILAMIN

(SERUM INSTITUTE)

اسٹی لامن

Somatostatin (as acetate) 250mg and 3mg, d-mannitol 5mg inj. 250mg
amp Rs. 599 37, 3mg amp. Rs 3711.65

CHROMOSTAT INJ

کروموسٹاٹ

CHROMOSTAT TAB

کروموسٹاٹ ٹبلٹ

پلازما کی کمی دور کرنے والے مرکبات

PLASMA SUBSTITUTE

DEXTRAN

ڈیکسٹران

افعال و منافع: ڈیکسٹران ۶ فیصدی نارمل سیلائن یا ۵ فیصدی ڈیکسٹروز سیلوشن کے ساتھ پلازما کی کمی کو دور کرنے میں مفید و معاون ہے۔ ڈیکسٹران کے ذرات خون میں حل ہو کر پلازما پروٹین کی طرح کام کرتے ہیں۔ شدید جریان خون، صدمات، حادثات، آپریشن، جلنے کے نتیجے میں خون کے پلازما کی کمی کو پورا کرتا ہے۔

مقدار و ترکیب: شدید اخراج خون کے نتیجے میں ہونے والے صدمہ کی حالت میں ڈیکسٹران کی بوتل ۱۵ منٹ میں چڑھانا چاہیے دوسری بوتل ۳۰ سے ۴۵ منٹ میں، مریض کی حالت کے لحاظ سے مقدار و وقت کا تعین کرنا چاہیے۔

معثر اثرات: غد و لفاوی اور ساختوں میں ڈیکسٹران جذب نہ ہونے کے سبب کبھی کبھی ورمی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

احتیاط: زیادہ مقدار میں، قلب پر ناخوشگوار اثرات کی حالت میں، پیشاب کی کمی یا رکسنے میں نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

LOMODEX 70

(RALLIS)

لو مودیکس ۷۰

Low molecular wt dextran with average mol wt of 70,000 in 5% Dextrose or in 0.9% in normal saline 6% iv infusion 540ml Rs 61.86

LOMODEX -40

(RALLIS)

لو مودیکس ۴۰

Solu of 10% w/v Dextran having average mol wt of 40,000 in 0.9% saline or 5% Dextrose 540ml Rs 150.28

MODIFIED-GELATIN مائیڈ گیلٹین پالیپپٹائیڈ POLY PEPTIDE

افعال و منافع: یہ مرکب پلازما کا نعم البدل ہے خون میں پلازما کی کمی، شدید صدمات، چوٹ، حادثات، جٹ، اپریشن، خون عطیہ دینے اور جریان خون کے نتیجے میں پلازما کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہترین ہے۔

مقدار و خوراک: صدمہ کی معمولی حالت میں ۵۰۰ سے ۱۵۰۰ ملی لیٹر شدید حالت میں ۲۰۰۰ ملی لیٹر تک دے سکتے ہیں۔

متنی افعال: حساسیت کی حالت میں، قلبی صدمات، مستقل رہنے والا ہائی پلڈ پریشر میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ری ایکشن جلد پر چمکتے پڑنا Oedema، لو بلڈ پریشر، وجم القلب ابھائی متکی سینہ میں کبھی درد بخار تیز ہونا، بے چینی کھجلی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: پوری بوتل بیک وقت چڑھانا چاہیے بوتل جسمانی حرارت کے مطابق گرم ہونا بہتر ہے بلڈ بنک سے لیا گیا خون اس میں شامل کر کے نہیں چڑھانا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈیجی ٹالس کے مرکبات اور شکر کے اجزاء کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں۔

تجارتی مرکبات

HAEMACCEL (HOECHST) 500ml Rs 145 00

SERACCEL (SERUM INSTITUTE) 500ml Rs 129 00

بھیکل
سیرا کسل

VACCINES AND SERUM ویکسین و سیرم

ANTI SNAKE VENOM SERUM انٹی اسنیک وینم سیرم

افعال و منافع: یہ سیرم کالے ناگ، وائپر، کریٹ وغیرہ ہر طرح کے زہریلے سانپ کے کاٹنے میں مفید

Snake Bite

ہے۔

مقدار و ترکیب: پہلی خوراک ۲۰ ملی لیٹر محلول شدہ سیرم دریدی طور سے بہت آہستہ آہستہ لگایا جائے

۲۰ ملی لیٹر انٹ کے حساب سے دوسری خوراک ۲ گھنٹہ بعد دینا چاہیے اس کے بعد ہر ۶ گھنٹہ بعد ۱۰ مل مقدار

Triangle-shaped Poisonous Snake head



دیتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ زہریلی علامات ختم ہو جائیں۔

مضر اثرات: کبھی کبھی شدید سیرم ری ایکشن اور صدمہ کی حالت ہو جاتی ہے۔

احتیاط: ۱۰ ملی لیٹر ۱۰ گھنٹہ وقفہ دائر میں حل کر کے زیر جلد لگائیں۔ ۳۰ منٹ تک مقامی رد عمل

Rounded head Non-Poisonous Snake



Reaction کو نوٹ کریں۔

تجارتی مرکبات

SII POLYVALENT (SERUM INSTITUTE) ایس آئی آئی پالی ویلنٹ

Polyvalent Rs 1582.69 Biovalent . Rs 85.55

ANTI SNAKE VENOM (HAFFKINE) انٹی اسنیک وینم پالی ویلنٹ انجکشن

POLYVALENT IN.

10ml Rs.126.00

Havrix

Hepatitis A Vaccine

The world's first hepatitis A vaccine

Varilrix



India's First Vaccine Against Varicella

DIPHTHERIA ANTI TOXIN ڈیفٹیریا انٹی ٹاکسین

اقبال و منافع: خناق کے علاج میں یہ انجکشن بہت کارگر ہے۔ لوز تین، حنجرہ اور انفی خناق کے لیے اکیر ہے۔

مقدار و ترکیب: اگرچہ یہ انٹی ٹاکسین خناق کی شافی دوا ہے لیکن کبھی بے احتیاطی سے انجکشن کے ری ایکشن کے سبب مریض کی موت بھی اسی سے ہو سکتی ہے لہذا اس کا ٹسٹ پہلے ضرور کر لینا چاہیے۔ 0.05 ملی لیٹر ۱۰ گنے نارمل سیلائن میں حل کر کے کلائی پر زیر جلد لگائیں ۲۰ منٹ کے بعد اگر اس مقام پر ری ایکشن کے اثرات مثلاً جلد کا متورم ہونا سرخی کھجلی محسوس ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انجکشن ری ایکشن کر رہا ہے۔ اس کے لیے یہ سیرم بہت ہلکا کر کے رفتہ رفتہ مقدار خوراک بڑھا کر دینا چاہیے۔ اگر ری ایکشن کے اثرات نہ ظاہر ہوں تو ۲۰ ہزار یونٹ عضلاتی انجکشن لگائیں اگر خناق کا اثر ہوائی نالی اور ناک کی جھلی تک پہنچ گیا ہو تو ۴۰ ہزار یونٹ لگائیں۔ اگر کوئی فائدہ نہ ہو تو ۲۴ گھنٹہ بعد یہی خوراک دوبارہ لگائیں ٹھیک ہونے پر ۶ ہفتہ کے وقفہ سے دو خوراک اور لگادیں۔

مضر اثرات اور احتیاط: انٹی اسٹیک وینم کی طرح

تجارتی مرکبات

DIPHTHERIA (BENGAL IMMUNITY) ڈیفٹیریا انٹی ٹاکسین

ANTITOXIN I.P.

Diphtheria toxoid Ampoule of 10, 000 i.u. Rs. 19.94 Ampoule of 20,000 i.u. Rs. 39.74

DIPHTHERIA ANTITOXIN (HAFFKINE) ڈیفٹیریا انٹی ٹاکسین

10, 000 i.u. amp. Rs. 34.88

DIPHTHERIA ANTITOXIN (SERUM INSTITUTE) ڈیفٹیریا انٹی ٹاکسین

10, 000 i.u. Rs. 19.00, 20, 000 i.u. Rs. 37.44

گیس کنٹرین انٹی ٹاکسین GAS GANGRENE ANTITOXIN

افعال و منافع: گیس کنٹرین کے انٹکسن کو روکنے اس کے علاج کے لیے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: حفظ مائع کے لیے ۱۵ ہزار یونٹ عضلاتی انجکشن لگائیں علاج کے لیے ۷۵ ہزار

یونٹ عضلاتی لگائیں ۸ گھنٹہ بعد دوبارہ لگائیں یہاں تک کہ مرض کی علامات ختم ہو جائیں۔

متنی افعال: اس دوا سے حساس مریضوں کو اور ویریڈی نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: انجکشن لگانے سے قبل ٹسٹ ضرور کرائیں۔

تجارتی مرکبات

گیس کنٹرین GAS GANGRENE ANTITOXIN (CHANDRA BHAGAT)

گیس کنٹرین GAS GANGRENE ANTITOXIN I.P. (BENGAL IMMUNITY)

Gas gangrene antitoxin I.P. Ampoule or 4000 I.U. Rs. 10.0 Ampoule of 10,000 I.U. Rs. 24.65

گیس کنٹرین GAS GANGRENE ANTITOXIN I.P. (HAFFKINE)

(Perfringens) 4000 i.u. Enzyme refined globulin. 4,000 i.u. Phenol

I.P. (preservative) 0.25% Ampoule of 2.6 ml amp 32.33

HISTAGLOBIN

ہسٹا گلوبین

افعال و منافع: دہ، بلغمی کھانسی، آدھاسیس (حقیقہ) پتی اچھلنا، ایگزیم، ناک کی جھلی کا ورم مزمن ورم

غار الانف، جلد کی الرجی، وغیرہ میں یہ دیکسین مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ ملی لٹر کا انجکشن ایک ہفتہ کے وقفہ سے ۱۰ انجکشن لگائیں بچوں کو ۱ ملی لٹر لگائیں۔

متنی افعال: شدید حاد متعدی امراض میں، کارٹی سون کے علاج کے دوران، خراب رد عمل ہوتا ہوتا ہے۔

احتیاط: حمل، اور ایام حیض میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: بکٹریا سے تیار ہونے والے ویکسین کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں۔

تجارتی مرکب

- ALLERGAM INJ** (BIOGENICS) ارم انجکشن
 3x2 ml vial with water for injection. Rs. 55.00
- AUNATIV** (PHARMACIA) اوناٹو
 Human immunoglobulin 0.165g corresponding to 250 iu, Anti HBS
 amino acetic acid 20mg sodium chloride 4mg per ml I.M. inj 5ml amp
 (1250iu) Rs.6840.
- GAMMALIN H INJECTION** (CHEMECH) گمالین ایچ انجکشن
 Human normal immuno globulin 12mg Histamine dihydrochlor 0.15%
 Sodium Thiosulphate 32mg 3 ampoules.
- HISTAGLOBULIN** (SERUM INSTITUTE) ہسٹاگلوبین
 Human normal immunoglobulin 12mg Histamine dihydrochloride
 0.15mg sod. thiosulphate 32mg 3 ampoules Rs. 48.55

HUMAN NORMAL IMMUNO GLUBULIN

ہیومن نارمل ایمنو گلوبولین

افعال و منافع: وائرس اور بکٹیریا سے پیدا ہونے والے متعدی امراض جو کہ قوت مدافعت کی کمی کے
 سبب پیدا ہوتے ہیں مفید ہے اس سے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے یہ انجکشن جراثیمی
 امراض کو روکنے میں معاون ہوتے ہیں۔

احتیاط: انجکشن لگانے کے بعد شدید صدماتی کیفیت اور ری ایکشن کو دھیان میں رکھیں۔

تجارتی مرکبات

- GAMMALIN INJECTION** (CHEMECH) گمالین انجکشن
GAMMA FINE (HAFFKINE) گما فین
 Human normal immunoglobulin 10% injection 1ml Rs.16.50
- GAMMIMUNE-N** (BIOGENICS) گم ایمنی یون۔ این
 Human normal immunoglobulin 50mg per ml inj. 100ml bottle:
 Rs 5450.00

GLOBAL 10% INJ & 16.5 (BIOGENICS)

گلوبال

Human normal immunoglobulin I P 100mg & 165mg per ml inj
100mg 1ml vial Rs 29 75, 165mg 1ml vial Rs 44 50

SANDOGLOBULIN

(SANDOZ)

سندو گلوبولین

Immuno globulin intravenous (human) 1g and 3g per vial powder for
inj 1g vial Rs.3030 003 vial Rs 4630

RABIES VACCINE

رے بیزو یکسین

افعال و منافع: کتے، گیڈر، نیولے، بلی، وغیرہ کے کاٹنے پر اس سے بچاؤ اور علاج کے لیے یہ انجکشن مفید ہیں۔

مقدار و ترکیب: حفظ ماقدم کے لیے ۴ انجکشن لگائے جاتے ہیں پہلے دن، ساتویں دن، اور اکیسویں دن آخری انجکشن ۳۶۵ دن کے بعد، زہر کا اثر ہو جانے پر ۵ انجکشن لگانا چاہیے پہلے، تیسرے، ساتویں، چودھویں اور اٹھائی سوویں دن۔

منفی افعال: حمل کی حالت میں نیومایکسین، کلورو ٹیٹراسائیکلین، ایمنو ٹراسین کے ساتھ حساسیت کا خطرہ ہے۔

مضر اثرات: درد سر، اورم غدو، انجکشن کی جگہ سرخ و متورم ہونا، جلد پر الرجی کا اثر۔

احتیاط: حفظ ماقدم کے لیے بیمار، ضعیف اور بیماری کے بحرانی دور میں نہیں لگانا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ایسی ادویہ کے ساتھ جو قوت مدافعت کو کمزور کرتی ہیں استعمال مناسب نہیں۔

تجارتی مرکبات**BERIRAB**

(HOECHST)

بری ریب

MERIEUX

(SERUM INSTITUTE)

میری ایکس

INACTIVATED RABIES VACCINE (HDC)

ان اکیٹیوڈ رے بیزو یکسین

Injection. 1ml Rs. 619 55

Vaccine for Human Use

RABIPUR

(HOECHST)

ربی پڑ

per ml injection. 1ml Rs. 215.00



TETANUS ANTITOXIN ٹے ٹے انس انٹی ٹاکسین

افعال و منافع: ٹے ٹے انس سے حفاظت اور علاج کے لیے مفید ہیں۔
 مقدار و ترکیب: حفظ ماقدم کے لیے ۱۵۰۰ یونٹ زیر جلد لگائیں علاج کے لیے الیکٹریک یونٹ آہستہ آہستہ وریڈی لگائیں بعد ازاں ۱۰ سے ۲۰ ہزار روزانہ جب تک مریض معصیاب نہ ہو جائے۔
 مضرت اثرات: انجکشن کے بعد فوراً ۱۰-۱۲ دن تک ری ایکشن ہو سکتا ہے جلد پر دو دوڑے پختے ہونے، کھجلی، جوڑوں کا درد جلد پر کھج (odema)، غد و متورم صدمہ بیہوشی۔
 احتیاط: زیر جلد چند قطرے کلائی کی جلد کے نیچے لگا کر ۵ امٹ انتشار کریں بغیر ٹسٹ کے لگا ہوا خطرہ سے خالی نہیں اگر مقام انجکشن پر کھجلی ورم سرخی ابھار نمودار ہو تو نہیں لگانا چاہیے۔

ANTICATARMAL VACCINE انٹی کٹارل ویکسین

افعال و منافع: سردی نزلہ زکام سے حفاظت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
 مقدار و ترکیب: مضرت اثرات و احتیاط دوا کے ساتھ پرچہ کے مطابق۔

HEPATITIS. B. VACCINE ہیپاٹائیٹس بی ویکسین

افعال و منافع: ورم جگر پیدا کرنے والے بی وائرس سے حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۲۰ مائیکرو گرام۔
 منفی افعال: شدید انفکشن میں دینا مضر ہے۔
 احتیاط: وریڈی راہ سے اور حاملہ کو نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

CELLOGNOST HBsAg	(HOECHST)	سیلوگ نوسٹ
40. RS 285, Storage: 2-8 degreeC.		
ENGRIX-B	(SMITHKLINE)	انجی ریکس بی
Vial with sterile syringe Rs. 430 (paed) Hepatitis B. surface antigen protein 10mg/0.5 ml inj. single dose vial with syringe Rs. 240.00 also Engerix-B multidose vial Rs.3000 (10 adult doses & 20 paediatric doses.)		

MEASLES, RUBELLA & MUMPS VACCINE

خسرہ، روبیلا اور کنور ویکسین

افعال و منافع: خسرہ روبیلا اور کنور MUMPS سے محفوظ رکھنے اور ان امراض کے خلاف قوت مدافعت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۰.۵ ملی لٹرز پر جلد بازو کے اوپر حصہ میں لگانا چاہیے۔

منفی افعال: شدید انفکشن کی حالت میں، لیوکیمیا، شدید انیمیا، گردوں کے امراض میں، نظام عصبی کی خرابی اور تھج الفاصل میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: جلد پرداغ پڑنا، بخار غد و لعاب دہن کا بڑھنا، گردوں کے غد و لفادیہ کا بڑھنا۔

تجارتی مرکبات

LIVE COMBINED
FREEZE DRIED

(CHANDRA BHAGAT)

لوکبا سنڈ فریزڈ رائیڈ
میزل روبیلا مپس ویکسین

MEASLES-RUBELLA,
MUMPS VACCINE

TRIMOVAX (MMR)

(SERUM INSTITUTE)

ٹرائی موواکس

TRIVIRATEN

(HOECHST)

ٹرائی ورائٹن

TRESIVAC

(SERUM INSTITUTE)

ٹری سی ویک

MEASLES VACCINE

میزل ویکسین

افعال و منافع: خسرہ سے حفاظت اور بچوں میں اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: آدھ ملی لٹرز پر جلد۔

منفی افعال: شدید تنفسی تکالیف میں، الرجی، متعدی امراض، تپ و ق اور حاملہ میں اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: بخار، بد ہضمی، جلد پرداغ پڑنا، تیز بخار میں دورے پڑ سکتے ہیں۔

احتیاط: دریدی اور مرگی والے بچوں کو نہیں لگانا چاہیے ۲ سے ۸ ڈگری درجہ حرارت میں انفکشن رکھے جائیں۔

تجارتی مرکبات

MEASLES VACCINE

(SERUM INSTITUTE)

میزل ویکسین

0.5 ml ampouls Rs. 14.75

M-VAC

(SERUM INSTITUTE)

ایم ویک

Single-dose amp. Rs.23.45

RIMEVAX

(SMITHKLINE)

ریمی ویکسین

Single dose vial with sterile diluent and sterile syringe Rs.13.50

MENINGO COCCAL VACCINE مینینگو کاکل ویکسین

افعال و منافع: دماغی پردوں کا ورم جو اس جرثومہ سے پیدا ہوتا ہے اس سے حفاظت کے لیے استعمال کرائی جاتی ہے۔

مقدار و خوراک: آدھ ملی لیٹر زیر جلد لگائیں۔

منفی افعال: شدید انفکشن والے امراض میں اس کا استعمال مناسب نہیں۔

مضر اثرات: انفکشن کے مقام پر ورم درد سرخی اور ابھار ہونا، جسم میں پانی کی زیادتی ہونا۔

احتیاط: حاملہ اور ۲ سال سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔ ویریڈی نہ لگائیں۔

تجارتی مرکبات

MENCEVAX

(SMITHKLINE)

مین سی ویکس

s.c. 10 dose vial with sterile diluent Rs.250.00

MENINGO COCAL

(SERUM INSTITUTE)

مینینگو کاکل ویکسین

VACCINE A+C

50 dose vial Rs.295.45

OMNIGEN C

(BENGAL IMMUNITY)

او منی جن۔ سی

ORAL POLIO VACCINE (S. INSTITUTE) اورل پولیو ویکسین

افعال و منافع: ہر طرح کے پولیو انفکشن سے بچاؤ کے لیے کارگر ہیں۔

منفی افعال: شدید امراض متعدد یہ ہیں۔ حاملہ اور نوجوانی سین سے الرجک بچوں میں نہیں دینا چاہیے۔
احتیاط: صرف خوردنی استعمال کرانا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

POLIO SABIN (ORAL POLIO) (SMITHKLINE) پولیو سابن
25 dose polypropylene plastic tube: Rs. 63.00
ORAL POLIO VACCINE SABIN (HAFKINE) اورل پولیو ویکسین
50 vial of 20 dose Rs. 9.22

QUADRUPLE VACCINE کو اڈروپل ویکسین

افعال و منافع: یہ خناق، پولیو، کالی کھانسی اور نئے نئے نس سے حفاظت کے لیے استعمال کرائی جاتی ہے۔
مقدار و خوراک: پیدائش سے تیسرے ماہ آدمی لی لٹر ہر مہینہ ۳ مہینہ تک دی جاتی ہے، بوٹر خوراک ۶ ماہ بعد دینا چاہیے۔

منفی افعال: شدید انفکشن کی حالت میں عصی خرابیوں میں اور کارٹی سون کے مرکبات کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: مقامی رد عمل، جلد پر ابھار اور چکے پڑنا، انجکشن کی جگہ درد، ورم، ابھار ہونا بخار خشکی، بے چینی۔

احتیاط: ۶ سال سے زائد عمر کے بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

SPECIAL ASTHMA MIXED VACCINE (BENGAL IMMUNITY) اسپیشل اسٹھما میکسڈ ویکسین

افعال و منافع: یہ ویکسین نزلہ زکام اور دم سے حفاظت کے لیے لگایا جاتا ہے۔

مقدار و ترکیب و احتیاط: انجکشن کے ساتھ پرچہ کے مطابق۔

SPECIAL ECZEMA MIXED VACCINE (Bengal Immunity)

افعال و منافع: یہ ایکریما، مچا جن، ہار ہار ہونے والے ایگزیم سے حفاظت کے لیے مستعمل ہیں۔
مقدار و ترکیب: مضر اثرات و احتیاط: پرچہ کے مطابق۔

STREPTO STAPHYLO MIXED VACCINE (Bengal Immunity)

افعال و منافع: یہ ویکسین اسٹریپٹوکوکس اور اسٹریپٹوکوکس جراثیم سے پیدا ہونے والے امراض سے حفاظت کرتی ہے۔
مقدار و ترکیب: استعمال مضر اثرات و احتیاط کے لیے پرچہ دیکھیں۔

TETANUS TOXOID

افعال و منافع: بچوں اور حاملہ عورتوں کو ٹیٹس سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کرائی جاتی ہے۔
مقدار و ترکیب: حاملہ کو آدمی ملی لٹرو ویکسین چھٹے مہینہ دوسری خوراک آدھ ماہ بعد تیسری خوراک ۹ ماہ بعد دینا چاہیے بچوں کو صرف ایک خوراک آدھ ملی لٹرو دینا چاہیے ۵ سال بعد بوسٹر ڈوز دینا چاہیے۔

TRIPLE ANTIGEN (GLAXO)

افعال و منافع: یہ ویکسین خناق ٹیٹس اور کالی کھالسی سے حفاظت کے لیے دی جاتی ہے۔
مقدار و ترکیب: پہلے سال کے بچہ کو ۱ ماہ کے وقفہ سے ۳ خوراکیں دی جاتی ہیں بوسٹر ڈوز ۱۸ ماہ اور ۵ سال میں دی جاتی ہے ۵ سال سے زائد عمر والوں کو نہیں دینا چاہیے۔
منفی افعال: شدید بخار کی حالت میں والدین کو دورہ آنے کی ہسٹری میں بوقت پیدائش ہونے والے

دماغی صدمات و عوارض میں۔ شٹ کرنے پر ری ایکشن ہونے میں عصبی امراض، شدید الرجی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: بخار، بے چینی، بھوک کم ہو جاتی ہے۔

Tyvax-ViTM ٹائی فائیڈ ویکسین

30mcg VI Capsular Polysaccharide Typhoid Vaccine

TYPHOID VACCINE ORAL ٹائی فائیڈ خوردنی ویکسین

افعال و مواقع: سالمو نیلا ٹی ٹی فائی جراثیم سے بچاؤ کے لیے خوردنی طور پر استعمال کرائی جاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶ سال سے زائد عمر والوں کو ایک کپسول پہلے دن تیسرے دن پانچویں دن کھانے سے ایک گھنٹہ قبل تازہ پانی یا دودھ سے دینا چاہیے۔

منفی افعال: آنٹوں کے شدید ورم، شدید بخاروں، ایام حمل، اور قوت مدافعت کی کمی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: نظام ہضم میں خرابیاں ہو سکتی ہیں۔

احتیاط: ۶ سال سے کم عمر والوں کو نہیں دینا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: انٹی بائیوٹک اور سلفا گروپ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکب

TYPHORAL

(HOECHST)

ٹائی فورال

3 caps Rs. 153.00

TYPHIM-VI

(ALIDAC)

ٹی ٹی فم

LACTOBACILLUS SPOROGENES

لکٹو بے سی لس اسپاروجینس

افعال و منافع: یہ موٹی لیاں انفکشن، انٹی بائیوٹک کی وجہ سے آنے والے اسہال اور آنتوں کے فعل کو درست کرنے کے لیے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳ بار یا ۶۰ سے ۱۲۰ ملیں۔

تجارتی مرکبات

SPORLAC

(UNISANKYO)

اسپارلیک

Spores of lactobacillus sporogenes 60 million tabs: 10: Rs.9 23

SPORLAC POWDER

(UNISANKYO)

اسپارلیک پوڈر

Spores of actobacillus sporogenes 150 million per 1.8 g powder
15x1.8g sachets Rs.30.90

VIZYLAC

(UNICHEM)

وزائی لیک

Lactobacillus sporogenes 40 million spores, 10: Rs.8.58

STERILE MILK PROTEIN

اسٹیرائل ملک پروٹین

افعال و منافع: مزمن متعدی بیماریاں، کرائک انفکشن، ایسے امراض جو انٹی بائیوٹک اور سلفا ڈرگس سے درست نہ ہوں ان کے علاج میں معاونت کرتے ہیں۔

مقدار و ترکیب: ۲ سے ۵ ملی لٹر روزانہ یا ایک دن وقفہ سے ۶ یا زائد عضلاتی انجکشن لگائیں۔

تجارتی مرکبات

SIOLAN-12 INJ

(ALBERT DAVID)

سیالان ۱۲ انجکشن

,SIOLAN INJ

(ALBERT DAVID)

ساولان انجکشن سادہ

CHELATING AGENT**تریاتی مرکبات****DESFERIOXAMINE****ڈس فیریو آکسائین**

افعال و منافع: جسم میں آئرن کی زیادتی، جسم سے زائد فولاد کے مادوں کو خارج کرتی ہے۔ لیکن ہموگلوبین یا انزائم کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ فولاد کے انجذاب اور کمی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ فیصدی کاسلوشن ۵۰۰ ملی گرام ۵ ملی لٹرو اثر میں حل کر کے عضلاتی دیا جاسکتا ہے۔ شدید ضرورت میں آدھ گرام سے ۴ گرام شفاف سلوشن وریدی راہ سے ۱۲ گھنٹہ میں دیا جاسکتا ہے بہت آہستہ لگانا چاہیے خوردنی طور سے ۵ سے ۱۰ گرام ۱۲ گھنٹہ میں دیا جاسکتا ہے۔

متنی افعال: حمل کی حالت میں دینا منع ہے۔

مضر اثرات: بلڈ پریشر کم، جلد پر ری ایکشن کا اثر، صدمہ، بے چینی، دورہ پڑنا، ہضم کی خرابیاں جگر اور گردے کا فعل متاثر ہونا، پیشاب گلابی یا کستھی رنگ کا آنا۔

احتیاط: دوران علاج قلب اور آنکھوں کے افعال پر نگاہ رکھنا چاہیے۔ وریدی انجکشن تیز لگانے سے موت ہو سکتی ہے۔

تجارتی مرکب**DESFERAL**

(HIND CIBAGEIGY)

ڈس فیرال

Desferrioxamine 500mg Dry active substance. 500mg vials.

DIMERCAPOL**ڈائی مرک پول**

افعال و منافع: معدنی زہروں مثلاً سکنیا، پارہ، سونا، بسمتھ، حصیلیم، انٹی موئی، لیڈ سیسہ جیسی چیزوں کے جسم میں پہنچنے پر ان کے اخراج اور مضر اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔

مقدار و ترکیب: پہلے دن ۴۰۰ سے ۸۰۰ ملی گرام عضلاتی انجکشن کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دوسرے دن ۲۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام بچوں کو ۵ ملی گرام فی کلو گرام وزن کے حساب سے۔

منفی افعال: فولاد اور سیلیم کے زہروں میں، جگر کی کمزوری اور ہائی بلڈ پریشر میں معر ہے۔

معر اثرات: بلڈ پریشر ہائی ہونا، وجع القلب، تے متلی ابکائی، جسم میں گرمی کا احساس، بھوک کی زیادتی، آنسو زیادہ آنا، آنکھوں کا متورم اور سرخ ہونا، آشوب چشم، ناک بہنا، عضلات اور اعصاب میں درد، درد شکم، درد سر، ہاتھوں میں جھنجھناہٹ، سینہ اور حلق میں تشنج، پیشانی اور ہاتھوں میں پسینہ زیادہ آنا، انجکشن کے مقام پر درد دوسرے اور تیسرے انجکشن کے بعد بخار کی زیادتی۔

احتیاط: کسی طرح کے ری ایکشن معر اثر بخار کی تیزی میں انجکشن روک دیں، علامات ختم ہونے پر دوبارہ لگائیں۔

تجارتی مرکب

B.A.L. INJECTION

(BOOTS)

بی۔ اے۔ ایل انجکشن

Dimercapol 100mg per 2ml in 2ml ampoule 12x2ml: Rs 1260 00

PENICILLAMINE

پینی سیلامین

افعال و منافع: جسم میں کاپر (تانبہ) کی مہلک مقدار پہنچنے پر اس کے خراب اثر کو دور کرنے کے لیے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ ولسن ڈیزیز، نجر الغاصل شدید پیشاب میں ذرات اور سسٹ کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ولسن ڈیزیز میں ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۴ مرتبہ کھانے سے آگے قبل اور سوتے وقت کھلائیں، پیشاب میں سسٹ خارج ہونے پر اسے ۴ گرام یومیہ۔

منفی افعال: حمل، گردوں کی خرابی، اے پلاسٹک انیمیا، میں کھلانا معر ہے۔

مضر اثرات: کھلی، جسم پر داغ پڑنا، چکے ابھار Oedema، بخار ہڈی میں درد و دکا بڑھنا، پتی اچھنا، بھوک کی کمی، فم معدہ پر درد، قے متلی ابکائی، دست آنا جگر خراب ہونا زخم معدہ، لیوکوسائٹ کی کمی، تقرابین کی کمی خون میں سرخ ذرات کی کمی اسٹوفیلیا، پیشاب میں پروٹین کا اخراج، پیشاب میں خون آنا، کان بجنا عصب باصرہ میں درد ہو سکتا ہے۔

احتیاط: بخار و دیگر علامات ردیہ ظاہر ہونے پر دوا بند کر دیں کھلی، پتی کا علاج انٹی ہشائین ادویہ سے۔

تجارتی مرکبات

CUPRIMINE

(MERINO)

کیوپرامین

Penicillamine 200mg caps.

CILAMIN-250

(PANACEA)

سلامین

D-penicillamine 250mg caps 10 Rs 78.89

PENICILLAMINE CAPS (NEON)

پن سیلامین کپسول

Penicillamine 250mg caps; 5x10 caps Rs.395 00

خون میں پروٹین کم کرنے والے مرکبات

HYPOLPIDAMEMIC AGENT

BEZAFIBRATE

بنزافائبریت

افعال و منافع: خون میں پروٹین کی مقدار میں اضافہ ہونے پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار

منفی افعال: جگر و پتے کے امراض، گردوں کی شدید کمزوری، حالت حمل اور ایام رضاعت میں مضر

ہے۔

مضر اثرات: فتور، غصہ، جلد، الرجی، ہالوں کا کرنا۔
احتیاط: ایسٹروجن تھیراپی کے دوران، بچوں کو بہتر نتائج برآمد نہ ہوں تو وہ استعمال نہ کرائیں۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: مائع انجناد خون ادویہ، دافع شکر (ایپاٹیس) میں دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

BEZALIP	(BOEHRINGER)	بزا لپ
Benzafibrate 200mg, tabs: 10; Rs. 76.23		
BEZALIP RETARD	(BOEHRINGER)	بزا لپ دیرپا
Benzafibrate 400mg, tabs: 10; Rs. 150.00		

CHOLESTRAMIN

کولسٹرامین

افعال و منافع: خون اور پلازما میں کولیسٹرول کی مقدار کم کرنے میں، کولیسٹرول کے سبب دست آنا،
ایپاٹیس، صفرا کی نالی میں رکاوٹ اور کھجلی اور فریبی دور کرنے میں معاون ہے۔
مقدار و ترکیب: بڑوں کو ۲ سے ۵۴ ملی گرام روزانہ ایک خوراک یا کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے
بچوں کو عمر کے مطابق ۶ سال سے کم عمر بچوں کو نہ دی جائے۔
منفی افعال: صفرا کی نالی کی رکاوٹ، قبض، حمل اور ایام رضاعت، میں دینا مضر ہے۔
احتیاط: طویل مدتی علاج کے دوران حل پذیر وٹامن کا استعمال کرنا چاہیے۔

تجارتی مرکب

QUESTAN	(CHANDRA BHAGAT)	کوئی شران
Anhydrous cholestyramine 9gm sachet Price N/A.		

CLOFIBRATE

کلوفائبریت

کولیسٹرول کی زیادتی کے سبب، قلبی تکلیف، عروق کا تنگ ہونا سانس میں تنگی، دل کا دورہ، ہارٹ ایٹیک، وجع القلب، عروق قلبی میں تسد، ذیابیطس میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۳۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے یومیہ ۲-۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔

منفی افعال: جگر اور گردوں کے امراض میں پتہ کی خرابی و پتھری میں لیام حمل و رضاعت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: ہالائی شکم میں تکلیف ہونے، متلی، آنٹوں کا ست ہونا، کبھی ہالوں کا گرنا، عضلات میں درد، خون کے سفید ذرات W.B.C. میں کمی، ہیوگلو جین میں کمی واقع ہونا۔

احتیاط: مانع انجماد خون ادویہ کم مقدار میں دینا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، فین ٹائن اور ٹالیو ٹاماڈ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

GEMFIBROCIL

گیم فی بروسل

افعال و منافع: خون میں پروٹین کی زائد مقدار کم کرنے میں مفید ہے۔ ذیابیطس، موٹاپا اور ان امراض میں جو پروٹین کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۹۰۰ سے ۱۰۰۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے کھانے سے ۳۰ منٹ پہلے۔

منفی افعال: بچے کے امراض پتھری و رم عروق بند ہونا، جگر گردوں کے امراض میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: ہضم کی خرابی، درد شکم، متلی تے اسہال، اسٹونفلیا، جلد پر داغ عضلاتی درد بصارت میں فرق، لیو کوسائٹ کی کمی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: علاج سے قبل خوراک ورزش وغیرہ تدابیر سے پروٹین کم کریں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

LIPIGEM	(TIDE)	لیپی جیم
Gemfibrozil 300mg caps 10 caps.	Rs.44.00	
LIPIZYL	(NICHOLAS)	لیپی زائل
Gemfibrosil 300mg caps 20 caps	Rs 70.00	
LOSTEROL	(GUFIC)	لوشرول
Gemfibrosil 300mg caps 2x15 caps	Rs. 96.15	
LOPID	(PARKE DAVIS)	لوپڈ
Gemgibrosil 300mg caps 10 caps	Rs. 96.75	
NORMOLIP	(SUN PHARMA)	نارمولپ
Gemgibrozil 300mg caps. 6 caps	Rs.47.88	
TRIGLYD	(MICRO LABS)	ٹرائی گلائڈ
Gemfibrozil U.S.P. 200mg caps;	Price N/A	

GUGGAL STERONES

گوگل اسٹیرون

افعال و منافع: خون میں کولیسٹرول، لیپو پروٹین چربی کی زیادتی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے کے بعد

منفی افعال: ہاضمے کی خرابیاں دست پچش آنا

احتیاط: جگر کے امراض میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکب

GUGLIP	(CIPLA)	گوگلپ
Guglip equivalent to gugulsterones 25mg tabs. 15 tabs	Rs. 21.12	

LOVASTATIN

لووا سٹاٹن

افعال و منافع: کولیسٹرول اور چربی کی زیادتی اور اس سے پیدا ہونے والے عوارض میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام ایک خوراک میں شام کو کھانے کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ ۸۰ ملی گرام تک
 منفی افعال: دوا سے حساسیت شدید ورم جگر، حمل اور لیام رضاعت میں دینا مضر ہے۔
 مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، تھج عضلات، درد سر، سینہ کا درد، متلی سانس میں تنگی درد شکم، تے
 اسہال بے چینی، نیند میں کمی، ضعف باہ
 احتیاط: جگر کے امراض، آنکھوں اور گردوں کی جانچ کراتے رہیں۔ کریاٹین لیول میں اضافہ ہو تو دوا
 بند کر دیں ۱۸ سال سے کم عمر کو نہیں دینا چاہیے۔
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: اراکی تھروماکی سین گیم فی بروسل کے مانع انجماد خون اور ریغام پی سین
 کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

LOVADAC	(ALIDAC)	لوواڈیک
Lovastatin 20mg: 10. Rs. 125.00		
RECOL	(THEMIS CHEMICALS)	ری کول
Lovastatin 10mg & 20 mg: tabs: 10mg: 25: Rs 145 00, 20mg: 25:		
Rs.250.00		
ROVACOR	(STAN CARE)	روواکور
Lovastatin 10mg and 20mg . tabs: 10mg . 10: Rs. 120.00, 20mg: 10:		
Rs. 210 00		

RIBOFLAVIN TETRABUTYRATE

ریبو فلی وین ٹٹرایبوٹائی ریٹ

افعال و منافع: کولیسٹرول، پروٹین کی زیادتی ہائپر لیوڈیمیا سے پیدا ہونے والے امراض کو دور کرنے

میں مفید ہے، شرائین میں سختی، ہائی بلڈ پریشر ذیابیطیس، جگر و پتے کے امراض، فریبی، ورم قریہ، آشوب چشم، الرجی چہرے کا انگڑیما، پلاگرہ منہ کی جھلی کی سوجن (قلاع) حاملہ میں ربوفلے وین کی کمی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام دن میں ۳ بار

مضر اثرات: متلی، ابکائی،

تجارتی مرکب

LIPABOL

(CADILA)

لیپابول

Riboflavin tetrabutyrate 20mg tabs. 10 tabs: Rs.4.98

وجع القلب کو روکنے اور عروق کو کشادہ کرنے والی ادویہ

ANTI ANGINAL AND CORONARY VASODILATOR

وہ دوائیں جو وجع القلب کی شدت کو کم کرتی ہیں **BETA BLOKER**

ACEBUTOLOL

ایس بیوٹولول

افعال و منافع: انجائنا، درد دل ہارٹ ایٹک، ہائی بلڈ پریشر حرکات قلبیہ کے بے ترتیب ہونے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہائی بلڈ پریشر میں ۴۰۰ ملی گرام یومیہ کلائیں یا ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار قلبی حرکات کی بے ترتیبی یا شدید ضرورت کے وقت ۲۵ ملی گرام وریڈی بھی لگایا جاسکتا ہے۔

منفی افعال: قلبی صدمہ Shock، 100/60 سے کم بلڈ پریشر، عروق قلبیہ میں تشدد اور ویراپال

کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

مضر اثرات:۔ لو بلڈ پریشر و جمع القلب، ڈپریشن، نظام ہضم میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔
احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں، ایک دم دوا روک دینا نقصان ہو سکتا ہے۔

تجارتی مرکب

SECTRAL-200

(RHONE POULENC)

سیکڑال

Acebutolol Hcl equiv. to acebutool 200mg: tabs: 10: Rs. 38.72

ATENOLOL

ایٹی نولول

افعال و منافع: شدید و جمع القلب، قلبی حرکات بے ترتیب ہونا، قلب کے والو خراب ہونا سر میں شدید چوٹ ضربات میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: شدید و جمع القلب میں اور سر کی چوٹ میں ۵ سے ۱۰ ملی گرام وریڈی آہستہ آہستہ لگائیں پھر ۵۰ سے ۲۰۰ ملی گرام برلہ دن دن میں ۳-۴ بار کئی خوراکیوں میں دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: اگر نبض کی حرکات ۵۰ فی منٹ سے کم ہوں، سسٹولک پریشر ۱۰۰ سے کم ہو قلبی تشدد دوسرے تیسرے درجے کا ہودل فیل ہونا، سینہ میں شدید درد و حمل اور ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔
مضر اثرات: و جمع القلب، لو بلڈ پریشر، عروق قلبیہ میں تشدد قلبی صدمہ Shock جگر اور گردوں کی خرابی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: بوڑھوں میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رو عمل: دافع ذیابیطیس ادویہ، کلونی ڈین کے مرکبات، ڈیجی ٹیلیس کے مرکبات

تجارتی مرکبات

ALOTEN	(CORB)	الومین
Atenolol 50mg & 100mg, tabs 50mg 10, Rs 11 50 100mg 10 Rs 20 70		
ANGTOL	(SWIFT)	اسٹی ٹول
Atenolol 25mg, 50mg, & 100mg tabs 25mg 15x14 Rs 174 30, 50mg 15x14 Rs 270 90, 100mg 15x14 Rs 444 00		
ANGTOL PLUS	(SWIFT)	اسٹی ٹول پلس
Atenolol 50mg, nifedipine 20mg, sust release tabs 10x10 Rs 378 00		
ATECARD	(DAHUR)	ایٹی کارڈ
Atenolol 25mg, 50mg and 100mg, tabs 25mg 14, Rs 10 80, 50mg 14, Rs 18 00, 100mg 14; Rs 33 00		
ATECARD-D	(DAHUR)	ایٹی کارڈ ڈی
Atenolol 50mg, chlorthalidone 12 5mg tabs 14 Rs 25 00		
ATCARDIL	(SUNPHARMA)	ایٹ کارڈیل
Atenolol 50 & 100mg; tabs 50mg 14 Rs 18 38 100mg 14 Rs 35 18		
ATECOR	(WINMEDICARE)	ایٹی کور
Atenolol 25mg 50mg & 100mg tabs 25mg 14 tabs Rs 11 00 50mg 14 tabs Rs 18 10 100mg 14 tabs Rs 32 00		
ATEN	(KOPRAN)	ای ٹن
Atenolol 25 mg, 50mg & 100mg tabs 25mg 4x4x14 Rs 193 50, 50mg 4x4x14 Rs 307 60, 100mg 4x4x14 Rs 553 20		
ATEN-75	(KOPRAN)	ای ٹن ۷۵
Atenolol 75mg tabs 4x4x14 tabs Rs 442 98		
ATENEX 25/50/100	(KOPRAN)	ای ٹن ۲۵/۵۰/۱۰۰
Atenolol 25mg/50mg/100mg, film coated tabs 25mg 14 Rs 12 60 50mg 14; Rs 19 50, 100mg 14 Rs 33 00		
ATENOVA	(LUPIN)	ای ٹی نووا
Atenolol 50mg & 100mg tabs 50mg 14 Rs 18 41 100mg 14 Rs 41 96		

BETA 50/100	(STADMED)	بے تا ۵۰/۱۰۰
Atenolol 50 100mg: 50mg 14 tabs: Rs.19.00 100mg 14 tabs: Rs.34 50		
BETA-BIDURET	(BIDDLESAWYER)	بے تا بی ڈریٹ
Atenolol 50mg amiloride Hcl 2.5 mg hydrochlorthiazide 25mg caps; 10: Rs.11.50		
BETACARD	(TORRENT)	بی تا کارڈ
Atenolol 25mg, 50mg & 100mg tabs 25mg 14: Rs.12.95 : 50mg 14 Rs.19.95 100mg: 14: Rs.36.95		
BETANACTEN	(HIND ANTIBIOTICS)	بی تا نکسین
Atenolol 50mg, Nifedipine (sust. Releases) 20mg caps 10x10 Rs 23 80		
BETA-NICARDIA	(UNIQUE)	بی تا کارڈیا
Atenolol 50mg, nifedipine (sustained release 20mg; caps 10: Rs 19 92		
BETANIF	(UNISEARCH)	بی تا نف
Atenolol 50mg , s-r nifedipine 20mg; tabs: 10 : Rs.20.80, 30: Rs.57.25		
BETANOL	(UNISEARCH)	بی تا نول
Atenolol 50mg tabs; 14 tabs Rs.18.00		
BETATRTOP	(SUN PHARMA)	بی تا ٹروپ
Atenolol 50mg, nifedipine 20mg sustained release caps 14: Rs.33 87		
BETEN	(SIGMA LABS)	بی تا ٹین
Atenolol 50mg & 100mg : tabs: 50mg: 14: Rs. 16.87, 100mg : 14: Rs.31 87		
CALBETA	(TORRENT)	کال بیٹا
Atenolol 50mg , nifedipine s-r 20mg. tabs: 10: Rs.23.90		
CARDULES PLUS 10/20	(NICHOLAS)	کارڈولس
Atenolol 50mg, nifedipine 10mg/20mg s-r caps: 10 mg: 10: Rs 16.50, 20mg: 10: Rs.20.00		
CATENOL	(ALIDAC)	کے ٹی نال
Atenolol 50mg & 100mg Tablets: 50mg 14: Rs 22.40: 100mg: 14: Rs.40.60		
DIBETA	(TORRNT)	ڈا بی تا
Atenolol 50mg, hydrochlorthiazide 25mg and Amiloride 2.5mg. Caps 10 Rs.14.07		

DEPTEN	(CADILA)	ڈیپ ٹین
Atenolol 50mg nifedipine 20mg s-r tabs: 10tabs: Rs.19.50		
EUCARD	(MALLADI)	یو کارڈ
Atenolol BP 50mg & 100mg tabs, 50mg: 10x10 Rs 150.00, 100mg 10x10 Rs. 256.50		
FALTENOL TABS	(FALMA LABS)	فالٹی ٹاب
Atenolol 25mg; 50mg & 100mg tabs; 25mg: 14 Rs. 8 20; 50mg: 14 Rs 13 70, 100mg: 14 Rs.26.40		
HIPRES	(PROTEC)	ہائی پریس
Atenolol 50mg & 100mg tabs: 50mg: 10: Rs.16 65 100mg 10: Rs 22 64		
HIPRES-D	(PROTEC)	ہائی پریس ڈی
Atenolol 50mg Hydrochlorthiazide 2.5mg Amiloride Hcl 2.5mg caps 10 Rs.12 07		
LONOL	(KHANDELWAL)	لونول
Atenolol 25mg, 50mg; 100mg; tabs 25mg 10 Rs.7.16, 50mg: 10: Rs 11.10; 100mg : 10: Rs.20.52		
NILOL	(INTAS)	نی لول
Atenolol 50mg, nifedipine 20mg : s-r tabs: 10. Rs. 20.50		
NORMOLOL	(PACE)	نارمولوج
Atenolol 50MG & 100mg tabs: 50mg 10: Rs.12.10: 100mg 10: Rs.23 00		
ODINOL	(ALEMBIC)	اوڈی ٹال
Atenolol 25mg, 50mg & 100mg tabs: 25mg: 10 Rs 8 00, 50mg: 10: Rs 12.00, 100mg : 10. Rs.15.00		
PRESOLAR	(CIPLA)	پری سولر
Atenolol 50mg Nifedipine (sr) 20mg: caps 10. Rs.23 08		
SELCA	(PACE)	سل کا
Atenolol 50mg, Nifedipine 20mg sustained release caps 10: Rs 22 10		
STADMED BETA	(STADMED)	اسٹڈ میڈیٹا
Atenolol 50mg & 100mg . tabs : 50mg: 14: Rs.16.00, 100mg. 14: Rs.27 00		

TELOL	(MAX)	ٹی لول
Atenolol 50mg & 100mg tabs: 50mg: 10: Rs. 10.42, 100mg : 10: Rs.18.03		
TENASE	(JENBURKT)	ٹی نیس
Atenolol 50 & 100mg : tabs: 50mg: 10: Rs.11.90, 100mg: 10: Rs.22.10		
TENOCLOR	(ICI)	ٹی نوکلور
Atenolol 100mg, chlorthalidone 25mg: tabs: 14: Rs.48 85		
TENOCLOR-50	(ICI)	ٹی نوکلور ۵۰
Atenolol 50mg, chlorthalidone 12.5mg tabs: 14: Rs.30.31		
TENOCLOR-25	(ICI)	ٹی نوکلور ۲۵
Atenolol 25mg, chlorthalidone 12.5mg: tabs: 14: Rs.18.92		
TENOFED CAPS	(IPCA)	ٹی نو فیڈ کپسول
Atenolol D.P. 50mg, Nifedipine USP 20mg, sustained release caps 10: Rs.24.50		
TENOLOL	(IPCA)	ٹی نولول
Atenolol 25mg, 50mg, and 100mg; 25mg: tabs 14: Rs.15.40; 50mg: tabs 14: Rs.26.60; 100mg: tabs 10: Rs.19.00		
TENORIC 100	(IPCA)	ٹی نورک ۱۰۰
Atenolol 100mg, chlorthalidone 25mg: tabs: 10: Rs.23.00		
TENORIC-50	(IPCA)	ٹی نورک ۵۰
Atenolol 50mg, chlorthalidone 12.5mg: tabs: 10: Rs.13.00		
TENORIC 25	(IPCA)	ٹی نورک ۲۵
Atenolol 25mg, chlorthalidone 12.5mg: tabs: 10: Rs. 12.00		
TENORMIN	(ICI)	ٹی نارمن
Atenolol 100mg 50mg and 25mg tabs 100mg: 14: Rs. 47.85; 50mg : 14: Rs.29.70; 25mg: 14: Rs. 18.83		
TENSICARD	(TROIKAA)	ٹن سی کارڈ
Atenolol 25.50 & 100mg: tabs: 25mg: 10x14: Rs.105.00, 50mg: 10x14: Rs.154.00, 100mg : 10x14: Rs.266.00		
TENSIMIN	(UNIQUE)	ٹن سی من
Atenolol 50mg & 100mg 50mg: 14: Rs.19.10, 100mg: 14: Rs.23.90		

BISO PROLOL FUMERATE ہائی سوپرولول فومی ریٹ

افعال و منافع: وجع القلب، انجائنا، ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ ملی گرام دن میں اہار شدید ضرورت ہو تو ۱۰ ملی گرام دن میں اہار بچوں کو دینا مناسب نہیں۔

منفی افعال: قلبی عروق میں تسد، ہارٹ ایک، پیپیروں کا دمہ، عروق میں رکاوٹ کے امراض، حمل اور ایام رضاعت، بلغمی دمہ میں استعمال جائز نہیں۔

مضر اثرات: چکر آنا، سردرد، بے چینی، سینہ میں درد، نیند میں خلل، فتور، ہضم۔

احتیاط: ذیابیطس، چنبل (Psoriasis) میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ ری ایکشن: بلڈ پریشر کم کرنے والی دوائیں، ذیابیطس کی دواؤں کے ساتھ قلبی حرکات درست کرنے والی ادویہ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکب

CONCOR

(MERCK)

کن کور

Bisoprolol fumerrate 5mg: tabs: 10: Rs. 75.00

METOPROLOL

مے ٹوپرولول

افعال و منافع: ہائی بلڈ پریشر و وجع القلب، حرکات قلب کا غیر منتظم ہونا، شدید ہارٹ ایک میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہائی بلڈ پریشر میں ۱۰۰ ملی گرام یومیہ، وجع القلب، ہارٹ ایک C.C.F. میں ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار

منفی افعال: قلب کے اذن یا بطن میں رکاوٹ، قلبی صدمہ shock میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: فتور، ہضم، نیند میں خلل، جسم سرد رہنا۔

احتیاط: حمل اور زچگی کے ایام میں مقدار خوراک کم دیں، دیر پا بل کے ساتھ اور انسولین لینے والوں کو استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

BETALOC INJ	(ASTRA-IDL)	بیٹالاک انجکشن
Metoprolol tartrate 1mg/ml inj 5x5ml amps	Rs 12 57, 5ml Rs 2 45	
BETALOC DURULES	(ASTRA-IDL)	بیٹالاک ڈیوریٹ
Metoprolol tartrate 100mg and 200mg sustained release tablets		
100mg 10 Rs 18 00 200mg. 10 Rs 36 00		
BETALOC	(ASTRA-IDL)	بیٹالوک
Metoprolol tartrate 50mg & 100mg tabs 50mg 10 Rs 10 66 100mg		
10 Rs 17 26		
LOPRESOR	(HIND CIBAGEGY)	لوپریسر
Metoprolol tartrate 50mg & 100mg tabs 50mg. 10. Rs. 12 20 100mg		
10 Rs 22 40		
LOPRESOR INJ	(HIND CIBAGEGY)	لوپریسر انجکشن
Metoprolol tartrate 5mg/5ml inj 5ml Rs.5 53		
METOCARD	(TORRENT)	میٹوکارڈ
Metoprolol 50mg & 100mg tabs 50mg. 10 Rs 7 80 100mg 10		
Rs 14 80		
METOLAR-H	(CIPLA)	میٹولار ایچ
Metoprolol 100mg hydrochlorothiazide 12mg tabs, 10 tabs	Rs 17 06	
METOZIDE	(TORRENT)	میٹوزائیڈ
Metoprolol 100mg Hydrochlorothiazide 12mg tabs 10 tabs	Rs 15 00	
METOLAR	(CIPLA)	میٹولار
Metoprolol 50mg/100mg tabs 50mg: 10 Rs 8 95 100mg 10 Rs 16.32		
SELOPRES	(ASTRA-IDL)	سیلوپریس
MetoprololTARTRATE 100mg Hydrochlorothiazide 12 5mg Tabs 10		
Rs 18 35		
SELOPRESS-50	(ASTRA-IDL.)	سیلوپریس ۵۰
Metoprolol tartrat 50mg Hydrochlorothiazide 12 5 mg tabs, 10		
Rs 10 10		
TRIPRESS	(ASTRA-IDL.)	ٹریپریس
Metoprolol tartrate 100mg Hydrochlorothiazide 12 5mg Hydralazine		
25mg 10 tabs Rs 21.10		

LIDOFLAZINE

لڈو فلازین

افعال و منافع: خون کی رسد کی کمی سے ہونے والے امراض قلب میں مفید ہے۔

مقدار و استعمال: پہلے ہفتہ ۶۰ ملی گرام روزانہ دوسرے ہفتہ ۶۰ ملی گرام دن میں ۲ بار تیسرے ہفتہ ۶۰ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے سے پہلے اگر خاطر خواہ کامیابی نہ ملے تو مقدار خوار اک بڑھادیں

متنی افعال: حالت حمل میں دینا منع ہے

احتیاط: وجع القلب کے مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکب

CLINIUM

(ETHNOR)

کلی نیم

Lidoflazine 60mg tab 10 Rs. 15.60

PINDOLOL

پنڈولول

افعال و منافع: معمولی اور اوسط ہائی بلڈ پریشر، وجع القلب قلبی حرکات کی بے ترتیبی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اوسط ہائی بلڈ پریشر میں ۱۰ سے ۱۵ ملی گرام روزانہ ایک ہفتہ پھر ۵ ملی گرام ہفتہ میں ۱ بار وجع القلب میں ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار۔ قلبی حرکات کی بے ترتیبی میں ۵ ملی گرام دن میں ۲ سے ۳ بار

متنی افعال: قلبی صدمات، قلب کے لیل ہونے، پیپھروں میں تردد، گردوں کے لیل ہونے اور حالت حمل میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: بے چینی، چکر آنا نظام ہضم میں خلل خواب میں ڈرنا چیخنا، چلانا

احتیاط: بیہوشی کی حالت میں عقلی محنت میں ذیابطیس اور تیزابیت میں گردوں کے لیل ہونے اور حمل میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ہمیشہ والی ادویہ، قلبی حرکات کو درست کرنے والی ادویہ کے ساتھ دینا منع ہے۔

تجارتی مرکب

VISKEN

(SANDOZ)

دس کن

Propranolol 10mg & 15 mg: tabs 10mg: 10: Rs. 19.91 15mg 10: Rs 25.20

PROPRANOLOL

پروپرانولول

افعال و منافع: قلب کی حرکات کی زیادتی، ہائی بلڈ پریشر، وجع القلب، عروق میں تنگی اور ادھاسیسی MIGRAINE میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہائی بلڈ پریشر میں ۴۰ ملی گرام دن میں ۲ بار آہستہ آہستہ مقدار خوراک بڑھائیں وجع القلب میں ۱۰ ملی گرام دن میں ۲ بار
متنی افعال: بلغمی دمہ، قلبی تسدد، قلبی صدمہ، دل کے فیل ہونے میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

مضر اثرات: دل کا درد، لوہلہ پریشر، خوف، ڈپریشن، متلی تے، اسہال جلد پر داغ، آنکھیں خشک جیسی علامات ہو سکتی ہیں دوا روکنے پر یہ علامات ختم ہو جاتی ہیں۔
احتیاط: دل فیل ہونے، ذیابیطیس شکر، عظم غدہ قدامیہ، جگر گردوں کے امراض آپریشن سے پہلے اور حالت حمل میں احتیاط
دواؤں کے ساتھ رد عمل: دیرپا بل، کلونی ڈین کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

BETABLOC

(USV)

بیٹا بلاک

Propranolol Hcl 10mg : tabs 10: Rs 3.00

BETA BLOC FORTE

(USV)

بیٹا بلاک فورٹ

Propranolol Hcl 40mg: tabs 10 Rs 9 35

BETA-XIPAMID

(GERMAN REMEDIES)

بٹا پامائیڈ

Propranolol Hcl 40mg, xipamid 10mg. tabs: 10 Rs. 14.86

BETASPAN

(SMITHKLINE)

بیٹا سپان

Propranolol Hcl 40mg s-r caps: 10: Rs 6.75

CARDIOLONG

(SOL)

کارڈیولانگ

Propranolol Hcl 40mg & 80mg sustained release caps 40mg: 10: Rs. 8.62 80mg: 10 Rs. 14.00

CIPLAR

(CIPLA)

پلار

Propranolol Hcl 10mg, 40mg & 80mg Tablets: 10mg: 10: Rs.4.31, 40mg: 10: Rs.10.56, 80mg: 10: Rs.12.50

CIPLAR-H

(CIPLA)

پلار- ایچ

Propranolol hcl 40mg Hydrochlorothiazide 25mg Tablets: 10: Rs.4.62

CORBETA

(SARABHAI)

کاربیٹا

Propranolol Hcl 10mg & 40mg tabs: 10mg: 10 Rs. 4.01; 40mg : 10, Rs.9.32

CORBETAZINE

(SARABHAI)

کاربیٹازائن

Propranolol Hcl 40mg Hydrochlorothiazide 25 mg: tabs: 10: Rs.11.27

INDERAL

(ICI)

انڈیرال

Propranolol Hcl 10mg 40mg & 80mg 10mg: 10: Rs.4.91 40mg : 10: Rs.11.39 80mg: 10: Rs.25.83

PROPAL

(SIGMA LABS)

پروپال

Propranolol hcl 10 & 40mg : tabs: 10mg : 10: Rs.3.86, 40mg: 10: Rs.8.33

SOTALOL سوٹالول ہائیڈروکلورائیڈ**HYDROCHLORIDE**

افعال و منافع: وجع القلب، دل کی بے ترتیب حرکات، ہائی بلڈ پریشر، مایو کارڈیل انفارکشن عظیم غددہ درقہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۸۰ سے ۱۶۰ ملی گرام یومیہ ایک خوراک میں، وجع القلب ۱۲۰ سے ۳۶۰ ملی گرام

یومیہ

منفی افعال: سمجھدوں کی عروق میں تشنج، قلب میں تسدد کے مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: بلڈ پریشر کم ہونا، نظام جذب و انجذاب METABOLISM متاثر ہونا، آنکھوں اور جلد پر ری ایکشن کا اثر نظام ہضم میں خلل ہو سکتا ہے

احتیاط: ذیابیطیس کے مریضوں کو دوا بتدریج کم کرنا چاہیے، حمل اور ایام رضاعت میں، گردوں کی خرابی اور دمہ میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکب

SOTAGARD

(GLAXO)

سوٹاگارڈ

Sotalol Hcl 40mg & 80mg tabs; 40mg 10. Rs 11 27 80 mg 10: Rs 21 25

کیلیم چینل بلاکر

CALCIUM CHANNEL BLOCKER

اس میں وہ دوائیں شامل ہیں جو دل کے درد، ہارٹ ایک کور وکٹی ہیں، قلب میں دوران خون میں ہونے والی رکاوٹ کو دور کرتی ہیں شرائین قلبیہ میں وسعت پیدا کر کے خون کی رسد کو بڑھاتی ہیں۔

DILAZEP

ڈلازیپ

افعال و خواص: قلبی دوران خون میں رکاوٹ، عروق قلبیہ کی خرابیاں، وجع القلب شرائین میں تشنج اور سختی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار شدید حالت میں ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار دے سکتے ہیں

متنی افعال: حساسیت پیدا کرنے والے مریضوں کو نہ دی جائے

مضر اثرات: الرجی، فتور، ہضم، سردرد، منہ میں زخم ہو سکتا ہے

احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتنیں۔

تجارتی مرکب

CORMELIAN

(KHANDELWAL)

کاری لائن

Dilazep (as dihydrochlor)

100mg, tabs: 10; Rs 35.18

DILTAZEM

ڈلتازیم

افعال و منافع: شرائن کی سختی اور تشنج کے سبب ہونے والا وسیع القلب $Angina$ مزمن و حاد القلب اور بائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و استعمال: ۳۰ سے ۶۰ می گرام دن میں ۳ بار کھانے سے پہلے رفتہ رفتہ مقدار خوراک پر جائیں۔

متنی افعال: حالت حمل تک سانس سنڈروم، دوسرے اور تیسرے درجہ کا پورٹائیک (CCF) سانس میں شدید تنگی اور رکاوٹ میں دینا منع ہے۔

مضر اثرات: سانس میں تنگی اذن اور بطن (A.V) میں رکاوٹ پیروں نخنوں میں درم مکی جلد پر درخ سرد ہو سکتا ہے۔

احتیاط: ایام رضاعت میں، لو بلڈ پریشر، گردوں اور جگر کی خرابی میں نہیں دینا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: بیٹا بلاکر، ڈیجیٹلس، ایکی ڈرون، سی می ٹی ڈین، ڈایزی پام بیسٹ کی دواؤں کے ساتھ دینا خطرناک ہے۔

تجارتی مرکبات

ان جی زیم (SUN PHARMA) ANGIZEM

Diltiazem 30mg and 60mg tabs 30mg 10: Rs.17.49 60mg 10: Rs.34.44

چیمیل (MICRO LABS) CHANNEL

Diltiazem Hcl 30mg and 60mg tabs 30mg 10: Rs.18.10; 60mg: 10:

Rs.34.90

ڈل کال (BOEHRINGER-M) DILCAL

Diltiazem Hcl 30mg and 60mg tabs 30mg 10: Rs.14.75; 60mg: 10:

Rs.28.50

ڈل کال ایس آر (BOEHRINGER-M) DILCAL SR

Diltiazem Hcl 90mg sustained release tabs 10: Rs. 38.50

DICARD	(INTAS)	ڈی کارڈ
Diltiazem 30mg and 60mg tabs 30mg 10 Rs 11 20 60mg 10 Rs 21 90		
DICARD SR	(INTAS)	ڈی کارڈ ایس آر
Diltiazem Hcl 90mg tabs 10 Rs 41 00		
DILCARDIA	(UNIQUE)	ڈیل کارڈیا
Diltiazem Hcl 30mg and 60mg tabs 30mg 10 Rs 17 20 60mg 10 Rs 33 30		
DILCARDIA SR 90	(UNIQUE)	ڈیل کارڈیا ایس آر ۹۰
Diltiazem Hcl 90mg , sustained release tabs 10 Rs 42 90		
DILCONTIN	(MODI-MUNDIPHARMA)	ڈیل کان ٹن
Diltiazem 60mg, 90mg & 120mg controlled release tabs 60mg 10 Rs 34 50, 90mg 10 Rs 49.70, 120mg: 10 Rs 57 65		
DILGARD	(PROTEC)	ڈیل گارڈ
Diltiazem Hcl 30mg and 60mg tabs 30mg: 10 Rs.16.78 60mg 10 Rs 32.54		
DILGINA	(KOPRAN)	ڈیل جینا
Diltiazem Hcl 30mg and 60mg tabs 30mg: 10 Rs. 16.43 60mg : 10 Rs 31 16		
DILITISYN	(THEMIS CHEMICALS)	ڈیل ٹی سائن
Diltiazem Hcl 30mg & 60mg tabs: 30mg : 10 Rs. 16.32, 60mg: 10 Rs 25 29		
DILOTOL	(PACE)	ڈیلو ٹول
Diltiazem Hcl 30mg & 60mg tabs: 30 mg 10 Rs. 17.42 60mg 10 Price N/A		
DILTIME SR	(ALIDAC)	ڈیل ٹائم ایس آر
Diltiazem Hcl 90mg & 120mg: s-r tabs: 90mg: 10 Rs.44.70, 120mg: 10 Rs.58 70		
DILZEM	(TORRENT)	ڈیل زیم
Diltiazem 30mg and 60mg tabs 30mg: 10 Rs.18.95 60mg . 10 Rs.36 90		

DILZEM-SR	(TORRENT)	ڈل زیم ایس آر
Diltiazem 90mg sustained release tabs 10 tabs	Rs. 46 90	
DILZEM INJ	(TORRENT)	ڈل زیم انجکشن
Diltiazem Hcl 5mg per ml inj 5ml vial	Rs 17.00	
DTM	(BIOCHEM)	ڈی ٹی ایم
Diltiazem 30mg and 60mg tabs 30mg 10	Rs 17 50 60mg . 10:	
Rs.32.75		
EMDIL	(MALLADI)	ایم ڈیل
Diltiazem Hcl 30mg and 60mg tabs 30mg . 10x10	Rs. 182.40; 60mg	
10x10	Rs.253.40	
MASDIL	(LUPIN)	ماس ڈیل
Diltiazem 30mg & 60mg tabs: 30mg. 10	Rs.17 77, 60mg 10	
Rs.33.76		
SEFGARD	(HIND ANTIBIOTICS)	سیف گارڈ
Diltiazem Hcl 30mg & 60mg tabs, 30mg: 10x10	Rs.143.40, 60mg	
10x10	Rs 168 85	

NIFEDIPINE

نائی فی ڈی پن

افعال و منافع: عروق قلبیہ کے تشنج، قلب میں دباؤ گھٹن محسوس ہونا، وجع القلب (انچائٹا)، ہائی بلڈ پریشر، دل کے قیل ہونے میں مفید اور معاون ہے۔

مقدار و ترکیب: دل کے درد میں ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام ہر ۸ گھنٹہ بعد زیادہ سے زیادہ ۲۰ ملی گرام ہائی بلڈ پریشر میں ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام گھنٹہ بعد۔

منفی افعال: حساسیت، شدید وجع القلب، لو بلڈ پریشر، حمل قلبی صدمہ سانس کی جھلی دوسرے درجہ کا قلبی تسد اور ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

معنر اثرات: درد سر، بے چینی، دم odema منہ کی جھلی متورم ہو سکتی ہے۔

احتیاط: لو بلڈ پریشر میں، دوا آہستہ آہستہ بند کریں، زیادہ بیلنس اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

ADALATOROS	(BAYER)	ادالت اورس
Nifedipine 40mg & 60mg extended release tabs. Price: N/A		
ANGIBLOC	(ALKEM)	انجی بلاک
Nifedipine 5mg & 10mg caps 5mg 30 Rs.9.55 10mg: 30. Rs.15.36		
ANGIBLOC RETARD	(ALKEM)	انجی بلاک ریٹارڈ
Nifedipine 20mg, sustained release tabs 10: Rs.8.50		
BETANACTEN	(HINDUSTAN)	بٹا نکٹین
Atenolol 50mg, nifedipine 20mg: s-r caps: 10: Rs.23.18		
BETA-NICARDIA	(UNIQUE)	بٹا نکارڈیا
Nifedipine 20mg sustained release. Atenolol 50mg capsule 10caps. Rs.19.92		
BETANIF	(UNISEARCH)	بٹانف
Atenolol 50mg, nifedipine 20mg SR caps, 10 caps Rs. 20.80; 30 caps Rs. 57.25		
BETA TROP	(SUN PHARMA)	بٹا ٹروپ
Nifedipine 20mg Atenolol 50mg sustained release caps 14 caps: Rs.33.87		
CALBETA	(TORRENT)	کیل بیٹا
Nifedipine 20mg, atenolol 50mg: s-r tabs: 10: Rs.19.54		
CALBLOC	(UNISEARCH)	کیل بلاک
Nifedipine 5mg, 10mg caps; 5mg: 50, Rs.20.75; 10mg. 10: Rs.6.50; 10mg: 60, Rs.36.39		
CALBLOC RETARD	(UNISEARCH)	کیل بلاک ریٹارڈ
Nifedipine 10mg & 20mg sustained release tabs: 10mg 10tabs: Rs.5.50, 20mg: 10 tabs: Rs.8.18		
CALCIGARD	(TORRENT)	کیل سی گارڈ
Nifedipine 5mg & 10mg: caps 5mg: 10: Rs.5.50 10mg: 10: Rs.7.90		
CALCIGARD RETARD	(TORRENT)	کیل سی گارڈ ریٹارڈ
Nifedipine 20mg, tabs 10: Rs.10.50		
CAPNIF	(PACE)	کیپ نف

Nifedipine 5, 10 & 20mg retard tabs: 5mg: 10: Rs.4.32; 10mg: 10: Rs.5.95; 20mg: 10: Rs.8.65

CARDIPIN (INTAS) کارڈیپن

Nifedipine 5mg & 10mg: caps: 5mg: 10: Rs.4.90, 10: Rs.6.50

CARDIPIN RETARD (INTAS) کارڈیپن ریٹارڈ

Nifedipine 20mg: s-r tabs: 10: Rs.9.80

CARDULES (NICHOLAS) کارڈیولس

Nifedipine 5mg & 10mg liquid filled caps 5mg: 10: Rs.12.90 10mg: 10: Rs.21.00

CARDULES PLUS (NICHOLAS) کارڈیولس پلس

Nifedipine 10mg & 20mg, atenolol 50mg: s-r caps: 10mg: 10: Rs.16.50, 20mg: 10: Rs.20.45

CARDULES RETARD (NICHOLAS) کارڈیولس ریٹارڈ

Nifedipine 10mg & 20mg: caps 10mg: 10: Rs.8.30, 20mg: 10: Rs.10.00

DEPICOR (MERCK) ڈیپیکور

Nifedipine 5mg & 10mg: caps: 5mg: 10: Rs.4.99, 10mg: 10: 7.21

DEPICORD SR (MERCK) ڈیپیکور ایس آر

Nifedipine 20mg: s-r tabs: 10: Rs.9.70

DEPIN (CADILA) ڈیپن

Nifedipine 10mg & 5mg caps 10mg: 30: Rs.22.75 100: Rs.74.30 5mg: 50: Rs.26.00 100: Rs.27.00

DEPIN RETARD (CADILA) ڈیپن ریٹارڈ

Nifedipine 20mg: sust release tabs 10: Rs.8.90

DEPTEN (CADILA) ڈیپٹن

Nifedipine 20mg, atenolol 50mg: s-r tabs: 10: Rs.19.50

MYOGARD (SEARLE) مایوگارد

Nifedipine 5mg & 10mg: caps 5mg: 10: Rs.4.40 10mg: 10: Rs.8.23

MYOGARD-LA (SEARLE) مایوگارد ایل اے

Nifedipine 20mg sustained release tabs: 10: Rs.10.52

NACTEN (HIND.ANTIBIOTICS) ناکٹین

Nifedipine 5mg, 10mg & 20mg tabs: 5mg: 10x10 Rs.46.80; 10mg: 10x10 Rs.64.80; 20mg: 10x10 Rs.85.90

NICARDIA	(UNIQUE)	نکارڈیا
Nifedipine 5mg & 10mg caps 5mg: 10: Rs.4.97, 100: Rs.41 30 10mg : 10: Rs.7 40 100: Rs.59.65		
NICARDIA-CD	(UNIQUE)	نکارڈیا سی ڈی
Nifedipine extended release 30mg tabs: 10: Rs.25.10		
NIFEDINE	(S.G. PHARMA)	نئی ڈین
Nifedipine 10mg; tabs: 10: Rs.7.49		
NIFELAT	(CIPLA)	نالی فی لیٹ
Nifedipine 5 & 10mg : Caps 5mg : 10: Rs. 5.06, 10mg: 10: Rs. 7.32		
NIFELAT RETARD TABS	(CIPLA)	نالی فی لیٹ ریٹارڈ ٹیبلیٹ
Nifedipine 20mg: s-r tabs 10. Rs.7.60		
NIFETEX TR	(BPRL)	نالی فی ٹیکس ٹری آر
Nifedipine 20mg , atenolol 50mg: Blister pack of 10caps: Price: N/A		
NIFETOLOL CAPS	(ANGLO FRENCH)	نالی فی ٹولول
Nifedipine USP 20mg (sustained release) Atenolol 50mg Caps 10; Rs.24.45		
NILOL	(INTAS)	نی لول
Nifedipine sustained release 20mg, Atenolol 50mg tabs 10 tabs : Rs.20.50		
NITENOL	(PHARMED)	نالی ٹی نول
Nifedipine (sustained release) U.S.P. 20mg Atenolol B.P 50mg 10x10's		
PRESOLAR	(CIPLA)	پری سولر
Nifedipine 20mg, atenolol 50mg: tabs: 10: Rs.23.06		
TENOFED	(IPCA)	ٹے نوفڈ
Nifedipine 20mg, atenolol 50mg: caps: 10: Rs.24.50		

NITRENDIPINE

نالی ٹرن ڈی پن

افعال و منافع: معمولی اور درمیانی درجے کا ہائی بلڈ پریشر، ہر قسم کے انجائنا (درد دل) قلبی عروق میں تنگی، قلب کے افعال کی خرابی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ ملی گرام دن میں ایک بار زیادہ سے زیادہ ۴۰ ملی گرام دو خوراکیوں میں یومیہ

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو سانس میں تنگی قلبی تسدد، قلبی صدمہ۔ دل کا ٹیل ہونا، سینہ میں درد حمل اور دودھ پلانے کے ایام میں غاذ اثرات ہوتے ہیں۔

مضر اثرات: درد سر، جلد پر داغ، گھٹنوں میں درم خفقان، چکر آنا متلی، الرجی بے چینی نجات خواب زیادہ کھائی دینا تنگی تنفس، آواز کے ساتھ سانس آنا، اسہال، بکواس کرنا ضعف باد، غشوگی بصارت میں فرق بالوں کا گرنا، گلے میں خراش، نسیان، پیروں میں درد۔

احتیاط: بے ہوشی کی ادویہ، ذیابیطیس غدہ درقہ کے خرابی، گردوں کی خرابی میں احتیاط برقیں دوا فوراً بند نہ کریں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈیجاکسن، کلونی ڈین ویراپامیل، ارمک سی بی ٹی ڈین اور انڈومیتھ سون کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

CARDIF (CONCEPT) کارڈف

Nitrendipine 10mg & 20mg tabs: 10mg 10: Rs 9 50: 20mg 10: Rs.12 75

CARDIF BETA (ALBERT DAVID) کارڈف بیٹا

Nitrendipine 10mg & 20mg, atenolol 50mg: film coated tabs: 10mg: 10: Rs.28.00, 20mg: 10: Rs.38.00

NITREPIN (USV) نائی ٹری پن

Nitrendipine 10mg and 20mg tabs: 10mg: 10: Rs.14.80, 20mg: 10: Rs.19.80

VERAPAMIL

ویراپامیل

افعال و خواص: یہ میلیم کو قلب کے عضلات تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ تشنج عضلات قلبیہ وجع القلب، ہائی بلڈ پریشر، قلبی حرکات کی بے ترتیبی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہائی بلڈ پریشر میں ۸۰ سے ۱۶۰ ملی گرام دن میں ۲ بار، قلبی حرکات کی بے ترتیبی میں ۴۰ سے ۸۰ ملی گرام

منفی افعال: لو بلڈ پریشر میں قلبی صدمات میں، سانس کی تنگی، قلب کے اذن و بطن میں رکاوٹ، دل ٹیل ہونے میں سانس سنڈروم میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: قبض و دوسر، چکر آنا، جلد پر داغ پڑنا، لو بلڈ پریشر سانس کی تنگی قلاع مردوں میں چھاتیاں بڑی ہونا، دودھ نکلنا۔

احتیاط: جگر کی خرابی اور زیادہ مقدار میں دینے سے ہارٹ ٹیل ہو سکتا ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: بیٹا بلا کر دوائیں، ڈیجاسن، سائیکلو سپورین، تھیوفائی لین، مرخی عضلات دوائیں، کاربامایز پائن، ریفام پی سین، لیتھیم، بیہوشی کی دوائیں، دافع، بلڈ پریشر ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

CALPITIN

(BOEHRINGER)

کیلا پیٹین

Verapamil 40mg & 80mg Dragees 40mg: 10: Rs.8.86 80mg: 10:

Rs.17.36

CALAPTIN INJ

(BOEHRINGER)

کیلا پیٹین انجکشن

Verapamil Hcl 5mg per 5x2ml inj 2ml: Rs.8.23

CALAPTIN 120/240 SR (BOEHRINGER)

کیلا پیٹین ۱۲۰/۲۴۰ ایس آر

Verapamil Hcl 120mg & 240mg sustained release tabs; 120mgmg: 10

Rs. 36.50 240mg: 10 Rs.55.00

ISOPTIN

(GERMAN REMEDIES)

آئی سوپ ٹین

Verapamil Hcl 40mg & 80mg: 40mg: 10: Rs. 7.43, 80mg: 10:

Rs.14.37

ISOPTIN-240 SR

(GERMAN REMEDIES)

آئی سوپ ٹین ۲۴۰ ایس آر

Verapamil Hcl 240mg sustained release tabs 10 tabs: Rs. 54.26

ISOPTIN INJ

(GERMAN REMEDIES)

آئی سوپ ٹین انجکشن

Verapamil Hcl 5mg per 2ml inj. 5x2 ml: Rs.8.23

VASOPTEN

(TORRENT)

واسوپ ٹین

Verapamil 40mg, 80mg, 120mg tabs 40mg: 10mg: 10: Rs.6.52 : 80mg

: 10: Rs.17.38 120mg. 10: Rs.24.50

VERMIL

(THEMIS CHEMICALS)

دیراٹل

Verapamil 40mg & 80mg: tabs: 40mg: 10: Rs.5.02, 80mg: 10: Rs.9.10

NITRATES**نائٹریٹس**

اس گروپ میں وہ دوائیں شامل ہیں جو قلبی عروق میں وسعت پیدا کر کے آسجین کی رسد میں اضافہ کرتی ہیں۔

ERYTHRITYL TETRA NITRATE ارائی تھرائی ٹائل ٹرائٹرائٹ

افعال و خواص: وجع القلب (انجائنا) ہارٹ ایک اور ہارٹ فیل ہونے کے خطرہ کے وقت استعمال کرائی جاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: خطرہ کے وقت ۵ ملی گرام کی گولی زبان کے نیچے رکھ کر چوسیں۔ خوردنی طور پر ۱۵ ملی گرام کھانے سے پہلے یا سوتے وقت کھلائیں۔

منفی افعال: حساس اور الرجک مریضوں میں۔

مضر اثرات: درد سر، چہرے پر سرخی، بے چینی، ضعف، لوہلڈ پریش جلد پر داغ جلد متورم ہو سکتی ہے۔

تجارتی مرکبات

CARDILATE

(BURROUGHS WELLCOME)

کارڈی لیٹ

Erythrityl tetranitrate 5mg & 15mg : tabs: 5mg : 10x10: Rs.10.30

15mg: 100: Rs.20.67

GLYCERYL TRINITRATE گلیسرائل ٹرائی ٹرائٹرائٹ

افعال و منافع: یہ دوا قلب میں خون کی سپلائی کو تیز کرتی ہے قلب کے بطون کے دباؤ میں کمی کرتی ہے۔ شدید وجع القلب (ہارٹ ایک) پیچھڑوں میں درم، اور ہارٹ فیل ہونے سے بچانے اور علاج کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: وجع القلب میں آدھالی گرام ہر ۳ منٹ بعد جب تک درد نہ رک جائے حفظ بالقدم

کے لیے آدھا ملی گرام محنت و مشقت سے قبل پیمپروڈوں کے درم اور اوڈیما میں ۰.۰۸ ملی گرام سے ۲.۳ سے ۵ سے ۱۰ امٹ کے وقفہ سے دیں۔

متقی افعال: سر کی چوٹ اور دماغی جریان خون میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: چہرے پر سرخی، سینہ میں درد، بے چینی، لوبلڈ پریش غشی، ضعف قلب نبض بطی زیادہ مقدار میں دینے سے تھکی، جسم نیلا، ہیموگلوبین کی کمی، دماغ میں خون کی کمی ہوتا۔

احتیاط: امراض قلب وریہ میں، حالت حمل اور رضاعت میں، احتیاط برتیں دوران استعمال غشی طاری ہو سکتی ہے۔

تجارتی مرکبات

ANGISED (BURROUGHS WELLCOME) این جی سنڈ

Glyceryl trinitrate 0.5mg; tabs 30: Rs. 9.87

NITROCONTIN (MODI-MUNDI PHARMA) نائٹروکونٹن

Glyceryl trinitrate 2.6mg and 6.4mg: controlled release tabs 2.6mg:

25tabs: Rs.38.75, 6 4mg: 25 tabs: Rs.55.00

NITROCURE (PANACEA) نائٹروکیور

Glyceryl trinitrate (introglycerin) 5mg per ml inj. 5ml amps

ISOSORBIDE آئی سوسار بائیڈ ڈائی نائٹریٹ

DI-NITRATE

افعال و منافع: درد دل (انجائنا) اور پیمپروڈوں میں خون کی رسد میں کمی مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: خوری اثر کے لئے ۵ سے ۱۰ ملی گرام زبان کے نیچے چوسیں۔ خوردنی طور پر ۵ سے ۱۰ ملی گرام دن میں ۴ بار۔

متقی افعال: شدید قلبی دباؤ، اور صدمہ کی کیفیت میں دینا خطرناک ہے۔

احتیاط: گلوکوما میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

CARDICAP-TR (NATCO FINE) 40MG: 25., 70.00	کھڑی کپٹی آر
ISSOMACK RETARD (BIOCHEM) 40mg: 10: Rs.31.87	آئی سو میک رٹارڈ
ISORDIL (GEOFFREY MANNERS) 10mg: 100:Rs.10.16	آئی سورڈیل
SORBICAP (JENBURKT) 10 caps Rs.18.50	ساربی کپ
SORBITRATE (NICHOLAS) 10mg:50: Rs.9.65	ساربی ٹریٹ

آئی سو-سار ہائیڈ موٹو نائٹریٹ ISO SORBIDE MANO NITRATE

افعال و متافع: یہ ہر طرح کے درد دل انجانا میں مفید ہے۔ خون کی رگوں کے دھاؤ کو کم کرتی ہے۔
قلب کی ہر ایک رگوں میں خون پہونچانے میں مدد دیتی ہے، عروق میں تنگی و رکاوٹ کے سبب ہونے
والے لوجع القلب اور ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام دن میں ۲-۳ بار کھانے کے بعد۔

متفی افعال: تحس کالیل ہوتا، لو بلڈ پریشر حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: درد سر، چہرے پر سرخی، چکر آنا۔

احتیاط: ابتداء میں کم مقدار دیں۔ شدید قلبی دہاس مایو کارڈیل انفارکشن، دل بیٹھنے میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

ANGICOR (HINDUSTAN GEIGY) 60mg: 10: Rs.35 00	انجی کور
ANGITRIT (UNISEARCH) 20mg tabs 10: Rs.19 50	انجی ٹریٹ
IHD 20/40 (STADMED) 40mg: 10: Rs.29.75	آئی ایچ ڈی ۲۰/۴۰
IMDUR (ASTRA-IDL) 60mg, tabs:10:Rs.35.00	ایم ڈور
ISMO-10/20/40 (BOEHRINGER) 40mg:10:Rs.43.10	آئی سو ۱۰/۲۰/۴۰
ISOCOR-20 (MERCK) 20mg: tabs: 10: Rs.17.50	آئی سو کور
ISOTRIM (PACE) 40mg: 10: Rs.31.80	آئی سو ٹریم
MONICOR (WALLACE) 20mg tabs 10. Rs.13.95	مونئی کور
MONIT 20 (INTAS) 20mg: tabs 10: Rs 10.70	مونٹ ۲۰

MONOCONTIN (MODI-MUNDI PHARMA)	مونوکانٹن
50mg. controlled release tabs: 10: Rs.42.50	
MONO SORBITRATE (NICHOLAS)	مونو ساربیٹریٹ
40mg: 10: Rs.38.80	
MONOTRATE (SUN PHARMA) 10mg 10: Rs.12.00	مونوٹریٹ
MONOTRATE OD (SUN PHARMA)	مونوٹریٹ دن میں ایک بار والی
50mg: s-r tabs: 10: Rs.41.7	
NITROFIX (MICRO LABS) 40mg. 10: Rs.25.00	نائٹرو فیکس
VASONIT 10/20/30 TABS (RECON)	واسونٹ ۱۰/۲۰/۳۰
30mg: 10: Rs.24.55	

NITRO GLYCERINE

نائٹرو گلیسرین

افعال و منافع: وجع القلب (Angina) کے علاج اور بچاؤ کے لئے مستعمل ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۲.۵ ملی گرام دن میں ۲-۳ بار کھلائیں انجکشن ۵ ملی گرام عضلاتی لگائیں۔
 منفی افعال: حاد یا مزمن قلبی تھلاؤ، شدید انیسیا، گلوکوما، لو بلڈ پریشر میں دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

ANGISPAN TR	(LYKA) 50: Rs.60.63	انجی اسپان
ANGISPAN SP	(LYKA) 50: Rs.87.91	انجی اسپان وریا
MILLISROL	(KHNADELWAL) 10ml: Rs.34.46	ملی سروگل
MYONT	(TROIKAA) 5ml vial: Rs.46.50	ماکی اونٹ
MYOVIN	(CADILA) 60g: Rs.37.53	ماکی اوون کریم
NITRODERM TTS (CIBA-GEIGY) 10: Rs.658.39		نائٹرو ڈرم ٹرانسڈر
NITROMACK (BIOCHEM)		نائٹرو میک انجکشن
5ml amp. 10x5ml: Rs.600.00		



تجارتی مرکبات

ILDAMIN TABS

(GERMAN REMEDIES)

ال ڈامن

24mg:10.Rs.40.00

ILDAMIN INJ

(GERMAN REMEDIES) ال ڈامن انجکشن

Oxyfedrine hcl 4mg/2ml inj 2ml: Rs.3.18

حرکات قلب کی بے ترتیبی دور کرنے والی ادویہ

ANTI ARRHYTHMIC DRUGS

AMIODARONE

ایمی ڈرون

افعال و منافع: حرکات قلب کی بے ترتیبی، والف پارکن سن وائٹ سنڈروم و جمع القلب کے ساتھ حرکات غیر منتظم جو کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوں یہ دوا مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ایک ہفتہ تک یا ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار پھر ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۱ بار دینا چاہیے۔

منفی افعال: اذنی بطنی رکاوٹ میں، شدید جمع القلب صدمہ، غدد در قیہ کی خرابی ایام رضاعت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: طبقہ قریہ میں دھبے پڑنا، بصارت میں خلل، عروق خشنہ میں ورم، جگر اور غدد در قیہ کے افعال میں خرابی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: ماہر امراض قلب کی نگرانی میں استعمال کرائیں غدد در قیہ پیمپروں، جگر، آنکھوں کے افعال پر نگاہ رکھیں ہارٹ ایک اور حالت حمل میں احتیاط برتیں۔

منفی رد عمل: ڈیپاکسن، میلشیم، مانع انجماد خون ادویہ، بیٹا بلا کر در دول کو روکنے والی ادویہ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

ALDARONE	(ALIDAC) 200mg; tabs 10: Rs.66.20	آلڈرون
CORDARONE	(TORRENT) 100mg tabs 10: Rs.39.90	کارڈرون
CORDARONE-X	(TORRENT)	کارڈرون ایکس
200mg tabs 10: Rs.77.90		
CORARONE-X I.V. (TORRENT)		کارڈرون ایکس آئی وی
50mg per ml inj. 3ml amps: Rs.32.12		

ڈائی سوپائی رامائیڈ فاسفیٹ

DISOPYRAMIDE PHOSPHATE

افعال و منافع: آپریشن، وجع القلب کی ادویہ کے استعمال ڈیپاکسن کے استعمال سے ہونے والی حرکات قلب کی بے ترتیبی میں مفید ہے۔ حرکات قلب کو کنٹرول کرنے میں معاون ہے۔

مقدار و ترکیب: مقدار خوراک کا تعین حالت مرض و قوت کے مطابق کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ مقدار ۸۰۰ ملی گرام ۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے مرض کو کنٹرول کرنے نارمل حالت پر رکھنے کے لئے ۱۰۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد دی جائے۔

متقی افعال: دوسرے اور تیسرے درجے کی اذنی بطنی رکاوٹ میں، قلبی صدمات شدید ہارٹ ایٹک میں اور دوا سے حساس مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: بصریات میں فرق منہ خشک، پیشاب رکنا خون کے نمکیات میں اضافہ، عضلات میں درد، کمزوری، چکر، ذہنی الجھن، یرقان سدی، غشی، خون میں شکر کی کمی، متلی، اسہال نفاہت اور بے چینی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: ڈیجیٹالس کے مریضوں کو حالت حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

NORPACE	(SEARLE) 150mg; 10: Rs.56.64	نارپیس
REGUBEAT	(BIDDLE SAWYER)	ریگوبیٹ
100mg; tabs: 6: Rs.107.50		

LIGNOCAINE HCL**لگنوکیں ہائیڈروکلورائیڈ**

افعال و منافع: حرکات قلب کی بے ترتیبی میں مفید ہے۔ بیهوش کرنے والی دوا کے اثرات ڈیہاکسن کی معضرت کو دور کرنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲.۵ سے ۵ ملی لیٹر دریدی آہستہ آہستہ ۱ سے ۲ منٹ میں دیا جائے یا ڈیکسٹروز ۵۰۰ ملی لیٹر میں ۱۰ ملی لیٹر انجکشن ملا کر آہستہ آہستہ چڑھایا جائے۔

منفی افعال: سانس کی جھگی میں، ہر قسم کے اذنی اور بطنی تسدو میں بے ہوشی والی دواؤں سے حساس مریضوں میں دیتا مضر ہے۔

مضر اثرات: قلب میں شدید انقباض، ڈیپریشن، مایوسی، پست ہمتی، آنکھوں میں دھندلا پن، ہاتھ کانپنا، دور سے پڑنا، گھبرانا، منہ خشک، لولہ پریشر سینہ میں جھگی محسوس ہوتی ہے۔

احتیاط: قلبی حرکات کی جانچ، کارڈیک مانیٹر کے ساتھ بھی یہ دوا استعمال کریں ڈیپریشن یا گھبراہٹ کی حالت میں دوا روک دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

GESICARD (S.G PHARMA)

کیسی کارڈ

20mg: inj 5ml: Rs.1.07; 50ml : Rs 5 97

XYLOCARD INJ 2% (ASTRA-IDL)

زاکو کارڈ انجکشن

5ml vial. Rs.1.86 50ml: Rs.10.35

MEXILETIN**میگزلی ٹین**

افعال و خواص: قلب کے خانہ بطن میں ٹراپی، مایو کارڈیل انفارکشن قلب میں خون کی رسد نہ پہنچنے کے سبب قلب کی بے ترتیبی حرکات میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ سے ۶۰۰ ملی گرام پہلی خوراک ۲ گھنٹہ بعد ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار دریدی راہ پہلی خوراک ۲۰۰ سے ۲۵۰ ملی گرام ۲۵ ملی گرام فی منٹ کے حساب سے دینا چاہیے پھر ۱۰۰ ملی گرام ۱ منٹ کے حساب سے دی جائے۔

مضر اثرات: فور ہضم، نظام عصبی میں خلل اور ہلڈ پریشم ہو سکتا ہے۔

احتیاط: سانس کی بھگی، سانس کی نالی میں خرابیاں، لوہلڈ پریشم و جگر اور گردوں کے امراض میں پارکن سن ڈیزیز حالت حمل اور لیام رضاعت میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

MEXITIL (GERMAN REMEDIES) میگزئی ٹل ہلیٹ

50mg: 10 Rs 59.80; 150mg: 10 Rs.169.70

MEXITIL INJ (GERMAN REMEDIES) Rs.36 23 میگزئی ٹل انجکشن

PRO CAINAMIDE HCL پرو کے نامائیڈ

افعال و منافع: وجع القلب، شرائین قلبیہ میں تشنج اور درد، بطنی دہاؤ کی کمی میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱۰۰۰ ملی گرام (۴ گولی) پہلی خوراک پھر ۵۰۰ ملی گرام رتی کلو گرام وزن کے حساب سے ۳ گھنٹہ بعد۔ انجکشن ۵۰۰ ملی گرام سے ایک گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد لگانا چاہیے کنٹرول ہو جانے پر صرف براہ من دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ہاضمہ کی خرابیاں، لیو کو سامیٹ میں کمی ہو سکتی ہے۔
احتیاط: قلب و جگر اور گردوں کی کمزوری میں حاملہ کمزور اور ضعیفوں کو نہیں دینا چاہیے دوران علاج سیرولاجیکل ٹسٹ کراتے رہنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

PRONESTYL (SARABHAI) پرونس ٹائل

Procainamide hcl 250mg: tabs: 10: Rs.37.53

PRONESTYL INJ (SARABHAI) پرونس ٹائل انجکشن

Procainamide hcl 100mg per ml inj 10ml: Rs.35.50

PROPAFENONE HCL پرو پانی نون ہائیڈرو کلورائیڈ

افعال و منافع: بطنی دہاؤ کی خرابی، حرکات قلب کی بے ترتیبی والف پارکن سن وائٹ سنڈروم میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۳ دن بعد ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار بچوں میں دیا جاتا ہے۔

منفی افعال: ایسا ہارٹ ایفک جو کنٹرول میں نہ آ سکے، قلبی صدمہ، سانس میں تنگی جسم میں نمکیات اور پانی کی کمی، پیپھروں کی عروق میں تسد و لو بلڈ پریشر اور حمل میں نقصان دہ ہیں۔
مضر اثرات: چکر آنا، متلی، تے، ذائقہ خراب، قبض، اسہال، درد سر، بے چینی، الرجی ضیق النفس۔
احتیاط: صرف ڈاکٹر کی نگرانی میں دینا چاہیے، دل ٹیل ہونے جگر گردوں کی خرابی ضیفوں میں ہیں مگر کے مریضوں میں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: حرکات قلب کو کنٹرول کرنے والی دواؤں، ڈیجیٹالس وارفارین کی مانی ٹی ڈین، پروپرانولول، میناپرولول اور ریقام پی سین کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکب

RYTMONORM

(GERMAN REMEDIES)

رائٹ مونارم

Propafenone hcl 150 mg: tabs: 10; Rs. 170.00

کوئی نی ڈین فینائل-تھائل باربیٹوریٹ

QUINIDINE PHENYETHYL BARBITURATE

افعال و منافع: یہ دوا قلب کی انتہائی حرکات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ قلب میں تناؤ، وجع القلب، خفقان، نیند نہ آنا، بے چینی، الجھن گھبراہٹ اور عضلات کے تشنج میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام یومیہ ضرورت پڑنے پر مقدار دو گنی دے سکتے ہیں بچوں کو عمر کے مطابق۔

منفی افعال: قلبی افعال کے جزوی یا کلی انقطاع میں ہرگز استعمال نہ کرائیں۔
مضر اثرات: لتور ہضم، چکر آنا، کان بچنا، سانس میں تنگی، بصارت میں فرق درد سر بخار لو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر کے امراض میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈیہاکسن اور نائٹروگلیسرین کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکب

NATCARDINE

(FRANCO-INDIAN)

نٹ کارڈین

400mg, tabs 10. Rs. 18.66

QUINIDINE SULPHATE

کوئی نی ڈین سلفیٹ

افعال و منافع: وجع القلب شراکین اور وریڈوں میں چک اور ضربات کی کمی، دل کے لیل ہونے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

متقی افعال: قلب میں شدید رکاوٹ، وجع القلب (انجائنا) قلب کی مہلی اور عروق میں خرابی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: کان بجا، بصدات میں فرق، چکر آنا، درد سر، ہاتھ کا پناہ ملنے، تشنج الارچی، غنودگی لو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔ سٹ کے بغیر نہیں لگانا چاہیے عروق میں سدہ بننے کے خطرہ میں۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: مانع انجماد خون، مرضی عضلات، ڈی جاکسن، دافع حیرایت، دافع بلڈ پریشر ادویہ، فینوباربیٹون، فین ٹائن، نارادرینالین کے ساتھ دینا مناسب نہیں ہے۔

تجارتی مرکب

QUINIDINE

(WELLCOME) 200mg, tabs: 10. Rs. 33.60

کوئی نی ڈین

ہائی بلڈ پریشر روکنے والی ادویہ

PHENTOLAMINE

فین ٹولامین

افعال و منافع: ہائی بلڈ پریشر، شدید وجع القلب، پیچیدوں کے درم اور ٹیڈمر کے آپریشن میں مفید

—

مقدار و ترکیب: ۵ ملی گرام بچوں کو اعلیٰ گرام وریڈی دینا چاہیے۔ آپریشن کے دوران اگر بلڈ پریشر میں اضافہ ہو تو فوراً ۵ سے ۱۰ ملی گرام وریڈی دینا چاہیے۔

امراض میں منفی افعال: شدید لو بلڈ پریشر میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: لو بلڈ پریشر، درد دل، چکر متلی، تھکاوٹ اور ناک بند ہو سکتی ہے۔

احتیاط: دوران علاج بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں ۸۰ سسٹولک سے نیچے استعمال کرنا خطرناک ہے۔

LABETALOL HCL لابیٹالول ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: یہ الفا بیٹاری سپر بلا کر روپ سے ہے۔ ہر طرح کے ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: پہلی خوراک ۵۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ضرورت کے مطابق مقدار و خوراک ۲۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام یومیہ تک دے سکتے ہیں بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

امراض میں منفی رد عمل: پھیپھڑوں میں تشنج، درد، الرجی، وائیں بطن میں تسد، سانس لینے میں تکلیف، قلبی صدمہ، ہارٹ فیل کا خطرہ، دل بیٹھن (کارڈیک ڈپریشن) ایام حمل اور رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: لو بلڈ پریشر، وجع القلب، درد سر، یرقان، پراگندہ خواب نظر آنا۔

احتیاط: دل کے افعال کی خرابی یا فیل ہونے میں اچانک دوا روکنے دیا بیٹس، ورم ہار بٹون گل پھولے اور امراض جگر میں استعمال سے احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: میٹاشیم کے مرکبات بیہوشی کی دوا کے ساتھ نقصان ہو سکتا ہے۔

تجارتی مرکب

NORMADATE (GLAXO) 50mg:10 Rs.15.03

تاریخ

CAPTOPRIL

کیپ ٹوپریل

افعال و منافع: ہارٹ ایک مزمن، C.C.F. معمولی اور شدید ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: کبھی کارڈیک فیلر C.C.F. میں ۱۲.۵ سے ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار زیادہ سے

زیادہ ۱۵۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے،

ہائی بلڈ پریشر میں ۱۲.۵ سے ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار زیادہ سے زیادہ ۵۰ ملی گرام دوا آہستہ آہستہ بڑھائی جائے۔

امراض میں منفی رد عمل: مدرات بول کے استعمال سے سوڈیم کی کمی ہو جانے پر گردوں کے امراض حمل، رضاعت میں اور بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: جلد پر دلغ ذائقہ خراب، نیوٹروفیل کی کمی۔

احتیاط: مکھیا میں سن کرنے والی ادویہ، لیوکیما پیدا کرنے والی ادویہ، خون کے سفید ذرات W.B.C. پر نگاہ رکھیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: پوٹاشیم اور مریکول ادویہ، (NSAID) عروق کشادہ کرنے والی ادویہ، کلونی ڈین، الوپیرنال، پروجینی سڈ، پروکینامائیڈ قوت مدافعت گھٹانے والی ادویہ، اور ڈیجیٹلس کے ساتھ دینے سے اثرات خراب نکلتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

ACETEN	(WOCKHARDT) 25mg 10: Rs.33.35	ایسی ٹن
ACEZIDE	(WOCKHARDT) 15mg:10: Rs.24.13	ایسی زائیڈ
ANGIOPRIL	(TORRENT) 25mg:10: Rs.29.50	این جیو پریل
CAPOTRIL	(LUPIN) 25mg 10:Rs 34.57; 50mg 4:Rs 25 81	کیپو ٹریل
CAPOTRIL-H	(LUPIN) 25mg:10 Rs.36.23	کیپو ٹریل-ایچ

ENALAPRIL

انالپرل

افعال و منافع: ہائی بلڈ پریشر بول کے ٹیل ہونے، ذیابیطیس بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: پہلی خوراک ۵ ملی گرام دن میں ایک بار بعد میں ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام یومیہ دل کے ٹیل ہونے C.C.F. میں مریکول ادویہ کے ساتھ ۲.۵ ملی گرام یومیہ۔

امراض میں منفی رد عمل: حالت حمل اور ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ورم Oedema، جلد پر دلغ پڑنا، سرد درد، بے چینی، چکر آنا، فتور، ہضم۔

احتیاط: لوہڈ پریشر میں، گردوں کی خرابی میں، احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: مدرات بول، پوٹاشیم کے مرکبات، دیگر دفاعی بلڈ پریشر ادویہ، اور
لیتھیم کے مرکبات کے ساتھ اس کا استعمال معر ہے۔

تجارتی مرکبات

CONVERTEN	(KHANDELWAL) 10mg:10 Rs 24.82	کنورٹین
EN-ACE	(NICHOLAS) 10mg:10:Rs.29.40	این اے سی
EN-ACE-D	(NICHOLAS) 25mg:10:Rs.29.60	این اے سی۔ ڈی
ENAM	(STANGEN) 20mg:10:Rs.38.00	ای نم
ENAMATE	(GLENMARK) 10mg:10:Rs.28 19	انامیٹ
ENAPRIL	(INTAS) 20mg:10:Rs.54.00	اناپریل
ENAPRIL-HT	(INTAS)	اناپریل ایچ ٹی
Enapril maleate 10mg, Hydrochlorothiazide 25mg: tabs: 10.	Rs. 26.00	
ENAPRIL LP	(INTAS)	اناپریل ایل ڈی
Enapril maleate 10mg, Hydrochlorothiazide 12.5mg: tabs: 10:	Rs. 24.50	
ENCARDIL	(MRDLEY) 10mg 10:R.26.90	این کارڈیل
ENPRI	(WOCKHAR) 10mg:10:Rs.21.83	این پرائی
ENVAS TABS	(CADILA) 20mg:10:Rs.60 60	ان واس ٹبلٹ
ENZIDE	(CADILA)	ان زائیڈ
Enalapril maleate 10mg, hydrochlorothiazide 25mg: tabs: 10:	Rs.22 00	
HYTROL	(SUN PHARMA)10mg:10 Rs 22 00	ہائی ٹرول
INVORIL	(RANBAXY) 10mg:10:Rs. 325.20	ان وورل
INVOZIDE	(RANBAXY)	ان ووزائیڈ
Enalapril maleate 10mg, hydrochlorothiazide 25mg: tabs: 10:	Rs.33.10	
MINIPRIL	(ALEMBIC)	مینی پریل
Enalapril maleate 2.5mg, 5mg and 10mg: tabs: Price: N/A		
NEWACE	(MAX) 10mg :10: Rs.32.00	نیو اے سی
NORMACE	(UNISEARCH) 10mg: 10: Rs.28 10	نار میس
NURIL	(U.S.VITAMIN) 10mg, 10: Rs.28.66	نورل
OREN 2.5/5/10	(NATCO) 10mg:10:Rs.29.50	اورن ۲.۵/۵/۱۰
TENFRI	(PACE) 10mg: 10: Rs.28.65	ٹن فرائی

VASONORM-5	(KOPRAN) 5mg: 10: Rs.15.50	واسونارم ۵
VASOPRIL	(PROTEC) 5mg: 10: Rs.15.91	واسوپرل
VIVIRIL	(SARABHAI) 10mg: 10: Rs 26.83	وائی وی رل
VIVIRIL-D	(SARABHAI)	وائی وی رل ڈی
Enalapril maleate 10mg, hydrochlorthiazide 2.5mg: tabs: 10: Rs.29.50		

LISINOPRIL

لی سی نوپرل

افعال و منافع: یہ دوا معمولی اور درمیانی درجے کے ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: پہلی خوراک ۵، ۲۰ ملی گرام دن میں ایک بار پھر ۵ سے ۲۰ ملی گرام مرض کے مطابق دی جائے زیادہ سے زیادہ ۴۰ ملی گرام۔ ربول ادویہ کو اس کے استعمال سے پہلے بند کر دینا چاہیے بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

منفی افعال و امراض میں: شرائین میں رکاوٹ، رگوں میں تسد، حالت حمل جسم پر خونی دھبے اور تھج میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: لو بلڈ پریشر ہونا، گردوں کی کمزوری، اوڈیما، جلد پر داغ پڑنا، چکر آنا، دروسر، اسہال، کھانسی، الجھن، گھبراہٹ، خفقان، متلی، ضعف و نفاست۔

احتیاط: گردوں کی خرابی والے ہائی بلڈ پریشر میں، شدید قلبی دباؤ میں، گردوں کی خرابی، دوران علاج گردوں کے فعل پر نگاہ رکھیں۔

دیگر دواؤں کے ساتھ رد عمل: پوٹاشیم کم کرنے والی دواؤں، اینڈو میتھاسون، لیتھیم، دافع بلڈ پریشر دواؤں کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

BIOPRIL	(BIOCHEM) 10mg: 10: 32.00	بیو پرل
CIPRIL	(CIPLA) 10mg tabs: Rs 60.00	پرل
HIPRIL	(MICRO LABS) 5mg: 10: Rs.34.80	ہپرل
HYPACE	(TATA PHARMA) 10mg: 10: Rs.59.50	ہائی پیس
INRAS	(MERIND) 10mg: 10: Rs.66.87	ان راس
LINVAS	(CADILA) 10mg: 10: Rs.73.70	لن واس

LIPRIL	(LUPIN)	10mg 10. Rs 67.59	لیپرل
LISIR	(KRAMER)	10x10 Rs 507.83	لیسیر
LISICARD	(GUFIC)	10mg 10 Rs.55.60	لیسیکارڈ
LISSINACE	(ALKEM)	10mg 10: Rs.60.00	لیسیسینس
LISORIL	(IPCA)	10mg 10: Rs.71.75	لیسورل
LISTRIL	(TORRENT)	10mg: 10 Rs.72.90	لیسٹرل
LPL	(CONCEPT)	10mg. 10 Rs 54.00	ایل پی ایل
ODACE	(ALIDAC)	10mg: 10: Rs.30.70	اوڈیس

PERINDOPRIL

پیرن ڈوپرل

افعال و منافع: وجع القلب (انجائنا) بول کاٹل ہونا، دل بیٹھنا (C.C.F.) میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۲ ملی گرام پہلی خوراک دن میں ابار صبح کو دی جائے ۱ سے ۲ ہفتہ بعد ۴ ملی گرام تک
 دی جاسکتی ہے۔ دوا سے ۲-۳ دن قبل مدرات بول بند کر دینا چاہیے، بوڑھوں میں ۲ ملی گرام سے زائد نہ
 دیں، بچوں کو قطعاً نہ دیں۔

منفی عمل: C/1 حالت حمل، ایام رضاعت اور بچوں میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: کھانسی، بے چینی، کمزوری، تھکات، درد سر، تیند اور مزاج میں خلل، ذائقہ خراب نم
 معدہ پر درد، متلی ابکائی، درد شکم، جلد پر داغ پڑنا، خون میں یوریا کی زیادتی، پیشاب میں پروٹین کا خارج ہونا
 ، خون میں ہیموگلوبین، سرخ ذرات پلے ٹی لیٹ میں کمی ہونا۔

احتیاط: گردوں کے افعال پر نظر، بیہوشی کی دوا، مدر بول ادویہ، دوا شروع کرنے سے ۳ دن قبل بند
 کر دیں۔

دیگر ادویہ کے ساتھ رد عمل: پوٹاشیم کے مرکبات، مدرات بول، مرخی اعصاب ادویہ، ایپی
 پرائیم اور لیتھیم کے مرکبات کے ساتھ اثرات خراب رونما ہونے میں۔

تجارتی مرکبات

COVERSYL

(SERDIA)

کورسائل

Perindopril (as tertbutylamine) 4mg; tabs. 10: Rs.246.22

RAMIPRIL

رامی پرل

افعال و منافع: یہ حرکات قلب کو کنٹرول کرتی ہے ہر طرح کے ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ہائی بلڈ پریشر میں ۲.۵ ملی گرام دن میں اہار قلب کے فیل ہونے میں ۲.۵ ملی گرام پومیہ آہستہ آہستہ بڑھا کر ۱۰ ملی گرام تک دی جاسکتی ہے۔
منفی رد عمل: حالت حمل اور ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔
مضر اثرات: چکر آنا، کمزوری، حلی قے، درد سر، خفقان، تھکاوٹ، درد شکم اسہال حج Oedema، خشک کھانسی، عضلات اور سینہ میں درد ضعف ہاڈ پریشن، ذائقہ خراب۔
احتیاط: الرجی کی ہسٹری میں، جگر و گردوں کے امراض میں قلبی تناؤ، ہارٹ ایٹک لیو کو سائٹ کی کمی اور لو بلڈ پریشر میں اور بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: مدریول ادویہ، دیگر بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

CARDACE
RAMACE

(HOECHST) 5mg: 10: Rs. 70.10
(ASTRA-IDL) 5mg: 10: Rs. 70.00

کارڈیس
رامیس

CALCIUM CHANNEL

کیلیم چینل

BLOCKING AGENT

بلاکنگ ایجنٹ

AMLODIPINE BESILATE املوڈی پن بی سائی لیٹ

افعال و منافع: ہائی بلڈ پریشر کے لئے لائن نمبر کی دوا ہے۔
مقدار و ترکیب: ۲.۵ ملی گرام دن میں اہار زیادہ سے زیادہ ۱۰ ملی گرام بچوں کو نہیں دی جاسکتی۔
مضر اثرات: درد سر، حج، الجھن گھبراہٹ، حلی جلد پردھاریاں، چکر آنا۔

احتیاط: حمل ایام رضاعت اور جگر کے افعال کی خرابی میں۔

تجارتی مرکبات

AMCARD	(SYSTOPIC)	10mg: 10	Rs.136.00	ایم کارڈ
AMDEPIN	(CADILA)	10mg: 10:	Rs 125.90	ایم ڈی پن
AMLODAC	(ALIDAC)	10mg: 10:	Rs.39 50	الوڈیک
AMLOGARD	(PFIZER)	10mg: 10:	Rs.420.72	الوگارد
AMLOPIN	(LYKA)	10mg: 10:	Rs.120.00	ایم لوپن
AMPREZ-5/10	(CROSLANDS)	10mg: 6:	Rs.70.00	ایم پریز ۱۰/۵
ANGIGAURD	(SWIFT)	10mg: 10x10:	Rs.1011 00	این جی گارڈ
TAMLOD	(TATA PHARMA)	20mg: 10	Rs	ٹام لوڈ

NIMODIPINE

نموڈی پن

افعال و منافع: عروق کے تشنج، دماغی جمل میں جریان خون، دماغی عروق پھولنا (انورسما) یا شق ہو جانے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶۰ ملی گرام ہر ۴ گھنٹہ بعد ۲۱ دن کھلائیں۔

منفی افعال: C/1 حالت حمل اور ایام رضاعت میں ضرر رساں ہے۔

مضر اثرات: چکر آنا، لو بلڈ پریشر، درد سر، چہرے پر سرخی، جسم میں سویاں سی چھنا، متلی، صبح (اوڈیما)، کھانسی، آواز کے ساتھ سانس آنا، پیپھڑوں میں درد ہونا۔

احتیاط: جگر کے فعل کی خرابی میں، عروق قلبیہ کی تنگی اور رکاوٹ میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

MODIPIN	(ZELTA (CADILA)	30mg: caps: 30:	Rs.151.80	موڈی پن
NIMODIP	(USV)	30mg: tabs: 10:	Rs.59.91	نموڈپ
NIMOTIDE	(TORRENT)	30mg: caps: 6:	Rs.32.90	نموٹائیڈ
VASOTOP	(PROTEC)	30mg tabs: 10:	Rs 59.09	واسوٹوپ
VASOTOP INFUSION	(PROTEC)	50ml:	Rs.105.00	واسوٹوپ بوجھل

FELODIPIN

فیلوڈیپن

افعال و منافع: ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: پہلی خوراک ۵ ملی گرام پھر ۵ سے ۱۰ ملی گرام ۱۰ سے ۱۵ سال تک ہے۔

منفی افعال: حالت حمل اور ایام رضاعت میں دینا نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: ٹخنوں کا متورم ہونا، چکر، الجھن، گھبراہٹ، اور سر درد، غلغلہ، دل کی دھڑکن، پھولنا۔

احتیاط: خرابی جگر اور عروق قلبیہ کی شکل میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: سی می ٹی ڈین، فین ٹائن، کارہمازی پائن، فینو ہار پی لون کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

FELOGARD-ER

(CIPLA) 10mg, 10, Rs.33.00

فیلو گارڈ ای آر

PLENDIL

(ASTRA-IDL) 10mg, 10, Rs 69.00

پلین ڈیل

RENEDIL

(HOECHST) 10mg, 10, Rs 69.00

رینی ڈیل

سنٹرل ایڈری نرجک ان ہی بی ٹر

CENTRAL ADRENERGIC INHIBITORS

اس گروپ میں دو دوائیں شامل ہیں جو غدد کلاہ کردہ کے افراز کو روک کر بلڈ پریشر پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

CLONIDINE HCL

کلونی ڈین ہائیڈرو کلورائیڈ

افعال و منافع: یہ پلازما میں پائے جانے والے رے نین ملائے کو کم کرتی ہے یہ مادہ بلڈ پریشر کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہر طرح کے ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۰.۰۵ سے ۱.۰ ملی گرام دن میں ۳ بار مقدار خوراک آہستہ آہستہ بڑھاتا چاہیے۔
منفی افعال: عروق قلبیہ میں ٹھگی، مایو کارڈیل انفارکشن، وجع القلب، دماغی امراض، کردے کے

مرمن امراض، نقرس، جگر کی حاد تکالیف میں دینا مضر ہے۔
 مضر اثرات: منہ خشک، پیاس، نشہ کی کیفیت، غنودگی محسوس ہوتی ہے۔
 احتیاط: دوا ایک دم بند نہ کریں ورنہ بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، حالت حمل، ایام رضاعت و ڈپریشن میں احتیاط لازم ہے۔
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: اس کے ساتھ دوسری بلڈ پریشر کم کرنے والی دوائیں دینا مناسب نہیں۔

تجارتی مرکبات

ARKAMIN	(UNICHEM)	100mg tabs: 10: Rs.4.80	ارکامین
ARKAMIN-H	(UNICHEM)		ارکامین ایچ
100mg, chlorthiazide 20mg: tabs: 10: Rs.5.43			
CATAPRES	(GERMAN REMEDIES)	150mg. 10: Rs.3.64	کتاپریس
CATAPRES DIU	(GERMAN REMEDIES)		کتاپریس ڈیو
Clonidine hcl 0.1mg chlorthalidone 15mg: tabs: 10: Rs.7.73			
CLOTHALTON	(S.G.PHARMA)		کلو تھالٹن
Clonidine hcl 100mg, chlorthalidone 15mg: tabs: 10: Rs.3.45			

DOBUTAMINE HCL ڈیوٹامین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: شدید وجع القلب، دل کا فیل ہونا، قلبی صدمہ میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۲.۵ تا ۱۰ ملگرام سے ۱۰۰ ملگرام تک فی کلو/ فی منٹ کے حساب سے دی جاتی ہے۔
 متقی افعال: حساس مریضوں میں استعمال نہ کرائیں۔
 مضر اثرات: قلبی حرکات میں اضافہ، بلڈ پریشر اور بطنی اخراج میں اضافہ۔
 احتیاط: دوران علاج قلب کی حرکات و ضربات بلڈ پریشر اور اخراج بول پر نظر رکھنی چاہیے حاملہ اور بچوں کو دینا منع ہے۔

تجارتی مرکبات

DOBUCIN	(TROIKAA)	5x5ml amps: Rs.285.10	ڈیو بسین
---------	-----------	-----------------------	----------

DOBURAN INJ. (SHREE GANESH) 5ml amp: Rs.335.00 ڈیوران
 DOBUTREX (EL LILY RANBAXY) vial: Rs.388.00 ڈیوٹریکس

METHYL DOPA

میٹھائل ڈوپا

افعال و منافع: ہائی بلڈ پریشر کی اہم دوا ہے۔ شدید درمیانی درجے کا اور نہ ٹھیک ہونے والے بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار مقدار خوراک میں کی بیشی مرض کے حساب سے ۵۰۰ سے ۲ گرام تک دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: جگر کے حاد امراض میں، یرقان کلاہ گردہ میں خرابی یا ٹیومر میں استعمال سے خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

مضر اثرات: نشہ، درد سر، ضعف، نفاہت، گھبراہٹ، منہ خشک، ہاضمہ خراب، یرقان، خون کی کمی، کومب شٹ کا نتیجہ مثبت ہو سکتا ہے۔

احتیاط: حمل میں ورم میں اور شٹ غیر طبعی میں اور خون کی کمی میں احتیاط برتنا چاہیے۔
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: نرائی سائی تک اور دیگر بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ، راولفیا، اور ہائیڈرالازین کے مرکبات کے ساتھ نتیجہ خراب برآمد ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

ALPHADOPA	(MERIND) 250mg tabs 10, Rs.30.48	الفا ڈوپا
DOPAGYT	(THEMIS CHEMICALS) 10: Rs.15.29	ڈوپا گٹ
DOPAMET	(STANGEN) 10 tabs: Rs.13.00	ڈوپا میٹ
EMDOPA	(IDPL) 10: Rs.30.49	ایم ڈوپا
MELDOPA	(IDPL) 10, Rs.30.28	میل ڈوپا
SEMBRINA 250	(BOEHRINGER) 10x10: Rs 241.39	سیم برینا ۲۵۰

Once a day

Nicardia® Nicardia® 

RETARD 10 mg/20mg
 Nifedipine Sustained Release Tablets

RETARD 30
 Nifedipine

EXTENDED
 RELEASE
 TABLETS

پیری فیئرل ایڈری نرجک ان ہی بی ٹر

PERIPHERAL ADRENERGIC INHIBITOR

اس گروپ میں وہ ادویہ شامل ہیں جو غده کلاہ گردہ کے بیرونی حصہ کے افراز میں کمی کر کے بلڈ پریشر پر اثر انداز ہوتی ہے۔

RESERPINE

ری سرپین

افعال و منافع: ہر طرح کے بلڈ پریشر میں مفید ہے۔ حالت حمل میں ہونے والے قسم الدم Toxemia میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۰.۲۵ سے ۰.۵ ملی گرام روزانہ ضرورت پر ۵.۵ ملی گرام تک دی جاسکتی ہے۔ شدید ضرورت پر اسے ۲ ملی گرام عضلاتی انجکشن لگانا چاہیے۔

منفی افعال: پارکن ڈیزیز، ڈپریشن میں غده درقہ گردوں میں خرابی مرگی، گردہ یا کلاہ گردہ کا نیومرز خم معدہ اور زخم قولون میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: ناک بند ہونا، نفاہت، زخم معدہ جلد پر داغ پڑنا، اسہال، لو بلڈ پریشر سانس میں تنگی ورم سوج Odema، چہرہ سرخ ہو سکتا ہے۔

احتیاط: زخم معدہ کے مریضوں، ورم معدہ، مرارہ کی پتھری، شرائیں کی سختی سانس کی تنگی، قلبی حرکات کی بے ترتیبی، دوسرے کھانسی حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈیجیٹل ایس بیہوش کرنے والی ادویہ اور دیگر بلڈ پریشر کم کرنے والی دواؤں کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں۔

تجارتی مرکبات

ADELPHANE

(HIND. CIBA GEIGY) 10:Rs.1.22

ADELPHANE-ESIDREX

(HIND. CIBA GEIGY)

ایڈلفین
ایڈلفین ایسی ڈریکس

10 tabs: Rs.32 09

GENOPHANE
SARPLAZINO

(GENO)
(GENO)

10: Rs. 1.50
10: Rs. 1.71

جینوفین
سرپلازینو

DIURETIC

ڈایورٹک (پیشاب آور ادویہ)

AMILORIDE

ایمی لورائیڈ

افعال و منافع: جگر کی خرابی کے سبب درم آنا، استقاء Dropsy، ضعف قلب کے سبب ہونے والا استقاء اور ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: قلبی استقاء میں ۵ سے ۱۰ ملی گرام دن میں اہار۔ ۲۰ ملی گرام تک دے سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر میں ۵ سے ۱۰ ملی گرام دن میں اہار استقاء کھدی میں ۵ ملی گرام دن میں اہار۔ ۲۰ گرام سے زیادہ نہیں دینا چاہیے۔

منفی افعال: خون میں پوٹاشیم کی زیادتی، پوٹاشیم والی غذا یا دوا کے استعمال جگر اور گردوں کی تکالیف میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: بھوک کی کمی، متلی تے، پیٹ میں بھاری پن، معدہ میں غراش جلن، ہاتھ پیر اینٹھنا، قبض اسہال جلد پر داغ پڑنا، لو بلڈ پریشر، پوٹاشیم میں اضافہ، تیزابیت، خون میں یوریا، نائٹریو جن کی زیادتی۔

احتیاط: ذیابیطس کے مریضوں میں، گردوں کے افعال پر نگاہ رکھیں، حمل کی حالت میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

AMIFRU-40

(ELDER)

ایمی فرو

Amiloride Hcl 5mg Frusemide 40mg 10: Rs. 10.85

AMIMIDE

(BIDDLE SAWYER) 10: Rs. 11.60

ایمی مائیڈ

BETA BIDIURET

(BIDDLE SAWYER) 10: Rs. 13.85

بتا بڈوریٹ

BIDIURET

(BIDDLE SAWYER) 10: Rs. 12.09

بڈوریٹ

BIDIURET-L

(BIDDLE SAWYER) 10: Rs. 7.50

بڈوریٹ ایل

DIBETA

(TORRENT) caps: 10: Rs. 14.07

ڈائی بیٹا

FRUMIL

(GENO) 5mg: tabs: 10: Rs. 6.80

فرومل

HIPRES-D
LASIRIDE

(PROTEC) 10 caps Rs 12 07
(HOECHST) 10 Rs 7 47

ہائپر س ڈی
لاسی رائیڈ

CHLORITHALIDONE

کلوری تھالی ڈون

افعال و منافع: نمبر ۱ کی ہائی بلڈ پریشر کم کرنے اور پیشاب آور دوا ہے، ورم، خون میں زہریلے اثرات حمل کا تسمم الدم، Toxaemia، قبل حیض تناؤ اور درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ ملی گرام یومیہ شدید حالت میں ۱۰۰ ملی گرام یومیہ دے سکتے ہیں۔ مرض پر قابو رکھنے کے لئے ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام ہفتہ میں ۳ بار

منفی افعال: دماغی الجھن یا ڈپریشن میں، زخم معده و آنتوں کی حالت میں، شدید کمزوری میں پتہ کی پتھری، مرگی اور دمہ میں اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: منہ خشک ہونا، چکر آنا۔

احتیاط: دوا ایک دم بند نہ کریں، ورنہ بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ حالت حمل اور ایام رضاعت میں ڈپریشن اور گھبراہٹ اور امراض قلب میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ٹرائکی سائی کلک، القابلا کر، بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ ڈیجی ٹیلیس اور کوئی نی ڈین اور دافع درد ورم ادویہ NSAIDS لیجیم انسولین اور خوردنی دافع ذیابیطیس ادویہ کے ساتھ خراب اثر ہو سکتا ہے۔

تجارتی مرکبات

ATECARD-D

(DABUR)

ایٹی کارڈ۔ ڈی

Chlorthalidone 12.5mg, atenolol 50mg tabs: 14: 25.00

CATAPRES DIU

(GERMAN REMEDIES)

کیتاپریس

Clonidine 0.1mg Chlorthalidone 15mg tabs 10: Rs.7.73

CLOTHALTON

(S G PMCLS)

کلوتھالٹن

Clonidine Hcl 100mcg Chlorthalidone 15mg tabs 10: Rs.3.45

HYTHALTON

(S G PMCLS)

ہائی تھالٹن

Chlorthalidone 100mg 10: Rs.25.47

TENOCLOR

(ICI)

ٹینوکلور

Atenolol 100mg, chlorthalidone 25mg; tabs: 14. Rs.48.85

TENORIC

(IPCA)

ٹینورک

Atenolol 100mg Chlorthalidone 25mg tabs 10. Rs.23 00

FRUSEMIDE**فروسی مائیڈ**

افعال و منافع: پھیپھڑوں کے ورم قلبی تناؤ، وجع القلب، گردوں کے سبب ہونے والے ورم اور ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۸۰ ملی گرام ایک خوراک دن میں اہار یا ایک دن کے وقفہ سے کھلائیں بچوں کو ۲ سے ۴ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے۔

متشی افعال: سلفا گروپ سے حساس مریضوں میں خون کی سپلائی کی کمی میں، لو بلڈ پریشر میں پوٹاشیم کی کمی میں، ایڈسین ڈیزیز میں خراب اثرات رونما ہوتے ہیں۔

مضر اثرات: فتور ہضم، بے چینی جلد پر داغ، نقرس، خون میں عدم توازن ہو جاتا ہے۔

احتیاط: حالت حمل، ایام رضاعت، نقرس، جگر اور گردوں کی خرابی ذیابیطیس پیشاب کی جلن میں احتیاط، تیس، علاج کے دوران اور بعد پوٹاشیم کی اضافی مقدار دیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: لیٹھیم، حرکات قلب کو کنٹرول کرنے والی ادویہ، سیفالوسپورین، ایسی ٹوزولامائیڈ کارٹی سون، انسولین دافع درد ورم ادویہ NSAID کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات**AMIFRU-40**

(ELDER)

ایم ایف رو ۴۰

Frusemide 40mg amiloride hcl 5mg; tabs 10: Rs.10/85

AQUAMIDE

(SUNPHARMA)

ایکوامائیڈ

Frusemide 20mg spironolactone 50mg tabs 10x10: Rs.220.00

FRUMIL

(GENO)

فرمیل

Frusemide 40mg, amiloride hcl 5mg; tabs: 10: Rs.8.73

FRUSELAC

(LUPIN)

فروسی لیک

Frusemide 20mg spironolactone 50mg tabs 10: Rs.30 40

FRUSENEX

(GENO)

فروسی ٹیکس

Frusemide 40mg and 100mg. tabs. 40mg. 10: Rs 2 30, 100mg. 10: Rs.6.60

LASILACTONE 50/100

(HOECHST)

لاسی لکٹون ۵۰/۱۰۰

Frusemide 20mg Spironolactone 50mg and 100mg tabs; 50mg tabs 10: Rs.31.27; 100mg : Rs. 53.94

LASIRIDE

(HOECHST)

لاسی رائیڈ

Frusemide 40mg Amiloride hcl 5mg. tabs. 10: Rs 7 47

LASIX

(HOECHST)

لاسکس ٹیبلٹ

Frusemide 40mg 25x10 tabs: Rs. 83 32

LASIX INJ

(HOECHST)

لاسکس انجکشن

Frusemide 20mg/2ml ; Rs.2.46

SALINEX

(IDPL) Frusemide 40mg 10: Rs 2 70 سالی ٹیکس

SPIROMIDE

(SEARLE)

اسپائرڈمائید

Frusemide 20mg Spironolactone 50mg 10 tabs: Rs 28 56

HYDROCHLOR THIAZIDE ہائیڈروکلور تھیازائیڈ

افعال و خواص: یہ گردوں سے پانی اور نمکیات کے اخراج میں تیزی پیدا کرتی ہے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے دیگر دفاعی بلڈ پریشر دواؤں کے ساتھ موثر رہتی ہے قلب اور گردوں کے سبب ہونے والے ورم قبل از حیض تناؤ و درد، چشم میں پانی جمع ہونا، دودھ کم کرنے حالت حمل میں، تسمم الدم Toxemia میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ سے ۷۵ ملی گرام دن میں اخور اکسیا کئی خورا کوں میں تقسیم کر کے دو صبح کو ناشتہ کے بعد یا دوپہر کو کھانے کے بعد دینا چاہیے اوسط خوراک ۲۰۵ ملی گرام سے ۲۵ ملی گرام یومیہ ہائی بلڈ پریشر کی دواؤں کے ساتھ مقدار خوراک کم کر دیں۔

متنی افعال: ورم جگر کے سبب ہونے والا کوما، پیشاب، بالکل بند ہونا اور گردوں کے ٹیل ہونے میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: خون میں نمکیات کی کمی، جلد پر دماغ پڑنا، بصارت میں فرق، نقرس، خون کا توازن بگڑنا

ابھمن ہے چینی۔
دواؤں کے ساتھ رو عمل: لیتھیم، ڈیجی ٹیلز کے ساتھ استعمال سے خراب رو عمل ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

ADELPHANE-ESIDREX (HIND. CIBA GEIGY) ایسی ڈرکیس
Reserpine 0.1mg Dihydrallazine sulph 10mg Hydrochlorthiazide 10mg
tabs 10: Rs.1.50

BETA BIDIURET (BIDDLE SAWYER) بیڈوریٹ
Atenolol 50mg amiloride hcl 2.5mg Hydrochlorthiazide 25mg tabs:
10: Rs.13.85

BIDURET (BIDDLE SAWYER) بیڈوریٹ
Hydrochlorothiazide 50mg amiloride hcl 5mg tabs 10: Rs.12.09

CAPTOTRIL-H (LUPIN) کیپ ٹوٹرل
Captopril 25mg Hydrochlorthiazide 25mg tabs 10: Rs.36.23

CIPLAR-H (CIPLA) سپار-ایچ
Propranolol Hcl 40mg Hydrochlorthiazide 25mg tabs 10: Rs.4.62

DIBETA (TORRENT) ڈی بیٹا
Hydrochlorthiazide 25mg, atenolol 50mg, amiloride 2.5mg: caps: 10
Rs.14.07

ESIDREX (HIND. CIBA GEIGY) ایسی ڈرکیس
Hydrochlorthiazide 50mg Tabs 10x10: Rs.6.12

HIPRES-D (PROTEC) ہائی پریس ڈی
Atenolol 50mg Hydrochlorthiazide 25mg Amiloride Hcl 25mg caps
10: rs.12.07

METOZIDE (TORRENT) میٹوزائیڈ
Metoprolol 100mg Hydrochlorthiazide 12mg tabs 10: Rs.15.00

NORMACE-D (UNISEARCH) نار میس
Enalapril maleate 10mg, hydrochlorthiazide 25mg. tabs: 10: Rs 29 00

SELOPRES (ASTRA-IDL) سیلو پریس
Metoprolol 100mg Hydrochlorthiazide 12.5mg tabs 10: Rs.18.51

TRIAMTERENE

ٹرائیم ٹیرین

افعال و منافع: پیشاب زیادہ مقدار میں خارج کرتی ہے، سوڈیم پوٹاشیم کے انجذاب کو روکتی ہے گردوں کی عروق پر اثر انداز ہو کر پیشاب کے اخراج میں زیادتی کرتی ہے۔ معمولی اور درمیانی ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔ دوسری ادویہ کے ساتھ قلب پر دباؤ کو کم کرتی ہے ورم کو دور کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ورم Oedema میں ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام پوٹاشیم کی خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔ منفی افعال: پوٹاشیم کی زیادتی میں، گردوں کے فیل ہونے میں، دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی، ابکائی، اسہال، پیروں کا اینٹھنا، جلد کا پھٹنا، دروسر، منہ خشک خون کا توازن بگڑنا۔

احتیاط: جگر اور گردوں کی کمزوری میں جسم میں تیزابیت کی زیادتی میں نقرس Gout، یہ رضاعت اور حمل میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: پوٹاشیم کے مرکبات، لیتھیم، ڈیجی ٹلیس، اینڈو میٹھاسین کے ساتھ اس کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔

XIPAMIDE

زیپامائیڈ

افعال و خواص: یہ دوا سیدھی گردوں کی باریک نالیوں پر اثر انداز ہو کر پیشاب کے اخراج میں اضافہ کرتی ہے معمولی اور درمیانی ہائی بلڈ پریشر، قلب و جگر گردوں کی خرابی سے ہونے والے ورم استقاء Dropsy میں اور ایام حمل میں ہونے والا ورم، وجع المغاضلی ورم میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہائی بلڈ پریشر میں ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام ایک خوراک صرف صبح کو دوسری دواؤں کے ساتھ ۲۰ ملی گرام سے زائد نہ دیں۔ مریض کے حالات کے مطابق مقدار خوراک کا تعین کریں۔

منفی افعال: جسم میں پانی اور نمکیات Electrolyte کی کمی میں، گردوں کی شدید خرابی، جگر کی خرابی کے سبب ہونے والی غنودگی Coma میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: ہاضمہ کی خرابیاں، چکر آنا۔

احتیاط: پوٹاشیم کی مقدار بڑھا دینا چاہیے، حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں، نقرس جگر اور گردوں کی خرابی میں

ذیابیطیس، غدہ در قیہ بڑھ جانے اور ایام رضاعت میں احتیاط رکھیں۔

تجارتی مرکبات

BETA-XIPAMID

(GERMAN REMEDIES)

بٹازہ پائلڈ

Xipamid 10mg, propranolol hcl 40mg: tabs: 10: Rs.14.86

XIPAMID

(GERMAN REMEDIES)

زیہ پائلڈ

Xipamid 20mg: tabs: 10: Rs.23.42

CLOPAMIDE

کلوپامائیڈ

افعال و منافع: یہ دوا گردوں کے افعال پر اثر انداز ہو کر پیشاب کے اخراج کو تیز کر دیتی ہے معمولی اور درمیانی درجے کے ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔ قلب و جگر گردوں کی کمزوری کے سبب ہونے والے ورم Odema میں مفید ہے دافع درد ورم دواؤں کے سبب ہونے والے ورم میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہائی بلڈ پریشر میں ۵ سے ۱۰ ملی گرام صبح کو دی جائے ورم میں ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام۔
منفی افعال: گردوں کے ورم، جگر اور گردوں کا فیل ہونا پوٹاشیم کی شدید کمی سلفا گروپ سے حساس مریضوں میں مرض ایڈیسن اور حمل کی حالت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: متلی ابکائی بے چینی، الجھن، منہ خشک، درد سر، تشنج عضلات چکر آنا الرجی، روشنی سے نفرت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: زیادہ مقدار میں اور طویل مدت تک اور ذیابیطیس میں احتیاط برتنا چاہیے۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: لیتھیم، کارٹی سون کے مرکبات دافع درد ورم ادویہ NSAID کے ساتھ دینا مناسب نہیں۔

تجارتی مرکبات

BRINALDIX

(SANDOZ)

بری نال ڈکس

Clopamide 20mg: tabs 5x20 Rs.70.25

BRINERDIN

(SANDOZ)

بری نرڈین

Reserpine 0.1mg Clopamide 5mg Dihydroaegocristine mestilate
0.5mg tabs 10: Rs.32.09

INDAPAMIDE HEMIHYDRATE انڈاپامائیڈ ہیمی ہائیڈریٹ

افعال و منافع: یہ معمولی درجے کی پیشاب آور دوا ہے، معمولی اور درمیانی ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۲.۵ ملی گرام دن میں ایک بار، ضرورت کے مطابق مقدار کم و بیش کی جاسکتی ہے۔
 منفی افعال: حمل، بچوں میں، جگر اور گردوں کے شدید امراض میں استعمال مناسب نہیں۔
 مضر اثرات: الرجی، جلد پر داغ، ورم فم معدہ، بے چینی اور عضلات میں تشنج ہو سکتا ہے۔
 احتیاط: دیگر پیشاب آور ادویہ کے ساتھ حالت حمل اور ایام رضاعت میں اس کا استعمال مناسب نہیں۔

تجارتی مرکبات

ATELOL-D	(THEMIS PHARMA)	ایٹیلول
Indapamide 2.5mg Atenolol 50mg tabs 14tabs	Rs.25.85	
LORVAS	(TORRENT)	لورواس
Indapamide Hemihydrate 2.5mg tabs 10 tabs	Rs.20.90	

قلبی حرکات کو کنٹرول کرنے والے مرکبات

INOTROPIC DRUGS

DIGOXIN

ڈیجاکسن

افعال و منافع: یہ دوا قلب کے انتظامی قوت میں اضافہ کرتی ہے حرکات قلب کی تیز حرکات اور تناؤ کو اعتدال پر لاتی ہے۔ وجع القلب کنبھٹو کارڈیک فیلر C.C.F. میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: پہلے ۲۴ سے ۳۶ گھنٹہ تک ۱ ملی گرام سے ۰.۵ ملی گرام قلبی حرکات کنٹرول ہونے پر ۰.۵ ملی گرام سے ۰.۵ ملی گرام تک دی جائے مرض کے حالات اور بچوں کو عمر کے مطابق مقدار خوراک کا تعین کرنا چاہیے۔
 منفی افعال: اذنی اور بطنی رکاوٹ میں، ناک بند ہونے، سانس کی تنگی میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: بھوک لی لی، تھکی بھارت میں ناقابل عمل ہے۔

احتیاط: دوران علاج مریض کو گہرائی میں رکھیں، پیپروہوں اور قلب کی دواؤں میں احتیاط، جسم میں پانی کے عدم توازن، جگر اور گردوں کی کمزوری، ضعفوں، خفہ رقیق اور اپنی میں احتیاط، دواؤں کے ساتھ رد عمل: کیشیم کے مرکبات، پوٹاشیہ خارج کرنے والے مرکبات وغیرہ، لیٹھیم، دافع تیزابیت، اور انٹی ہائیوٹک کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں۔

تجارتی مرکبات

CARDIONIN TABS	(SANDOZ)	کارڈیو آکسن
Digoxin I P 0.25mg Tabs 10x10	Rs 19.48	
DIGOX	(CADILA)	ڈیجاکس
Digoxin 0.25mg 10	Rs 1.95	
DIGOXIN PEAD. ELIXIR	(BURROUGGS WELLCOME)	ڈیجاکسن بچوں کا شربت
Digoxin 0.5mg/ml liquid 30ml	Rs 18.27	
LANOXIN INJ	(BURROUGHS WELLCOME)	لینوکسن انجکشن
Digoxin 0.5mg/2ml inj 2ml.	Rs 5.31	

DOBUTAMINE HCL ڈوبوٹامین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: یہ دوا دل کے کے فیل ہونے، شدید وجع القلب، دل کے آپریشن، صدمہ قلب میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲.۵ سے ۱۰ ماگروگرام / فی کلوگرام / فی منٹ کے حساب سے دی جائے زیادہ سے زیادہ ۴۰ ماگروگرام / فی کلوگرام کے حساب سے دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: حساسیت کے مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: حرکات قلب کو تیز کرتی اور بلڈ پریشر میں اضافہ کرتی ہے۔

احتیاط: حرکات قلب تیز اور بے ترتیب ہونے پر احتیاط برتیں دوا کے استعمال کے دوران نبض اور قلب کی حرکات پر نگاہ رکھیں حاملہ اور بچوں کو استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

DOBUCIN	(TROIKAA)	ڈوبوسین
Dobutamine hcl 50mg per ml inj. 5x5ml amps: 285.10		
DOBURAN INJ	(SHREE GANESH)	ڈبوران انجکشن
Dobutamine hcl 250mg per 5ml: 5ml amp: Rs.335.00		
DOBUTREX	(RANBAXY)	ڈبوٹریکس

DOPAMINE

ڈوپامین

افعال و منافع: یہ دو گردوں اور شکم کی عروق کو کشادہ کر کے اخراج بول میں اضافہ کرتی ہے۔ قلب سے اخراج خون میں اضافہ کرتی ہے۔ بلڈ پریشر اور روح نفسانی کو تحریک پہنچاتی ہے۔ شدید قلبی دباؤ، گردوں کے فیل ہونے، صدمہ، انفکشن، صدمہ قلب اور آپریشن کے بعد ہونے والے ضعف میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۰۰ ملی گرام بہت آہستہ بوتل میں ڈال کر چڑھائیں۔

منفی افعال: قلب کے بائیں بطن کے والو میں خرابی، کلاہ گردہ کے ٹیو مر میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: معمولی متلی اور قے کی شکایت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: انفیوزن کے دوران قلبی حرکات پر نگاہ رکھیں۔

تجارتی مرکبات

DOPAMINE HCL INJ	(NEON)	ڈوپامین ہائیڈروکلورائیڈ انجکشن
5x5ml amps: Rs.100		
DOPINGA INJ	(INGA) 5ml: Rs.14.15	ڈوپنگا انجکشن



عروق کو کشادہ کرنے والی ادویہ

PERIPHERAL VASODILATOR

CINNA RIZINE

سی نارازائن

افعال و منافع: یہ دوا چکر آنے کان بجنے، متلی ابکائی کے مراکز پر مخدر اثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ، سفری تے، موشن سکس، منرڈیزیز میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہالٹوں کو ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو نصف مقدار، سفری تے اور چکر آنے میں ۲۵ ملی گرام سفر شروع کرنے سے قبل، کھلائیں۔

متقی افعال: الرجی اور حمل میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: جلد پر الرجی کا اثر، بے چینی ضعیفوں میں چکر آنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: لوہڈ پریشر میں، دوا کے استعمال کے دوران ڈرائیوری اور مشنری چلانے سے احتیاط رکھیں۔

تجارتی مرکبات

CINTIGO	(WALLACE)	25mg: 10: Rs.9.90	سین ٹائی گو
CINZAN	(FDC)	25mg: 10: Rs 11.00	سین زان
DIZIRON	(GLENMARK)	25mg: 10: Rs 9 19	ڈائی زی ران
STUGERON	(ETHNOR)	25mg: 25: Rs.37.50	اسٹکی ران
STUGERON FORTE	(ETHNOR)	75mg: 20: Rs 66 00	اسٹکی ران فورٹ
VERTIGON	(GENO)	25mg: 10: Rs.9.42	ورٹائی گان

CYCLANDELATE

سائی کلان ڈی لیٹ

افعال و منافع: دماغی اور عام جسمانی عروق کی خرابی تنگی کو دور کرتی ہے ساختوں میں کولیسٹرول جمع ہونے کو روکتی ہے۔ ساختوں میں آکسیجن پہنچانے میں معاون ہوتی ہے۔ دماغی سیل کی کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے رائی ناڈ اور برگرڈیزیز میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار
 منفی افعال: دماغی حادثات، چوٹ، گلاکوما، مایو کارڈیل انفارکشن میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
 مضر اثرات: نظام ہضم میں خلل، چہرہ سرخ ہونا، جلد کا سرخ ہونا۔

تجارتی مرکبات

CLENDAL	(SUN PHARMA)	400mg: 10x10: Rs 116.00	کلین ڈال
CYCLASSYN	(CIPLA)	10: Rs.20.00	سائیکلا سین
CYCLOSPASMOL	(ELDER)	10: Rs.30.50.	سائی کلو اسپامول

ڈائی ہائیڈرالزین سلفیٹ DIHYDRALZIN SULPHATE

افعال و منافع: یہ دوا خون کی رگوں کی سختی کو کم کرتی ہے عروق کو کشادہ کرتی ہے۔ دماغی اور گردوں کی عروق میں خون کی رسد میں اضافہ کرتی ہے۔ گردوں کی خرابی کے سبب ہونے والے ہائی بلڈ پریشر حمل کے ایام میں ہونے والے ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

منفی افعال: وجع القلب، ورم غلاف القلب اور حمل کے نصف اول میں دینا مناسب نہیں۔
 مضر اثرات: وجع القلب (انجائنا)، لو بلڈ پریشر، چہرہ سرخ، درد سر، عضلات و عظام میں درد پلازما کرے ٹی نین میں اضافہ، پیشاب میں خون آنا، گردوں کا فیل ہونا، پیشاب رکنا ورم عصب خون کا توازن بگڑنا۔

احتیاط: ہیپہرڈوں اور دماغی امراض میں گردوں کے کمزور اور فیل ہونے میں جگر کی خرابی اور ایام رضاعت میں اور دوا ایک دم بند کرنے میں احتیاط برتیں۔
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع ڈپریشن اور ٹراکولائزر کے ساتھ، بیہوش کرنے والی و دافع بلڈ پریشر ادویہ، ڈایازو کسائیڈ کے ہمراہ استعمال مضر ہے۔

تجارتی مرکب

NEPRESOL	(HIND. CIBA-GEIGY)		نہری سول
25mg: tabs: 10x10: Rs.8.03			

HYDRALLAZINE

ہائیڈروالزائن

افعال و منافع: یہ دوا شرائین کی سختی کو دور کرتی ہے غیر اختیاری عضلات کو ڈھیلا کرتی ہے، قلبی تناؤ اور عروق کی تنگی، ورم گردہ حالت حمل میں ہائی بلڈ پریشر کو دور کرتی ہے دوسری دواؤں کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر دور کرنے میں معاون ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ ملی گرام دن میں ۲ بار ۲ سے ۴ دن تک ضرورت کے مطابق مقدار خوراک رفتہ رفتہ ۵۰ ملی گرام تک دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: وجع المفاصل کے سبب ہونے والے قلبی عوارض، پیچیدوں کی شرائین میں رکاوٹ، دلی اثرات اور الرجک مریضوں میں اس دوا کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: درد سر، خفقان، بھوک کم، متلی قے چکر آنا، پسینہ کی کثرت، ناک بند جلد سرخ آنسو کی کثرت آنکھیں دکھنا، جلد سن ورم تھج Odema، بخار، الرجی غذائی نالی میں جریان خون اور اینیسیا ہو سکتا ہے۔

احتیاط: حمل میں خون کے غیر طبعی ہونے میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

CORBETAZINE

(SARABHAI)

کاربی نازائن

Hydrallazine 25mg, propranolol hcl 40mg tabs: 10: Rs.11.27

TRIPRES

(ASTRA-IDL)

ٹرائی پرس

Metoprolol 100mg Hydrochlorthiazide 12.5mg Hydrallazine 25mg tabs 10: Rs.21.10

ISOXSUPRINE HCL آکسوکس سپرائن ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: دماغ اور اعضاء جوارح کی ساختوں اور سیل میں خون کی رسد میں اضافہ کرتی اور آکسیجن کی زائد مقدار پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ دماغی شرائین کی تنگی اور سختی کو دور کرتی ہے آنکھوں میں تناؤ برگرڈیزیز، رائی ناڈیزیز، قبل از ولادت وجع کاذب اور اسقاط مندرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: دماغ میں خون کی کمی میں خوردنی طور سے ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ یا ۴ بار کھانے کے

بعد حالت بہتر ہونے پر مقدار آہستہ آہستہ کم کر کے ۱۰ ملی گرام دن میں ۲ بار دیں۔ انجکشن پہلی خوراک ۱۰ ملی گرام عضلاتی لگائیں حالت بہتر ہونے پر خوردنی دوا پر رکھیں وریڈی انجکشن سخت نگرانی میں ۰.۳ ملی گرام / فی منٹ کے حساب سے نارمل سیلان میں ملا کر دیا جائے، شدید ضرورت پر ۶۰ سے ۸۰ ملی گرام تک خوردنی یا عضلاتی دے سکتے ہیں۔

منفی عمل امراض میں: جریان خون کی حالت میں استعمال کرنا سخت نقصان دہ ہے۔
مضر اثرات: بلڈ پریشر کم کرتی ہے۔

تجارتی مرکبات

DUVADILAN	(DUPHAR) 10mg tabs	50 Rs. 15 87	ڈواڈی لان
DUVADILAN INJ	(DUPHAR)		ڈواڈی لان انجکشن
5mg/ml inj	6x2 ml amps	Rs. 12 95	
DUVADILAN RETARD	(DUPHAR)		ڈواڈی لان ریٹارڈ
40mg caps	10	Rs. 19.67	
SUPROX	(SWIFT) 10mg, 15x10	Rs. 82 50	سپروکس
SUPROX-SR	(SWIFT) 10 tabs	Rs. 22 00	سپروکس ایس آر
SUPROX INJ	(SWIFT) 5x2ml amp	Rs. 10 00	سپروکس انجکشن
UDILAN	(TROKAA) 10	Rs. 6.00	یوڈی لان ٹبلٹ
UDILAN INJ	(TROKAA) 5x2 ml amp	Rs. 13.00	یوڈی لان انجکشن

MINOXIDIL

میناکسی ڈل

افعال و منافع: یہ عروق کو کشادہ کرنے والی دوا ہے۔ زیر جلد بالوں کے خدد کو متحرک کر کے نئے بالوں کی پیدائش کرتی ہے۔ سھتہ گنج سر میں داخل پڑنا، بال گرنے میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱۳۰ ملی لٹر مقام ماؤف پر ۷-۸ بار پورے حصہ پر اسپرے کی جائے ۱۲ گھنٹہ بعد دوبارہ کی جائے۔

مضر اثرات: کبھی خراش، سرخی، کھجلی اور الرجی پیدا ہو سکتی ہے۔

احتیاط: دوا اسپرے کرنے سے قبل متاثرہ مقام کو چکنائی روغن یا اجزائے صاف اور خشک کر لینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

GROMANE	(ALIDAC)	50ml: Rs.150.00	مگرومین
HAIREX	(KOPRAN)	60ml: Rs.201.25	ہیریکس
HEBALD	(INTAS)	10ml: Rs.42.00	بی بالڈ
MINTOP	(STANGEN)	60ml: Rs.138.15	مین ٹاپ
MULTIGAIN	(TORRENT)	60ml: Rs.163.25	ملٹی گین

NYLIDRIN

نائی ڈرین

افعال و منافع: عروق اور ساختوں میں خون کا جتنا، خون رککنے کے سبب درد ورم، شرائین میں سختی خون کی رکاوٹ سے ہونے والے زخم، پیروں میں تشنج Leg Cramps پیروں کے سرد ہونے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: دوا کے ساتھ لٹریچر کے مطابق دیں۔

منفی افعال: پیسپیروں کی عروق میں شدید رکاوٹ شدید ورم میں دینا مضر ہے۔

احتیاط: غدہ درتہ کا بڑھنا، شدید وجع القلب، رک رک ہونے والے دل کے درد میں احتیاط برتنا لازم ہے۔

تجارتی مرکب

ARLIDIN TABS/INJ (USV) 5ml : Rs.5.18 ارلی ڈین مبلٹ رائیجشن

PENTOXI FYLINE

پن ٹوکسی فائی لین

افعال و منافع: شرائین کی سختی، قلب میں خون کی رسد کم پہونچنا دوران خون میں رکاوٹ ذیابیطس پیروں کے زخم مانغرا Gangrane آنکھ میں خون کی رسد کم پہونچنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۲-۳ بار کھانے کے بعد۔

منفی افعال: الریجک مریضوں میں، قلبی تناؤ، شدید جریان خون، آنکھ میں خون اترنا اور حمل میں اس کا استعمال خطرناک ہے۔

مضر اثرات: مہم کی خرابیاں، چکر آنا، چہرہ سرخ، متلی ابکائی، درد سر، وغیرہ ہو سکتا ہے۔

احتیاط: لوہڈ پریشر میں، گردوں کی خرابی اور عروقِ شہ کی رکاوٹ میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: مائع انجماد خون ادویہ، دافع ذیابیطس، دافع ہلڈ پریشر اور نائٹریٹ کے مرکبات کے ساتھ استعمال مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

ERYTAL-TR	(RECON)	10: Rs. 58.00	ادائی ٹال ٹی آر
FLEXITAL	(SUNPHARMA)	10: Rs. 58.86	فلے کسی ٹال
FLEXITAL INJ FOR INFUSION	(SUNPHARMA)	15ml amps: Rs. 11.09	فلے کسی ٹال انجکشن بوجھ والا
FLOWPENT INFUSION	(BOOTS)	15ml amp: Rs. 14.40	فلو پینٹ انفیوزن
FLOWPENT	(BOOTS)	tabs: 10mg: 10: Rs 59.84	فلو پینٹ
KINETAL-400	(PROTEC)	10: Rs. 58.00	کائی ٹی ٹال ۴۰۰
KINETAL - INJ	(PROTEC)	15ml: Rs. 14.17	کائی ٹی ٹال انجکشن
PENTOFYL	(PACE)	10: Rs. 5.90	پن ٹوفائل
RBFLEX	(TIDE)	10 tabs Rs. 53.30	آر بی فلکس
RBFLEX INJ	(TIDE)	15ml: Rs. 11.90	آر بی فلکس انجکشن
TRENTAL-400	(HOECHST)	10: Rs 59.84	ٹرین ٹال ۴۰۰
TRENTAL INFUSION	(HOECHST)	15ml: Rs. 14.40	ٹرین ٹال انفیوزن

زن تھی نول نیکوٹینیٹ XANTHINOL NICOTINATE

افعال و منافع: یہ دوا جسم کی عروقِ شہر یہ تک خون و آکسیجن پہنچانے، فاضل اور خراب مادوں کو خارج کرنے میں معاون ہے۔ دماغ میں خون کی سپلائی میں اضافہ کرتی ہے شریانیں کی سختی اور رکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ ذیابیطس، فالگریٹا، خون کی رکاوٹ سے پیدا ہونے والی تکالیف میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۰۰ ملی گرام عضلاتی یا دریدی بہت آہستہ آہستہ لگائیں زیادہ سے زیادہ ۹۰۰ ملی گرام یا خوردنی طور سے ۳۰۰ سے ۶۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

متقی افعال: شدید قلبی دہاو، وجع القلب، شدید جریان خون، قلب کے فعل کی خرابی میں دینا

خطرناک ہے۔

مضر اثرات: چہرہ سرخ چہرے اور گردن میں گرمی کی لہریں محسوس ہونا جو ۲۰-۱۰ منٹ میں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔

احتیاط: ہائی بلڈ پریشر اور زخم معده میں احتیاط برتیں ذیابیطس کے مریضوں میں شوگر چیک کراتے رہیں۔

تجارتی مرکبات

COMPLAMINA (GERMAN REMEDIES) 1x2ml: Rs.2.85

کمپلاینا انجکشن

COMPLAMINA TABS (GERMAN REMEDIES)

کمپلاینا ٹیبلٹ

150mg: tabs 10: Rs.3.45

COMPLAMINA RETARD (GERMAN REMEDIES)

کمپلاینا ریٹارڈ

500mg: tabs: 10: Rs.13.10

SULPHIN PYRAZONE

سلفن پائرازون

افعال و منافع: یہ دوا جوڑوں میں خرابی، افعال میں کمی کو درست کرتی ہے۔ پرانے نقرسی تھجڑ الفاصل شدید نقرس میں مفید ہے۔ رگوں میں خون جمنے، دماغی چوٹ قلبی دباؤ، وریڈوں میں خون جمنے، رکاوٹ اور ہارٹ فیل ہونے کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔

مقدار و ترکیب: خون جمنے Clot کی حالت میں ۶۰۰ سے ۸۰۰ ملی گرام روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے نقرس میں ۲۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام ۲ خوراکیوں میں تقسیم کر کے پھر ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار منفی افعال: زخم معده میں اور سیلیٹ کے مرکبات کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں۔

مضر اثرات: نظام ہضم میں خلل، زخم معده کا دوبارہ ہونا، ری ایکشن، پانی اور نمکیات کی کمی، خون کا غیر طبعی اور انیسیا ہو سکتا ہے۔

احتیاط: زخم معده کے مریضوں میں احتیاط برتیں، علاج کے دوران مریض کی نگرانی اور خون کی جانچ کراتے رہیں۔

TISSUE PLASMINOGEN ACTIVATOR ٹشو پلازمی نو جن ایکٹی ویٹر

افعال و منافع: یہ انجکشن پھیپھڑوں کی شریانیں میں خون جمنے Thrombosis میں مفید ہے، اچانک شدید وجع القلب (ہارٹ ایک) دل کے فیل ہونے یا یو کارڈیل انفارکشن میں خطرے کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام بوجھل میں ڈال کر آہستہ آہستہ ۳ گھنٹہ میں چڑھائیں۔
منفی افعال: جریان میں، لو بلڈ پریشر میں، سرکی چوٹ دماغی عروق کے شق ہونے میں جگر کے امراض، ورم بانقرا اس، ورم غلاف القلب جراثیمی، اور معدہ کے زخم میں اس کا استعمال خطرناک ہے۔
مضرات: جریان خون کا خطرہ، متلی تے ابکائی، جلد پر داغ پتی اچھلنا، کھجلی محسوس ہوتی ہے۔
احتیاط: آپریشن کے بعد چند روز تک، ذیابیطیس، جگر اور گردوں کی خرابی میں، حمل اور ایام رضاعت میں، اور عضلاتی انجکشن لگانے میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکب

ACTILYSE

(GERMAN REMEDIES)

اکٹی لائس

50 mg inj vial: Rs.17,745.13

مضیق عروق اور دافع درد شقیقہ ادویہ

VASO PRESSOR ANTI MIGRAION

ڈائی ہائیڈرو ارگوٹامین می سائی لیٹ

DIHYDRO ERGOTAMINE MESYLATE

افعال و منافع: آدھاسیس Migrain کے درد میں مفید ہے یہ عضلات، عظام اور عروق کے تشنج اور درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳ سے ۱۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی افعال: امراض قلب و ریہ میں۔ ہائی بلڈ پریشر ہائٹ ایک، انفکشن، صدمہ جگر اور گردوں کے امراض میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی تے، سن (خدر) اور وجع القلوب پیدا کر سکتی ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: بیٹا بلا کر دوائیں، اور ارائی تھرومائی سین کے مرکبات کے ساتھ دینا نقصان دہ ہے۔

تجارتی مرکبات

DHE (INGA) 1mg; tabs. 10. Rs 8 35 ڈی ایچ ای
DIHYDERGOT (SANDOZ) 1mg tabs 10; Rs 33.65 ڈی ہائیڈرگٹ

ERGOTAMINE TARTRATE ارگوٹامین ٹارٹریٹ

افعال و منافع: عروق کو سکیز کر تنگ کرنے والی دوا ہے، درد حقیقتہ سر کو جکڑنے والا درد سن یا س میں گرمی کی لہریں نکلنا تاؤ اور بے چینی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱ سے ۲ ملی گرام درد کے شروع میں آدھ گھنٹہ بعد اگر ضرورت ہو تو اسی گرام اور دی جائے ایک دن میں ۴ ملی گرام سے زیادہ نہیں دینا چاہیے۔

منفی افعال: ہائی بلڈ پریشر میں حمل کی حالت میں دینا خطرناک ہے۔

احتیاط: ایسیا، غدہ و رقیہ کا بڑھنا دوا کے دوران ڈرائیوری کرنا مشین چلانا خطرناک ہے۔

تجارتی مرکبات

ERGOPHEN (INGA) IP. 20mg; 10; tabs Rs 2.19 ارگو فین
MIGRANIL (INGA) 10; Rs. 12.95 مگرائل

FLUNARIZINE فلوٹاری زائن

افعال و منافع: آدمی سیسی شقیہ Migrain کے درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام دن میں ۱ بار ۵ دن تک پھر ۱۰ گرام دی جائے۔ ۴۰ کیلو گرام سے کم وزن والوں کو ۵ ملی گرام دی جائے۔

منفی افعال: پارکن سٹراڈیز میں دینا نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: نشہ کرتی ہے، جلد پر دھبے، درد سر، لمبہ معدہ پر درد، متلی، نیند نہ آنا، خشکی وزن میں اضافہ۔

احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

FLUNARIN
NOMIGRAIN
SIBELIUM

(FDC) 10: Rs.22.20
(TORRENT) 10mg. 10: Rs 20 90
(ETHNOR) 10 tabs Rs 39 70

فلونارین
نومی گرین
سائی بی لیم

MEPHENTERMINE

مے فن ٹرمائن

افعال و منافع: یہ لوہڈ پریشر میں مفید ہے۔ قلب کو تحریک دینا چاہتی ہے ڈپریشن کو دور کرتی ہے۔
مقدار و ترکیب: لوہڈ پریشر میں ۲۰ ملی گرام دن میں ۲ بار دی جائے۔ ڈپریشن میں ۱۰ ملی گرام دن میں ۱ سے ۲ بار دی جائے۔

احتیاط: شام ۴ بجے کے بعد دوا نہ دیں۔ نیند کی حالت میں نہ چلائیں۔

تجارتی مرکبات

MEPHENTINE

(WYETH)

مے فن ٹین

Mephentermine sulph 10mg tabs 20: Rs.26.50

MEPHENTINE INJ (WYETH) 10ml vial: Rs.53 50

مے فن ٹین انجکشن

PHOLEDRINE

فولی ڈرین سلفیٹ

افعال و منافع: یہ لوہڈ پریشر، آپریشن کے وقت بیہوشی طاری کرتے وقت محسوس کے رکھنے شدید
انگلش، دواؤں کے استعمال کے دوران اچانک بلڈ پریشر کم ہو جانے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اچانک دوران خون رکھنے کو لپس (صدمہ) طاری ہونے میں عضلاتی یا زیر جلد ۲۰
ملی گرام لگائیں ضرورت پر دوبارہ لگائیں۔ وریڈی طور سے ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام بوتل میں ڈال کر آہستہ

آہستہ آہستہ ۲ گھنٹہ میں چڑھائیں۔

تجارتی مرکب

VERITOL AMPOULES/LIQUID (BOEHRINGER)

ویری ٹول انجکشن

سن اور بیہوش کرنے والی ادویہ

ANAESTHETIC

BUPIVACAINE HCL بوپی واکین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: یہ عصبی ریشوں کے گرد حصار بنا کر اعصاب کو بے حس کر دیتی ہے نخاع سے نکلنے والے عصبی ریشوں کو سن کرنے، آپریشن کے درمیان خون کم خارج ہونے۔ ذیابیطیس موٹاپا یا زیادہ موٹے افراد کے آپریشن میں مفید رہتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام ریڑھ کے مہروں کے درمیان بہت آہستہ آہستہ لگائیں۔

متقی افعال: شدید جریان خون میں، قلبی صدمہ میں، بے ہوشی میں سسم الدم Septicemia میں، عانی اور متعدی امراض میں، پولیو، انیمیا، استرخاء، آتھک، پشت کے درد، حجر الفاصل، ریڑھ کی بد وضعی، نخاع کی ٹی بی، جو شیلے اور ضدی مریضوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

مضر اثرات: زیادہ مقدار دینے سے ڈپریشن، چڑچاہن، بد مزاجی چکر، دھندلا پن، ہاتھ ہیر کچکپانا، خشکی، دورہ پڑنا، سینہ میں تنگی، لولبلڈ پریشر، الرجی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: دریدی استعمال نہ کریں، حمل وضع حمل کے دوران، ہائی اور لولبلڈ پریشر میں نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

ANAWIN INJ (NEON) 5x5ml amp Rs 34.50

اناون انجکشن

SENSORCAINE (ASTRA-IDL) 20ml vial: Rs. 19 44

سین سورکین

SENSORCAINE HEAVY 0.5% (ASTRA-IDL)

سین سورکین ہیوی

5x4ml ampoule: Rs.29.90

SENSORCANE SPINAL (ASTRA-IDL)
5x4ml amps: Rs 27.90

سین سورکین اسپائنل

SENSORCANE WITH ADRENALINE (ASTRA-IDL) سین سورکین وڈائیڈرینالین

LIGNOCAIN HCL لگنوکین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: مقامی تخدیر (سن کرنے کے لئے) زیادہ موثر اور طاقت ور دوا ہے۔ غشاء مخاطی کے اندر نفوذ کر جاتی ہے دانت نکالنے، وضع حمل کے دوران نغالی تخدیر کے ذریعہ، آپریشن سے ولادت کرانے بچھو کاٹنے، غدہ قدامیہ کے آپریشن، رحم کی صفائی، چھوٹے آپریشن جہاں مقامی تخدیر کی ضرورت ہو، نغالی تخدیر سے زیریں شکم کے آپریشن کے لئے مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرم نغالی انجکشن کے ذریعہ لگائیں۔ مقامی سن کرنے کے لئے ضرورت کے مطابق لگائیں۔

منفی افعال: شدید صدمہ، قلبی عصبی امراض میں، ریڑھ کی بد وضعی میں تسیم الدم Septicemia میں شدید ہائی اور لو بلڈ پریشر میں خون کی شدید کمی Anaemia اور پشت کے درد میں اس کا استعمال مناسب نہیں۔

مضر اثرات: کبھی کبھی الرجی ہو جاتی ہے۔

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی اور مرگی میں احتیاط رکھیں۔

تجارتی مرکبات

GESICAIN 2% JELLY (S.G. PHARMA) 30ml: Rs.9.03 گیسی کین جلی

GESICAIN SOLUTION (S.G. PHARMA) 2% vial: Rs.7.28 گیسی کین سلوشن

GESICAIN 2% SOL WITH ADRENALINE (S.G. PHARMA) 30ml vial: Rs.9.23 گیسی کین ۲% سلوشن وڈائیڈرینالین

GESICAIN 4% TOPICAL (S.G. PHARMA) 30ml: Rs.11.17 گیسی کین ٹوشن

GESICAIN OINT (S.G. PHARMA) 35g: Rs.7.64 گیسی کین مرہم

LIGNOCAINE HCL INJ (PREM PHARMA) 30ml vial: Rs.8.00 لگنوکین انجکشن

LIGNOCAINE WITH ADRENALINE (PREM PHARMA)

30ml vial: Rs.8.00

LOX 2% INJ

(NEON) 30ml vial: Rs.8.40

XYLOCAINE

(ASTRA-IDL) 30ml: Rs.7.95

XYLOCAINE 2% WITH ADRENALINE (ASTRA-IDL)

30ml: Rs.8.21

XYLOCAINE 5% HEAVY (ASTRA-IDL)

25x2ml: Rs.48.91

XYLOCAINE JELLY (ASTRA-IDL) 30g: Rs.10.65**XYLOCAINE OINTMENT (ASTRA-IDL) 35gm: Rs.14.13****XYLOCAINE TOPICAL (ASTRA-IDL)**

Lignocaine hcl 4% 30ml: Rs.6.83

XYLOCAINE VISCOUS (ASTRA-IDL)

Lignocaine hcl 2% 100ml: Rs.8.92

لگنوکیئن انجکشن

لاکس انجکشن

زاکلوکیئن

زاکلوکیئن وڈائیڈرینالین

زاکلوکیئن ہیوی

زاکلوکیئن جیلی

زاکلوکیئن مرہم

زاکلوکیئن لوشن

زاکلوکیئن اسپرے

سو نگھا کر بے ہوش کرنے والی ادویہ

INHALATION**ENFLURANE**

ان فلورین

افعال و منافع: اس کا اثر بہت جلد اور دیرپا ہوتا ہے۔ ہر طرح کے آپریشن اور ہر عمر والوں کو استعمال کرائی جاسکتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۴ فیصدی لوشن آکسیجن یا آکسیجن نائٹر آکسائیڈ کے ہمراہ سو نگھائی جاتی ہے۔

منفی افعال: قلبی حرکات بے ترتیبی، دورے کی ہسٹری اور ولادت کے دوران اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی تے جگر میں خرابی اور ری ایکشن ہو سکتا ہے۔

ETHER

ایتر

افعال و منافع: ایمر جنسی کے وقت، آپریشن کے لئے مریض کو بے ہوش کرنا چوٹ لگنا حادثات، وغیرہ کے موقع پر جلد علاج کے لئے اور تکلیف رفع کرنے کے لئے اس کو سونگھا کر بے ہوش کیا جاتا ہے۔

FLUOTHANE HALOTHANE

فلو تھین ہالو تھین

افعال و منافع: یہ ایک فراری نشہ آور دوا ہے۔ بیہوش کرنے کے لئے مستعمل ہے ہر عمر اور ہر طرح کے آپریشن کے لئے عمدہ چیز ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ سے ۴ فیصدی لوشن آکسیجن یا آکسیجن / نائٹروس آکسائیڈ کے ساتھ مخصوص آلے سے سونگھائی جاتی ہے۔

منفی افعال: جگر کے امراض اور ابتدائی ایام حمل میں مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی، تے، بولبلڈ پریشر، نبض ضعیف اور سانس رک رک کر آتی ہے۔

احتیاط: دوا کی بوتل کو اچھی طرح بند کر کے روشنی سے بچا کر رکھی جائے کبھی اس کے استعمال سے بلڈ پریشر اچانک کم ہو جاتا ہے اس کے لئے ایڈرنالین تیار رکھیں۔

تجارتی مرکب

FLUOTHANE

(ICI) 250ml. Rs. 1440.00

فلو تھین

ISOFLURANE

آئی سو فلورین

افعال و منافع: بے ہوشی طاری کرنے والی دواؤں کے ساتھ اس کے استعمال سے بیہوشی جلد طاری ہو جاتی ہے۔

ہر قسم کے آپریشن کرنے کے لئے مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳ فیصدی آکسیجن کے ساتھ استعمال کرائی جاتی ہے۔

منفی افعال: رحم سے جریان خون روکنے والی دواؤں کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں ہے۔

مضر اثرات: نظام تنفس پر دباؤ، لوبلڈ پریشر، رحم کو ڈھیلا مسترخی کرتا ہے متلی قے آسکتی ہے۔
احتیاط: ولادت کے دوران اس کا استعمال جائز نہیں۔

NITROUS OXIDE

نائٹرس آکسائیڈ

افعال و منافع: عام بیہوشی کے لئے مستعمل ہے، دانتوں کی سرجری، بڑے آپریشن سرجری کے لئے بیہوش کرنے کے لئے مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۸۰ فیصدی

مضر اثرات: آکسیجن کی کمی، متلی ابکائی، لیو کو سائیٹ اور مخ العظام غیر طبعی ہونا۔

نیند اور بیہوشی طاری کرنے والے انجکشن

INTRAVENOUS HYPNOTICS

DIAZEPALM

ڈایازی پام

افعال و منافع: دماغ میں جلد نفوذ کر جانے کے سبب پورے جسم کے افعال کو معطل کر کے بیہوشی طاری کر دیتی ہے۔ اس سے گہری نیند آتی ہے۔ عضلات مسترخی ہو جاتے ہیں ۲ سے ۴ گھنٹہ تک مریض گہری نیند میں رہتا ہے، چھوٹے آپریشن، انڈواسکوپ، دورے پڑنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ سے ۱۰ ملی گرام عضلاتی یا وریدی، آپریشن سے آدھ گھنٹہ قبل۔

مضر اثرات: خشکی، حرکات غیر ارادی، قبض ڈپریشن، بصارت میں فرق، پٹکل، لوبلڈ پریشر، پیشاب رکنا، جلد پر داغ پڑنا، کبھی برقان ہوتا۔

احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں وریدی انجکشن آہستہ لگائیں امنٹ میں الٹی لٹر دوسری دواؤں کے ساتھ نہ دیں۔

تجارتی مرکبات کی فہرست منوم اور مخدرا دویہ کے تحت دیکھئے۔

KETAMINE

کشیامین

افعال و منافع: یہ فوری اثر کرنے والی بیہوشی کی دوا ہے یہ عضلاتی اور وریڈی راہ سے دی جاتی ہے۔ یہ دماغی نظام پر اثر انداز نہیں ہوتی اس لئے لو بلڈ پریش حادثات اور صدمات میں بھی استعمال کرائی جاسکتی ہے۔ مختصر مدت کی بیہوشی کے لئے معمولی اور درمیانی آپریشن سے قبل استعمال کرائی جاتی ہے دوروں کی حالت میں بٹرایوں کے چکر، اور بکواس کے لئے بچوں اور بوڑھوں کے لئے براہ مقعد بھی دی جاتی ہے۔ مقدار و ترکیب: وریڈی ایلٹی گرام / فی کلو گرام سے ۲۵، ۳۰ ایلٹی گرام / کلو گرام تک دے سکتے ہیں عضلاتی ۶.۵ سے ۱۳ ایلٹی گرام / فی کلو گرام تک لگا سکتے ہیں۔

منفی افعال: دماغی چوٹ، ایکسیڈنٹ اور حساس مریضوں میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: قلب کی حرکات میں تیزی نبض سریع و متواتر سانس تیز چلنا، سانس میں تکلیف۔ قلبی حرکات بے ترتیب، شجرہ میں تشنج، تیز وریڈی انجکشن لگانے یا ڈرپ دینے سے تنفس ست بلند پریش کم ہو جاتا ہے، بھوک کی کمی متلی تے انجکشن کی جگہ درد ہوتا ہے۔

احتیاط: سانس ست ہونے پر مصنوعی تنفس سے احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: اور ہارپی ٹون کے مرکبات ساتھ استعمال نہ کریں۔

تجارتی مرکبات

ANEKET INJ 50/10	(NEON) 10x2 ml amps: Rs.230.00	ایلی کیٹ انجکشن
KETALAR	(PARKE-DAVIS) 10ml: Rs.89.50	کیٹالار
KETAMAX	(TROIKAA) 5x2ml amps: s.109.00	کشیامیکس
KETMIN	(THEMISCHEMICALS) 2ml vial:Rs.22.90	کیٹ من

PANTATHAL SODIUM

پنٹا تھال سوڈیم

THIO PANTONE SODIUM

تھیو پن ٹون سوڈیم

افعال و منافع: وریڈی طور سے معمولی اور درمیانی آپریشن کے لئے مختصر مدت میں بیہوشی طاری کرنے کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے اس سے عضلات مسترخ نہیں ہوتے شدید دوروں شرابی کا

جنوں بوڑھوں اور بچوں کے لئے براہ مقصد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۵ سے ۵ فیصدی تازہ سیلوشن استعمال کرنا چاہیے۔

منفی عمل: شدید امراض قلب، لوہلڈ پریشر اور ایڈیسن ڈیزیز میں استعمال نہ کریں۔

مضر اثرات: نظام تنفس پر دباؤ، وریڈوں میں انجماد خون، سانس رک کر آنا ہوائی نالی میں تشنج

پیسپروں کی عروق میں تشنج، تھوک زیادہ آنا، ہچکی چکر آنا، درد سر، جلد پر داغ متلی ابکائی، الرجی۔

احتیاط: لوہلڈ پریشر میں تنفس پر دباؤ اور سانس رکنے میں احتیاط رکھیں۔

تجارتی مرکبات

ANESTHAL

(JAGSONPAL) 1g: Rs.40 69

اے لن تھال

INTRAVALSODIUM

(RHONE POULENC)

انٹرا وال سوڈیم

THIOSOL INJ

(NEON) 1gm vial. Rs.45.20

تھیوسول

1g: 50amps: Rs.2083.81

PROPOFOL

پروپوفول

افعال و منافع: یہ منوم اور مسکن دوا ہے اس کا اثر دقتی ہوتا ہے۔ کمزور اور صاحب فراش مریضوں کو سکون سے رکھنے اور معمولی آپریشن کے لئے مستعمل ہے۔

مقدار خوراک: ۲ ملی گرام / کلو گرام کے حساب سے وریڈی استعمال کیا جاتا ہے۔

منفی افعال: نظام تنفس کی کمزوری، دماغ میں خون کی رسد میں کمی، میں اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی تے درد سر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: دیگر بیہوشی طاری کرنے والی دواؤں اور الیون کے مرکبات کے ساتھ اس کا استعمال مناسب

نہیں

sobride

DIAZEPAM TABLETS & INJECTABLES

INDICATIONS

- For relief of tension & anxiety states or which associated with agitation & situational stress.
- All varieties of neurosis.
- An aid to control agitation, tremor, hallucinations, in delirium treatment.
- Concurrently with other drugs or treatments in depression & psychosis.
- Toxaemia of pregnancy, to shorten labour, in threatened abortions, antepartum & postpartum haemorrhage.
- Status epilepticus or severe recurrent convulsive seizures.
- As a muscle relaxant in tetanus, in spastic muscular contractures.



سو برائیڈ

ANTI ALLERGIC**دافع الرجی****ANTI HISTAMINE****دافع حساسیت ادویہ****ASTIMIZOLE****ایس ٹی می زول**

افعال و منافع: ایک اہم دافع حساسیت دوا ہے۔ نظام عصبی کو خراب نہیں کرتی دماغ پر کوئی برا اثر نہیں ڈالتی۔ جلد پر پختے پڑنا Oedema ناک بہنا، الرجی کے سبب آنکھ دکھنا دمہ کھجلی وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ ملی گرام یومیہ شدید ضرورت پر ۳۰ ملی گرام تک دے سکتے ہیں بچوں کو عمر کے مطابق دوا کھانے سے آگنٹہ قبل یا آگنٹہ بعد دی جائے۔

منفی افعال: C/1 حاملہ عورتوں، بوڑھوں اور جگر کے امراض میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: زیادہ عرصہ استعمال سے وزن میں اضافہ، منہ خشک، درد شکم اسہال نفخ شکم جلد پر دغ پڑنا۔

تجارتی مرکبات

ACEMIZ	(LUPIN) 10: Rs.10.81	ایس ٹی می
ACEMIZ SUSP	(LUPIN) 60ml: Rs.10.70	ایس ٹی می سرب
ALERZOLE	(THEMIS PHARMA) 10, Tabs: Rs.13.71	ارزول
ALERZOLE SUSP	(THEMIS PHARMA) 60ml: Rs.15.50	ارزول سرب
ALESTOL	(INDOCO) 10: Rs.12.00	اے لستول
ASTELONG	(TORRENT) 10, Rs.17.90	ایس ٹی لانگ
ASTELONG SUSP	(TORRENT) 60ml: Rs.23.90	ایس ٹی لانگ سرب
ASTEM	(MEDLEY) 10: Rs.14.50	ایس ٹی می
HISTALONG	(STANGEN) 10: Rs.15.47	ہسٹالانگ
HISTEESE. TAB,SUSP		ہس ٹی می سرب
HZAX TABS	(KANPHA) 10: Rs.13.01	ایزاکس
PERIONE	(MERIND) 10: Rs.16.00	پریون

STEMIZ. (CADILA) 10·Rs.17.10 اٹے مڑ
STEMIZ SUSP (CADILA) 50ml· Rs.12.56 اٹے مڑ سرپ

AZATADINE MELEATE

ازاناڈین میلی ایٹ

افعال و منافع: مزمن نزلہ زکام ناک بہنا، امراض جلد، پتی اچھلنا، (ارنی کیریا) جلد پر چبھتے پتہ جلد کا درم Odema، الرجک ایگزیم، کیڑے مکوڑوں کا کاٹنا، مقعد اور رحم کی کھجلیاں، دووں اور یہ مکاری ایکشن۔

مقدار و ترکیب: اٹلی گرام دن میں ۲ بار بچوں کو ۰.۲۵ سے ۰.۵ ملی گرام۔

منفی اثرات: نومولود کمزور اور دوا سے حساس مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: گلوکوما۔ آنکھوں میں دباؤ، زخم معدہ، فم معدہ کا تسد، امراض قلب ہائی بلڈ پریشر عظم مندہ در قیہ میں اور دماغی کاموں کے دوران احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، باربی ٹون، دافع انجماد خون اور نظام عصبی کو متاثر کرنے والی ادویہ۔

تجارتی مرکبات

ZADINE (FULFORD) زاڈین ٹبلٹ سرپ
10: Rs.23.50; 50ml syrup Rs.12 60

CETRIZINE HCL

سائٹری زین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: موسمی خرابی، مزاج کی خرابی غذائی بے احتیاطی سے ہونے والی الرجی، پتی اچھلنا، ناک بہنا، جسم پر دوڑے پٹنا Oedema کھجلی اور بے چینی میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۰.۵ ملی گرام دن میں ابار ۶ سال سے کم عمر بچوں کو نہ دیں۔

مضر اثرات: خشکی محسوس ہوتی ہے۔ درد سر، چکر آنا، ہاضمہ کی خرابی، بکواس کرنا۔

احتیاط: حالت حمل، ایام رضاعت اور گردوں کے امراض میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

ALDAY	(SOL PHARMA) 10mg caps	ہل دے
ALERID	(CIPLA) 10 tabs Rs 25 00	الرد
ALERID SYRUP	(CIPLA) 30ml Rs 12 80	الرد سیرپ
ALLERZINE	(JENBURKT) 10 Rs 12 00	الرزین
CETIHIST	(BDH)	سی ٹی ہسٹ
CETIRIZ	(ALKEM) 10 tabs Rs 19 90	سی ٹی ریز
CETRIZET	(SUN PHARMA) 10 Rs 27 50	سیٹ ری زیت
CETZINE	(GLAXO) 10 tabs Rs 27 50	سیٹ زائن
CETZINE SYRUP	(GLAXO)	سیٹ زائن سیرپ
CEZIN SYRUP	(DEE PHARMA)	سی زن سیرپ
CITRAZAN	(MAC) 10 Rs 24 00	سٹرا زان
EKON- D.T.	(BLUE CROSS) 10 Rs 18 80	ای کون
HISNOFIL	(CROSSLANDS) 10 Rs 15 00	ہس نو فل
HIZTIGO	(GUARDIAN (CROSLANDS) 10 Rs 24 50	ہس ٹائی گو
RHIZIN	(RECON) 5 Rs 25.00	رہائی زن
SIZON	(SYSTOPIC) 10mg. tabs. 10 Rs 25 00	سائی زون
SIZON SYRUP	(SYSTOPIC) 50ml. Rs. 22. 50	سائی زون سیرپ
TRIZ	(INDOCO) 10 Rs 14.00	ٹریز
TRIZ SYRUP	(INDOCO) 30ml: Rs 12 50	ٹریز سیرپ
XERO-SED	(MAX) 10 Rs 25 00	زیرو سینڈ
ZETOP	(CADILA) 10 Rs 23 10	زی ٹوپ
ZIRLON	(WAVE) 10 Rs 24 50	زیر لون
ZIRTIN	(TORRENT) 10: Rs 24.50	زیر ٹین
ZYNCET	(UNICHEM) 10. Rs 27 50	زائن سیٹ
ZYRTEC	(UNI-UCB) 10 tabs Rs 27 50	زائر ٹیک
ZYRTEC SYRUP	(UNI-UCB) 60 ml Rs 25 50	زائر ٹیک سیرپ

CHLORPHENIRAMINE MALEATE کلور فینی رامین مائل ایٹ

افعال و منافع: یہ ایک دیرپا دافع حساسیت انٹی آرجک دوا ہے ہر قسم کی الرجی ناک بہنا، پتی اچھلنا، ارٹی کیریا، جسم پر پھٹتے پڑتا Oedema، غذائی الرجی دواؤں ٹور سیرم سے ہونے والی الرجی، رحم اور

مہل کی کھلی، کیرے کوڑوں کا کٹنا وغیرہ میں مفید ہے۔
 مقدار خوراک: ۳ ملی گرام دن میں ۳-۴ بار بچوں کو ۲ ملی گرام۔
 مضر اثرات: خشکی چکر آنا۔
 احتیاط: دوا کے دوران استعمال ڈرائیونگ اور مشنری چلانا نہیں چاہیے۔

تجارتی مرکبات

D-ALER	(LIFE) 10x10 Rs 126.90	ڈی اے آر
HEPASULFOL AA	(FRANCO INDIAN) 25: Rs.30.72	ہیپاسلفول
FLUCOLD	(WALLACE) 10.Rs.8.00	فلوکلڈ
FLURID	(KLAR SEHEN) 10.Rs.5.99	فلورڈ
PIRITON EXPECTORANT	(GLAXO) 460ml: Rs.22 59	پری ٹون کف سرب
PIRITON TABS	(GLAXO) 500: Rs 16 06	پری ٹان ٹبلٹ

CLEMASTIN

کلی ماسٹین

افعال و منافع: جلد متورم اور سرخ ہونا، ناک بہنا، پتی اچھلنا جلد پر چکے پڑنا Oedema دواؤں کی
 الرجی وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱ ملی گرام دن میں ۲ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔
 مضر اثرات: خشکی، چکر آنا، منہ خشک، دل دھڑکنا، ہاضمے کی خرابی ہو سکتی ہے۔
 احتیاط: دوا کے استعمال کے بعد ڈرائیوری کرنا، مشنری چلانا نہیں چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصبی کو سن کرنے والی ادویہ کے ساتھ اس کا استعمال مضر
 ہے۔

تجارتی مرکبات

TAVEGYL	(SANDOZ) 10: Rs 46.00	ٹاوی گل ٹبلٹ
TAVEGYL SYRUP	(SANDOZ) 60ml: Rs.38.00	ٹاوی گل سرب
TAVIST	(WANDER) 6: Rs 31.00	ٹاویسٹ
TAVIST SYRUP	(WANDER) 50ml: Rs.32.67	ٹاویسٹ سرب

CYPRO HEPTADIN

سائپر وپٹاڈین

افعال و منافع: ہر طرح کی الرجی کھلی، جلد کا متورم ہونا، الرجی کے سبب نزلہ زکام درد سر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۴ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو نصف خوراک ۲ سال سے کم عمر والوں کو نہیں دینا چاہیے۔

منفی افعال: گلوکوما، جھپ بول، زخم معدہ، معدہ کا منہ بند ہونے میں ورم غدہ قدامیہ مٹانے میں رکاوٹ میں ایام رضاعت اور نو مولود کو دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: منہ خشک، چکر آنا، نیند نہ آنا اور خشکی محسوس ہوتی ہے۔

احتیاط: پیمپروڈوں کے امراض خصوصاً دمہ میں، دوا کے استعمال کے بعد ڈرائیوری اور مشنری چلانا منع ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصبی کو کمزور کرنے والی ادویہ کے ساتھ اس کا استعمال مضر ہے

تجارتی مرکبات

CIPLACTIN	(CIPLA) 100ml: Rs.10.75	سپلا شین سرپ
CIPLACTIN TABS	(CIPLA) 10: Rs.2.77	سپلا شین ٹبلٹ
CYDINE	(CFL) 200ml: Rs.30.80	سائی ڈین سرپ
CYPROWAL	(WALLACE) Rs.27.55	سائی پرووال سرپ
PERITOL TABS	(THEMIS CHEMICAL) 10: Rs.7.01	پیری ٹال ٹبلٹ
PERITOL SYRUP	(THEMIS CHEMICAL) 200ml: Rs.27.83	پیری ٹال سرپ
PRACTIN	(MERIND) 10: Rs.4.70	پراکٹین ٹبلٹ
PRACTIN SYRUP	(MERIND) 100ml: Rs.11.38	پراکٹین سرپ

The effective answer from an anti-histamine

COSZIN 
(Cetizine)

ڈیکس کلور فینی رامن میلی ایٹ

DEXCHLOR PHENIRAMINE MELEATE

افعال و منافع: الرجی کی مختلف حالتوں میں مفید ہے۔ دیگر انٹی الرجک دواؤں کے مقابلے میں معر اثرات اس میں کم ہیں، موسمی نزلہ، ناک بہنا، آنکھیں دکھنا، ہتی اچھلنا جلد پر چکے ابھار اور Oedema میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔

مضر اثرات: متلی تے معمولی خشکی محسوس ہوتی ہے۔

احتیاط: دوا استعمال کرنے کے بعد ڈرائیوری اور مشنری چلانا نہیں چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، انٹی ڈپریشن، ہاربی ٹون، نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی دوائیں دافع انجماد خون خوردنی کا استعمال نقصان دہ ہے۔

تجارتی مرکبات

POLARAMINE (FULFORD) 2mg 10 tabs Rs 7 60 پولارامین ٹبلٹ

POLARAMINE REPEATABS (FULFORD) پولارامین ری پی ٹیب

6mg 10 tabs Rs. 16.00

POLARAMINE PEAD SYRUP (FULFORD) پولارامین بچوں کا سرپ

0.5mg per 5ml syrup 50ml Rs. 16.94

DIMETHIDINE

ڈائی می تھی ڈین

افعال و منافع: یہ ایک زبردست دافع الرجی دوا ہے۔ ہر قسم کی الرجی، حساسیت کے لئے مفید ہے ہتی اچھلنا، جلد پر دوڑے پڑنا، کھجلی، دواؤں کی الرجی، فرج و مقعد کی کھجلی، موسمی و وبائی نزلہ نزلہ وی بخار میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶ سال سے زائد عمر والوں کو ۱ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

منفی افعال: سرگی، جس بول کی تکالیف میں اس کا استعمال ممنوع ہے۔

مضر اثرات: معمولی نشہ محسوس ہوتا، خشکی، دست آنا (اسہال) متلی ابکائی، نیند نہ آنا، بے چینی چکر

آبہ دور، مٹانے اور آنٹوں میں بے چینی محسوس ہونا۔
احتیاط: دوا کے استعمال کے دوران ڈرائیوری اور مشنری چلانا خطرناک ہے۔

تجارتی مرکبات

FORISTAL (HIND CIBA GEIGY) 1mg tabs 10 Rs 4 80 فورسٹال
FORISTAL LONTABS (HIND CIBA GEIGY) 10 Rs 7 50 فورسٹال لان ٹیب

ڈائی فین ہائیڈرامین ہائیڈروکلورائیڈ

DIPHEN HYDRAMINE HCL

افعال و منافع: یہ دوا دافع حساسیت اور دافع درد شکم ہے۔ الرجی کی علامات مثلاً جلد پر پھٹتے دوزے پڑنا، ناک بہنا، نزلہ، پتی اٹھلنا، الرجک ایگزیماء معده آنٹوں میں بے چینی، خفص کا تکلیف سے آنا اور پارکینسنز ڈیزیز میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار علامات میں کمی ہونے پر دن میں صرف ابار دیں۔
منفی افعال: نومولود بچوں کو دینا منع ہے۔ گلوکوما میں بھی مضر ہے۔

مضر اثرات: خشکی، الجھن، عصبی کمزوری، بے چینی، متلی، قے اسہال۔ بصارت میں فرق، کبھی دو تصاویر دکھائی دینا، قبض، ناک بند، خفقان، درد سر، نیند نہ آنا، خون کی کمی، معدہ میں بے چینی، منہ خشک، سینہ میں جھگی محسوس ہوتی ہے۔

احتیاط: حمل، رضاعت کے دوران، ڈرائیوری اور مشنری چلانے سے پہلے اس کا استعمال مضر ہے زیادہ مقدار میں دینے سے دور ہوا اور موت بھی ہو سکتی ہے۔

تجارتی مرکبات

BENADRYL (PARKE-DAVIS) 50. Rs.12 74 بنادرل
BENADRYL SYRUP (PARKE-DAVIS) Rs.41.27 بنادرل سرب
DIMIRIL (CHOGULE HIND) 25mg tabs 30 Rs 11 50 ڈی می ریل ٹبلیٹ

ام برامین ہائیڈروکلورائیڈ EMBRAMINE HCL

افعال و منافع: فوری اثر کرنے والی زبردست دافع حساسیت انٹی الرجی دوا ہے پتی اچھلنا جلد کا متورم ہو Oedematous، الرجک ایگزیمیا چھاجن، نزلادی بخار، ناک بہنا اور کھجلیاں میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱۲ سال سے زائد عمر کے لئے ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار آرام آنے پر ۲۵ ملی گرام دن میں ابار دینا چاہیے۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو، نومولود، بچوں، ایام رضاعت، گلوکوما، مرگی میں دینا مضر ہے۔
مضر اثرات: خشکی پھر آنا، منہ خشک ہو جاتا ہے۔

احتیاط: دوا کے استعمال کے بعد ڈرائیوری کرنا اور مشنری چلانا خطرناک ہے۔

تجارتی مرکب

MEBRYL

(SMITHKLINE) 10 Rs. 12.45

برائل

ہالوپائی رامین ہائیڈروکلورائیڈ HALO PYRAMINE HCL

افعال و منافع: ایک اہم دافع حساسیت دوا ہے، شدید الرجی، آنکھ ناک کان اور جلد پر الرجی کا اثر، شدید نزلہ زکام، نزلادی بخار، ورم غارالانف پتی اچھلنا، دواؤں کی الرجی ایگزیمیا، کیزے کوزوں کے کانٹے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۵ سے ۱۰ سال کے بچوں کو صرف ۲۵ ملی گرام
یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے انجکشن ۲۰ ملی گرام عضلاتی یا دریدی بہت آہستہ لگائیں، مرہم ۱ فیصدی دن میں ۳-۴ بار لگائیں۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو نہ دیں۔

مضر اثرات: خشکی، پھر آنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔

LORATADINE

لوراٹاڈین

افعال و منافع: ناک حلق، جلد، آنکھوں پر ہونے والے الرجی کے اثرات میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۱۰ ملی گرام یومیہ ایک خوراک میں۔
 منفی افعال: خمل، ایام رضاعت۔ ۲ سال سے کم عمر بچوں میں دینا نقصان دہ ہے۔
 مضر اثرات: بے چینی، متلی، درد سر ہو سکتا ہے۔
 احتیاط: جگر کے امراض، ۱۲ سال سے کم عمر کے بچوں کو استعمال کرنے میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

LORFAST
LORIDINE

(CADILA) 10mg tabs; 10 tabs 36.10
(HEALTH CARE) 10 tabs 22.20

لورافاسٹ
لوریڈین

LOVASTATIN

لوو اسٹین

افعال و منافع: ہر قسم کی الرجی میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام دن میں ۲-۳ بار
 مضر اثرات: خشکی پیدا کرتی ہے۔
 احتیاط: دوا استعمال کرنے کے بعد ذرا تھوری کرنا اور مشنری چلانا خطرناک ہے۔

تجارتی مرکبات

CALCILUVIN (BOEHRINGER) 10 dragees: Rs. 8.66
 CALCILUVIN SYRUP (BOEHRINGER)
 100ml: Rs. 17.48

کیلسی لوون ہلیٹ
کیلسی لوون سیرپ

میب ہائیڈرالین ناپا ڈی سائی لیٹ

MEB HYDRALIN NAPA DISYLATE

افعال و منافع: ہر قسم کی الرجی پتی اچھلتا، جلد پر چکے دوورے پڑنا، کھجلی الرجک ایگزیم، غذاؤں اور
 دواؤں سے الرجی، ناک بہنا، حساسیتی (آنکھ دکھنا)، کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔

منفی افعال: درم غده قدامیہ، گلوکوما، میں مضر ہے۔

مضر اثرات: خشکی، چکر آنا۔

احتیاط: دوا کے استعمال کے بعد ڈرائیوری کرنا اور مشنری چلانا خطرناک ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصبی کو کمزور کرنے والی، ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

INCIDAL TABS

(BAYER) 10 Rs. 5 50

ان سی ڈال

METHDILAZINE-HCL میٹڈیلازین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: انٹی ہشامین اور دافع حساسیت دوا ہے ہر قسم کی الرجی کو دور کرتی ہے، ناک بہنا، اور

حساسیتی جی اچھلنا، دواؤں کی کاری ایکشن کیڑے کوڑوں کا کاٹنا اور کھجلی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۸ ملی گرام دن میں ۲ بار بچوں کو ۳ ملی گرام۔

منفی افعال: مخدر اور مسکن اعصاب ادویہ کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں۔

مضر اثرات: خشکی چکر آنا۔

احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں۔ دوا استعمال کے بعد ڈرائیوری اور مشنری چلانا منع ہے۔

تجارتی مرکبات

DILOSYN TABS

(ALENBURYS) 10 Rs 7.19

ڈلوسائن مہلید

DILOSYN SYRUP

(ALENBURYS) 120ml Rs. 17.74

ڈلوسائن سرپ

PHENIRAMINE MELEATE فینی رامین میلی ایٹ

افعال و منافع: ہر قسم کی الرجی، نزلہ زکام، ناک بہنا، کیڑے کوڑوں کا کاٹنا جی اچھلنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ ملی گرام دن میں ۲ یا ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق انجکشن ۲۲، ۷۵ سے ۲۵ ملی گرام

عضلاتی۔

منفی افعال: ورم غدہ قدامیہ، حمل اور ایام رخصت میں خراب اثرات رونما ہو سکتے ہیں۔
مضر اثرات: خشکی کرتی ہے۔

احتیاط: دوا کے استعمال کے دوران ڈرائیوری کرنا اور مشنری چلانا منع ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، عصبی نظام کو کمزور کرنے والی ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

AVIL 25/50 (CASSELLA MED) 50mg 10: Rs 2.03 ایول ٹیبلٹ ۲۵/۵۰

AVIL INJ (CASSELLA MED)

2ml Rs.2.17 ; 10ml vial. Rs.6 21

AVIL SYRUP (CASSELLA MED) 100ml: Rs 8.24

PHENAMIN INJ (P&B LABS) amp. Rs 2 40

ایول سیرپ
فینی رامن انجکشن

PHENYL EPHRINE HCL

فینائل ایفرین

افعال و منافع: ناک کی جھلی متورم ہونا ناک بند ہونا، آپریشن کے بعد ناک کی تکالیف میں مفید ہے۔
مقدار ترکیب: ۱۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔ عموماً یہ دوسری دواؤں کے ساتھ دی جاتی ہے۔
منفی افعال: جگر گردوں کی خرابی میں، اثرات خراب رونما ہوتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

CINARYL DROPS (THEMIS PHARMA) 15ml Rs.8 78

CINARYL LIQUID (THEMIS PHARMA) 60ml Rs. 10.60

CINARYL TABS (THEMIS PHARMA) 10: Rs.5 34

سٹارائل ڈراپس
سٹارائل لکویڈ
سٹارائل ٹیبلٹ

فینائل پروپانولامین ہائیڈروکلورائیڈ

PHENYL PROPANOLAMINE HCL

افعال و منافع: عروق میں تنگی کے سبب ناک بند ہونا، ناک بہنا، چھینکیں زیادہ آنا، ناک میں کھجلی
چھین، حلق پر نزلہ کرنا، آنکھوں سے پانی بہنا، نزلہ، ورم غارالانف، انفلوآنزہ میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۵۰ ملی گرام ہر ۱۲ گھنٹہ بعد استعمال کرائیں۔

منفی افعال: C/1 ہائی بلڈ پریشر میں شرائین الریہ کے امراض میں زخم معده اور مثانہ کے تسد میں
صل اور ایام رضاعت میں منع ہے۔

مضر اثرات: خشکی، چکر آنا، منہ خشک ہونا۔

احتیاط: گلوکوما، امراض قلب، ہائی بلڈ پریشر، دورم غدہ قد امیہ میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

اے لیکس کف فارمولہ (L.YKA) ALEX COUGH FORMULA

50ml. Rs. 19.75

CALMCOLD	(PHARMACIA) 10	Rs 7.60	کام کولڈ ٹبلٹ
CALMCOLD CAPS	(PHARMACIA) 10.	Rs 14 26	کام کولڈ کپسول
CALMCOLD SUSP	(PHARMACIA) 60ml	Rs 13.41	کام کولڈ سرب
CONTAC-CC	(SMITHKLINE) 10	Rs 9 25	کان ٹک
CORICIDIN-F	(FULFORD) 10x10	Rs.42 60	کوری سیڈین
COSOME	(MERCK) 100ml	Rs 25 31	کوسوم
ESKOLD	(SMITHKLINE) 10	Rs 14.10	ایس کولڈ
ESKOLD EXPECT.	(SMITHKLINE) 60ml	Rs 14 95	ایس کولڈ سرب
FEBREX PLUS	(INDOCO) 10.tabs	Rs 8 03	فیبیریکس ٹبلٹ
FEBREX PLUS SYRUP	(INDOCO) 60 ml.	Rs 11 06	فیبیریکس پلس سرب
TIXYLIX	(RHONEPOULENC) 500ml	Rs 37 55	ٹیکسی لکس

پرومی تھازین ہائیڈروکلورائیڈ PROMETHAZINE HCL

افعال و منافع: الرجی، حساسیت، دوا یا غذا کی ایکشن، نزلہ و بخار، ناک بہنا، نزلہ زکام، پتی اچھلنا جلد پر چلتے پڑنا کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: براہ دہن ۲۵ سے ۷۵ ملی گرام سوتے وقت اپار یا ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بذریعہ انجکشن ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام گہرا عضلاتی انجکشن لگائیں بچوں کو عمر کے مطابق۔

منفی افعال: نومولود چھوٹے بچوں ایام رضاعت گلوکوما، اور حساس مریضوں کو استعمال کرنا منع ہے۔

مضر اثرات: خشک چکر آنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔
احتیاط: دوا کے استعمال کے بعد ڈرائیوری کرنا اور مشنری کا استعمال ممنوع ہے۔

تجارتی مرکبات

PHENA KID	(SWIFT)	115ml: Rs 11.98	فینا کڈ
PHENA -P	(SWIFT)	50ml Rs.15 98	فینا۔ پی
PHENA INJ	(SWIFT)	2ml amp Rs.3.10	فینا انجکشن
PHENERGAN	(RHONE POULINC)		فینرگان
10mg: 10: Rs.2 53, 25mg: 10: Rs.4 35			
PHENERGAN ELIXIR	(RHONE POULINC)		فینرگان الیکسر
100mg: Rs.11.62,			
PROMETHAZINE HCL INJ	(RHONE POULINC)		پرومی تھازین انجکشن
10x2ml: Rs.33.40			
PROMASUN	(SUN PHARMA)	10 tabs Rs 2 05	پروماسن

TERFINADIN

ٹرفی ناڈین

افعال و منافع: ہر قسم کی الرجی اور حساسیت میں مفید ہے۔
مقدار و خوراک: ۶۰ ملی گرام دن میں ۲ بار یا ۱۲ ملی گرام دن میں ابار۔ بچوں کو عمر کے مطابق۔
منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔
مضر اثرات: درد سر، پسینہ کی کثرت، ہاضمہ کی خرابی، سانس میں تنگی، جلد پر داغ پڑنا۔
احتیاط: حالت حمل اور لیام رضاعت میں، پیپھروں کے امراض اور جگر کی خرابی میں E.C.G. کے غیر طبعی ہونے میں احتیاط برتیں۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: کیا کینازول اور اراپی تھرومائی سین کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

HISTAFEN	(DEYS)	10: Rs.22.50	ہسٹافین
HISTERF	(MAX)	50ml: Rs.21.30	ہسٹرف
HISTERNA TABS	(P&B LABS)	10: Rs.22.45	ہسٹرنا

HISTERNA SUSP	(P&B LABS) 50ml. Rs.16.62	ہسٹرناسرپ
TEDIN	(GUFIC) 10: Rs. 41.30	ٹےڈن
TEDIN SYRUP	(GUFIC) 60ml: Rs.20.90	ٹےڈن سرپ
TEFICON	(MODI-MUNDIPHARMA) 10: Rs.41.00	ٹےفی کون
TERDANE	(INTAS) 10: Rs.23.00	ٹرڈین
TERDANE SUSP	(INTAS) 50ml: Rs.14.00	ٹرڈین سرپ
TERF	(LUPIN) 120mg. 10: Rs.37.08	ٹرف
TERF SUSP	(LUPIN) 50ml: Rs.20.15	ٹرف سرپ
TERFAX-60	(KOPRAN) 10x10 Rs 239.72	ٹرفیکس ۶۰
TERFAX SUSP	(KOPRAN) 60ml. Rs.26.55	ٹرفیکس سرپ
TERFED SUSP	(CIPLA) 60ml: Rs.21.31	ٹرفڈ سرپ
TERFED TABS	(CIPLA) 10. Rs.43.33	ٹرفڈ ٹیبلٹ
TERIGON	(MEJDA) 60ml Rs.19.05	ٹریگان
TERIGON TAB	(MEJDA) 10: Rs.19.56	ٹریگان ٹیبلٹ
TERIN	(WOCKHARDT) 10 tabs Rs.21.11	ٹیرن
TERIN SUSP	(WOCKHARDT) 50 ml: Rs.19 10	ٹیرن سرپ
TOFRIN	(TORRENT) 10: Rs.43.50	ٹوفرین
TOFRIN SUSP	(TORRENT) 50ml: Rs.23.90	ٹوفرین سرپ
TREXYDIN	(RANBAXY) 10: Rs.50.00	ٹریکسیڈین
TREXYL	(RANBAXY) 10 tabs Rs. 43.95	ٹریکسائل
TREXYL SUSP	(RANBAXY) 50 ml. Rs. 21.30	ٹریکسائل سرپ
ZENAD	(DABUR) 10 tabs Rs.22.95	زینڈ
ZENAD SUSP	(DABUR) 50 ml: Rs.19.95	زینڈ سرپ
ZOTER	(ALLIDAC) 10. Rs.44.30	زوتر
ZOTER SUSP	(ALLIDAC) 50ml: Rs.24 50	زوتر سرپ

ٹرائی می پرازین ٹارٹریٹ TRIMEPRAZINE TARTRATE

افعال و منافع: ہتی اچھلتا، کھلی، بچوں کو تسکین دینے کے لئے۔ بیہوشی کی دوا سے قبل اس کے اثرات دیرپا ہوتے ہیں۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ ملی گرام ۳-۴ بار یومیہ، بچوں کو ۲.۵ سے ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار، بچوں کو

سکون پہونچانے اور نیند لانے کے لئے ۵.۵ ملی گرام سے ۶.۵ ملی گرام ایومینہ کی جاتی ہے۔ زیوشی سے قبل ۲ سے ۳ ملی گرام / کلو گرام کے حساب سے آپریشن سے ۲ گھنٹہ قبل صفائی اکامیں۔

منفی افعال: ایام رضاعت، جگر گردوں کے امراض میں، مرکی، پارلن کن ڈیٹینڈو رقیہ سے اذہ کی کمی گلوکوما، ورم، غدہ قدامیہ اور ضعف میں استعمال کرنا مناسب نہیں۔

مضر اثرات: خشکی، ڈپریشن، الرجی، صفرا کی تولید میں کمی، قلب کے فعل کی غیر طبعی حالت، ایوبڈ پریشانس لینے میں وقت، جلد پرداغ پڑنا، سر گھومنا، دورے پڑنا، دودھ میں زیادتی، لیو کو سامیٹ میں کمی روشنی سے نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔

احتیاط: دوا کے استعمال کے دوران مشنری چلانا، ڈرائیوری کرنا منع ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصبی کو کمزور کرنے والی ادویہ، دافع ذیابیطیس اور ہلڈ پریشکم کرنے والی دواؤں کے ساتھ اس کا استعمال خطرناک ہے۔

ٹرائی پرولی ڈین ہائیڈرو کلورائیڈ TRIPROLIDINE HCL

افعال و منافع: ہر قسم کی الرجی، ناک بہنا، الرجک آشوب چشم، پتی اچھلنا، جلد پر چکے دوڑے پڑنا۔
مقدار و ترکیب: ۱۲ سال سے زائد عمر والوں کو ۵.۵ سے ۲.۵ ملی گرام دن میں ۳ بار ۶ سے ۱۲ سال کی عمر میں ۲.۵ ملی گرام ۱ سے ۶ سال کی عمر میں ۲.۵ ملی گرام سے ۲ ملی گرام۔

مضر اثرات: جلد پرداغ پڑ سکتے ہیں۔

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں احتیاط برتنا چاہیے۔ بچوں کی پہونچ سے دور رکھیں۔

تجارتی مرکبات

ACTIFED	(BURROUGHS WELLCOME) 10. Rs 8.64	اکٹی فڈ
ACTIFED PLUS	(BURROUGHS WELLCOME) 10. Rs. 10.67	اکٹی فڈ پلس
DELETUS TABS	(NICHOLAS) 10: Rs. 10.38	ڈی لی ٹبس
DELETUS-D	(NICHOLAS) 100ml: Rs. 26.07	ڈی لی ٹبس-ڈی

دورہ روکنے والی دوائیں

ANTI CONVULSANTS

ACETAZOLAMIDE

ایسیٹازولامیڈ

افعال و منافع: یہ کاربونک انزائم کے اثر کو روک کر دورہ روکنے میں مدد پہنچاتی ہیں۔ آنکھ کی رطوبت، Aqueous Humor کی پیدائش میں رکاوٹ پیدا کر کے آنکھ کے تناؤ کو کم کرتی ہے۔ ہر قسم کے گلوکوما، آنکھ میں دباؤ، شدید درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: گلوکوما میں ۲۵۰ ملی گرام سے اگر ام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے مرگی میں ۸ سے ۳۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے یومیہ ماؤنٹین سیکنس Mountain Sickness میں ۵۰۰ ملی گرام سے اگر ام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔

منفی افعال: سلفونامائیڈ سے الرجی میں غیر گلوکومائی حالت میں اور زیادہ دن استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔

مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، پیشاب میں رسوب آنا، گردے میں پتھری بننے اور خون کی غیر طبعی کیفیت پیدا کرنے میں مدد پہنچاتی ہے۔

احتیاط: حالت حمل میں اس کا استعمال منع ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: فوئک ایسڈ، دافع ذیابیطس اور خوردنی مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ: خراب اثر ہوتا ہے۔

تجارتی مرکب

DIAMOX

(LEDERLY) 10 Rs 5 11

ڈایاموکس

CARBAMAZEPINE

کاربامازی پائن

افعال و منافع: مرگی میں یہ فین ٹائن کی طرح کام کرتی ہے لیکن یہ زیادہ موثر نہیں ہے مرگی کی مختلف حالتوں میں درد شقیقہ میں نفسیاتی الجھنوں، شراب نہ ملنے کے اثرات بد، ذیابیطیسی عصبی درد عضلات چہرہ کی انٹنشن وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ابتدائی خوراک ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ضرورت پر ۱۲۰۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دے سکتے ہیں۔ بچوں کو ۱۰ ملی گرام / فی کلو گرام کے حساب سے دی جائے۔
منفی افعال: C/I جگر کے شدید امراض، حمل اور ایام رضاعت میں مخ العظام کی خرابی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: دو تصاویر دکھائی دینا، بصارت میں فرق خشکی حرکات غیر ارادی متلی ابکائی پر قان۔
احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں قلب و جگر اور گردوں کے امراض میں ضعیفوں میں احتیاط برتیں۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈاکسائیکلین، خوردنی مانع حمل ادویہ، آکسوزایڈ، اراکی تھرومائی سین، سی ی ٹی ڈین، لی تھیم، ڈیکسٹرو پروپاکسائی فین ڈل ٹی زم، کارٹی سون، ویراپا مل اور فین ٹائن کے ساتھ استعمال مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

CARBADAC 200	(ALIDAC) 6	Rs.9 65	کارباڈیک ۲۰۰
CARBATOL	(TORRENT)		کارباتول
100mg 10: Rs.10 12, 200mg 10: Rs 17.82; 400mg 10: Rs 30 57			
CARMAZ 100/200	(NATCO)		کارماز
100mg. 10: Rs 11.20; 200mg: 10: Rs.24 00			
EPITOL	(INTAS)		ای پی ٹول
100mg: 10: Rs.7.00; 200mg, 10: Rs 13 71, 400mg: 10: Rs 26.00			
EPITOL SYRUP	(INTAS) 50ml: Rs 11.50		ای پی ٹول سرب
FAZEPINE TABS	(FALMA) 200mg tabs; 10: Rs 18 80		فیری پائن ٹبلٹ
MAZETOL	(S G PHARMA)		مے زے ٹول
100mg: 10: Rs.9.25, 200mg 10: Rs.17.96; 400mg 10: Rs 35 05			

تجارتی مرکبات

CLONOTRIL	(CORRENT) 2mg 10 Rs 29 50	کلونوٹرل
LONAZEP	(SUN PHARMA) 10 Rs 29 70	لونازپ
RIVOTRIL	(PIRAMAL HEALTH CARE)	ریوٹرل

PHENYTOIN SODIUM

فین ٹائن سوڈیم

DIPHENYL HYDANTOIN SODIUM ڈائی فینائل ہائیڈنٹائن سوڈیم

افعال و منافع: مرگی کی یہ ایک منتخب دوا ہے، دماغ کو ماؤف نہیں کرتی، مرگی کے شدید دورے قلبی حرکات کا بے ترتیب ہونے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بچوں کو ۱۵۰ سے ۳۰۰ ملی گرام بالٹوں کو ۳۰۰ سے ۶۰۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے قلبی حرکات کی بے ترتیبی میں ۱۰۰ ملی گرام پہلے دن دوسرے تیسرے دن سے نصف خوراک کر دینا چاہیے۔

منفی افعال: قلب میں رکاوٹ، حمل اور ایام رخصت میں، الرجی کے دوران استعمال نہ کرائیں۔
مضر اثرات: ہضم کی خرابیاں، نیند نہ آنا، سستی کاہلی، الرجی، بالوں کی کثرت، خون میں خرابی، نندہ لعدیہ متورم، چشم کی حرکات غیر ارادی، Nystagmus لین العظام ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر کی خرابی میں، خون کے سرخ ذرات کی کمی میں، بوڑھوں اور ضعیفوں میں احتیاط برتیں۔
دوا آہستہ آہستہ بند کریں، دوران استعمال E.C.G. چیک کراتے رہیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، آئی سو نیازائیڈ، کلورم فینی کال مانع حمل گولیاں، کارنی سون، گوانی ڈین، وٹامن ڈی ڈیجی ٹیلز ری فام پی سین ڈاکسا ساکلیکین اور فروسی مائیڈ کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

EPSOLIN	(CADILA) 100mg tabs 100 Rs 44 29	ایپ سولن
EPSOLININJ	(CADILA) 50mg/ml 2ml 4 13	ایپ سولن انجکشن
DILANTIN-SUSP	(PARK-DAVIS) 114ml Rs 8 84	ڈائی لین ٹین سرپ

EPTOIN	(BOOTS) 100mg tabs 100	Rs 42 25	ایپٹون
GAROIN	(RHONE-POULENC)		گراون
Phenyton sod 100mg	Phenobarbitone sod 50mg tabs 10	Rs 5 59	
PHENYTAL 50	(INTAS)		لیٹائی ٹال ۵۰
Phenobarbitone 50mg, Phenyton sod 100mg tabs, 10 tabs		Rs 5 50	
PHENYTAL-30	(INTAS)		لیٹائی ٹال ۳۰
Phenobarbitone 30mg, Phenyton sod 100mg tabs 10 tabs		Rs 5 20	

ETHOSUXIMIDE

ای تھو سکسی مائیڈ

افعال و منافع: ابتدائی مرگی میں مفید ہے مرگی کی دیگر دواؤں کے ساتھ دوسری قسم کی مرگی میں بھی قائم رہتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶ سال سے کم عمر میں ۲۵۰ ملی گرام پہلی خوراک ۶ سال سے زائد عمر والوں کو ۵۰۰ ملی گرام۔ مریض کے حالات کے مطابق مقدار خوراک کا تعین کیا جائے۔
مضر اثرات: نظام ہضم اور عصبی نظام کو کمزور کرتی ہے۔ جلد پر داغ پڑتا، خون میں غیر طبیعی تغیر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر کے افعال کی جانچ کراتے رہیں، حمل اور ایام رضاعت میں جگر اور گردوں کی خرابی میں، احتیاط برتیں، دوا آہستہ آہستہ بند کریں۔

تجارتی مرکبات

ETHOSUXIMIDE	(PARKE-DAVIS) 114ml, Rs 45	ای تھو سکسی مائیڈ
ZARONTIN	(PARKE-DAVIS) 114ml, Rs 47.39	زارنٹین

GABAPANTIN

گاباپنٹین

افعال و منافع: مرگی اور دیگر اسباب سے دورہ پڑنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۲ سال سے زائد عمر والوں کو ۹۰۰ سے ۱۸۰۰ ملی گرام یومیہ ۳ خوراکیں میں تقسیم کر کے۔
متنی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو، الرجی، ۱۲ سال سے کم عمر والوں کو دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: غنودگی پکڑ آنا، حرکات غیر ارادی، الجھن گھبراہٹ، درد سر، مقلہ چشم کا مسلسل حرکت کرنا،

ہاتھ کا پھنا، متلی ابٹائی، دو تھوڑے دکانی دینا، ناک بہنا۔
احتیاط: حمل اور ایام رخصت میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکب

NEURONTIN

(PARKE DAVIS)

نیورن ٹین

PHENOBARBITONE

فینوباربیٹون

افعال و منافع: مرگی کے دوروں کو روکنے، بے خوابی، درد، بے چینی تسکین درد، شقیقہ، چکر آنا،
ناچنا کودنا، کالی کھانسی، دماغی اور جسمانی بے چینی اور کھجلی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: مرگی میں ۳۰ ملی گرام سوتے وقت اور صبح کو، تسکین درد کے لئے ۳۰ ملی گرام دن
میں ۳ بار نیند کے لئے ۶۰ سے ۱۰۰ ملی گرام سوتے وقت۔

منفی افعال: حمل، جگر کی خرابی، خون کی کمی، ضعف قلب و اعصاب میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: سستی کا بلی پیدا کرتی ہے۔ مریض عادی ہو جاتا ہے۔

احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ، وال پورک ایسڈ، پتھو
ٹریکسٹ گرائی سوفل وین کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

BEETAL

(INTAS) 10 Rs 2 60

بی ٹال
گارڈی ٹال

GARDENAL

(RHONE POULENC)

30mg. 10. Rs. 4 88, 60mg. 10. Rs 6.72

GAROIN

(RHONE POULENC) 10 Rs 6 85

کے روان
لومی ٹال

LUMINAL

(BAYER) 250. Rs. 21.59

لومی ٹالٹ

LUMINALET

(BAYER) 500 Rs. 10 11

فینوبارب ۳۰/۶۰

PHENOBARB 30/60

(INTAS) 60mg. 10. Rs 3 80

PRIMIDONE

پرائی می ڈون

افعال: یہ فیوہاربی ٹون کی طرح اثر کرتی ہے۔ ہر قسم کی مرگی کا دورہ روکنے اور اس کو ٹھیکین دینے اور نیند لانے میں مفید ہے۔ دورے پڑنا بھی کچلے لگنا عصبی درد کو روکنے میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۲۵ ملی گرام سوتے وقت ہر تیسرے دن مقدار بڑھائی جائے ۵۰۰ ملی گرام تک دے سکتے ہیں۔ مقدار کا تعین مرض اور مریض کے حالات کے مطابق کیا جائے۔

مضر اثرات: سستی کا بلی، نظام عصبی میں خلل، عادی ہونا، خون کی حالت غیر طبعی، خون کی کمی ہونا۔

احتیاط: حمل، ایام رضاعت، جگر، گردوں اور پیچھڑوں کے امراض میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دیگر دورہ روکنے والی دوائیں، کیو مارین مانع الجھاد خون، مانع حمل گولیاں اور شراب کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

MYSOLINE

(ICI) 10 Rs 20 30

مالی سولین

✓ SODIUM VALPORATE

سوڈیم وال پوریٹ

افعال: اس دوا سے گاما امینو پیوٹارک ایسڈ (Gaba) میں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے دورہ پڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کی مرگی کے دورے کو روکنے میں مفید ہے۔

مقدار: بالغوں کے لئے ۶۰۰ ملی گرام پیمہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے، مریض کے حالات اور مرض کے حساب سے ۲۰۰ ملی گرام ہر تیسرے دن اضافہ کر سکتے ہیں۔ بچوں کو ۲۰ سے ۵۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے کئی خود اکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی افعال: C/1 جگر کے امراض اور حاملہ عورتوں میں اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: وزن میں اضافہ، ہالوں کا گرنا، جسم کا پھول جانا، ورم ہانقراس، جگر فیل ہونا، اور عصبی امراض ہو سکتے ہیں۔

احتیاط: شدید مرگی میں Grand Mal، بچوں کو، دماغی طور سے کمزور اور ماؤف مریضوں کو بڑے

آپریشن کے دوران احتیاط برتیں، جگر کے افعال کی جانچ کراتے رہنا چاہیے، شکر کی جانچ کا نتیجہ غلط نکلنے پر احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: باربی ٹون اور دوسری دورہ روکنے والی دواؤں، ذائغہ ڈپریشن دواؤں کے ساتھ استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

ENCORATE	(SUN PHARMA)	10. Rs.14 95	ان کوہسٹ
EPILEX	(RECLITT & COLMAN)	10. Rs 14.50	ایپیلیکس ٹیبلٹ
EPILEX ORAL SOLN.	(RECLITT & COLMAN)	100ml. Rs 32 00	ایپیلیکس سرب
VALPARIN 250	(TORRENT)	10. Rs.12 90	والپارین
VALPARIN LIQUID	(TORRENT)	110ml. Rs.35 10	والپارین لکویڈ
VALPARIN ALKAETS	(TORRENT)	500mg. 10. Rs.35 90	والپارین الکیٹس
VALPROL	(INTAS)	200mg tabs 10. Rs.12 90	والپرول

TRIMETHADIONE

ٹرائی می تھادیون

افعال و منافع: شدید مرگی میں مفید ہے۔ اچانک کر جانا، دورہ پڑنا منہ سے جھاگ نکلنا، فینو باربی ٹون اور فین ٹائن کے ساتھ استعمال کرائی جاسکتی ہے۔

مقدار ترکیب: بالغوں کو ۹۰۰ ملی گرام سے ۲۱۰۰ ملی گرام تک ۳-۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے ضرورت پر ۳۰۰ ملی گرام ۴ ہون کے وقت سے اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ بچوں کو ۳۰۰ ملی گرام ۶ سال سے زائد عمر میں ۶۰۰ ملی گرام یومیہ ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

مضی افعال: C/I جگر اور گردوں کی خرابی میں۔ عصب ہا صرہ کی تکلیف میں استعمال نہ کرائیں۔
مضر اثرات: جلد پر داغ، معدہ میں بے چینی اور تکلیف، بصارت میں فرق، حلق میں خراشیں پڑ سکتی ہیں۔

احتیاط: خون کی جانچ خصوصاً ہیموگلوبین کی جانچ کراتے رہنا چاہیے۔

دافع قے اور چکر روکنے والی ادویہ

ANTI EMETICS & ANTI VERTIGO DRUGS

بٹاہسٹین ڈائی ہائیڈرو کلورائیڈ

BITAHISTINE DIHYDROCHLORIDE

افعال: یہ دوا کان میں خون کی رسد میں اضافہ کرتی ہے جس سے تغلیظ اور کان کے اندرونی حصہ کی عروق اور ساختوں میں زیادہ خون پہنچ کر کان کی اندرونی تکالیف کو دور کرتی ہے۔ یہ دوا چکر آنے کان بچنے، کم سنائی دینے، قے متلی کان کے درد اور منہ علامیہ میں مفید ہے۔
مقدار: ۸ ملی گرام دن میں ۳ بار مرض کے حالات کے مطابق دوا کی مقدار دیں۔ ۴۸ ملی گرام تک دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: اینس کی خرابی اور آنکھ میں پھلی پیدا ہونے میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: زخم معدہ اور ہضم کی خرابی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: حاملہ اور زخم معدہ کے مریضوں کو استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

VERTIN

(DUPHAR) 8mg tabs 50: Rs. 105.00

ورٹین

CINNARIZINE

سینارائی زین

افعال: یہ کان کے پردے اور متعلقہ اعضاء پر مسکن اثر کرتی ہے۔ چکر آنے، کان بچنے طنین و دوی

Tinnitus، سرگھومنا، سفری قے متلی Motion Sickness میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۳ سال سے زائد عمر والوں کو ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام بچوں کو ۱۲.۵ ملی گرام ۳ بار۔

منفی افعال: C/H دوا سے الرجک مریضوں میں اور حمل میں اس کا استعمال مناسب نہیں

مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، بے چینی، غنودگی، ہاضمہ کی خرابی، زیادہ دن استعمال سے دماغ ماؤف ہونا خشکی۔

احتیاط: لو بلڈ پریشر میں دوا کے دوران ڈرائیوری اور مشنری سے پرہیز۔

تجارتی مرکبات

CINTIGO (WALLACE)	25mg tabs 10	Rs 9 00	سن ٹائی گو
CINZAN (FDC)	10	Rs 11 00	سن زان
CINZAN 75MG (FDC)	75mg tabs 20	Rs 30 55	سن زان ۷۵ ملی گرام
DIZIRON (GLENMARK)	25mg tabs 10	Rs 9 19	ڈائی زی ران
STUGERON (ETHNOR)	25mg tabs 25	Rs 37 50	اسٹوگران
STUGERON FORTE (ETHNOR)	75mg tabs 20	Rs 66 00	اسٹوگران فورٹ
VERTIGON (GENO)	25mg tabs 10	Rs 9 42	ورٹی گان
VERTIGON-75 (GENO)	75mg tabs 10	Rs 19 15	ورٹی گان ۷۵

CYCLIZINE

سائی کلی زین

افعال: سفری قے Motion Sickness، چکر آنے، منرڈیزیز، کان میں ورم آپریشن سے قبل مخدرات، مسکنات اور منومات کے سبب ہونے والی قے متلی، ورم جگر، ورم معدہ کی بے چینی کو دور کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سال سے زائد عمر میں ۵۰ ملی گرام ۵ سے ۱۰ سال میں ۲۵ ملی گرام ۱ سے ۵ سال میں ۱۲، ۵ گرام دن میں ۳ بار سفری قے میں سفر سے اکھنڈ قبل کھلائیں۔
منفی افعال: C/1 دوا سے حساس مریضوں کو نہ دیں۔

مضر اثرات: جسم کپکپاتا، جگر میں ورم، وریڈی انجکشن سے صدماتی کیفیت ہونا۔
احتیاط: حالت حمل میں احتیاط برتیں، دوا کے دوران ڈرائیوری اور مشنری چلانا نہیں چاہیے۔

تجارتی مرکب

MARZINE (BURROUGHS WELLCOME)	50mg tabs 10	Rs 5 55	مارزائن
------------------------------	--------------	---------	---------

DIMENHYDRINATE

ڈائی من ہائیڈری میٹ

افعال و منافع: چکر آنا، سفری قے، متلی ابکائی، بکلی کا جھکا لگنے سے ہونے والی قے، آپریشن یا بیہوشی

کی دوا سے ہونے والی قے کان کی خرابی سے ہونے والی قے چکر آنا وغیرہ میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: بالعموم کو ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام ۶ سے ۱۲ سال کی عمر میں ۳۰ سے ۶۰ ملی گرام ۲ سے ۶ سال میں ۱۵ سے ۳۰ ملی گرام دن میں ۳ بار سفری قے کے لئے سفر سے اگھنٹہ قبل۔
 منفی افعال: C/1 دوا سے حساس افراد کو، حاملہ اور دودھ پلانے والی کو نہ دیں۔
 مضر اثرات: خشکی کرتی ہے۔

احتیاط: دوا کے استعمال کے بعد ڈرائیوری کرنا اور مشنری چلانے سے آگاہ کر دیں۔
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: انٹی بائیوٹک دواؤں کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

DRAMAMINE	(SEARLE) 50mg tabs 10: Rs.10.45	ڈرامامین ٹبلٹ
DRAMAMINE LIQUID	(SEARLE) 30ml Rs.6.65	ڈرامامین لکویڈ
GRAVOL	(WALLACE) 50mg tabs 10: Rs.9.95	گرے دول ٹبلٹ

DOMPERIDONE

ڈوم پیریڈون

افعال: دافع قے، معدہ کی تیزابیت کو معتدل کرنے والی دوا ہے، حرکات دودیہ کو ست کرتی ہے، مدہ کی تیزابیت سے پیدا ہونے والی متلی ابٹائی اور دوسری تکلیف کو آرام پہونچاتی ہے۔ ڈیپریٹیس کے سبب ہونے والی بد ہضمی، آپریشن، انفکشن، دواؤں غذاؤں نیز ریڈیو تھیراپی سے ہونے والی قے متلی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۰ ملی گرام دن میں تین بار کھانے سے ۱۵-۲۰ منٹ قبل اور سوتے وقت دی جائے۔
 منفی افعال: C/1 حالت حمل اور ایک سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ دی جائے۔
 مضر اثرات: معمولی درد شکم محسوس ہو سکتا ہے۔

تجارتی مرکبات

DOMPERON	(ALIDAC) 10mg tabs 10: Rs.16.70	ڈوم پرین
DOMPERON DROPS	(ALIDAC) 30ml:Rs.16.50	ڈوم پرین ڈراپس
DOMSTAL	(TORRENT) 10mg tabs 10: Rs.19.90	ڈومسٹال

DOMSTAL SUSP	(TORRENT) 30ml : Rs.20.90	ڈومستال سرپ
ENDOPACE	(THEMIS PHARMA)	انڈوپیس
10mg tabs 10 tabs: Rs.18.16		
ENDOPACE SUSP	(THEMIS PHARMA)	انڈوپیس سرپ
GASTRACTIVE	(ETHNOR) 50ml: Rs.118.00	گیس ٹریکٹو
GASTRIUM	(MICRO LABS)	گیس ٹریم
GASTRIUM SUSP	(MICRO LABS)	گیس ٹریم سرپ
MOTINORM	(MEDLEY) 10mg tabs 10: Rs.17.60	موٹینارم
MOTINORM SYRUP	(MEDLEY) 30ml: 16.80	موٹینارم سرپ
NAUSIDOME	(BOOTS) 10mg tabs 10: Rs.20.00	نازی ڈوم ٹیبلٹ
NAUSIDOME SUSP	(BOOTS) 30ml: Rs.15.00	نازی ڈوم سرپ
NORMETIC	(LUPIN) 10mg tabs 10: Rs.15.90	نارے ٹک
NORMETIC SUSP	(LUPIN) 30ml: Rs.16.90	نارے ٹک سرپ
NORMODIL	(MEJDA) 10mg tabs 10: Rs.14.85	نارموڈیل
NORMODIL SUSP	(MEJDA) 30ml: Rs.11.65	نارموڈیل سرپ
PERIM	(KANPHA)	پیریم ٹیبلٹ سرپ
10: Rs.14.22; 30ml: Rs.17.03		

MECLIZINE HCL میک لائی زین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال: یہ مسکن اور دافع حساسیت اثر رکھتی ہے۔ حاملہ کی قے روکنے کی مخصوص دوا ہے۔ صبح کو ہونے والی قے، حمل کے سبب خرابی ہضم مرعہ آپریشن کے بعد ہونے والی قے، متلی ابکائی، ریڈیو تھیراپی کے بعد ہونے والی قے، سفری قے دماغی الجھن کے سبب ہونے والی قے متلی ابکائی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام سوتے وقت کلائیں۔

متنی افعال: C/1 بچوں کو دینا مناسب نہیں۔

معثر اثرات: خشکی کرتی ہے۔

احتیاط: اس کے استعمال کے بعد ڈرائیوری کرنا اور مشنری چلانا منع ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب کے ساتھ معثر ہے۔

تجارتی مرکبات

DILIGAN	(UNI-UCB)	ڈالی گان
Mecizine Hcl 12.5mg Nicotinic acid 50mg tabs 10:	Rs.7.75	
PREGNIDOXIN	(UNI-UCB)	پریگنی ڈاکسن
Mecizine Hcl 25mg Caffeine 20		
PREGNIDOXIN	(UNI-UCB)	پریگنی ڈاکسن
Mecizine Hcl 25mg Caffeine 20mg tabs 10:	Rs.7.50	

METOCLOPRAMIDE

میٹاکلوپرورامائیڈ

افعال: یہ دوا غذائی نالی کی حرکات کو کنٹرول کرتی ہے۔ شدید سقے، متلی ابکائی اور معدہ کے درد میں مفید ہے آنتوں سے فضلات کو جلد خارج کرتی ہے۔

مقدار: ہالٹوں کو ۱۰ ملی گرام یومیہ دن میں ۳ بار بچوں کو آدھ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے۔

منفی افعال: C/1 معدہ آنتوں سے جریان خون تسد، یا سوراخ ہونا، مرگی، بصارت میں فرق اور دوا سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: خشکی پی اچھلنا، منہ خشک ہونا، حرکات غیر ارادی، چہرے اور گردن کی عجیب و غریب حرکات جڑوں کا بند ہونا، دودھ کی پیدائش میں زیادتی۔

احتیاط: حمل، ایام رضاعت اور گردوں کی خرابی میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: جگر کے انزائم کو روکنے والی ادویہ، Anti Cholinergic, Mao, Inhibitor اور فینوتیازین کے ساتھ نہ دی جائے۔

تجارتی مرکبات

EMENIL	(ASTRA-IDL) 10ml:	Rs.5.93	ایمیل انجکشن
MATOCOL MPS	(PFIMEX) 100ml:	Rs.18.75	میٹوکول ایم۔ پی۔ ایس
MAXERON	(WALLACE) 10ml vial:	Rs.7.25	میکسی ران
MAXERON MPS	(WALLACE) 10 tabs:	Rs.7.55	میکسی ران ایم پی ایس

METOCONTIN	(MODI-MUNDI PHARMA)	میٹو کون ٹین
10: Rs.10.55		
METOPAR	(CFL PHARMA) tabs: Rs.4.90	میٹوپار
METOPAR SUSP	(CFL PHARMA) 60ml: Rs.8.75	میٹوپار سرب
NAUSIFAR-MPS	(INFAR) 100ml gel: Rs.24.85	نوسی فار ایم پی ایس
PARAMET	(WALLACE) 10: Rs.48.85	پیرامٹ
PARAMET SUSP	(WALLACE) 60ml: Rs.8.75	پیرامٹ سرب
PERINORM	(IPCA) 10mg: 10: Rs.4.75	پیری نارم
PERINORM INJ	(IPCA) 10ml: Rs.4.75	پیری نارم انجکشن
PERINORM LIQUID	(IPCA) 30ml: Rs.6.81	پیری نارم لکویڈ
PROPAMID MPS	(CFL) 10: Rs.7.75	پروپامڈ ایم پی ایس
PROPAMID MPS GEL	(CFL) 100ml: Rs.23.60	پروپامڈ ایم پی ایس جیل
REGLAN	(CFL) 10mg: tabs 10: Rs.4.55	ریگلان
REGLAN INJ	(CFL) 10ml: Rs.7.95	ریگلان انجکشن
REGLAN SYRUP	(CFL) 30ml: Rs.6.90	ریگلان سرب
SIGMET	(SIGMA LABS)	سیگ میٹ
10mg: tabs: 10: Rs.4.82		سیگ میٹ انجکشن
SIGMET INJ	(SIGMA LABS)	
10ml vial: Rs.7.50		
TAGRID	(CORE) 10mg tabs 10: Rs.4.20	ٹاگرڈ
TOMID	(GUFIC)	ٹومڈ
10mg tabs; 10: Rs.4.: syrup 5mg per ml 30ml Rs.5.25		

اونڈان سٹرون ہائیڈروکلورائیڈ **ONDAN SETRON HCL**

افعال: تے متلی، ریڈیو تھیراپی، اور انٹی ٹاکسین سے ہونے والی تے و متلی میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۸ ملی گرام وریدی انجکشن آہستہ آہستہ لگائیں، یا ۳۲ ملی گرام ۱۰۰ ملی لیٹر نارمل سیالمن میں ملا کر آہستہ آہستہ ۱۵ منٹ میں چڑھائیں خوردنی طور سے ۸ ملی گرام دن میں ۲ بار۔
 متقی افعال: C/1 حساس مریضوں کو اور ایام رضاعت میں استعمال نہ کرائیں۔
 مضر اثرات: قبض درد سر، چہرہ سرخ ہونا، جگر کے افرات میں اضافہ۔

احتیاط: حالت حمل میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

EMESET	(CIPLA) 8mg: 6 tabs Rs.84.00	ایک سیٹ انجکشن
EMESET INJ	(CIPLA) 4ml: Rs.40.10	ایک سیٹ انجکشن
ONCODEN	(TIDE) 8mg: 10: Rs.126.90	آن کوڈین انجکشن
ONCODEN INJ	(TIDE) 2ml: Rs.22.00	آن کوڈین انجکشن

PROCHLORPERAZINE

پروکلورپیرازین

افعال: درد شقیقہ منرڈیزیز، کان کے اندرونی حصہ کی خرابی، نفسیاتی الجھن اس کا تزو فرینیا Schizo Phrenia تنہائی پسندی، شدید قے، متلی ابکائی میں مفید ہے۔

مقدار: ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار یا ۵، ۲ ملی گرام کا گہرا عضلاتی انجکشن لگائیں۔

منفی اثرات: C/1 کمزور تخمیف لاغر مریضوں اور جگر کی خرابی میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: لو بلڈ پریشر، خشکی، نیند کی کمی، جلد پر داغ پڑنا کبھی حرکات غیر ارادی کرنا۔

احتیاط: لو بلڈ پریشر میں مرگی، جگر کی خرابی، حمل، ایام رضاعت، امراض قلب، تسدد امعاء میں احتیاط برتنیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، عصبی نظام کو نقصان پہنچانے والی ادویہ اور الفا بلا کر کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

EMIDOXYN	(KALLIS) 5mg tabs 10: Rs.7.86	ایک ڈاکسن
STEMETIL	(RHONE POULENC)	اسٹیمیٹیل
5mg: 10: Rs.7 10, 25mg: 10: Rs.11.44		
STEMETIL INJ	(RHONE POULENC)	اسٹیمیٹیل انجکشن
10 amps: Rs.41.00 10ml vial Rs.20.07		

پرومیٹھازین تھیوکلایٹ PROMETHAZINE THEOCLATE

افعال: سفری تے متنی ابکائی، بد ہنسی کانوں میں خرابی کے سبب ہونے والی تے، درد شقیقہ، ریڑھ تھیراپی کے سبب ہونے والی تے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سال سے زائد عمر والوں کو ۲۵ ملی گرام سوتے وقت ۱۰ سے کم عمر والوں کو نصف مقدار سفری تے کے لئے گھنٹہ قبل از سفر کھلائیں۔

منفی افعال: C/1 حساس مریضوں کو نہ کھلائیں۔

مضر اثرات: خشکی پیدا کرتی ہے۔

احتیاط: دوا کے استعمال کے بعد مشنری چلانے اور ایوری کرنا منع ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب نظام عصبی کو کمزور کرنے والی دواؤں کے ساتھ نہ دیں۔

تجاتی مرکبات

AVOMINE

(RHONE POULENC)

اسدومن

25mg tabs 10 tabs Rs. 7.56

PHENA KID

(SWIFT) 115ml Rs 11 98

فیناکڈ

PHENA P

(SWIFT) 50ml Rs 16 98

فینا بی

PHENA INJ

(SWIFT) 2ml amp Rs 3 90

فینا انجکشن

PROMASUN

(SUN PHARMA)

پروماسن

ٹرائی فلو پرومے زائن ہائیڈروکلورائیڈ

TRIFLUO PROMAZINE HCL

افعال: تے متنی بے چینی، تناؤ نفسیاتی الجھن اور تسکین کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۲۰ سے ۵۰ ملی گرام روزانہ وریڈی ۱ سے ۳ ملی گرام عضلاتی ۵ سے ۱۰ ملی گرام لگائیں۔

منفی افعال: C/1 غنودگی کی حالت، بے ہوشی جگر کی خرابی اور دماغ کے ماؤف ہونے میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: نظام عصبی میں خلل، سستی کاہلی، لو بلڈ پریشر خون کے تناسب میں فرق بصارت میں

فرق جگر کے افرازات میں کمی ہو سکتی ہے۔ گہری نیند آتا۔

احتیاط: معمر افراد میں، امراض قلب میں، پارکنسن ڈیزیز میں حمل رضاعت اور مرگی میں اور زیادہ مقدار میں دینے سے احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصمی کوست کرنے والی دواؤں کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

SIQUIL

(SARABHAI) 10mg: 10: Rs.7.43

سکونل ٹیبلٹ
سکونل انجکشن

SIQUIL INJ

(SARABHAI)

1ml: Rs.4.93 10ml vial: Rs.13.93

دافع پارکنسنز دوائیں

ANTI PARKIN SON DRUGS

AMANTA DIN

امان ٹاڈین

افعال: پارکنسن علامیہ ہاتھ پیر کپکپانا، چہرہ بے رونق، اواز باریک اور آہستہ ٹکنا، عضلات پھڑکنا، سر اور جسم آگے کو جھک جانا انگوٹھے ہتھیلی سے لگ جانا گھٹنے مڑ جانا، مریض کا لڑکھڑا کر چننا کبھی گر جانا، جسم میں سونیاں چبھنا، گرمی کا احساس ہونا، دماغی درم Ince Phalitis کے بعد ہونے والا پارکنسن علامیہ میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۰۰ ملی گرام روزانہ ناشتہ کے بعد ۵ سے ۷ دن بعد کوئی افاقہ نہ ہو تو دوپہر کے کھانے کے بعد ۱۰۰ ملی گرام اور دینا چاہیے۔

منفی افعال: C/1 دوا سے حساس مریضوں کو اور حالت حمل میں نہ دی جائے۔

احتیاط: اگر دماغی عروق میں تسد ہو، نفسیاتی بیماریاں اور مرگی کی ہسٹری پائی جاتی ہو تو اس کو استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکب

AMANTREL

(PROTEC) 10: Rs.30.00

امان ٹرل

BENZ HEXOL HCL

بنز ہکسول ہائیڈروکلورائیڈ

افعال: جسم کا ہلکا، غیر ارادی حرکات، ناپچنے کودنے ریسرچین، فینو تھیازین کی خراب علامات میں مفید ہے۔

منفی افعال: کوما، غنودگی، بے ہوشی، جگر کے امراض، مخ العظام کی خرابی، ضعف و اضمحلال میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: خشکی، بصارت میں فرق، چکر آنا متلی، الجھن گھبراہٹ۔

احتیاط: مسمر افراد میں شرائین کی سختی، وجع القلب میں اور طویل مدت تک علاج سے احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

BENZYDOL-5

(LA PHARMA)

بنزائی ڈول۔ ۵

Haloperidol 5mg Benzhexol 2mg tabs 10: Rs.12.91

PARNON

(SIGMA LABS) 2mg: tabs: 10: Rs4.54

پارنن

BIPERIDEN HCL

بائی پری ڈین

افعال: نظام عصبی پر دباؤ، پارکنسن علامیہ، دواؤں کے اثرات سے ہونے والی غیر ارادی اور غیر طبعی حرکات دماغی چوٹ، صدمات سے ہونے والی غیر ارادی حرکات و رد شقیقہ کو ٹھین کے اثرات بد میں مفید ہے۔

مقدار: اعلیٰ گرام ۲ سے ۳ مرتبہ یومیہ رفتہ رفتہ مقدار بڑھائی جائے ۴ ملی گرام تک دے سکتے ہیں ۲ سے

۵ ملی گرام عضلاتی یا آہستہ وریدی شدید حالتوں میں ۱۰ سے ۲۵ ملی گرام عضلاتی یا وریدی بہت آہستہ۔

منفی افعال: C/1 گلو کوما اور آنتوں کی خرابی میں نہ دی جائے۔

مضر اثرات: خشکی، بصارت میں فرق پیشاب میں کمی یا رکاوٹ ورم غدہ قدامیہ منہ خشک رہنا۔

احتیاط: وجع القلب، دورہ پڑنے کا رجحان، حمل، دورم غدہ قدامیہ میں احتیاط برتیں۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: نظام عصبی کو کمزور کرنے والی اودیہ پارکنسن دواؤں کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

DYSKINON	(BOEHRINGER-M) 10: Rs. 16.50	ڈس کے نین ٹیلیٹ
DYSKINON INJ	(BOEHRINGER-M)	ڈس کے نین انجکشن
5mg per ml; Rs. 9.86		

BROMOCRIPTINE

برومو کریپ ٹین

افعال: پارکنسن ڈیزیز، بندش حیف، دودھ کی زیادتی جو رتوں کی ہانچہ پن میں مفید ہے۔
مقدار: ۲۵ ملی گرام روزانہ ہمراہ غذا، ۱۳ سے ۲۸ دن بعد ۵۰ ملی گرام کر دینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ ملی گرام یومیہ دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: قے متلی، درد سر، قبض چکر آنا، لوہلڈ پریشر اور خشکی۔

احتیاط: جو عورتیں حاملہ ہونا نہ چاہتی ہوں، حمل کے دوران، زخم معده ذیابیطیس جگر اور گردوں کے امراض میں اس کا استعمال احتیاط سے کریں دوا کے دوران ڈرائیوری کرنا مشنری چلانا نہیں چاہیے۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب اور ارگٹ کے مرکبات کے ساتھ اس کا استعمال نہ کریں۔

تجارتی مرکبات

BROM-INGA	(INGA) 10: Rs. 70.77	بروم انگا
PRAVIDEL	(SANDOZ)	پراویڈیل
PROCTINAL	(BIDDLE SAWYER)	پراکٹینال
2.5mg: 10: Rs. 107.50		
SEROCRYPTIN	(SERUM INSTITUTE)	سرو کریپ ٹین
2.5mg tabs 2x5; 110.00		

CARBIDOPA

کاربی ڈوپا

افعال: پارکن سز کی علامات میں مفید ہے۔

مقدار: بالغوں کو ۲۵ ملی گرام ۱۰۰ گرام لوڈوپا کے ساتھ دی جائے عموماً دونوں کا مرکب ملتا ہے۔

منفی اثرات: گلوکوما میں اور جلد کے امراض میں دینا نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: متلی، قے، بھوک کی کمی، بلڈ پریشر کم ہونا، حرکات غیر ارادی ہونا پیشاب کی رنگت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: دواؤں کے امراض میں مزمن گلوکوما میں۔ بیہوشی کی حالت میں دمہ بلغمی میں جگر گردوں کے امراض میں، زخم معدہ کی ہسٹری میں، حمل ایام رضاعت میں ۱۸ سال سے کم عمر میں، احتیاط رکھیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ، فیرس سلفیٹ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

SYNDOPA 275	(SUN PHARMA) 10: Rs.60.21	سن ڈوپا ۲۷۵
SYNDOPA 110	(SUN PHARMA) 10: Rs.31.50	سن ڈوپا ۱۱۰
SYNDOPA PLUS	(SUN PHARMA) 10: Rs.53.97	سن ڈوپا پلس
TIDOMET FORTE	(TIDE) 10: Rs.52.55	ٹڈومت فورٹ
TIDOMET PLUS	(TIDE) 10: Rs.49.20	ٹڈومت پلس
TIDOMET L.S.	(TIDE) 10: Rs.32.00	ٹڈومت ایل ایس

LEVODOPA

لوڈوپا

L. DI HYDROXY

ایل ڈی ہائیڈروکسائی

PHENYL ALAMINE

فینائل ایلامین

افعال: ہر قسم کے پارکن سین علامیہ میں دماغی ورم انسٹلائی ٹس تسد عروق دواؤں کے اثر سے ہونے والی پارکن سن کی علامات میں مفید ہیں۔

مقدار: پہلی خوراک ۵۰۰ ملی گرام یومیہ ہر ہفتہ ۲۵۰ ملی گرام کا اضافہ کیا جائے ۳ گرام تک دے سکتے

منفی افعال: C/1 شدید عوارض میں، گلوکوما اور مہلک رسولیوں میں دینا منع ہے۔
 مضر اثرات: متلی تے، عدم اشتہا، لو بلڈ پریشر نظام عصبی میں خلل، حرکات غیر ارادی پیشاب کا
 رتقین ہونا۔
 احتیاط: قلب و جگر گردوں اور پھیپھڑوں اور امراض قد و میں، زخم معدہ گلوکوما، اور حمل میں احتیاط
 برتیں۔
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ، پائی ری ڈاکسن اور فیرس سلفیٹ کے
 ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

BENSPAR	(ALIDAC) 10: Rs.45.22	بن سار
BIDOPAL	(BIDDLE SAWYER)	بڈوپال
500mg tabs 10: Rs.24.48		
LEVODOPA AND CARBIDOPA TABS	(NEON)	لوڈوپا اینڈ کاربی ڈوپا
LEVOPA	(WALLACE) 500mg 10: Rs.26.00	لوڈوپا
PARKIMET 275	(BIDDLE SAWYER) 10: Rs.59.85	پارکی میٹ ۲۷۵
SYNDOPA 275	(SUN PHARMA) 10: Rs.60.21	سن ڈوپا ۲۷۵
SYNDOPA 110	(SUN PHARMA) 10: Rs.31.50	سن ڈوپا ۱۱۰
SYNDOPA PLUS	(SUN PHARMA) 10: Rs.53.97	سن ڈوپا پلس
SYNDOPA CR	(ALBERT DAVID) 10: Rs.100.00	سن ڈوپا سی آر
TIDOMET FORTE	(TIDE)	ٹڈومیٹ فورٹ
Levodopa 250mg carbidopa 25mg tabs; 10: Rs.52.55		
TIDOMET L.S.	(TIDE) 10: Rs.32.00	ٹڈومیٹ ایل ایس
TIDOMET PLUS	(TIDE) 10: Rs.49.20	ٹڈومیٹ پلس

ORPHENADRINE HCL آرفیناڈرین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال: پارکنسن ڈیزیز، دواؤں کے اثر سے ہونے والی پارکنسن علامیہ میں مفید ہے۔
 مقدار: ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار، تیسرے دن ۵۰ ملی گرام کا اضافہ کیا جائے زیادہ سے زیادہ ۴۰۰ ملی
 گرام ہوسکتے ہیں۔

منفی افعال: گلوکوما، ضعف و نقاہت، ورم غدہ قدامیہ میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: جگر اور معدہ کی رطوبات کی پیدائش میں کمی، دماغی الجھن، غصہ زیادہ مقدار میں نقصان دہ ہے۔ جلد پر داغ پڑ سکتے ہیں۔

احتیاط: معدہ اور امعاء کے تسد میں، اور امراض قلبیہ میں احتیاط برتیں، دوا آہستہ آہستہ بند کریں۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: فینوتھیزین، دافع حساسیت، مسکن دماغ ادویہ کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

ORPHAMOL (TORRENT) 10: Rs.7.50 اور قامول
ORPHAMOL FORTE (TORRENT) 10: Rs.10.50 اور قامول فورٹ
ORPHIPAL (BIDDLE SAWYER) 50mg tabs 10: Rs.12.90 آر پی پال

PROCYCLEDINE HCL پرو سائیکلی ڈین ہائیڈرو کلورائیڈ

افعال: یہ ایک مانع افزا دوا ہے ہر قسم کے پارکنسن میں مفید ہے۔

مقدار: ۲.۵ ملی گرام ۳ بار کھانے کے بعد ۳ دن بعد ۲.۵ ملی گرام کے حساب سے اضافہ کیا جائے
زیادہ سے زیادہ مقدار خوراک ۳۰ ملی گرام

منفی افعال: C/1 حرکات ارادی خلل

مضر اثرات: مانع افزا اثرات معدہ و جگر، زیادہ مقدار میں دینا مضر ہے۔

احتیاط: گلوکوما، حمل ورم غدہ قدامیہ، امراض قلبیہ میں۔ دوا آہستہ آہستہ بند کریں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: فینوتھیزین، انٹی ہشامین اور مسکن دماغ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

KEMADRIN (BURROUGHS WELLCOME) کیماڈرین
2.5mg, 10: Rs.7.11

SELEGILENE HCL

سیلی گی لین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: پارکن سن ڈیزیز میں مفید ہے۔ اس کو تنہا یا لوڈ وڈپا کے ساتھ استعمال کرایا جاتا ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱۰ ملی گرام صبح کو ایک خوراک ناشتہ کے بعد یا دو خوراکیوں میں تقسیم کر کے ناشتہ اور
دوپہر کے کھانے کے بعد۔

منفی افعال: C/1 وہ مریض جن کو دورے پڑتے ہوں، اور بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔
مضر اثرات: لو بلڈ پریشر، حرکات غیر ارادی، متلی الجھن گھبراہٹ نفسیاتی عوارض۔
احتیاط: حمل، لیام رضاعت اور ۱۶ سال سے کم عمر والوں کو نہیں دینا چاہیے۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: مہرڈین اور Maol کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

ELDEPRYL	(THEMIS CHEMICALS)	ایل ڈپرائل
10mg: 10: Rs.65.80		
ELEGELIN	(SUN PHARMA) 5mg tabs: 10: Rs.35.00	ایلی کے لن
JUMEX	(TORRENT) 5mg tabs 10: Rs.39.00	جو میکس
SELGIN TABS	(INTAS) 5mg 10: Rs.35.30	سیل گن ٹبلٹ
SELERIN-5	(PROTEC) 5mg: tabs: 10: Rs.24.00	سلی رین

ٹرائی ہگزائی فینائیڈل ہائیڈروکلورائیڈ

TRIHXY PHENIDYL HCL

افعال: پارکن سن ڈیزیز کے علاج میں دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر دی جاتی ہے۔
مقدار: پہلے دن ۱۰ ملی گرام ہر تیسرے دن ۱۰ ملی گرام کا اضافہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ۶ سے ۱۰ ملی گرام
کھانے کے ساتھ استعمال کرائی جائے۔

منفی افعال: C/1 گلوکوما میں آلات ہضم اور آلات بول کے تسد دورم غدہ قد امیہ میں دینا منع ہے۔
مضر اثرات: منہ خشک، بصارت میں فرق، پکر آنا، معمولی متلی بے چینی، قبض پیشاب میں تنگی یا
رکاوٹ، وجع القلب تپکی کا پھیل جانا، آنکھوں میں تناؤ دوسرا الجھن بکواس کرنا

احتیاط: معمر افراد میں، تھلب شرائین کے مریضوں اور وجع القلب کے مریضوں میں احتیاط برتنی۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: فینوتھیزین انٹی ہشامین اور مسکن دماغ ادویہ کے ساتھ اس کا استعمال
مضر ہے

تجارتی مرکبات

BEXOL	(INTAS) 2mg tabs 10: Rs.3.50	بکسول
COMBIDOL-1.5	(INTAS) 10: Rs.5.20	کبیدی ڈول ۱.۵
COMBIDOL-5	(INTAS) 10: Rs.11.00	کبیدی ڈول ۵
COMBIDOL-10	(INTAS) 10: Rs.18.00	کبیدی ڈول ۱۰
EMETIL PLUS	(LA PHARMA) 10 tabs; Rs.11.40	ایمی ٹیل پلس
EMETIL DS	(LA PHARMA) 10 tabs; Rs.18.00	ایمی ٹیل ڈی ایس
HEXIDOL	(TORRENT) 10: Rs.6.90	ہیکسی ڈول
HEXIDOL PLUS	(TORRENT) 10: Rs.18.90	ہیکسی ڈول پلس
HEXIDOL FORTE	(TORRENT) 10: Rs.21.31	ہیکسی ڈول فورٹ
HEXINAL	(TORRENT) 10: Rs.2.73	ہیکسینال
LACALM PLUS	(LA PHARMA) 10: tabs: Rs.5.00	لاکالم پلس
LACALM FORTE	(LA PHARMA) 10: tabs: Rs.8.50	لاکالم فورٹ
LAHEXY	(LA PHARMA) 10: Rs.3.00	لاہیکسی
NEOCALM PLUS	(INTAS) 10 tabs Rs.3.80	نیو کالم پلس
NEOCALM FORTE	(INTAS) 10 tabs Rs.9.60	نیو کالم فورٹ
PACITANE	(LEDERLE) 10: Rs.7.40	پاسی ٹین
PARKIN	(MICRO LABS)	پارکین
TRAZINE-H	(SUN PHARMA) 10 tabs Rs.3.19	ٹرازائن ایچ
TRAZINE-SC	(SUN PHARMA) 10 tabs Rs.7.99	ٹرازائن ایس سی
TRINICALM PLUS	(TORRENT) 100 tabs Rs.39.00	ٹرائیکالمنی کالم پلس
TRINICALM FORTE	(TORRENT) 100 tabs Rs.55	ٹرائیکالمنی کالم فورٹ
TRINORM-1.5	(SUN PHARMA)	ٹرائیکالمنی نارم ۱.۵
Trihexyphenidyl hcl 2mg, haloperidol 1.5mg tabs; 10 tabs Rs.9.55		ٹرائیکالمنی نارم ۵
TRINORM-5	(SUN PHARMA) 10 tabs Rs.19.50	ٹرائیکالمنی نارم ۱۰
TRINORM-10	(SUN PHARMA) 10 tabs Rs.28.00	ٹرائیکالمنی نارم ۱۰
TRIPHEN	(SUN PHARMA) 10: Rs.3.06	ٹرائیکالمنی فین

TRIPHENAZIN (SUN PHARMA) 10 Rs 7 67

ٹرائی فینازین

PIRIBEDIL

پائی ری بی ڈل

افعال: پارکنسن ڈیزیز میں مفید ہے۔ دماغ اور حافظہ کی کمزوری چکر آنا، دماغی چوٹ صدمات میں مفید ہے۔

مقدار: ۵۰ سے ۲۰۰ ملی گرام روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے، مرض کی کیفیت اور دوا کے اثرات کے مطابق دوا کی مقدار میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

منفی افعال: C/1 شدید قلبی دباؤ، وجع القلب، ہارٹ ایک حالت حمل میں نہیں دینا چاہیے۔

مضرات: نظام ہضم میں معمولی خلل

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈوپامائی نرجک اور انٹاگونسٹ دواؤں کے ساتھ نہ دی جائے۔

تجارتی مرکبات

TRIVASAL L.A.

(SERDIA)

ٹرائی وصال۔ ایل۔ اے

Piribedil 50mg, tabs 10 Rs 130 81

دافع بخار اور مسکن درد دوائیں

ANTIPYRETICS and ANALGESIC

دافع درد وہ ادویہ ہیں جو اپنی خاصیت سے دماغ کے درد محسوس کرنے والے حصے کے احساس کو کم کر دیتی ہیں۔ دافع بخار ادویہ جسم کے درجہ حرارت کو قائم رکھنے والے مرکز پر اثر انداز ہو کر اس کی زائد حرارت کو دور کرتی ہیں۔

ANALGIN

اتالجنین

افعال: ایک دافع بخار مسکن درد دوا ہے ہر قسم کے درد، بخار، درد سر جسم کے کسی حصہ میں ہونے والے درد گتھیائی بخار اور عصبی درد کمر کے درد میں مفید ہے۔

مقدار: ۵۰۰ ملی گرام سے اگرام ہر ۸ گھنٹہ بعد انجکشن عضلاتی اگرام دن میں ۲ بار۔
 منفی افعال: پائی روزنوں سے حساس مریضوں میں نبض ضعیف دوران خون ست اور جگر کی کمزوری
 میں، ۳ ماہ یا ۵ کلو وزن سے کم بچوں کو نہ دی جائے۔
 مضر اثرات: خون میں سفید ذرات کی کمی، صدمہ کی کیفیات، ری ایکشن پیشاب سرخ، ہنڈ پر اثر کم
 ہونے کی کیفیت ہو سکتی ہے۔
 احتیاط: خون کے سفید ذرات کی جانچ کراتے رہیں۔ حمل اور نفٹ الدم (خون تھوکنے) میں نہیں دینا
 چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب اور سائیکلو سپورین کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

COMPAIN TABS	(REMEDIES (INDIA) 10: Rs 4 76	کم پین
CENOLGIN SYRUP	(CARMINOL) 60ml 7.50	سی ٹو جین سرب
DOLOPAR	(MICRO LABS) 10: Rs 5.60	ڈولوپار
DOLOPAR SYRUP	(MICRO LABS) 60ml Rs 13.80	ڈولوپار سرب
KANAMOL	(KENT)	کانامول
OXALGIN	(CADILA) 10 Rs 7 62	اوکسالجین
PROMALGIN	(UNILIDS) tabs, 10. Rs 2 76	پرومال جین
TOLAGIN	(PHARMED) 10. Rs. 6.80	ٹولاجین
TROMALGIN	(LA PHARMA) 10: Rs 4 71	ٹرومال جین
ULTRAGIN SYRUP	(MANNERS) 60ml: Rs 8 39	الٹرا جین سرب
ZIMALGIN	(RALLIS) 10: Rs. 5.49	زیمالجین

OPIOIDS

افیون کے مرکبات (دافع درد)

بوپری نارفین ہائیڈروکلورائیڈ BUPRENORPHINE HCL

افعال: وجع القلب ہر قسم کے درد، آپریشن سے قبل اور بعد کو ہونے والے درد میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۵.۳ ملی گرام عضلاتی یا بہت آہستہ وریدی لگائیں، ۱۰ انجکشن ۸ گھنٹہ بعد دوبارہ

لگا سکتے ہیں زبان کے نیچے رکھ کر چوسنے والی گولی ۵.۲ ملی گرام ہر ۸ گھنٹہ بعد، گولی چبا کر یا نگل کر نہیں لینا چاہیے۔

مضر اثرات: خشکی منہ کی کثرت سانس لینے میں کبھی کبھی تکلیف ہونا۔
احتیاط: نظام تنفس کی کمزوری میں کمزور اور ناتواں مریضوں میں، دوا کے دوران ڈرائیوری اور مشنری چلانے سے احتیاط برتن۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: مرکزی نظام عصبی کو کمزور کرنے والی اور Maol کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

NORPHIN	(UNICHEM) 2ml Rs.8.49	نارفین انجکشن
PENTOREL	(KHANDELWAL) 2ml: Rs.72.65	پن ٹورل
TIDIGESIC	(TDPL) 10: Rs.21.22	ٹائی ڈی جے سک

CODIEN PHOSPHATES کوڈین فاسفیٹ

افعال: ہر طرح کے درد سر کا درد دانت درد پیٹھ کا درد عصبی اور عضلاتی درد اور خشک کھانسی کو روکنے میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۵ ملی گرام دن میں ۳-۴ بار۔
مضر اثرات: غنورگی خشکی، قبض، بے چینی، الجھن، گھبراہٹ تے منگی ہو سکتی ہے۔
احتیاط: دوا کے دوران مشین چلانا اور ڈرائیوری منع ہے۔

DEXTRO PROPOXYPHENE ڈیکسٹرو پروپاکسی فین

افعال: انفون کے جڑ سے تیار کردہ مسکن درد دوا ہے مرکزی نظام عصبی پر اثر کر کے درد کو سکون پہونچاتی ہے۔ معمولی اور شدید دردوں پیٹھ کے درد، درد سر، درد شقیقہ، دانتوں کے درد، موج، چوٹ، فریکچر، ہڈیوں کے درد آپریشن کے بعد ہونے والے درد کینسر کے درد اور عضلات کے درد میں مفید ہے۔
مقدار: بالغوں کو ۶۵ ملی گرام دن میں ۳ سے ۴ بار۔

متفی افعال: حمل، جگر گردوں کے امراض میں استعمال نہ کرائیں۔

مضراثرات: چکر آنا، نیند آنا، غنودگی، قے، متلی، قبض درد شکم جلد پر داغ کمزوری بصارت میں فرقہ
احتیاط: دور در روکنے والی انٹی ڈپریشن، دارفین، منوم مخدر اور نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی دواؤں کے
ساتھ احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

ANADIX	(CONCEPT) 12: Rs.7.82	اناڈیکس
BREN-PX	(KOPRAN) 10: Rs.12.48	برین پی ایکس
BUTAPROXYVON	(WOCKHARDT) caps 8: Rs.8.40	بیوٹا پراکسیون
CORBUTYL	(ROUSSEL) 20 tabs: Rs.18.72	کاربوٹائل
PARVON	(JAGSONPAL) caps: 10: Rs.10.75	پارون
PARVON-N	(JAGSONPAL) 100: Rs.50.00	پارون-این
PARVON SPAS	(JAGSONPAL) caps: 10: Rs.12.30	پارون اسپاس
PARVON FORTE	(JAGSONPAL) 10: Rs.17.30	پارون فورٹ
PROXYTAB	(WOCKHARDT) tabs: 10: Rs.6.71	پراسکی ٹیب
PROXYVON	(WOCKHARDT) 8: Rs.9.05	پراسکیون
SPASMO PROXYVON	(WOCKHARDT) 8: Rs.9.70	اسپازمو پراسکیون
SUBDU	(U.S. VITAMIN) 8: Rs.7.02	سب ڈیو
SUDHINOL	(RANBAXY) tabs 10: Rs.11.50	سدمی ٹال
SYSTAFLAM	(SYSTOPIC) 10: Rs.14.00	سیسٹا فلیم
WALAGESIC	(WALLACE) 10: Rs.11.30	والے جے سک
WYGESIC	(WYETH) 10: Rs.7.04	وائی جے سک

PANTANIL

پنٹائل

افعال: ایلون کا مصنوعی مرکب ہے۔ ایلون کی طرح مسکن درد اور نیند آور ہے۔ قلب کے آپٹن
سے قبل استعمال کرائی جاتی ہے۔

مقدار: بیہوشی کے لئے ۵ سے ۱۵۰ ماگروگرام / فی کلو وزن کے حساب سے درد روکنے کے لئے ۱۰۰
ماگروگرام زیر جلد انجکشن لگایا جائے۔ آپریشن سے قبل ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام عضلاتی انجکشن لگائیں۔

منفی اثرات: نظام تنفس کی کمزوری میں، سانس کی نالیوں میں رکاوٹ، دماغ میں بھاری پن لو بند پریش، ضعف و نفاہت، حساسیت میں اس کے اثرات خراب رونما ہوتے ہیں۔
مضر اثرات: متلی قے سانس میں تنگی، لو بند پریش، کھلی سانس رکنا، ہوائی نالی تشنج، سینہ میں درد، پیشاب کم ہونا یا رکنا کبھی دورے پڑنا۔
احتیاط: نظام تنفس پر نگاہ رکھیں، سانس کی تنگی لو بند پریش اور سینہ کے درد میں احتیاط برتیں۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: مرکزی نظام عصبی (C.N.S.) کو کمزور کرنے والی، دواؤں کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکب

TROFENTYL (TROIKAA) 5x10ml amp Rs 625 00 ٹروفین ٹائل

MORPHIN SULPHATE

مارفین سلفیٹ

افعال: شدید درد، شدید بے چینی، خیندہ آنے میں مفید ہے۔
مقدار: ۵ اٹی گرام عضلاتی انجکشن لگائیں۔
مضر اثرات: خشکی، قے، متلی، ابکائی چکر آنا۔
احتیاط: آلات تنفس کی مکالیف بلغمی ذمہ میں احتیاط برتیں۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام تنفس کو ست کرنے والی ادویہ۔

تجارتی مرکبات

MORCONTIN 10/30/60/100 (MODIMUNDI PHARMA) مارکونٹن

10: Rs. 154 00

MORPHINE INJ. (DEYS) 100x2ml amp. Rs 250 00 مارفین انجکشن

PENTAZOCINE

پنٹازو کین

افعال: مارفین کی طرح فوری اثر کرنے والی زبردست دافع درد دوا ہے جو ۴ سے ۶ گھنٹہ تک اپنا اثر رکھتی ہے۔
شدید درد عضلاتی درد چوٹ ورم موج آپریشن کے بعد ہونے والا درد قوی لچ اور کینسر کے درد زچلی

کے درد میں مفید ہے۔

مقدار: خوردنی طور سے ۱۵ سے ۳۰ ملی گرام ہر گھنٹہ بعد عضلاتی انجکشن ۳۰ سے ۶۰ ملی گرام۔ وریدی ۳۰ ملی گرام بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مفتی اثرات: C/1 دماغی دباؤ بھاری پن سانس کی کمزوری نشہ کے عادی اور سر کی چوٹ میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: نشہ پیدا کرتی ہے۔ چکر آنا، متلی اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔

احتیاط: حمل، پیسپروں جگر اور گردوں کی تکالیف میں قلبی درد قبل از ولادت اور نارمل سیلان کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نشیلی ادویہ، اور MAOI کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

CINEPAR	(DEEPHARMA) tabs 6: Rs.11.50	سائی نی پر
DYMIC	(GLENMARK) caps 6: Rs.10.59	ڈائی مک
EXPERGESIC	(WIN MEDICARE) 10: Rs.49.50	ایکسپر جے سک
FORACET	(RANBAXY) 12: Rs.18.13	فوراسٹ
FORTAGESIC	(WIN MEDICARE) 10: Rs.49.50	فورٹا جے سک
FORTWIN	(RANBAXY) 8x1 ml amps: Rs.53.77	فورٹ ون انجکشن
FORTWIN TABS	(RANBAXY) 12 tabs: Rs.27.25	فورٹ ون ٹبلٹ
PENTALGIN INJ	(P&B LABS) amp Rs.10.20	پن ٹال جن انجکشن
PENTAWIN	(BIOCHEM) 1ml: Rs.7.00	پنٹا ون
PENTAVON	(JAGSONPAL) 1ml: Rs.4.15	پنٹا ون
PENTAZOCINE INJ	(PREMPHARMA) 1ml: Rs.7.15	پنٹا زو کین انجکشن
PENZYL	(SIGMA LABS) 10ml vial Rs 72.98	پن زائل
SOSEGON TABS	(WIN MEDICARE)	سوسی گن ٹبلٹ
25mg tabs 10: Rs 20.89		

PETHIDINE HCL**پیتھی ڈین ہائیڈروکلورائیڈ**

افعال: درد دور کرنے بیہوشی کی دوا استعمال کرنے سے قبل، زچگی کے درد کو دور کرنے دوا کا دورہ روکنے میں مفید ہے۔

مقدار: ۲۵ سے ۱۰۰ ملی گرام زیر جلد یا عضلاتی انجکشن لگائیں وریڈی ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام۔

PARACETAMOL**پیرا سیٹامول**

افعال و منافع: دافع درد بخار دوا ہے، سردرد، شقیقہ عضلاتی درد دانت کے درد، حلق کی خراش، وجع الفاصل نزلہ زکام ایام حیض کے درد میں مفید ہے۔

مقدار: بالغوں کو ۵۰۰ ملی گرام سے اگر ام تک دن میں ۲-۳ بار زیادہ سے زیادہ دن بھر میں ۴ گرام بچوں کو عمر کے مطابق ۳ ماہ سے کم عمر کے بچوں کو نہ دی جائے۔

منفی افعال: پیرا سیٹامول سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: بد ہضمی، متلی، جلد پر داغ پڑنا، خون میں غیر طبعی تبدیلیاں۔

احتیاط: جگر اور گردوں کے مریضوں میں احتیاط لازم ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع انجماد خون دواؤں کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

APYRIN	(LIFE) 60ml: Rs.7.48	پاپائیرین
BEPAMOL TABS	(BIOLOGICAL E) 10: Rs.3.10	پامول ٹیبلٹ
BEPAMOL SYRUP	(BIOLOGICAL E) 60ml: Rs.8.50	پامول سیرپ
CENOLGIN SYRUP	(CARMINOL)	سینالجن سیرپ
Paracetamol I.P. 62.5mg & Analgin I.P. 62.5mg per 5ml; 60ml	Rs.7.50	
COFAMOL SYSP	(CFL) 60ml Rs.13.93	کوفامول
DYMIC	(GLENMARK) 6 caps: Rs.10.59	ڈائی میک
FAL 650	(FALMA) 10: Rs.5.46	فال ۶۵۰
FALMADOL	(FALMA) 10: Rs.3.51	فال ماڈول
FALMADOL SUSP	(FALMA) 450ml: Rs.30.10	فال ماڈول سیرپ

FFBRFX	(INDOCO) 10 Rs 4 00	فیبریکس
FFBRFX SUSP	(INDOCO) 60ml bottle Rs 11 30	فیبریکس سرب
FFBRFX 250 SUSP	(INDOCO) 60ml Rs 12 95	فیبریکس سرب ۱۵۰
FFBRINIL INJ	(SIGMA LABS) 15ml vial Rs 15 29	فیبریئل
FEVASTIN SUSP	(TABLETS INDIA) 60ml bottle	فیواستین
FORACET	(RANBAXY) 12 Rs 18 13	فوراسیٹ
HORMOPIRIN	(J & J DECHANE) 500 Rs 95 00	ہارموپائیرین
MALIDENS	(NICHOLAS) 10 Rs 4.31	مالیڈین
METAMOL	(BDH) 10 Rs 6 00	میٹامول
METAMOL SYRUP	(BDH) 450ml Rs 41 00	میٹامول سرب
METOPAR	(CFL) 10 Rs 4 90	میٹاپار
METOPAR SYRUP	(CFL) 60ml Rs 8 75	میٹاپار سرب
MOLIN	(PHARMACIA) 450ml. Rs.24 25	مولین
NEOFEBRINTABS	(NEO PHARMA) 10 Rs 9.95	نیو فبرین ٹبلٹ
NEOMOL INJ	(NEON) 10x2ml amps; Rs 55 00	نیو مول انجکشن
PHERIMOL TABS	(P & B LABS) 10. Rs 6 05	فیری مول
PROXYTAB	(WOCKHARDT) 10. Rs 6 63	پراسکس ٹیب
PYRIGESIC	(EAST INDIA) 60ml Rs 9 95	پائیرجیسک
PYROSED	(PFIMEX) 60ml. Rs.11.25	پائیروسڈ
SINUMOL TABS	(P & B LABS) 10. Rs.9 08	سائی نومول
SOPARIN-KID	(KLARSEHEN) 10. Rs.2.35	سوپارین
TWC30	(ETHNOR) 6: Rs.24 68	ٹی ڈبلیو سی
WALAGESIC	(WALLACE) 10. Rs 11.30	والے جے سک
WYGESIC	(WYETH) 10. Rs.7.04	وائی جے سک
ZIMALGIN	(RALLIS) 10 Rs 5 49	زیمالجین

TRAMODOL HCL

ٹراموڈول ہائیڈروکلورائیڈ

افعال: معمولی اور شدید دردوں کو روکنے، آپریشن کے درد کو روکنے اور کسی بھی طرح کے درد کو سکون دینے کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۱۳ سال سے زائد عمر والوں کو ۱۰۰ ملی گرام عضلاتی یا زیر جلد یا وریدی آہستہ آہستہ لگائیں۔

بہل میں ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ۴۰۰ ملی گرام تک دے سکتے ہیں۔
 منفی افعال: شراب کے نشے کی حالت میں، بے چینی الجھن دور کرنے والی دواؤں کے بعد دینا مضر ہے۔
 مضر اثرات: پسینہ کی زیادتی، چکر آنا، متلی تے، منہ خشک، بے چینی کبھی دورے پڑنا سانس اور قلب میں تکلیف محسوس ہونا عادت پڑنا۔
 احتیاط: دوا سے حساس مریضوں کو دورہ کی ہسٹری میں حمل اور ایام رضاعت میں، دوا کے بعد ذرا بیوری کرنے اور مشنری چلانے سے احتیاط برتیں۔
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈپریشن دور کرنے والی ادویہ MAOI ادویہ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

CONTRAMAL

(S.G.PHARMA)

کانٹرا مل

1ml. Rs.13.91; 2ml: Rs.25.68

TRAMAZAC

(CADILA) 1ml amp Rs.8.10

ٹرامازیک انجکشن

TRAMAZAC CAPS

(CADILA) caps 10: Rs.58 10

ٹرامازیک کپسول

TRASIC

(KOPRAN) caps 10x10 Rs 550.10

ٹراسک کپسول

مرکزی نظام عصبی کو متحرک کرنے والی ادویہ

C.N.S. STIMULANTS

CODERGO CRINE MESYLATE کوڈرگو کرائن می سائی لیٹ

افعال و منافع: معمر لوگوں کے ضعف دماغ اور اضطلال میں مفید ہے حافظہ کی کمزوری دماغی صلاحیت میں کمی، موڈ کی خرابی، غیر مہذب حرکات کرنا اور معمولات میں فرق ذاتی بے توجہی چکر آنے درد سر، دماغی امراض، درد شقیقہ اور ہائی بلڈ پریشر کی علامات میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۳ سے ۶ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے کھانے سے قبل استعمال کرائیں۔

ڈرپ کے ذریعہ ۰.۳ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے چڑھائیں ۰.۳ ملی گرام عضلاتی یا زیر جلد لگائیں۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریض اور پرانے مالنخولیائی مریضوں میں استعمال نہ کرائیں۔
مضر اثرات: ہاضمہ کی خرابی، جلد کا سرخ ہونا، ناک بند ہونا، ہاتھ پیر ایٹھنا، درد سر۔ چکر آنا، کھانے کے ساتھ دوا استعمال کرنے سے مضر اثرات میں کمی۔

احتیاط: سینہ کے شدید درد میں
دواؤں کے ساتھ رد عمل: کیفین کے ساتھ خراب رد عمل ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

HYDERGINE (SANDOZ) 3x10: tabs Rs.344.00 ہائیڈرجین ہیلپٹ
HYDERGINE INJ (SANDOZ) 6x1ml Rs.90.00 ہائیڈرجین انجکشن

ERGOLOID MESYLATE ارگولائیڈ میسائی لیٹ

افعال: دماغی افعال میں سستی کاہلی، موڈ کی کیفیت طاری ہونا، دماغ کے نارمل حالت میں نہ ہونے پر یہ دوا قائم ہو نچاتی ہے۔

مقدار: ۱ ملی گرام دن میں ۳ بار
منفی اثرات: دوا سے حساس اور الجھنوں میں مبتلا مریضوں کو استعمال کرنا مضر ہے۔
احتیاط: خون میں اور فائبرین کی زیادتی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکب

CERELOID (SUN PHARMA) 10 tabs Rs.90.10 سیری لائیڈ

PIRACETAM پائی راسی ٹام

افعال: یہ دوا دماغی نظام Metabolism کو درست کر کے نظام عصبی میں تیزی پیدا کرتی ہے۔
دماغی کمزوری، بچوں کی یادداشت میں کمی معمر لوگوں کی دماغی کیفیات میں خرابی، دماغی چوٹ صدمات

دماغی پوٹ سے ہونے والی بے ہوشی، حرکی اعصاب کے فعل میں کمی، دماغی کمزوری، نفسیاتی الجھنوں میں ملید ہے۔

مقدار: ہانفوں میں پہلی خوراک ۸۰۰ ملی گرام پھر ۴۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو ۲۰۰ ملی گرام / فی کلو گرام کے حساب سے ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی افعال: حمل جگر گردوں اور قلب کے امراض میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: نفسیاتی خرابیاں، ضدی، جھٹ کرنا جنسی تحریک پیدا ہونا۔

احتیاط: گردوں جگر اور قلب کے مریضوں میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

CERECETAM	(INTAS) 10: Rs.16.50	سیری سی نام
NOOTROPIL	(UNI-UCB) 5x5ml amp: Rs.133.15	لوئر دہل
NORMABRAIN	(TORRENT) 100ml: Rs.70.90	لوئر مابریں
PIRATAM	(BIDDLE SAWYER) 60ml: Rs.61.20	پائی رائٹام

PIRIBEDIL

پائی ری بیڈل

افعال: معمر لوگوں میں دماغی کمزوری، ضعف، واضح محلال، یادداشت اور کام کرنے کی صلاحیت میں کمی، دماغی کام میں کوتاہی کان بچنا، سستی چکر آنا حادثات سے ہونے والے دماغ پر خراب اثرات میں مفید کام انجام دیتی ہے۔ پارکن سن ڈیزیز میں مفید ہے۔

مقدار: ۵۰ ملی گرام دن میں ۱ بار شدید حالتوں میں دن میں ۲ بار کھانے کے ساتھ۔

منفی افعال: امراض قلب غشی، حمل میں دینا نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: ہضم میں خرابی

دواؤں کے ساتھ رد عمل: نظام عصبی کو تحریک پہنچانے والی ادویہ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکب

TRIVASTA L.A.	(SERDIA)	لری و سٹائل اسے
Piribedil 50mg tabs 10: Rs.130.81		

پائی ری ٹی نال ڈائی ہائیڈرو کلورائیڈ مونو ہائیڈریٹ

PYRITINAL DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRETE

افعال: بچوں میں دماغی نشوونما کی کمی، دماغی صدمات، دماغ میں آکسیجن کی رسد میں کمی، دماغی نخر کو متحرک کرنے میں مفید و معاون ہے۔

مقدار: ۱۰۰ ملی گرام سے ۲۰۰ ملی گرام بچوں کو عمر کے مطابق علاج کئی ہفتوں جاری رکھنا چاہیے۔
مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، جگر کے افرازات کی زیادتی بھوک کی زیادتی نیند میں خلل اور کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے۔

احتیاط: چھوٹے بچوں سے احتیاط رکھیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: لوہی سول، گولڈ کے مرکبات اور ڈی پھسٹامین کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

ENCEPHABOL

(MERCK) 10: Rs.75.01

این سی قابل

ENCEPHABOL INFUSION

(MERCK)

این سی قابل انفیوژن

2ml twin pack Rs.16.05

ENCEPHABOL SUSP

(MERCK) 100ml: Rs 81.82

این سی قابل سرب

نشہ کی عادت چھڑانے والی ادویہ

DRUGS FOR DRUG DEPENDENT

DI SULFIRAM

ڈائی سلفی رام

افعال: یہ دوا شراب کو خون میں جذب ہونے سے روکتی ہے۔ شراب کی عادت چھڑانے میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ڈاکٹر کی نگرانی میں دوا دینی چاہیے پہلے پیٹ کی صفائی کریں پہلے دن اگر ۱۰۰ گرام دوسرے دن ۳۰۰ گرام تیسرے دن ۵۰۰ گرام چوتھے دن ۲۵۰ گرام دی جائے پھر اس کی شراب کی خواہش

نوٹ کی جائے اگر ضرورت ہو ۵۰ گرام روزانہ جب تک مریض ٹھیک نہ ہو جائے۔

منفی افعال: C/1 علاج کے دوران الکحل کا کسی بھی صورت میں ٹانک کف سرپ میں بھی استعمال نہ کیا جائے، ذیابیطس، تھائرایڈ ایکسٹریکٹ کی کمی، مرگی، دماغی کمزوری ورم گردہ اور جگر کی خرابی میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: الجھن، بے چینی، جنسی قوت میں کمی الرجی، چکر آنے کی شکایت ہو جاتی ہے دوا جاری رکھنے سے علامات ختم ہو جاتی ہیں۔

احتیاط: دوران علاج شراب سے قطعی پرہیز کریں۔

تجارتی مرکبات

ANTADICT	(INTAS) Disulfiram 250mg 10: Rs.6.88	بگاڈکٹ
DISULFIRAM	(INTAS) 10: Rs.11.00	ڈاکٹر سلفی ریم
ESPERAL	(TORRENT) 10: Rs.10.82	پس ریل

ٹٹرائی تھائل تھایورم ڈائی سلفائیڈ

TETRA ETHYL THIURAM DISULPHIDE

بھال: یہ دوا شراب کے عادی مریضوں کی عادت چھڑانے میں کام کرتی ہے۔ اس سے مریض پر ماس بے خودی طاری ہو جاتا ہے۔

نقدار: ابتدائی خوراک اسے ۵۰ گرام روزانہ ۲-۳ دن تک پھر حالات اور مزاج کے لحاظ سے ۵۰۰ ملی گرام روزانہ یہ دوا اکثر کی نگہ رانی میں استعمال کرائیں۔

فی افعال: شدید قلبی امراض، حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں نفسیاتی عوارض میں مبتلا افراد کو استعمال نہ کریں۔

مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، خشکی، کاپلی، پھر تیلے پن کی کمی درد سر، مہاسے ٹکنا، ذائقہ لیسن یا کسی ت کی بو محسوس ہونا، لمبے عرصے تک استعمال سے عضلات و اعصاب میں درد۔

نیاط: شراب کے اثرات کی حالت میں اور شراب چھوڑنے کی خواہش نہ ہو ایسے افراد میں یہ دوا مال نہ کرائیں۔

نفسیاتی الجھن دور کرنے والی ادویہ

PSYCHO TROPIC DRUGS

AL PRAZOLAN

آل پروزولان

افعال: دماغی الجھن، گھبراہٹ، مانگو لیاٹی مریضوں، تنہائی سے ڈرنے والوں میں مفید ہے۔
 مقدار: ۲۵ ملی گرام سے ۰.۵ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے کے بعد ۲ دن تک پھر ۰.۵ ملی گرام
 دوسرے تیسرے دن مقدار خوراک بڑھائی جائے زیادہ سے زیادہ ۲ سے ۳ ملی گرام دینا چاہیے۔
 منفی افعال: دوا سے الرجک مریض، گلوکوما، حمل ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔
 مضر اثرات: خشکی سر میں ہلکا پن، منہ خشک متلی ابکائی الرجی وجع القلب، ضدی پن۔
 احتیاط: دوا چانک بند نہ کریں، دوا کے دوران مشنری چلانے ڈرائیوری کرنے سے احتیاط برتیں۔
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ دورہ روکنے والی دواؤں
 کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

ALPRAX	(TORRENT) 1mg: 10: Rs.17.95	آل پراکس
ALZOLAM	(SUN PHARMA) 1mg 10:Rs.16.58	آل زولام
ALZOMAX	(KAMRON) 10: Rs.19.95	آل زومیکس
ALZOPAX	(LA PHARMA) 1mg: 10: Rs.15.76	آل زوپاکس
ANXIT	(MICRO LABS) 1mg:10:Rs.18.00	اینکسٹ
ANXYL	(WAVE) 10: Rs.15.00	اینکسل
PLAXID	(SIGMA LABS) 1mg: 10: Rs.14.36	پلاکسڈ
POISE	(SYSTOPIC) .5mg: 10: Rs.11.00	پوائس
QUIET	(SWIFT) 1mg: 15x10: Rs.228.00	کوائٹ
RETYL	(PROTEC) 1mg: 10 : Rs.15.00	ریس ٹائل
TRANISOL	(GLENMARK) 1mg: 10: Rs.15.50	ٹرانسول
TRIKA	(UNISEARCH) 1mg: 10: Rs.19.75	ٹرائیکا

ZENAX	(STANGEN) 1mg. 10. Rs.170	زی نیکس
ZENOPRAX	(PACE (SOL) 0.5mg: 10. Rs 10.50	زی نو پراکس
ZOLAM	(STADMED) 1mg: 10. Rs 16.50	زولام
ZOLAX	(INTAS) 1mg: tabs 0.25mg: 10. Rs.6.20	زولاکس

BUSIPRONE HCL بوسی پرون ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: نفسیاتی عوارض، بے چینی، گھبراہٹ کو دور کرتی ہے۔ حیض آنے سے قبل کے دور بے چینی اور الجھن کو دور کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ابتدائی خوراک ۵ ملی گرام دن میں ۲-۳ بار رفتہ رفتہ مقدار خوراک بڑھا دینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ۴۵ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دیں۔


منفی افعال: مرگی، جگر اور گردوں کے امراض میں، حمل ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: چکر آنا، سینہ میں درد، درد سر، منہ خشک ہو جاتا ہے۔

احتیاط: جگر و گردوں کی بیماری کی ہسٹری میں اور بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

ANXIPAR	(TIDE) 10mg. 10: Rs 12.53	این کسی پار
BUSACTIL	(MEJDA) 10mg: 10: Rs 10.40	بوسا کٹل
BUSCALM	(MERIND) 10mg: 10. Rs.13.70	بس کام
BUSON	(KOPRAN) 10mg: 10x10: Rs.150.34	بوسان
BUSPIDAC	(ALIDAC) 10mg: 10: Rs.14.00	بس پی ڈیک
BUSPIN	(INTAS) 10mg: 10: Rs.16.60	بس پن



Alprazolam 0.25, 0.50 & 1 mg.

گھبراہٹ دور کرنے والی دوائیں

ANTI DEPRESENT

AMINOEPTIN HCL امینو ایپ ٹین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: دل کی گھبراہٹ نفسیاتی الجھن موڈ کی خرابی خلوت پسند افراد میں فائدہ کرتی ہے۔
مقدار: ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار پہلی خوراک ناشتہ کے بعد دوسری دوپہر کے بعد لینی چاہیے۔
منفی اثرات: چکر آنے سر گھومنے میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: حرکات قلب تیز ہونا، نیند نہ آنا، وزن کم ہونا بے چینی اور جگر میں خرابی چہرے پر مہاسے لگنا۔

احتیاط: مریض کو سخت نگرانی میں رکھیں مریض خود کشی کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ حمل اور آپریشن سے ۲۸ گھنٹہ قبل دوا بند کر دیں۔

تجارتی مرکب

SURVECTOR (SERDIA)

سر ویکٹر

Amineptine hcl. 100mg tabs 10: Rs.146.53

AMITRIPTYLINE

ایمی ٹریپ ٹائی لین

افعال: دل کی گھبراہٹ، پریشانی، بے چینی ضد، ہٹ دھرمی، نیند میں خلل شرابیوں کی بے چینی، بچوں کے بستر پیشاب کرنے میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۰ سے ۲۵ ملی گرام دن میں ۳ بار ہر تیسرے دن مقدار خوراک بڑھائی جاسکتی ہے۔

منفی افعال: گلوکوما قلب میں کسی قسم کا تسد و جگر کے امراض حمل میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: خشکی، چکر آنا، بے چینی مٹی ابکائی منہ خشک، بصارت میں فرق بلڈ پریشر کم ہونا، حرکات قلب بے ترتیب ہونا، سستی کاہلی، خسیوں کا متورم ہونا، پیشاب رکنا۔

احتیاط: امراض قلب کے مریضوں میں غدر در قیہ کے بڑھ جانے میں جگر کی خرابی، مرگی گلو کو باورم غدرہ قداسیہ میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: MAOI، ہاربی ٹون کے مرکبات دیگر مسکن دماغ اور دافع ڈپریشن دواؤں کے ساتھ شراب بلند پریشر کم کرنے والی ادویہ اور سن کرنے والی دواؤں کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

AMILINE	(TORRENT) 10: Rs.13.35	ایمیلین
AMITONE	(INTAS) 10: Rs.11.25	ایمیل ٹون
AMITROL	(TORRENT) 10: Rs.3.25	ایمیل ٹرول
AMITROL-DS	(TORRENT) 10mg 10: Rs.4.85	ایمیل ٹرول ڈی ایس
AMIXIDE	(SUN PHARMA) 10mg 10: Rs.11.00	ایمیل کسائیڈ
AMIXIDE-S	(SUN PHARMA) 10: Rs.10.00	ایمیل کسائیڈ ایس
AMIXIDE-H	(SUN PHARMA) 10: Rs.6.50	ایمیل کسائیڈ ایچ
ELIWEL	(SUN PHARMA) 10: Rs.14.72	ایلی ویل
LATILIN 25/50/75	(LA PHARMA) 10: Rs.13.30	لے ٹی لین
LIBOTRYP	(MERIND) 10: Rs.8.50	لیبو ٹریپ
LIBOTRYP DS	(MERIND) 10: Rs.12.50	لیبو ٹریپ ڈی ایس
LIMBICON	(SYSTOPIC) 10: Rs.6.00	لمبی کون
LIMBICON FORTE	(SYSTOPIC) 10: Rs.10.00	لمبی کون فورٹ
SAROTENA	(CFL) 10: Rs.17.00	سرو ٹینا
TRIDEP	(TORRENT) 10: Rs.13.35	ٹرائی ڈیپ
TRYPTOMER	(MERIND) 10: Rs.23.30	ٹرائپ ٹومر

AMOXAPINE

اموکساپین

افعال و منافع: ڈپریشن، دل گھبراتا، وحشت طاری ہونے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۱۵۰ ملی گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے زیادہ سے زیادہ ۳۰۰ ملی گرام معمر افراد میں ۲۵ ملی گرام ابتدا میں دن میں ۲ بار رفتہ رفتہ مقدار بڑھائیں ۵۰ ملی گرام سے زیادہ نہ

ویں۔ بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

منفی افعال: وجع القلب، عروق قلبیہ میں تسد، قلبی حرکات کا بے ترتیب ہونا سکتا، جگر کے شدید امراض میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ناکلی، منہ خشک، ہلڈ پریش کم ہونا، سینہ میں درد، جلد پر داغ پڑنا، ضدی مزاج، حرارت جسمانی کم ہونا۔

احتیاط: حمل میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکب

ڈی مولاکس 50.100 (LEDERLE) 100mg 10 Rs 50 00

CLOMI PRAMINE HCL کلومی پرامین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال: ڈپریشن اور دل گھبرانے کی مختلف حالتوں میں مفید ہے نیند لانے سکون پہنچانے، انجانے خوف و ڈر کو دور کرنے میں استعمال کرائی جاتی ہے۔

مقدار: ۵۰ ملی گرام سے ۱۵۰ ملی گرام ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔

منفی افعال: قلب کے شدید امراض میں۔

مضر اثرات: ضعف، بے چینی، جگر کے افرازات میں کمی ہونا، درد سر، ہاتھ پیر کا پھٹنا، چکر آنا، وزن بڑھنا، متلی ابکائی، سستی کاہلی، عضلات میں اٹٹھن اور سوجنا، بکواس کرنا، ضد مہذب حرکات کرنا، ذائقہ خراب، نیند میں خلل، بولنے میں فرق پیدا داشت میں کمی، پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا، ہاتھ پیر سن ہونا سینہ میں درد، ای سی جی ECG میں فرق، دودھ کی پیدائش زیادہ ہونا چھاتیوں بڑھنا، کان بچنا، عضلات کی کمزوری، غیر ارادی حرکات خفقان ہلڈ پریش میں اضافہ جگر کے فعل میں خلل، خون کے سفید ذرات میں کمی۔

احتیاط: قلبی امراض، گلوکوما، پیشاب کی کمی میں شدید جگر اور گردوں کے امراض میں لوہلڈ پریش، غدہ درقہ کے بڑھنے میں تھائرائیڈ کے مرکبات کے دوران، حمل اور ایام رضاعت میں شراب سے احتیاط برتنی۔

تجارتی مرکبات

ANAFRANIL	(HIND CIBA GEIGY)	25mg 10x10 Rs 244.20	انافرانل
CLOFRANIL	(SUN PHARMA) 25mg 10	Rs 29 02	کلوفرانل
CLOMOZIL	(GUFIC) 25mg 15	Rs 35 25	کلوموزل
CLONIL	(INTAS) 10mg 10	Rs.12.60	کلونل
CLOMIFRIL	(TORRENT) 25mg 10	Rs.29.51	کلومیفرل
OCIFRIL	(LA PHARMA) 50 mg 10x10	Rs 57	اوسیفرل

CLOZAPINE

کلوزاپائن

افعال: اسکازوفریینا، نظام عصبی میں خلل، وہ عصبی بیماریاؤں جن پر دوسری دوائیں کارآمد نہ ہوں۔
 مقدار: پہلے دن ۱۲.۵ ملی گرام دوسرے دن ۲۵ ملی گرام دن میں ۱ یا ۲ بار روزانہ ۲۵ ملی گرام بڑھائی جائے یہاں تک کہ ۳۰۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے روزانہ دی جائے مرض پر قابو پانے کے بعد ۱۵۰ سے ۳۰۰ ملی گرام روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے معمر لوگوں میں نصف خوراک سے ابتدا کی جائے بچوں کو یہ دوا نہ دی جائے۔

منفی اثرات: عصبی کمزوری، اعصابی بیماریاں، خون کی غیر طبعی حالت، جگر اور گردوں کے شدید امراض ضعف قلب حمل اور ایام رضاعت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: عصبی کمزوری، بلند پریشکرم ہو جانا، قلب و نظام تنفس پر دباؤ، دورے پڑنا، ورم غلاف القلب، گرم سم ربنا، عضو تناسل میں سختی، جنسی خواہش کا غیر متوازن ہونا، ہاضمہ میں خرابی، ای سی جی کا غیر طبعی ہونا، پیشاب میں شکر کی مقدار زیادہ ہونا۔

احتیاط: علاج سے قبل خون کے سفید ذرات کی جانچ کریں، اگر سفید ذرات W.B.C. ۳۰۰ سے کم ہوں تو دوا فوراً روک دیں، عورتوں کو مانع حمل دوائیں ساتھ میں ضرور دیں، مرگی ورم غدہ قدامیہ، گلوکوما، مفلوج اور جگر کے مریضوں میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ، شراب، ڈایازپام، لی تقسیم، انٹی، ہشامین ٹائن، کے ساتھ یہ دوا دینا مناسب نہیں۔

تجارتی مرکبات

IZAPIN	(TORRENT)	لو زاپین
mg 10 Rs 13 00	100mg: 10: Rs.48.00	
IZORIL	(INTAS)	سکائی زورل
mg 10. Rs.15 00;	100mg: 10: Rs 45.00	
IZOPIN	(SUN PHARMA)	سی زوپین
5mg 10: Rs 13 00;	100mg: 10: Rs.48.00	

DOTHIEPIN HCL

ڈو تھائی پن ہائیڈرو کلورائیڈ

افعال: ڈپریشن، بے چینی، گھبراہٹ اور دماغی الجھن پریشانی کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۷۵ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے یا ۱۵۰ ملی گرام سوتے وقت ۲۵ ملی گرام کے حساب سے مقدار خوراک میں اضافہ کیا جاسکتا ہے زیادہ سے زیادہ ۹۰۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

متفی اثرات: امراض قلب میں، قلبی حرکات کی بے ترتیبی میں، پائلیٹین جگر کے شدید امراض، حمل اور ایام رضاعت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: نظام عصبی میں خلل کاہلی، سستی، کم سم رہنا، نظام ہضم اور نظام دوران خون میں خلل ہو سکتا ہے۔

احتیاط: معمر افراد، مرگی، قلبی امراض، گلوکوما، ورم غدہ قدامیہ گردوں کی خرابی، میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: نظام عصبی کو کمزور کرنے والی ادویہ، شراب MAOI گوانی تھے ڈین اور مانع افراد جگر ادویہ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکب

PROTHIADEN	(BOOTS)	پرو تھیاڈین
25mg: 10: Rs.12.60;	75mg: 10: Rs.33.50	

DOXEPIN HCL ڈوکسی پن ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: ڈپریشن، عصبی خلل دماغی، مانجھ لیا، میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۷۵ سے ۱۰۰ ملی گرام ۳-۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے شدید حالتوں میں ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔ دن بھر میں ۱۵۰ ملی گرام سے زیادہ نہیں دینا چاہیے۔
 منفی افعال: گلوکوما میں، پیشاب بند ہونے یا رکنے اور دوا سے الرجی میں نہیں دینا چاہیے۔
 مضر اثرات: منہ خشک، قبض، بصارت میں فرق، چکر آنا اور خشکی ہو سکتی ہے۔
 احتیاط: حاملہ اور ۱۲ سال سے کم عمر بچوں کو نہ دی جائے۔
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ۔
 ٹراکولائزر شراب MAOI کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

DOXETAR (TORRENT)

ڈوکسی ٹارکپسول

10mg 10: Rs.12.90; 25mg 10: Rs.23.90

DOXETAR FORTE (TORRENT)

ڈوکسی ٹار فورٹ کپسول

75mg caps 6: Rs.29.00

FLUOXETINE فلوکسے ٹین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال: ڈپریشن کے مریض، بے چینی، الجھن گھبراہٹ، ذہنی پریشانی میں مفید ہے۔ ایسے مریض جن کو ہلکی مسکن دوا کی ضرورت ہو مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام روزانہ زیادہ سے زیادہ ۸۰ ملی گرام یومیہ معمر لوگوں میں ۲۰ ملی گرام، بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔
 منفی افعال: C/1 گردوں کے نل ہونے میں، ایام رضاعت میں خراب اثرات رونما ہوتے ہیں۔
 مضر اثرات: متلی قے، اسہال، درد سر، نیند کی کمی، بے چینی، خشکی چکر آنا، کمزوری بخار، جلد پر داغ پڑنا، الرجی، دورے پڑنا دماغ میں خلل ہو سکتا ہے۔

احتیاط: مرگی میں جگر کے فیل ہونے میں، گردوں کی خرابی، حمل امراض قلب ذیابیطیس میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: نائی ٹوفان، لیتھیم کے مرکبات اور MAOI کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

DWANEX	(MICRO LABS) 20g caps 10: Rs.11.95	ڈوانیکس
FLOXETIN	(WAVE) 20mg: caps:10: Rs.25.00	فلوکسےٹین
FLUDAC	(ALIDAC) 20mg caps 10: Rs.25.00	فلوڈیک
FLUFAN	(UNIQUE) 20mg caps 10: Rs.25.00	فلوفران
FLUGEN	(LA PHARMA) 20mg caps 10: Rs.25.10	فلوجین
FLUNIL	(INTAS) 20mg tabs 10: Rs.18.30	فلوٹل
FLUPAR	(MEJDA) 20mg caps 10: Rs.29.95	فلوپار
NODEP	(PACE) 20mg caps 10: Rs.25.95	نوڈپ
OXADEP	(TORRENT) 20mg : caps: 10. Rs.23.50	اوکساڈپ
PRODAC	(SEARLE) 20mg : caps	پروڈیک
PRODEP	(SUN PHARMA) 20mg caps 6: Rs.25.10	پروڈپ
TRIZAC	(UNISEARCH) 20mg caps 10: Rs.18.00	ٹرائی زیک

IMIPRAMINE HCL

ایمی پرامین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال: ڈپریشن، دل شکستگی، پڑمردگی، عزم و حوصلے کی کمی، چکر آنا، موڈ کی خرابی، نیند میں خلل، بستر پر پیشاب نکل جانا۔

مقدار: ۷۵ ملی گرام سوتے وقت یا کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے ۱۲ سال سے کم عمر بچوں کو ۲۵ ملی گرام سونے سے اگھنٹہ قبل، دوا صحت ہونے تک جاری رکھنا چاہیے، دوا آہستہ آہستہ اون کا وقفہ دے کر بند کرنا چاہیے۔

منفی افعال: C/1 قلبی امراض میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: منہ خشک بصریت میں فرق، الجھن بے چینی، پیشاب کارکنا، لو بلڈ پریشر وجع القلب، خفتان کبھی قلبی حرکات کا بے ترتیب ہونا۔

احتیاط: ۱۲ سال سے کم عمر والوں کو حاملہ اور مرضہ کو دینے میں احتیاط برتیں۔
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: MAOI گوانی تھی ڈین، بتھانڈین میتھائل ڈوپا، شراب، نظامِ معویہ کو
 مفلوج کرنے والی ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

ANTIDEP	(TORRENT)	انٹی ڈیپ
25mg: 10: Rs.4 40; 75mg: 10: Rs.11.28		
DEPRANIL	(LA PHARMA)	ڈپرائل
25mg 10: Rs.4.90; 75mg 10: Rs.12 00		
DEPRANIL PLUS	(LA PHARMA) tabs 10: Rs.5.90	ڈپرائل پلس
DEPSOL	(INTAS)	ڈپ سول
25mg 10: Rs.4.90; 75mg: 10: Rs.10.95		
DEPSOL PLUS	(INTAS) 10: Rs.5.40	ڈپ سول پلس
DEPSOL FORTE	(INTAS) 10: Rs.5.60	ڈپ سول فورٹ
DEPSONIL	(S.G.PHARMA) 25mg 10: Rs.4.23	ڈپ سونل
DEPSONIL-DZ	(S.G.PHARMA) 10: Rs 4.82	ڈپ سونل ڈی زیڈ
DEPSONIL DZ FORTE	(S.G.PHARMA)	ڈپ سونل ڈی زیڈ فورٹ
tabs: 10: Rs.5 35		
DEPSONIL-PM	(S.G.PHARMA)	ڈپ سونل پی ایم
75mg caps 10: Rs.16.05		
IMIPAM	(LA PHARMA) tabs 10: Rs.5.50	ایمپام
IMPRAMINE	(SUN PHARMA)	ایمپرامین
25mg tabs 10: Rs.4.48		
IMPRAMINE 75	(SUN PHARMA) 5mg caps 6: Rs.7.22	ایمپرامین ۷۵
IMPREL	(SIGMA LABS)	ایمپریل
Imipramine 25mg : tabs: 10: Rs.4.63		
PRAZEP-2	(SUN PHARMA) 10: Rs.5.86	پرازپ ۲
PRAZEP	(SUN PHARMA) 10: Rs.6.32	پرازپ
TANCODEP-2	(TORRENT) 10: Rs.5.50	ٹانکوڈپ ۲
TANCODEP	(TORRENT)	ٹانکوڈپ
Imipramine hcl 25mg Diazepam 5mg tabs 10: Rs.5.90		

LOXAPINE

لوکسا پائن

افعال: اسکاتزو فرینیا، شدید خلل دماغی، مایخو لیا، بچوں کی خراب عادتیں دور کرنے میں مفید ہے۔
مقدار: ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام عضلاتی انجکشن ۱۲.۵ سے ۵۰ ملی گرام خوردنی طور پر۔

منفی افعال: قلب کے افعال میں خرابی، کم سم رہنے والے افراد میں استعمال نہ کرائیں۔
مضر اثرات: خشکی، لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔
احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

LOXAPAC 10/25

(LEDERLE)

لوکسا پیک کپسول

10mg 10: Rs.27.50; 25mg 10: Rs.54.25

LOXAPAC-C LIQUID

(LEDERLE)

لوکسا پیک سی۔ لکوڈ

60ml: Rs.200.25

MIAN SERIN HCL

مانی این سیرین ہائیڈرو کلورائیڈ

افعال: ڈپریشن، نفسیاتی الجھن، عصبی ڈپریشن میں مفید ہے۔
منفی افعال: C/1، حمل اور ایام رضاعت میں، قلبی امراض میں عمر اور ذیابیطیس کے مریضوں جگر اور گردوں کے امراض میں استعمال نقصان دہ ہے۔
مضر اثرات: خشکی، منہ خشک، بصارت میں فرق قبض، خون میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: MAOI ادویہ، شراب، ہاربی ٹون کے مرکبات ہائی بلڈ پریشر رکھنے والی ادویہ بنز و ڈایاز پائن کے ساتھ یا اس کے ۴ دن بعد تک دینا نقصان دہ ہے۔

تجارتی مرکبات

DEPNON

(INFAR)

ڈپ نون

10mg. 10: Rs.20.90; 30mg : 10: Rs.54.60

SERIDAC

(ALIDAC) 10 mg tabs 10: Rs.17.20

سیری ڈیک

TETRADEP

(TORRENT) 30mg. 10: Rs.54 54

ٹترا ڈپ

NITROXAZEPINE

نائٹروکسازپیپائن

افعال: مختلف اسباب سے ہونے والا ڈپریشن، بستر پر پیشاب نکل جانا موڈ کی خرابی۔
 مقدار: ڈپریشن میں ۲۵ ملی گرام دن میں ۳ بار یا ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۳ ہفتہ تک، شدید حالتوں میں ۳۲۵ ملی گرام تک دی جاسکتی ہے بول بستر میں ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام سوتے وقت۔
 مضر اثرات: منہ خشک، قبض، چکر آنا، درد سر، جسم میں گرمی کا احساس، بے چینی، جلد پر داغ پڑنا، ہاتھ پیر کا غپناہ، دل دھڑکنے لگنا۔
 احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ، مرگی جگر اور گردوں کے نفل ہونے میں، امراض قلب، گلوکوما، پیشاب کی کی یاد رکھنے میں، خودکشی کے رجحان میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکب

SINTAMIL

(HIND.CIBA-GEIGY)

سن ٹائل

25 mg: 10: Rs.7.40

NORTRYPTYLINE HCL

نارٹریپٹیلین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال: جسم کی اندرونی خرابی سے پیدا ہونے والا ڈپریشن نفسیاتی الجھنوں کے سبب ہونے والا ڈپریشن، بستر پر پیشاب نکل جانا حساسیت، پتی اچھلنا اور الرجی میں مفید ہے۔
 مقدار: ۵۰ سے ۱۵۰ ملی گرام ایک خوراک سوتے وقت یا کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔
 منفی افعال: C/1 گلوکوما، پیشاب رکھنے میں درم غده قدامیہ میں امراض قلب کے مریضوں میں۔
 مضر اثرات: منہ خشک قبض بے صارت میں فرق پیشاب رکھنا، لوہڈ پریش چکر آنا حرکات قلبیہ کا بے ترتیب ہونا۔
 احتیاط: ایام حمل اور ایام رضاعت میں استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

PRIMOX

(SUN PHARMA) 10: Rs.9.10

SENSIVAL

(WALLACE)

10: Rs.9.10

پرائی سوکس
نیشنل وال

کلور پرومازین ہائیڈروکلورائیڈ CHLOR PROMAZINE

افعال و منافع: یہ ایک زبردست مانع افراز اور ڈوپامین کو روکنے والی دوا ہے یہ اسکیزوفریزیا، ہنگی آنے، بے چینی، الجھن، دماغی الجھن و گھبراہٹ کو دور کرتی ہے۔
مقدار و ترکیب: فوری طور پر ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ضرورت پر مقدار بڑھائی جاسکتی ہے شدید نفسیاتی الجھنوں میں اگر ام تک دی جاسکتی ہے۔
متنفی افعال: پارکنسنز ڈیزیز، جگر کے امراض، صاحب فراش کو نہیں دینا چاہیے۔
احتیاط: امراض قلب و جگر، یرقان کی ہٹری، حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط لازم ہے۔

تجارتی مرکبات

EMETIL PLUS	(LA PHARMA) 10: Rs. 1.40	ایمیل پلس
EMETIL DS	(LA PHARMA) 10: Rs. 18.00	ایمیل ڈی ایس
MEGATIL	(INTAS) 200mg: 10 Rs. 19.50	میگاتیل
MEGATIL INJ	(INTAS) 2ml amp Rs. 4.26	میگاتیل انجکشن
NEOCALM FORT	(INTAS) 10 tabs Rs. 9.60	نیو کالم فورٹ
SUNPRAZIN	(SUN PHARMA) 200mg, 10, Rs. 14.81	سن پرازین
TRAZINE-SC	(SUN PHARMA) 10 tabs Rs. 7.99	ٹرازین ایس سی
TRINICALM FORTE	(TORRENT)	ٹرائیکالمنی کام فورٹ
Chlopromazine Hcl I.P. 50mg, Trifluoperazine 2hcl 5mg and Trihexyphenidyl USP 2mg tabs 10: Rs. 6.90 100 Rs. 55.00		

فلوپینتھیکسول FLUPENTHIXOL

فلوپین تھیکسول

افعال و منافع: معمولی اور درمیانی درجے کے ڈپریشن اور اس کا تیز و فیر جینا میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ڈپریشن میں آدمی ملی گرام دن میں ۲ بار عام طور پر آدمی سے ۳ ملی گرام تک دی جاتی ہے۔ اسکیزوفریزیا Schizo Phrenia میں ۳ ملی گرام یومیہ دوا آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے۔
مرض پر قابو رکھنے کے لئے ۳ سے ۱۲ ملی گرام یومیہ دی جاسکتی ہے۔
متنفی افعال: شدید ڈپریشن زیادہ کی الجھن۔ غشی حمل ایام رضاعت، صاحب فراش کو دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: زیادہ مقدار میں دینے سے مریض کم سم رہتا ہے۔ بے چینی، نیند نہ آنا، وزن بڑھنا
احتیاط: پارکنسن ڈیزیز میں شراکین کی سختی میں بڑھاپے، جگر و گردوں کی خرابی، امراض قلب اور
پھیپھڑوں کی تکالیف میں احتیاط برتنا چاہیے
دواؤں کے ساتھ رد عمل: مرکزی نظام عصبی کو کمزور کرنے والی دواؤں کے ساتھ خراب رد عمل
ہوتا ہے۔

شراب لوڈوپا، مینا کلو پر اما نیڈ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

FLUANXOL (CFL) 10: Rs. 70.55

FLUANXOL DEPOT INJ (CFL)

Rs. 80.00 40mg / 2ml: Rs. 155.00

فلوکسال
فلوکسال ڈیپاٹ انجکشن

FLUPHENAZINE HCL فلو فینازین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: بے چینی، دماغی الجھن، گھبراہٹ، سن یاس کی تکالیف ہضم کی خرابیاں معمولی ہائی بلڈ
پریشر، بد مزاجی، درد سر، نفسیاتی الجھن، معمر افراد میں مزاج کی خرابی وغیرہ میں مفید ہے
مقدار و ترکیب: الجھن و گھبراہٹ میں ۱ ملی گرام دن میں ایک بار شدید حالتوں میں ۱ ملی گرام دن
میں ۲ بار، دماغی خرابی اور بکواس کرنے والے مریضوں میں ۵ء ۲ ملی گرام سے ۱۰ ملی گرام کئی خوراکیوں
میں تقسیم کر کے ۶ سے ۸ گھنٹہ کے وقفہ سے دی جائے مرض پر قابو پانے اور نارمل حالت پر قرار رکھنے
کے لئے اسے ۵ ملی گرام ایک خوراک یومیہ دینا چاہیے۔

منفی افعال: دماغ کے ماؤف ہونے میں، نیند کی گولیاں استعمال کرنے والے افراد میں، دردوں کے
مریضوں کو فینوتھیزین سے حساس مریضوں کو دوا نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: پارکنسن کی علامات، عضلات میں انقباضی حرکات کی کمی، سستی کاہلی، آنکھ کے
گولے میں غیر معمولی حرکات، خون کی غیر طبعی حالت ہونا جلد پر داغ پڑنا، پتی اچھلنا، دودھ کی پیدائش
میں زیادتی، تھوک کی کثرت، پیشاب زیادہ آنا۔

احتیاط: کلاہ گردہ کے ٹیومر، دماغ اور گردوں کی بیماریاں اور لو بلڈ پریشر میں احتیاط برتنا چاہیے

تجارتی مرکبات

ANATENSOL (SARABHAI)

اناٹن سال

Fluphenazine 1 mg tabs. 10.: Rs.7.00

ANATENSOL INJ (SARABHAI) 1ml vial: Rs. 29.81 اناٹن سال انجکشن

FLUDECAN INJ (SIGMA LABS)

فلوڈی کان انجکشن

10x1ml amp: Rs.185.50

PROLINATE INJ (SUN PHARMA)

پرولی نیٹ انجکشن

25mg/ml Vial Rs. 24.10

LITHIUM CARBONATE

لیتھیم کاربونیٹ

افعال و منافع: شدید خلل دماغی، پاگل پن، ڈپریشن اور دماغ کے ناکارہ ہونے میں مفید ہیں جسم میں پانی اور نمکیات کے توازن اور دماغ کے نظام پر اثر ڈالتے ہیں
مقدار و ترکیب: ۴۰۰ سے ۱۶۰۰ ملی گرام ایک خوراک یا دو خوراکیوں میں تقسیم کر کے یومیہ دی جانے رفتہ رفتہ مقدار خوراک میں اضافہ کیا جاسکتا ہے

منفی افعال: حمل، ایام رضاعت گردوں کے فیل ہونے، قدرہ درقیہ کے افراز کی کمی میں نہیں دینا چاہیے
مضر اثرات: معمولی متلی، ہاتھوں کا کپکپانا، درد شکم، بھوک کی کمی، قے اسہال بد ہضمی، پیاس کی زیادتی، پیشاب زیادہ آنا، عضلات پھڑکنا، ضعف، غیر طبعی حرکات ہوش و حواس گم ہونا، دورے پڑنا غشی اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔

احتیاط: ہائی بلڈ پریشر امراض قلب اور ذیابیطس میں احتیاط برتن
دواؤں کے ساتھ رد عمل: پیشاب آور ادویہ، دافع ورم و درد ادویہ NSAIDS فین ٹائن، فلوپین تھکسال، ہالوپری ڈال، ڈایازی پام میٹھائل ڈوپا، اور نٹراسا نکلین کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

LALITHIUM —(LA PHARMA)

300mg tabs 10, Rs.6 08

لالی قسیم

LICAB (TORRENT)

300mg tabs 10, Rs.8.90

لی کیب

LICAB XL (TORRENT)

Lithium carbonate 400mg 10, Rs 13 50

LITBON (PACF) 300mg tabs 10, Rs 6 95**LITHOCAP (INTAS)** 300mg 10 Rs 7 00**LITHOSUN (SUN PHARMA)** 300mg 10 Rs 6 67**LITHOSUN-SR (SUN PHARMA)**

400mg S-R tabs 10, Rs 14 00

لیکاب ایکس ایل

لیٹبون

لیٹو کپ

لیٹو سن

لیٹو سن ایس آر

PENFLURIDOL

پین فلوری ڈول

افعال و منافع اسکا زود فریاد ملنے کی حالت درست نہ ہو ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ سے بیزاری دماغی صلاحیت میں کمی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب ۲۰ سے ۱۲۰ ملی گرام ہفتہ میں ایک بار حالات کے مطابق دی جائے
 منفی اثرات ۱۰۰ سے ۱۵۰ مل گرام میں مریضوں کو نہ دی جائے، منہ خشک قبض پیشاب رکنا، تکی پھیل جانا، نیند نہ آنا، ان میں تشدد پیدا ہونا، ڈپریشن، دورے پڑنا تاک بند ہونا، الرجی، گرم سم رہنا
 احتیاط مسلسل ایام رخصت اور بچوں میں اس کا استعمال خارج از نقصان نہیں
 دواؤں کے ساتھ رد عمل نظام عصمی کو کمزور کرنے والی ادویہ، شراب، پروپرانولول، ٹرائی سائی کلب، انٹی ڈپریشن، کوئی قسمی ڈین کے مرکبات کے ساتھ خراب رد عمل ہو سکتا ہے

تجارتی مرکب**FLUMAP**

20mg - 10 Rs 79 90

فلومپ

PIMOZIDE

پائی موزائیڈ

افعال و منافع یہ ایک ڈوپامین، ری سہر بلا کر دوا ہے، شدید اسکیزوفریینیا، غلط دماغی میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب ۱ سے ۲ ملی گرام روزانہ شدید ضرورت کے تحت ۳-۸ ملی گرام
 منفی اثرات: قلبی حرکات کی بے ترتیبی میں، ای سی جی غیر طبعی ہونے کی حالت میں نہیں دینا چاہیے
 مضر اثرات: قلبی حرکات میں تبدیلی آسکتی ہے

احتیاط: ڈپریشن، پارکنسنز علامہ، مرگی جسم میں پانی کی کمی جگر و گردوں کی خرابی میں احتیاط برقرار۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: محرک قلب اور محرک اعصاب دواؤں کے ساتھ رد عمل خراب ہوتا ہے

تجارتی مرکبات

LARAP-2/4	(LA PHARMA) 4mg: 10 Rs. 17.45	لاراپ ۴/۲
MOZEP	(INTAS) 4mg: 10 Rs. 17.00	موزپ
NEURAP	(TORRENT) 4mg: 10: Rs. 39.90	نورپ
ORAP	(ETHNOR) 4mg: 10: Rs. 45.40	اورپ

PROCHLOR PERAZINE

پروکلور پیرازین

افعال و منافع: دردِ مہجہ Migrain منرڈیزیز، اندرونی کان کی خرابیاں نفسیاتی، اسکائی زوفیرینا،
شدید متلی اور تے میں مفید ہے

مقدار و ترکیب: ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار

منفی افعال: غنودگی کی حالت میں، مع العظام کی خرابی میں، جگر کی خرابی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے
مضر اثرات: لوہلڈ پریشربوڑھوں اور کمزور مریضوں میں، خشکی، خیندہ آنا، جگر کے افراز میں
رکاوٹ، الرجی، خاموشی

احتیاط: S/P خاموش اور کم سم رہنے والے مریضوں میں، لوہلڈ پریشربوڑھوں، مرگی جگر کی خرابی، حمل، ایام
رضاعت میں، امراض قلب، آنٹوں کی رکاوٹ میں احتیاط برتنا چاہیے
دوا کی ساتھ رد عمل: شراب، مرکزی نظام عصبی C.N.S مفلوج کرنے والی ادویہ، الغالباً کر کے
ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

EMIDOXYN (RALLIS) 5mg tabs 10x10: Rs. 78.63	ایمیڈاکسن
STEMETIL (RHONE-POULENC) 25mg: 10, Rs. 11.31	اسٹیمی ٹیل ٹیبلٹ
STEMETIL INJ (RHONE-POULENC)	اسٹیمی ٹیل انجکشن
1ml, Rs. 4.60: 10ml vial, Rs. 30.48	

پرومازین ہائیڈروکلورائیڈ PROMAZINE HCL

افعال و منافع: تے متلی، نفسیاتی الجھن آپریشن اور زچگی کے درد کو دور کرنے کے لئے شراب کا جنوں اور شراب کے اثرات بد کو دور کرنے کے لئے مفید ہے

مقدار و ترکیب: تے روکنے کے لئے ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام عضلاتی یا ویدی ۴ سے ۶ گھنٹہ کے وقفہ سے دیا جائے شدید حالتوں میں ۵۰ سے ۱۵۰ ملی گرام سرجری یا زچگی کی تکالیف میں ۵۰ ملی گرام ہفتی ڈین کے ساتھ ملا کر دی جائے بچوں کو ۲.۵ ملی گرام / فی کلو گرام کے حساب سے کئی خوراکوں میں تقسیم کر کے دی جائے

تھیوریدازین THIORIDAZINE HCL

افعال و منافع: بے چینی، ڈپریشن، گھبرانے، دماغی تناؤ ضدی مزاج نفسیاتی عوارض، دماغی الجھن، نیند میں خلل، جھگڑا، دماغی صلاحیت میں کمی، خلاف عادت حرکات کرنا بلا وجہ بولنا حرکت کرنا، جلد بازی، سوتے میں ڈرنا پیشاب نکل جانے میں مفید ہے

مقدار و ترکیب: بچوں کو ۵ سے ۱۵ ملی گرام روزانہ کئی خوراکوں میں تقسیم کر کے، بالغوں کو ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار ضرورت کے مطابق مقدار ۲۰ سے ۲۵ ملی گرام یومیہ دی جاسکتی ہے

منفی افعال: C/1 غنودگی اور کمزوری میں، شدید ڈپریشن خون کی خرابی نظام عصبی کی کمزوری میں نہیں دینا چاہیے

مضر اثرات: نشہ کرتی ہے، منہ خشک، چکر آنے بلڈ پریشر کم، ناک بند، دودھ کی افزائش زیادہ الرجی، روشنی سے نفرت، پیشاب بلا ارادہ نکل جانا، انزال دیر سے ہوتا

احتیاط: دوا کے دوران ڈرائیوری کرنا مشنری چلاتا منع ہے۔ علاج کے دوران خون کی جانچ کراتے رہیں حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط رکھیں

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع درد دواؤں کے ساتھ، نیند آور اور انٹی ہسٹامین دواؤں کے ساتھ استعمال نہ کرائیں

تجارتی مرکبات

MELLERETS	(SANDOZ)	میلی ریش
Thioridazine hcl 5mg tabs 5x20: Rs. 54.50		
MELLERIL	(SANDOZ) 100mg: 10 Rs.72.80	میلی رل
MELOZINE	(INTAS) 100mg: 10: Rs. 52.00	میلو زائن
RIDAZIN	(SUN PHARMA) 100mg: 10: Rs. 34.40	رڈازن
TENSARIL	(LA PHARMA) 100mg: 10, Rs. 36.00	ٹن سارل
THIORIL	(TORRENT) 100mg: 10: Rs. 28.78	تھیورل

THIOPROPERAZONE

تھاپرو پرو پیرازین

افعال و منافع: خلل دماغی، بکواس کرنا، مارنا پیننا چیننا چلانا، اسکا نزد فرینیا میں مفید ہے
 مقدار و ترکیب: ۵۰ ملی گرام عضلاتی انجکشن پھر ۵ سے ۱۰ ملی گرام براہ دہن دن میں ۳ بار شدید حالت
 میں ۵۰ ملی گرام دن میں ۲ بار انجکشن لگائیں کنٹرول ہونے پر خوردنی دوا شروع کر دیں
 احتیاط: دمہ جلد مشتعل ہونے والے مریض دماغی بے چینی، آنتوں کی رکاوٹ میں

TRIFLUOPERAZINE

ٹرائی فلو پیرازین

فعال و منافع: بکواس کرنے والے چیخ پکار لڑائی جھگڑے کرنے والے مریض اسکا نزد فرینیا کے
 مریضوں میں یہ دوا مفید رہتی ہے
 مقدار و ترکیب: ۲ سے ۶ ملی گرام روزانہ ۶ سے ۱۲ سال کے مریضوں کو ۴ ملی گرام کئی خوراکیوں میں
 تقسیم کر کے ۶ سال سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے
 منفی افعال: بے ہوشی اور غنودگی کی حالت، خون کی خرابی میں جگر کی خرابی، ورم غدہ قدامیہ، گلوکوما
 میں نقصان دہ ہے

احتیاط: پارکنسن کے مریض مرگی، حمل ایام رضاعت، دماغی امراض معمر افراد میں دماغ کو سن
 کرنے والی ادویہ کے ساتھ استعمال نہ کریں

تجارتی مرکبات

LACALM FORTE	(LA PHARMA) 10: Rs. 8.50	لاکام فورٹ
LACALM PLUS	(LA PHARMA) Rs. 5.00	لاکام پلس
NEOCALM	(INTAS) 10mg: 10: Rs. 5.00	نیو کالم
NEOCALM PLUS	(INTAS) 10:Rs.3.80	نیو کالم پلس
NEOCALM FORTE	(INTAS) 10:Rs.9.60	نیو کالم فورٹ
SIGMAZINE	(SIGMA LABS) 10mg: 10:Rs. 7.05	سگما زین
TRAZINE	(SUN PHARMA) 10mg: 10: Rs. 7.22	ٹرا زین
TRAZINE-H	(SUN PHARMA) 10: Rs.3.19	ٹرا زین ایچ
TRAZINE-S	(SUN PHARMA) 10: Rs. 5.33	ٹرا زین ایس
TRAZINE-SC	(SUN PHARMA) 10: Rs. 7.80	ٹرا زین ایس سی
TRINICALM	(TORRENT) 10: Rs.3.90	ٹرائی نی کالم
TRINICALM FORT	(TORRENT) 100: Rs.55.00	ٹرائی نی کالم فورٹ
TRINICALM PLUS	(TORRENT) 100: Rs.39.00	ٹرائی نی کالم پلس
TRIPHENAZIN	(SUN PHARMA) 10:Rs. 7.67	ٹرائی فننا زین

TRI FLUPRAMAZINE

ٹرائی فلو پر وے زین

افعال و منافع: غصہ کرنے والے جھگڑا اور بکواس کرنے والے۔ اسکاٹی زوفیرینیا میں قے و متلی
ابکائی روکنے کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۲۵ ملی گرام دن میں ۲ بار

منفی افعال: بیہوشی و غنودگی کی حالت میں خون کی غیر طبعی حالت میں جگر کی خرابی و نرم غدہ قد امیہ،
گلو کوما، ڈپریشن اور لو بلڈ پریشر میں نہیں دینا چاہیے

احتیاط: S/P پارکن سن ڈیزیز، مرگی حمل لیام رضاعت، دماغی امراض، معمر افراد میں اور دماغ کو
سکون دینے والی ادویہ کے ساتھ۔

تجارتی مرکبات

SIQUIL (SARABHAI) 10mg tabs 10: Rs. 7.43 سکوئل ٹبلٹ
SIQUIL INJ (SARABHAI) 1ml Rs. 4.93 10ml vial: 13.93 سکوئل انجکشن

TRI FLUOPERIDOL

ٹرائی فلوپری ڈول

افعال و منافع: اسکیزوفریزیا، خلل دماغی، ڈپریشن، نفسیاتی عوارض خود پسندی Autism میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ابتدا میں آدھی ملی گرام روزانہ تیسرے دن آدھی ملی گرام مقدار بڑھائی جائے زیادہ سے زیادہ ۸ ملی گرام تک دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: C/1 دواسے حساس مریضوں میں گلوکوما، امراض قلب، جگر کے امراض میں مضر ہے مضر اثرات: خشکی قبض، جس بول، خفقان، وجع القلب، بے چینی، چکر آنا بصارت میں فرق۔

احتیاط: S/P امراض قلب مرگی، ہائی بلڈ پریشر، بورم غدہ، قدامیہ، پیشاب کی کمی یا بند ہونے میں۔

تجارتی مرکبات

TRIPERIDOL (ETHNOR) 0.5mg tabs 10: Rs. 15.50 ٹرائی پری ڈول ٹبلٹ
TRIPERIDOL INJ (ITHNOR) ٹرائی پری ڈول انجکشن
2.5mg per ml inj. 6x1ml: Rs. 28.24

HALOPERIDOL

ہالوپری ڈول

اس دوا کے افعال و منافع، مقدار، خوراک، منفی افعال، مضر اثرات، احتیاط اور پر تحریر کردہ ٹرائی فلوپری ڈول کی طرح ہیں۔

تجارتی مرکبات

جوئی ڈول

BENZYDOL (LA PHARMA) جوئی ڈول ۱۰ ملی گرام
Haloperidol 5mg benzhexol 2mg tabs 10: s. 12.91
BENZYDOL-10mg (LA PHARMA) 10: Rs. 23.58 جوئی ڈول ۵ ملی گرام
BENZYDOL 1.5mg (LA PHARMA) 10: Rs. 6.74

COMBIDOL	(INTAS) 10mg: 10: Rs.18.50	کبھی ڈول
DEPIDOL	(TORRENT) 10mg: 10: Rs. 24.04	ڈی پی ڈول
DEPIDOL L.A. (TORRENT) inj. 1ml amp:	Rs.110.00	ڈی پی ڈول ایل اے
DEPIDOL DROPS (TORRENT)		ڈی پی ڈول ڈراپس
Haloperidol 2mg/ml 30ml: Rs.17.49		
HALORID	(PACE) 10mg: 10: Rs.31.00	ہالورڈ
HALOPLUS	(PACE) 10: Rs. 32.50	ہالوپلس
HEXIDOL	(TORRENT) 10: Rs.6.90	ہکسی ڈول
HEXIDOL FORTE	(TORRENT) 10: Rs.22.90	ہکسی ڈول فورٹ
HEXIDOL PLUS	(TORRENT) 10: Rs.18.90	ہکسی ڈول پلس
LARENASE	(LA PHARMA) 10MG: 10: Rs. 22.46	لاری نیس
SENORM	(SUN PHARMA) 20mg: 10: Rs. 42.41	سی نارم
SENORM-S INJ	(SUN PHARMA)	سی نارم ایس انجکشن
Haloperidol 5mg per ml inj 1 amps Rs. 4.40		
SENORM LA INJ (SUN PHARMA) 50mg inj. 1ml vial		سی نارم ایل اے
SERADOL (SIGMA LABS) 10: Rs. 23.10		سی راولڈ
SERADOL INJ (SIGMA LABS) 10x1ml amp. Rs. 44.00		سی راولڈ انجکشن
SERADOL PLUS (SIGMA LABS) Rs 13.81		سی راولڈ پلس
SERENACE (SEARLE) 5mg: per ml inj 1ml, Rs.4.56		سیری نیس
TRANCODOL (INTAS) 20mg: 10, Rs. 34.00		ٹرانکوڈول
TRANCODOL INJ. (INTAS) 1ml amp Rs. 4.50		ٹرانکوڈول انجکشن
TRINORM (SUN PHARMA) 10mg, 10, Rs. 28.20		ٹرائی نارم

TRAZODONE HCL

ٹرازوڈون

افعال و منافع: ڈپریشن، دل بیٹھنا، گھبراہٹ، بے چینی، نیند نہ آنا، وہم اسکازوفیرینا، شراب کا ڈپریشن البھن پریشانی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ ملی گرام سوتے وقت پہلے سون تک پھر ۱۰۰ ملی گرام تک دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: حمل، ایام رخصت، نرسنگ خواتین کو نہیں دینا چاہیے

مضر اثرات: خشکی، چکر آنا، سردی

احتیاط: فریسوس Periapism میں امراض قلب مرگی جگر اور گردوں کے امراض میں احتیاط برتنیں

دواؤں کے ساتھ رد عمل: D/1 مرخی عضلات Relaxant سونگھا کر بے ہوش کرنے والی ادویہ، شراب، نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ Maol، کلونی ڈین کے ساتھ دیکھنا ہے۔

تجارتی مرکبات

DEPRYL-25/50/100	(PROTEC) 100mg: 10: Rs.23.00	ڈپرائل
TRAZALON	(SUN PHARMA) 100mg 10:Rs.44.45	ٹرازالون
TRAZE 25/50/100	(LA PHARMA) 100mg 10: Rs. 40.52	ٹرازی
TAZODAC	(ALIDAC) 50mg 10: Rs. 20.60	ٹرازوڈیک
TRAZODEP	(TORRENT) 100mg: 10: Rs. 41.53	ٹرازوڈیپ
TRAZONIL	(INTAS) 100mg 10: Rs. 36.80	ٹرازونیل

مسکّنات و منومات (نیند آور)

SEDATIVES - HYPNOTICS

کلورڈایازی پاکسائیڈ CHLORDIAZEPOXIDE

افعال و منافع: بے چینی، تناؤ، آپریشن سے قبل اور بعد کی الجھن عادت بد، نیند کی کمی بد مزاجی میں مفید ہے

مقدار و ترکیب: ہاتھوں کو ۱۰ ملی گرام دن میں ۲ سے ۴ مرتبہ بچوں کو پوڑھوں کو صرف ۱۰ ملی گرام دن بھر میں یا ضرورت کے مطابق

متقی افعال: یہ تان ہاتھ جردوں کی کمزوری، خفایت، امراض قلب کے بعد صحیحیابی اور حساس مریضوں کو تندی جائے۔

مضر اثرات: نظام عصبی میں خلل، عادت پڑنا، خون میں تہدیلی ہونا سستی کاہلی

احتیاط: بوڑھے کمزور اور کم عمر بچوں، نشہ، حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں

تجارتی مرکبات

AMITROL	(TORRENT) 10: Rs.3.25	اے مٹرول
AMITROL D.S.	(TORRENT) 10: Rs.4.85	اے مٹرول ڈی ایس
AMIXIDE	(SUN PHARMA) 10: Rs.11.00	اے امکسائیڈ
AMIXIDE-5	(SUN PHARMA) 10: Rs.10.00	اے امکسائیڈ - ۵
EQUILIBRIUM	(JAGSONPAL)	ایکوی لبریم
Chlordiazepoxide 10mg tabs, 10 Rs.8.00		
EQUIREX	(JAGSONPAL) 10: Rs. 9.50	ای کیوریکس
LIMBICON	(SYSTOPIC) 10: Rs. 6.00	لی بی کون
LIBRIUM	(ROCHE)	لبریم
Chlordiazepoxide 10mg Tabs 10: Rs. 6.00 25mg 10: Rs. 9.19		

DIAZE PAM

ڈایازپام

افعال و منافع: نیند نہ آنا گھبراہٹ، پریشانی اور تناؤ کو دور کرتی ہے نفسیاتی عوارض، شراب چھڑانے کے بعد کی علامات میں، عضلات کے تناؤ اور درد کو دور کرنے کے لئے مفید و موثر ہے

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۳۰ ملی گرام ایک خوراک میں سوتے وقت

منفی افعال: عضلات کی نفاہت، بچوں کو، شدید گلوکوما میں نہیں دینا چاہیے

مضر اثرات: مرکزی نظام عصبی میں خلل، مستعدی میں کمی، ہاضمہ میں خرابی ہو سکتی ہے

احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں جگر اور گردوں کی خرابی، دماغی خرابی، اعضاء تنفس کی خرابی میں احتیاط برتنا چاہیے

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، مرخی اور مفلوج کرنے والی ادویہ سی می ٹی ڈین فین ٹائن بیہوش کرنے والی ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

ANXOL	(SIGMA LABS) 10mg: 10: Rs. 8.70	این کسول مہلپٹ
ANXOL INJ.	(SIGMA LABS) 10ml: vial: Rs. 11.90	این کسول انجکشن

CALMOD	(IDPL) 5mg tabs. 10: Rs 6.65	کالموڈ
CALMPOSE	(RANBAXY) 5mg tabs 10: Rs 8.00	کالمپوز ٹبلٹ
CALMPOSE INJ	(RANBAXY) 10x2ml amps Rs. 70.10	کالمپوز انجکشن
CALMPOSE SUSPENSION	(RANBAXY) 60ml Rs. 16.80	کالمپوز سرب
CAMRELEASE-TR	(NATCO) 15mg: 10: Rs. 15.00	کیمری لیزٹی آر
DIZEP	(INTAS) 10mg. 10: Rs. 3.70	ڈائی زیپ
DIZEP -P INJ	(PREM PHARMA) 2ml: Rs 5.00	ڈائی زیپ پی انجکشن
ELCION CR	(RANBAXY) 10mg e-r caps. 10 Rs. 11.98	الکون کری آر
LORI INJ	(NEON) 10x2ml amps, Rs. 65.00	لوری انجکشن
NEOMESMAR TABS	(DEYS) 10mg tabs: 10. Rs. 3.50	نیو میس مار ٹبلٹ
PAXUM	(EST INDIA) 5mg: tabs 10 Rs. 5.61	پاکسوم
PAXUM INJ	(EST INDIA) 2ml, Rs. 2.85	پاکسوم انجکشن
PEACIN	(LA PHARMA) 5mg tabs 10: Rs 2.81	پی سین
PLACIDOX	(LUPIN) 10mg: 10's: Rs. 10.69	پلاسی ڈاکس
VALIUM-2,5,10	(ROCHE) 10: Rs. 10.24	ولیئم ۲-۵-۱۰

FLURAZEPAM

فلورازی پام

افعال و منافع: نیند نہ آنا، بے خوابی سر Insomnia بے چینی میں مفید ہے

مقدار و ترکیب: ۱۵ سے ۲۰ ملی گرام سوتے وقت

مضر اثرات: کالی وستی، پکر آنا، خشکی، عادت پڑنا ضدی

احتیاط: طویل عرصہ استعمال کرنے، اچانک دوا بند کرنے لو بلڈ پریشر، عضلات کی کمزوری، قلب و جگر گردوں کی خرابی، نفسیاتی الجھنوں، گلوکوما، اسکائرزوفیرینا، مرگی، ڈپریشن حمل اور ۱۵ سال سے کم عمر میں احتیاط برتیں

دواؤں کے ساتھ رد عمل: مرکزی نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی دوا، شراب، ڈائی سلفوریم، سی ٹی ٹی ڈین اور دودھ روکنے والی دواؤں کے ساتھ استعمال نہ کریں

تجارتی مرکبات

نندرال (TORRENT) Flurazepam 15mg caps 10: Rs. 16.70

HYDROXYZINE

ہائیڈروکسائی زین

افعال و منافع: چکر بے چینی، ڈر خوف، آپریشن سے پہلے اور بعد کی الجھن گھبراہٹ کے لئے، نیند نہ آنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے کے بعد

منفی افعال: C/I حالت حمل میں دینا منع ہے

مضر اثرات: خشکی، جگر اور معدہ کی رطوبات میں کمی، زیادہ مقدار میں استعمال سے حرکات غیر ارادی کرتا

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصبی کو خراب کرنے والی ادویہ، مانع الجھلا خون ادویہ، کے ساتھ استعمال مضر ہے

تجارتی مرکبات

ATARAX TABS	(UNI-UCB) 25mg: 10, Rs 9 80	ایچریکس ٹبلٹ
ATARAX SYRUP	(UNI-UCB) 100ml Rs. 26 05	ایچریکس سیرپ
ATARAX DROPS	(UNI-UCB) drop; 15ml Rs. 16 50	ایچریکس ڈراپس
ATARAX INJ	(UNI-UCB) 2ml Rs. 6.51	ایچریکس انجکشن
VESPARAX	(UNI-UCB) 4: Rs. 4.50	ویس پارکس

LORAZEPALM

لورازی پام

افعال و منافع: بے چینی، ڈر خوف، آپریشن سے پہلے اور بعد کی الجھن اور گھبراہٹ کے لئے اور نیند نہ آنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: معمولی حالت میں ۱ سے ۴ ملی گرام روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے شدید حالتوں میں ۱۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے آپریشن کی گھبراہٹ کے لئے ۲ سے ۳ ملی گرام نیند نہ آنے کے لئے ۲ سے ۴ ملی گرام سوتے وقت

منفی افعال: C/I لورازی پام سے حساس مریضوں اور گلوکوما کے مریضوں کو نہ دی جائے

مضر اثرات: گھبراہٹ خلق خشک سونے سے اٹھنے پر درد سر، چکر آنا بصارت میں فرق ہٹا،

احتیاط: جگر اور گردوں کے مریضوں، نچیف و لاغر مریض، حمل لیام رضاعت کے دوران احتیاط
برہن دوا کے دوران ڈرائیوری اور مشنری چلانے سے باز رہیں۔

تجارتی مرکبات

ATIVAN	(WYETH) 2mg: 10: Rs. 7.90	اے ٹی وان
CALMESE	(THEMIS CHEMICALS) 2mg: 10: Rs. 7.36	کالمنس بیٹ
CALMESE INJ	(THEMIS CHEMICALS) 2ml: 10: Rs. 7.36	کالمنس انجکشن
LARPOSE	(CIPLA) 2mg: 10: Rs. 8.25	لارپوز
TRAPEX	(SUN PHARMA) 2mg 10, Rs. 7.00	ٹراپیکس

NITRAZEPALM

ناٹرازی پام



افعال و منافع: ہر قسم کی بے خوابی، نیند غائب ہونے میں مفید ہے

مقدار و ترکیب: ۵ سے ۱۰ ملی گرام سوتے وقت

منفی افعال: عضلات کی کمزوری اور کمزور مریضوں میں استعمال نہ کرائیں

مضر اثرات: کاپی، سستی، حرکات غیر ارادی مرکزی نظام عصبی میں خلل

احتیاط: نظام تنفس کی کمزوری میں حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں احتیاط برہن

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ کے ساتھ نہیں دینا

چاہیے۔

تجارتی مرکبات

DORMIN-5/10	(MICRO LABS)	ڈورمن
NIPAM	(LA PHARMA) 10mg tabs 10: Rs. 8.50	نپام
NITAVAN 5/10	(STADMED) 10mg: 10: Rs. 9.40	نٹاوان ۵-۱۰
NITRAVET	(ANGLO FRENCH) 10mg: 10: Rs. 10.40	ناٹراویٹ
NITRAVET KID TABS	(ANGLO FRENCH)	ناٹراویٹ بچوں والی
2.5mg: 10: Rs. 4.50		
NITROSUN	(SUN PHARMA) 10mg: 10: Rs. 10.40	ناٹروسن
RESTOREM	(BDH) 10mg: 10: Rs. 7.20	ریسٹورم

OXAZEPAM

آکسازپیام

افعال و منافع: بے چینی، تناؤ، ضدی پن، نفسیاتی دباؤ میں مفید ہے

مقدار و ترکیب: ۱۵ سے ۳۰ ملی گرام دن ۲-۳ بار

منفی افعال: خلل دماغی اور ۶ سال سے کم عمر بچوں کو نہ دی جائے

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی، مرگی، حمل اور لیام رضاحت میں احتیاط برتیں

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ انجماد خون کو روکنے والی

خوردنی ادویہ کے ساتھ رد عمل خراب ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

SEREPAX (WYETH) Oxazepam 15mg tabs 10, Rs. 5.90 سیری پیکس

SEREPAX 30 TABS (WYETH) سیری پیکس ۳۰

Oxazepam 30mg tabs 10, Rs. 9.80

PHENOBARBITONE

فینوباربیٹون

افعال و منافع: بے خوابی، درد کو روکنے، مرگی، زچگی کے دوروں میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۰ سے ۲۱۰ ملی گرام پوسہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے شدید مرگی کے لئے ۳۰۰

۸۰۰ ملی گرام زچگی کے دوروں میں ۲۰ ملی گرام دینا چاہیے

منفی افعال: C11 خلل دماغی گردوں اور جگر کی خرابی، قلب کی خرابی شدید ضعف میں نہیں دینا چاہیے

مضر اثرات: سستی کاٹلی، ڈر خوف سے جلد متاثر ہونا، عادی ہونے کا خطرہ

احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں، اچانک دوا بند کرنے میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

GARDENAL (RHONE POULENC)

30mg: 10: Rs. 4.88, 60mg: 10: Rs. 6.72

LUMINAL (BAYER) 100mg: 50 Rs. 5.25

گارڈی نال

لومی نال

LUMINALETES (BAYER)

لومی نالیٹ

Phenobarbitone 15mg tabs 30 Rs. 1.33

PHENOBARB 30/60 (INTAS) 10: Rs. 3.80

فینوبارب ۳۰/۶۰

PHENOBARBITONE SOD. INJ (RHONE POULENC)

فینوباربیٹون انجکشن

10x1 ml: Rs. 121.28

TRICLOFOS SODIUM

ٹرائی کلوفوس سوڈیم

افعال و منافع: نیند آور منوم دوا ہے۔ نیند کے عمل کو تیز کر کے جلد نیند لاتی ہے

مقدار و ترکیب: سوئے سے ۳۰ منٹ قبل بچوں کو ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی گرام عمر کے حساب سے دی

جائے۔ تسکین درد کے لئے ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار۔

منفی اثرات: جگر اور گردوں کے امراض، قلب کے شدید امراض میں نہیں دینا چاہیے

مضر اثرات: معمولی درد سر، ہاضمے کی خرابیاں جسم پر داغ پڑتا۔

احتیاط: شوگر سٹ کا نتیجہ غلط برآمد ہونے پر، دوا کے استعمال کے بعد ڈرائیوری اور مشین چلانے

سے احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: MAOI؟ شراب، باربیٹون کے مرکبات مانع انجماد خون ادویہ۔

تجارتی مرکبات

TRICLORYL SYRUP (GLAXO)

ٹرائی کلورائل

Triclofos Sodium BP 500mg per 5ml liquid 50 ml: Rs. 33.10

جراثیم کش ادویہ (انٹی بائیوٹک)

ANTIBIOTICS

AMIKACIN

امی کاسین

افعال و منافع: شدید انفکشن، متعدد امراض، گرام مثبت Gram-Positive گرام منفی

Gram-Negative جراثیم سے پیدا ہونے والے امراض مثلاً تعفن الدم Septice mia

آلات تنفس کے انفیکشن، سرسام، آنتوں کی سوزش، ورم، آپریشن کے بعد کے زخم، جلنے کے زخم ایسے جراثیم جو دوسری انٹی بائیوٹک سے ختم نہ ہو سکیں ہار ہار ہونے والے انفیکشن، آلات بول کے انفیکشن وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے دن میں ۲ بار تقسیم کر کے عضلاتی یا وریدی انجکشن لگائیں۔ نو مولود بچوں کو ۱۰ ملی گرام وزن کے حساب سے دن میں ۲ بار۔ خطرناک اور مہلک انفیکشن جس میں زندگی کو خطرہ لاحق ہو ۵۰۰ ملی گرام ہر ۸ گھنٹہ بعد دینا چاہیے زیادہ سے زیادہ ڈیرہ ۱۰ گرام پوریمین سے زیادہ علاج جاری نہ رکھیں۔

منفی افعال: ۱/ حمل ایام رضاعت اور گردوں کی خرابی میں دینا نقصان دہ ہے
احتیاط: جسم میں پانی کی کمی Dehydration میں مقدار خوراک کم دیں علاج سے پہلے پانی کی کمی کو پورا کرنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

AMIBIOTIC INJ 500/250/100	(NEON)	ایمی بائیوٹک انجکشن
100mg: 2ml vial Rs. 16.00		
AMICIN	(BIOCHEM)	ایمی سین
250mg: vial Rs 38.00: 500mg: vial Rs. 62.00		
AMIKACIN INJ	(PREM PHARMA)	ایمی کاسین
500mg: 2ml vial: Rs.62.00		
AMIRON	(KAMRON) 500mg: 2ml vial. Rs. 54.00	ایمی ران
ARKACIN	(MICRO LABS)	ارکاسن
IVIMICIN	(FDC) 500mg: 2ml vial Rs. 60.05	ایوی مائی سین
MIKAJECT	(TROIKAA) (500mg: 2ml vial: Rs.58.67	می کاجیکٹ
MIKACIN	(ARISTO) 500mg vial Rs. 62.00	می کاسین
PRIMIKACIN	(HIND ANTIBIOTICS)	پرائمی کاسن
• URTI • Sinusitis • Otitis media • UTI Uncomplicated		



AMOXYCILLIN

ایموکسیلین

افعال و منافع: آلات بول U.T.I.، آلات تنفس R.T.I. آلات ہضم G.T.I. کے انفکشن، سرسام، ورم غلاف القلب، صفر کی نالی کا انفکشن جلد اور نرم ساختوں کے انفکشن سوزاک کان ناک حلق E.N.T کے انفکشن سے حفاظت اور علاج کے لئے مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: معمولی اور اوسط درجے کے انفکشن میں ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار شدید انفکشن میں ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام وزن کے حساب سے روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے ہر ۸ گھنٹہ بعد سوزاک میں اگر ام کی ایک خوراک دی جائے۔

منفی افعال: اپنی سیلین سے الرجک افراد میں

مضر اثرات: نظام ہضم کی خرابی، اسہال کی شکایت ہو سکتی ہے

احتیاط: الرجک ری ایکشن میں، مونونیو کلو سس کے انفکشن میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

AMBROX (DEE PHARMA)	ایم بروکس
250mg: 10: Rs.28.50; 500mg: 10:Rs.52.50	
AMOKID (DEE PHARMA) 250mg:10:Rs.29.50	ایموکڈ
AMONATE (DEE PHARMA) 125mg: caps 6: Rs. 138.00	ایمونیت
AMOTID (DOLPHIN)	ایموٹڈ
250mg: 6: Rs.15.09; 500mg: 6: Rs. 29.07	
AMOTID BR (DOLPHIN)	ایموٹڈ بی آر
250mg: 6: Rs.17.59 500mg: 6: Rs.33.23	
AMOXIL (GERMAN REMEDIES)	ایموکسل
250mg: 6: Rs. 18.21; 500mg: 6: Rs.34.70	
AMOXIVAN (KHANDELWAL) 500mg: 6, Rs. 32.40	ایموکسی وان
AMOXIVAN DRY SYRUP (KHANDELWAL)	ایموکسی وان سیرپ
60ml: Rs. 25.17	
AMOXYBID (BIDDLE SAWYER)	ایموکسی بیڈ
250mg: 6: Rs.18.02; 500mg: 6: Rs.34.30	

AMOXYBID DRY SYRUP (BIDDLE SAWYER)	60ml Rs 23.40	ایموکسی بائیڈ سیرپ
AMOXYCILLIN CAPS (LYKA)	250mg: Caps: 100's Rs. 220.00	ایموکسی سیلین کپسول
BIOMOX DRY SYRUP (BIOCHEM)	30ml: Rs. 13.20	بیو موکسی سیرپ
BIOMOX CAPS (BIOCHEM)	250mg: 10caps Rs. 30.95; 500mg: 10caps Rs. 58.90	بیو موکسی کپسول
BIOMOX PAED. DROPS (BIOCHEM)	10ml: Rs. 14.40	بیو موکسی ڈراپس
BLUMOX 250/500 (BLUE CROSS)	250mg: 10: Rs. 32.00, 500mg: 6: Rs. 33.00	بلو موکسی
BLUMOX-P (BLUE CROSS)	125mg, disp. kid tabs. 10, Rs. 20.00	بلو موکسی پی
BLUMOX BH (BLUE CROSS)	10's: Rs. 33.00	بلو موکسی بی ایچ
BLUMOX BH DT 250/500 (BLUE CROSS)	250mg: 10. Rs. 33.00; 500mg: 6 Rs. 35.00	بلو موکسی ڈی ٹی
BROMOLIN CAPS (PROTEC)	250mg : 15: Rs. 46.20; 500mg: 6: Rs. 35.30	برو مولین کپسول
BROMOLIN D.T. (PROTEC)	125mg: 6: Rs. 12.00; 250mg: 6: Rs. 18.60	برو مولین ڈی ٹی
BROMOLIN SYRUP (PROTEC)	30ml: Rs. 20.30	برو مولین سیرپ
BROMOXYL FORTE (CONCEPT)	250mg: 10: Rs. 31.20, 500mg: 10: Rs. 59.40	برو موکسیل فورٹ
CARBOMOX 250/500 (WIN MEDICARE)	250mg: 6: Rs. 29.70; 500mg: 6: Rs. 46.80	کاربو موکسی
CIDOMEX (ROUSSEL)	250mg: 6, Rs. 16.86; 500mg: 6, 33.78	سی ڈو میکس
CIDOMEX DRY SYRUP (ROUSSEL)	60ml: Rs. 21.11	سی ڈو میکس
CIDORESP 250 (ROUSSEL)	250mg: 6: Rs. 20.27	سی ڈو ریسپی
CLAVUNATE (MAX)	6: Rs. 165.00	کلاوونیٹ
DAMOXY DRY SYRUP (DABUR)	60ml Rs. 21.26	ڈاموکسی سیرپ
DAMOXY PAED DROPS (DABUR)	10ml Rs. 13.89	ڈاموکسی ڈراپس

DANEMOX	(SOL)	ڈانی موکس
Amoxycillin 250mg 10x10 Rs 224 50, Amoxycillin 500mg 10x10 Rs. 429.70		
DANEMOX FORTE	(SOL)	ڈانی موکس فورٹ
Amoxycillin trihydrate 250mg dispersible tabs 10x10 Rs 224 50		
DANEMOX-KID	(SOL)	ڈانی موکس کڈ
Amoxycillin trihydrate 125mg tabs 25x10 Rs. 375 00		
DELAMIN	(HIND ANTIBIOTICS)	ڈی لامن
250mg: 6: Rs. 16 51, 500mg: 6: Rs. 31.37		
DELAMIN DISTABS	(HIND ANTIBIOTICS)	ڈی لامن ڈسٹس مہلیٹ
Amoxycillin trihydrate 125mg dis. tabs 10Rs.11.09		
DELAMIN ORAL SUSP	(HIND ANTIBIOTICS)	ڈی لامن سرپ
40ml Rs.14.66		
DICIMOX	(INDOCO)	ڈی سی موکس
250mg: 4: Rs. 11 83, 500mg: 4: Rs.19.95		
DICIMOX KID	(INDOCO)	ڈی سی موکس کڈ
Amoxycillin 125mg: disp. tabs: 10: Rs.15.96		
FALMOX (FALMA)	125mg: 10:Rs.26.50; 500mg.10 Rs.49.20	فالموکس
FALMOX DRY SYRUP (FALMA)	60ml:Rs.18.95	فالموکس سرپ
FALMOX DISTAB (FALMA)	250mg:10:Rs.28.95	فالموکس مہلیٹ
FLEMICLOX	(MEJDA)	فلی می کلاکس
Amoxycillin 250mg cloxacillin 250mg caps 6: Rs.25 60		
FLEMIPEN	(MEJDA)	فلی پی پن کپسول
250mg: 15: Rs. 40.69 500mg: 6: Rs.31.01		
FLEMIPEN DROPS	(MEJDA) 10ml: Rs.14.10	فلی پی پن ڈراپس
FLEMIPEN DRY SYRUP (MEJDA)	40ml: Rs.24.86	فلی پی پن سرپ
FLEMOXIN	(EAST INDIA) 40ml Rs. 14.27	فلی موکسن
GUTENFLOX	(MERCK) 500mg: 6: Rs. 33.01	گوٹن فلوکس
HYCIMOX	(PHARMED)	ہائی سی موکس
250mg : 10: Rs.26.26 : 500mg: 10: Rs. 49.92		
HYKIL	(REMEDIES (INDIA)	ہائی کل
250mg: 10: Rs. 26.50; 500mg: 10: Rs. 49.90		

HYKIL DRY SYRUP	(REMIDIES (INDIA)	ہائی کل سرپ
60ml Rs.19.46		
HYKIL PLUS CAPS	(REMIDIES (INDIA)	ہائی کل پلس
Amoxycillin 250mg cloxacillin 250mg caps 6	Rs. 29.61	
IDIMOX	(IDPL)	آئی ڈی موکس
250mg: 6: Rs.15.88; 500mg: 6: Rs.30.18		
IDIMOX DRY SYRUP	(IDPL) 60ml Rs. 19.60	آئی ڈی موکس سرپ
IMOX	(IPCA)	آئی موکس
250mg: 6: Rs. 16.25; 500mg: 6: Rs. 30.95		
IMOX-CLO	(IPCA) 250mg: caps: 6:Rs.31.22	آئی موکس کلو
LAMKLOX	(LYKA) caps 6: Rs.36.42	لیم کلاکس
LAMOXY (LYKA)	250mg: 3: Rs.8.01 500mg: 3: Rs.15.50	لاموکسی
LAMOXY DRY SYRUP	(LYKA) 40ml:Rs.23.68	لاموکسی ڈرائی سرپ
LAMOXY DISP. TAB	(LYKA) 250mg: 10: Rs.20.77	لاموکسی ڈسپلٹ
LAMOXY-BX (LYKA)	caps 6: Rs.19.50	لاموکسی بی-ایکس
MATA-PX 250/500	(NATCO)	ماتا پی ایکس
250mg: 10: Rs.22.45, 500mg: 10: Rs. 43.15		
MAXMOX	(MAX)	میکس موکس
250mg: 6, Rs. 16.23; 500mg: 6, Ra. 30.14; Syrup 40ml, Rs.14.00;		
Drops: 10ml, Rs.13.24		
METAMOX	(BDH) 250mg: caps: 10: Rs.25.52	میتاموکس
METAMOX DRY SYRUP	(BDH) 60ml: Rs. 19.80	میتاموکس سرپ
METACLOX	(BDH) 250mg: caps: 10: Rs. 51.00	میتاکلاکس
MINOXIL DRY SYRUP	(P&B LABS) 40ml Rs. 14.90	میناکسل سرپ
MOCLOX	(KIPRAN) 250mg: caps 6: Rs. 33.10	موکلاکس
MOCLOX DRY SYRUP	(KOPRAN) 40ml: Rs. 25.88	موکلاکس سرپ
MOX	(GUFIC) 250mg: 15:Rs. 40.64, 500mg: 15:Rs.74.92	موکس
MOX DRY SYRUP	(GUFIC) 60ml :Rs 35.49	موکس سرپ
MOX INJ.	(GUFIC)	موکس انجکشن
250mg vial,Rs.11.70, 500mg vial, Rs.19.20		
MOXILUM	(BIOCHEM)	موکسی لم
250mg: 10: Rs. 26.95, 500mg: 4: Rs. 48.90		

MOXILUM DRY SYRUP (BIOCHEM)	40ml Rs 15 31	موکسی لم سرپ
MOXILUM PAED. DROPS (BIOCHEM)	20ml Rs 10 31	موکسی لم ڈراپس
MOXYCARB (NICHOLAS)		موکسی کارب
250mg. 10: Rs. 38.79, 500mg. 10 Rs 63.30		
MOXYDIL (DUPHAR)		موکسی ڈل
250mg. 6: Rs. 16 29, 500mg. 6: Rs 31 02		
MOXYDIL INJ (DUPHAR)		موکسی ڈل انجکشن
250mg 5 ml vial Rs. 13 32: 500mg: 5ml vial, Rs. 22.62		
MOXYDIL SYRUP (DUPHAR)	40ml: Rs. 23 66	موکسی ڈل سرپ
MYCOCIN (CFL)	10: Rs. 31 82	مائی کو سین
MYCOCIN FORTE CAPS. (CFL)	caps 10: Rs 54.42	مائی کو سین کپسول
MYCOCIN DRY SYRUP (CFL)	30ml: Rs. 21.14	مائی کو سین سرپ
NATAMOX (NATCO)	250mg: 15. Rs. 40.15	ناٹو موکس
NATAMOX PAEDIATRIC DROPS (NATCO)		ناٹو موکس ڈراپس
10ml Rs.15.62		
NOVACLOX (CIPLA)	caps 9: Rs. 43.75	نو واکلاکس
NOVACLOX PED TABS (CIPLA)	tabs 15: Rs. 40.11	نو واکلاکس ٹیبلٹ
NOVAMOX (CIPLA)		نو و موکس
caps. 250mg: 15: Rs. 54.00, 500mg: 6: Rs. 39.00		
NOVAMOX DRY SYRUP (CIPLA)		نو و موکس سرپ
syrup 30ml: Rs. 14.50, 60ml: Rs.26.00		
NOVAMOX DT (CIPLA)	250mg: 15: Rs. 48.15	نو و موکس ڈی ٹی
NUMOX 250 (JENBURKT)	2ml vial; Rs 17.50	نو موکس ۲۵۰
NUMOX 500 (JENBURKT)	2ml vial; Rs. 23.90	نو موکس ۵۰۰
NUMOX 1000 (JENBURKT)		نو موکس ۱۰۰۰
500mg, inj. 3ml vial; Rs. 35.00		
OMNIPEN (PHARMED)	250mg caps : 10: Rs. 53 50	اوم نی پن
OPTIMOX-B (TROIKAA)		آپٹی موکس بی
Amoxycillin 250mg & bromhexine hcl 8mg: tabs: 10: Rs. 32 50		
OPTIMOX (TROIKAA)		آپٹی موکس
200mg: 10: Rs. 30.00, 500mg: 10: Rs. 56.00		
OPTIMOX INJ (TROIKAA)	500mg 1 vial: Rs. 21.20	آپٹی موکس انجکشن

PHENOXYL (RECON)	250mg. 10 Rs. 29.00, 500mg 10. Rs 52.00	فینوکسیل کپسول
PHENOXYL DRY SYRUP (RECON)	60ml: Rs. 23.00	فینوکسیل سیرپ
RESPIMOX (WOCKHARDT)	caps; 250mg: 6, Rs.21.10; 500mg: 6, Rs. 36.00; Syrup Amoxycillin 125mg, 250mg, bromhexine hcl; 4mg & 8mg per 5ml, 125mg: 30ml. Rs 15.70, 250mg 30ml, Rs 22.90	ریسپی موکسن
SUPRIMOX (GUFIC)	250mg caps 12: Rs. 59.90	سپری موکسن
SUPRIMOX INJ (GUFIC)	500mg vial Rs.19.10	سپری موکسن انجکشن
SYMOXYL (SARABHAI)	250mg: 6. Rs. 17.95; 500mg. 6: Rs. 34.80	سالی موکسن
SYMOXYL DRY SYRUP (SARABHAI)	60ml Rs.20.57	سالی موکسن سیرپ
SYMOXYL BR (SARABHAI)	250mg 6 Rs 18.36, 500mg 6 Rs. 33.82	سالی موکسن بی آر
SYMOXYL BR SUSP (SARABHAI)	30ml. Rs. 14.28	سالی موکسن بی آر سیرپ
TRESMOX (SARABHAI)	Amoxycillin 250mg Cloxacillin 250 caps; 6, Rs. 24.79	ٹریس موکسن
TORMOXIN (TORRENT)	250mg: 6. Rs. 19.50; 500mg: 6: Rs. 37.50	ٹورموکسن
TORMOXIN DRY SYRUP (TORRENT)	300ml: Rs. 11.38	ٹورموکسن
WARCILIN (PARKE DAVIS)	250mg: 3: Rs. 6.50; 500mg: 3: Rs. 12.98	وارسلین کپسول
WARCILIN DRY SYRUP (PARKE DAVIS)	30ml Rs. 9.00 60ml Rs. 15.51	وارسلین کپسول
XYTID (KAMRON)	250mg:10:Rs.29.27, 500mg:10:Rs.58.39	آئی ٹی ڈی
XYTID DRY SYRUP (KAMRON)	30ml: Rs.11.95	آئی ٹی ڈی سیرپ
ZAMOX 250/500 (PFIMEX)	caps 250mg: 10: Rs. 25.00 500mg: 10: Rs. 45.00	زاموکس کپسول
ZAMOX DISPERSIBLE TABS (PFIMEX)	125mg: 10: Rs. 14.50mg: 10: Rs. 27.50	زاموکس ٹیبٹ

AMPICILLIN

ایمپی سیلین

افعال و منافع: گرام مثبت Gram Positive اور گرام منفی Gram Negative جراثیم (بکٹیریا) سے پیدا ہونے والے امراض بھیچڑوں کے انفکشن، پیشاب کی نالی UTI غذائی نالی (G.I.T.I.) ناک کان حلق E.N.T. انفکشن، نمونیہ، سوزاک کے لئے مفید ترین دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ ملی گرام سے ۱ گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد، بچوں کو ۱۵۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی افعال: جینی سیلین سے حساس مریضوں میں الرجی ہو سکتی ہے۔

مضر اثرات: نظام ہضم میں خلل واقع ہوتا ہے۔

احتیاط: مولونیو کلو سس، گردوں کی خرابی، اور حمل میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: پروبینی سڈ کے ساتھ اس کے اثرات خون میں دیر تک قائم رہتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

ADILOX	(ALBERT DAVID)	ایسڈی لاکس
Ampicillin 250mg cloxacillin 250mg caps, 10,	Rs 44.92	
ALBERCILIN	(HOECHST)	البر سیلین
250mg: 4	Rs 6 97 500mg: 4: Rs. 12.96	
ALBERCILIN DROPS	(HOECHST) 10ml	البر سیلین
ALBERCILIN INJ	(HOECHST)	البر سیلین
250mg; vial; Rs. 6.99, 500mg; Rs. 9 63		
AMCLOX	(WALTER BUSHNELL) 250mg: caps 8:	ایم کلاکس
AMCLOX INJ	(WALTER BUSHNELL) 1vial	ایم کلاکس
AMPIDIL	(DUPHAR) 250mg caps 100:	ایمپی ڈیل
AMPIDIL SYRUP	(DUPHAR) 40ml	ایمپی ڈیل سرپ
AMPILIN (LYKA) 250mg. 16,	Rs.42.35; 500mg; 8,	ایم پی لین
AMPILIN DRY SYRUP	(LYKA) 40ml: Rs.25.25	ایم پی لین سرپ
AMPILIN TABS	(LYKA) 10,	ایمپی لین ٹبلٹ

AMPILIN INJ	(LYKA)	ہیپنی لین انجکشن
250mg 1 Rs 9 80 500mg. 1 Rs 11 94 1g Rs 18 95		
AMPILOX	(BIOCHEM) 250mg caps 10 Rs 52 50	ہیپنی لاکس
AMPILOX DRY SYRUP	(BIOCHEM) 40ml Rs 27 00	ہیپنی لاکس سیرپ
AMPILOX DS INJ	(BIOCHEM)	ہیپنی لاکس ڈی ایس انجکشن
Ampicillin 500mg, Cloxacillin 500mg inj Vial Rs 19 84		
AMPILOX INJ	(BIOCHEM)	ہیپنی لاکس انجکشن
Ampicillin 250mg Cloxacillin inj vial Rs. 13 92		
AMPILOX PAEDIATRIC INJ	(BIOCHEM) (بچوں والا)	ہیپنی لاکس انجکشن (بچوں والا)
Ampicillin 125mg: cloxacillin 125mg inj vial Rs 10 25		
AMPLUS	(JAGSONPAL)	ایم پلس
Ampicillin 250mg Cloxaacillin 250mg lactobacillus sporogenes 60million caps 10, Rs 58 80		
AMPLUS INJ	(JAGSONPAL)	ایم پلس انجکشن
Ampicillin 250mg Cloxacillin 250mg vial Rs. 14 20		
AMPIPEN	(WYETH) 250mg: 10 Rs. 26.59; 500mg: 10: Rs. 50.24	ایم پی پن
AMPIPENDRY POWDER	(WYETH) 60ml. Rs 20 25	ایم پی پن سیرپ
AMPISYN	(CIPLA) Inj. 5ml vial Rs. 5 42	ایم پی سائن
AMPISYN CAPS	(CIPLA)	ایم پی سائن کپسول
250mg: 4.Rs.6.72 500mg: 4:Rs.12.69		
AMPISYN SYRUP	(CIPLA) 40ml Rs 9 54	ایم پی سائن سیرپ
AMPITUM	(FDC) 1.5g vial inj Rs. 93 30	ایم پی ٹم
AMPITUM 750 INJ	(FDC) 0.75g vial inj Rs. 50.65	ایم پی ٹم ۷۵۰ انجکشن
AMPOXIN	(UNICHEM)	ایم پوکسن
250mg: 10: Rs. 26.95; 500mg: 10 Rs. 49.90		
AMPOXIN DRY SYRUP	(UNICHEM)	ایم پوکسن سیرپ
30ml Rs. 22 90, 60ml: Rs. 41 00		
ANTIBIOTICS	(PREM PHARMA) 500mg 10ml vial Rs. 11.50	انٹی بائیوٹک
ARISTOCILLIN	(ARISTO) 250mg: 4: Rs.10.36, 500mg:8 Rs.45.02	اریسٹو سیلین
ARISTOCILLIN INJ	(ARISTO)	اریسٹو سیلین انجکشن
250mg: vial Rs. 9.57, 500mg: vial, Rs. 13 14		
BACIPEN	(ALEMBIC) 250mg: 4: Rs. 11.50; 500mg: 4: Rs. 21.50	بای پی پن

BACIPEN INJ	(ALEMBIC)	ہاسی پن انجکشن
250mg: vial. Rs.8.00; 500mg: vial: Rs.11.50		
BAXIN	(LYKA) 250mg caps 8. Rs. 39 50	ہاکسن کپسول
BAXINSYRUP	(LYKA) 24g .Rs. 27.64	ہاکسن سیرپ
BAXIN INJ	(LYKA)	ہاکسن انجکشن
250mg: 1 vial: Rs.11.76 500mg: 1 vial Rs. 15.09 1000mg: 1 vial Rs.21 03		
BETAMAP	(TORRENT) 1vial Rs. 78.10	ہٹامپ انجکشن
BETAMAP ORAL	(TORRENT) tabs: 4: Rs.170.00	ہٹامپ اورل
BICLOPEN CAPS	(P&B LABS) 250mg caps; 10 caps Rs. 49.50	ہیکلوپین کپسول
BICLOPEN INJ	(P&B LABS) 1vial Rs. 14 14	ہیکلوپین انجکشن
BILACTAM FORTE	(CFL) 250mg caps 4: Rs 19 80	بی لاکٹام فورٹ
BILACTAM DRY SYRUP	(CFL) 60ml: Rs. 40.10	بی لاکٹام سیرپ
BIOCILIN	(BIOCHEM) 250mg: 10 Rs. 30.75, 500mg: 10: Rs. 56.95	ہیو سیلین
BIOCILIN DROPS	(BIOCHEM) 10ml: Rs.15.50	ہیو سیلین ڈراپس
BIOCILIN DRY SYRUP	(BIOCHEM) 30ml: Rs.15.50	ہیو سیلین سیرپ
BIOCILIN INJ	(BIOCHEM)	ہیو سیلین انجکشن
250mg: Rs.10.75, 500mg: Rs.15 00, 1g. Rs.20.95		
BLUCILLIN TABS	(BLUE CROSS)	ہیو سیلین ٹیبس
Ampicillin 250mg tabs; 10. Rs 26.80		
BLUCILLIN INJ	(BLUE CROSS)	ہیو سیلین انجکشن
Ampicillin 500mg/3ml inj. 1 amp: Rs.12.10		
BLUCLOX 500/250	(BLUE CROSS)	ہیو کلاکس ۵۰۰/۲۵۰
Ampicillin 250mg, cloxacillin 250mg/3ml inj Rs. 12.50, Ampicillin 125mg & cloxacillin 125mg/2ml inj: Rs.9.00		
BLUCLOX 500	(BLUE CROSS)	ہیو کلاکس ۵۰۰
Ampicillin (as sod.) 500mg, cloxacillin (sod.) 500mg: caps: 6: Rs.26.25		
BROACIL	(IDPL) 250mg: 4: Rs.9 85; 500mg: 4. Rs. 18.68	ہیو اسیل
BROACIL DRY SYRUP	(IDPL) 40ml: Rs.22 61	ہیو اسیل سیرپ
BROACIL INJ	(IDPL) 1vial: Rs. 10.22	ہیو اسیل انجکشن
BROADICILIN	(ALKEM)	ہیو ڈی سیلین
250mg: 10: Rs.28 80: 500mg: 10: Rs. 50.30		

BRODICLOX	(ALKEM)	بروڈی کلاکس
caps 250mg: 10. Rs. 26.45 ; 500mg: 10. Rs. 50.90		
CAMPICILLIN	(CADILA)	کمپی سیلین
250mg: 10. Rs. 31.50, 500mg: 10. Rs. 59.50		
CAMPICILLIN SYRUP	(CADILA) 60ml: Rs. 18.89	کمپی سیلین سیرپ
CAMPICILLIN INJ	(CADILA)	کمپی سیلین انجکشن
250mg vial: Rs. 8.70, 500mg vial: Rs. 12.10 1g vial: Rs. 20.50		
CINICILLIN	(CINICILLIN)	سینی سیلین
250mg: 10. Rs. 29.40; 500mg: 4. Rs. 19.60		
CINICILLIN INJ	(CINICILLIN)	سینی سیلین انجکشن
250mg vial Rs. 11.62, 500mg vial Rs. 14.81		
CLACIN	(INGA)	کلا سین
Ampicillin (as trihydrate) 250mg, Cloxacillin 250mg: Tabs 10, Rs. 42.74		
CLAMP CAPSULES	(SOL)	کلیمپ کپسول
Ampicillin trihydrate 250mg Cloxacillin sod. 250mg caps 15x8: Rs. 629.55		
COPEN	(MERCURY)	کوپن
Ampicillin (as trhyd.) 250mg, cloxacillin (as sod.) 250mg: caps: 25x4: Rs. 499.00		
DABCILOX	(DABUR)	ڈاب کلاکس
Ampicillin 250mg Cloxacillin 250mg: caps 10, Rs. 47.72; SYRUP: Ampicillin 125mg, Cloxacillin 125mg per 5ml, 40ml, Rs. 24.58; inj. Ampicillin 250mg Cloxacillin 250mg per vial, Rs. 13.95		
DEPLIN CAPS	(DEYS)	ڈیپ لین کپسول
250mg: 4: caps Rs. 10.25; 500mg: 4: caps Rs. 19.24		
DEPLIN SYRUP	(DEYS) 40ml	ڈیپ لین سیرپ
Rs. 13.04		
DEPLIN DROPS	(DEYS) 10ml	ڈیپ لین ڈراپس
Rs. 11.95		
DIACILIN	(DEE PHARMA)	ڈیاسیلین
250mg: 6 Rs. 10.86; 500mg: 6 Rs. 20.46		
DIACILIN DRY SYRUP	(DEE PHARMA) 40ml	ڈیاسیلین سیرپ
Rs. 9.50		
DIACILIN PEAD DROPS	(DEE PHARMA) 10ml	ڈیاسیلین ڈراپس
Rs. 9.35		

DIACILIN PLUS (DEE PHARMA) caps: 10	Rs 25 10	ڈیپاسیلین پلس
DUOCLOX (FDC)		ڈیوکلکس
Ampicillin 250mg, Cloxacillin 250mg caps. 10:	Rs. 49 19	
DUOCLOX DRY SYRUP (FDC) 60ml	Rs 40 69	ڈیوکلکس سیرپ
DUOCLOX-250 (FDC) caps 10, Rs. 27 25		ڈیوکلکس ۲۵۰
DUOCLOX INJ (FDC)		ڈیوکلکس انجکشن
250mg: 5ml inj: vial. Rs 11 64, 500mg Rs. 18.95		
ELCLOX (ELDER)		ایل کلکس کپسول
Ampicillin 250mg cloxacillin 250mg : caps 10:	Rs 48.35	
EMDICILLIN (MALLADI) 500mg. 10x10	Rs 450	ایم ڈی سیلین
EMDICILLIN DRY SYRUP (MALLADI)		ایم ڈی سیلین سیرپ
40ml: Rs 12.57		
EMDICLOX CAPS (MALLADI)		ایم ڈی کلکس کپسول
Ampicillin trihydrate 250mg, cloxacillin 250mg caps: 10x10		
Rs 495.00		
FALCLOX CAPSULES (FALMALABS)		فال کلکس کپسول
Ampicillin 250mg: Cloxacillin 250mg. cap 10:	Rs 49 32	
HUMILIN (FALMA) 500mg 10:	Rs.43.03	ہیومی لین
HUMILIN DRY SYRUP (FALMA) 60ml	Rs.17.30	ہیومی لین سیرپ
LUPILIN (LUPIN) 250mg: 4. Rs 6 51 500mg: 4 Rs 12 04		لیوپی لین
LUPILIN INJ (LUPIN) 500mg. inj: 1 vial: Rs. 7.68		لیوپی لین انجکشن
MEGAPEN (ARISTO) caps 8 Rs.49.90		میگاپن
MEGAPEN INJECTION (ARISTO)		میگاپن انجکشن
250mg: vil Rs 9.16 500mg vial. Rs. 13.30 1000mg vial Rs. 19.21		
MINILIN (BDH) 250mg: 10: Rs. 23 49, 500mg: 10 Rs. 45		منی لین
MINILIN DRY SYRUP (BDH) 60ml	Rs 23.00	منی لین سیرپ
MINOCILLIN (P&B LABS)		منوسی لین
Ampicillin (as trihydrate) 250mg & 500mg caps: 250mg. 10, 18 90		
500mg 10, 35 70		
MIXOPEN (BIOGENICS)		مکسوپن
Ampicillin cloxacillin caps: 10. Rs 52.00		

PARACLOX CAPS	(MAC)	۵۰ گلاکس
Ampicillin 250mg, Cloxacillin 250mg caps, 6 caps Rs. 30 60		
PARACLOX INJ	(MAC)	۵۰ گلاکس انجکشن
Ampicillin 250mg, Cloxacillin 250mg inj, 1 vial Rs. 13.29		
PENMIX	(DEE PHARMA) 24g Rs. 18 90	پین مکس سرپ
PENMIX FORTE CAPS	(DEE PHARMA)	پین مکس فورٹ کپسول
Ampicillin trihydrate 250mg, Cloxacillin 250mg caps; 10 Rs. 36 10		
PENMIX FORTE INJ	(DEE PHARMA)	پین مکس فورٹ انجکشن
Ampicillin 250mg Cloxacillin 250mg per vial 13.60		
PREMICILLIN INJ	(PREM PHARMA) Rs. 12.50	پریم سیلین انجکشن
PREMOCLOX INJ	(PREM PHARMA)	پریم کلاکس انجکشن
250mg 5ml Rs 11 25, 500mg 5ml Rs. 14 50, 1000mg 10ml Rs 19.50		
PREMOCLOX 250	(PREM PHARMA)	پریم کلاکس کپسول ۲۵۰
caps, 10 Rs 27 50		
PREMOCLOX 500	(PREM PHARMA)	پریم کلاکس کپسول ۵۰۰
caps; 10 Rs. 52 50		
PROMPICIN	(GENO)	پرام پی سین
Ampicillin (as trihydrate) 250mg, probenedcid 250mg caps 8 Rs.32.10		
REMCLOX CAPS	(INDIA)	رم کلاکس کپسول
Ampicillin 250mg Cloxacillin 250mg caps; 10 Rs. 49 90		
REMCLOX DRY SYRUP	(INDIA) 40ml Rs. 24.10	رم کلاکس سرپ
ROSCILLIN INJ	(RANBAXY)	روسی لین انجکشن
250mg vial Rs 6 96; 500mg vial Rs. 9.58		
ROSCILLIN PAED DRPS	(RANBAXY) 10ml: Rs. 11.65	روسی لین ڈراپس
ROSCILLIN	(RANBAXY)	روسی لین کپسول
250mg 8 Rs 24 60, 500mg; 8 Rs 46 25		
SULBACIN 750	(UNICHEM)	سلہا سین ۷۵۰
Sulbactum 250mg Ampicillin 500mg per cial inj; 1 vial Rs 43 10		

AZITHROMYCIN

ایزو تھرو مائی سین

افعال و منافع: ہالائی وزیریں آلات تنفس کے انفکشن (R.T.I.) جراثیمی درم لوز تین اور درم حجرہ نرم ساختوں اور جلد کے انفکشن آلات بول (U.T.I.) تاسلی اعضاء کے انفکشن میں بہت مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام دن میں ایک بار ۳ دن تک آلات بول اور تاسلی اعضاء کے انفکشن میں اگر ام واحد خوراک دی جائے۔

منفی افعال: دوا کے حساسی اثرات ظاہر ہونے پر نہ دی جائے۔

مضر اثرات: متلی، تے، درد شکم، اسہال، جلد پر داغ، خفقان، سینہ میں درد بد ہضمی، نفع شکم چکر درد سر، بے خوابی، الجھن، روشنی سے نفرت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں، حمل اور ایام رضاعت میں اور بچوں کے استعمال میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع تیزابیت دوائیں الو مٹم اور میکینیشیم کے مرکبات مضر ہیں۔

تجارتی مرکبات

AZITHRAL (ALEMBIC) 250mg cap 6: Rs. 168.00

ایزی تھرال

AZIWOK (WOCKHARDT)

ایزی واک

Azithromicin 250mg caps 6: Rs. 120.00

ZITHROMAX (PFIZER)

زائی تھرو میکس

Azithromicin (as dihydroxide) 250mg: caps: 6: Rs. 590.01

BACAMPICILLIN HCL باکام پی سیلین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: آلات تنفس (R.T.I.) تاسلی اعضاء کان ناک حلق (E.N.T.) کے انفکشن نرم ساختوں اور جلد کے زخم و انفکشن و سوزاک میں مفید و مجرب ہے۔

مقدار و ترکیب: ۴۰۰ سے ۸۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار سوزاک میں ۱۶۰۰ ملی گرام ایک بار

منفی افعال: پنی سیلین اور سیفالوسپورین سے الرجک مریضوں میں مولوٹک لیوسس کے انفکشن میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: نظام ہضم کی خرابیاں، کبھی خشاء معاطی اور زیر جلد زخف الدم بھی ہو جاتا ہے۔
احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں دوران علاج خون کی جانچ کراتے رہنا چاہیے۔
دواؤں کے اثرات: سوزاک میں پروبے نی سڈ کے ہر ادوینے سے اثر دیر تک قائم رہتا ہے

تجارتی مرکبات

پاپونس انجکشن

BIOPENCE (BIOCHEM)

1g vial ; Rs. 24 22 5g vial; Rs. 99.00

PYOPEN (GERMAN REMEDIES)

1g. 10: vial Rs. 226 53; 5g: 1 vial Rs. 96.27

پاپون

CEFACLO

سیفا کلور

افعال و منافع: درمیانی کان میں درم، آلات بول کے انفکشن (U.T.I.) آلات تنفس (R.T.I.) کے انفکشن، نرم ساختوں اور جلد کے انفکشن میں بہترین کام کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد زیادہ سے زیادہ ۴ گرام دن بھر میں بچوں کو ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے۔

مضر اثرات: حساسیت، نظام ہضم میں خلل ہو سکتا ہے۔

احتیاط: اپنی سیلین سے حساس مریضوں میں اور گردوں کے افعال کے خرابی میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع انجماد خون ادویہ کے ساتھ استعمال کرنا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

KEFLOR (RANBAXY) Cefaclor 250mg caps 10, Rs. 151.50 کیف لور

KEFLOR GRANULES (RANBAXY) 30ml: Rs. 54.00 کیف لور گرینول

KEFLOR POWDER (RANBAXY) 30ml: Rs. 65 00 کیف لور پوڈر

CEFADROXIL

سیفا ڈرو ایکسل

افعال و منافع: جلد اور نرم ساختوں کے انفکشن، آلات بول کے انفکشن (U.T.I.) میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب، متقی اثرات، مضر اثرات، احتیاط، سیفا لکسن کی طرح ہیں۔

سیفیکسیم کا بیان آگے درج ہے۔

تجارتی مرکبات

BID (KOPRAN) 500mg; caps 10x4	Rs. 520.10	بڈ کپسول
BID DRY SYRUP (KOPRAN) 60ml	Rs. 46.50	
CEDEX (DEF PHARMA) 500mg; caps: 3x10	Rs. 375.00	بڈ کپسول
CEDEX DRY SYRUP (DEF PHARMA) 60ml	Rs. 44.00	سڈروکس کپسول
CEFADUR SUSP (PROTEC) 30ml	Rs. 44.65	سڈروکس سرپ
CEFADUR DT (PROTEC)	Rs. 26.00	سیفاڈور سرپ
CEFADUR (PROTEC) 500mg; caps 4	Rs. 51.25	سیفاڈور ڈی۔ ڈی
DROXYBID (HIND ANTIBIOTICS) 500mg; tabs 4	Rs. 43.46	سیفاڈور
DROXYL (TORRENT) 500mg; 4	Rs. 56.80; 1g.2: Rs. 56.50	ڈراکسی بڈ
DROXYL SUSP (TORRENT) 30ml	Rs. 45.90	ڈراکسیل
KEFLOXIN (STANCARE) 500mg; caps: 6	Rs. 84.00	ڈراکسیل سرپ
KEFLOXIN POWDER (STANCARE) 30ml	Rs. 23.80	کیف لاکسن
LYDROXIL (LYKA) 500mg; 4	Rs. 54.80	کیف لوکسن پوڈر
LYDROXIL SYRUP (LYKA) 40ml	Rs. 53.78	لائی ڈروکسل
NEPHLEX 125/250/500 (NEO PHARMA)		لائی ڈروکسل سرپ
125mg; 4: Rs. 14.00; 250mg; 4: Rs. 26.00, 500mg; 4: Rs. 50.00		نیف لیکس
ODOXIL (LUPIN)		اوڈاکسل
500mg; 4: Rs. 58.00 1000mg; 6: Rs. 117.60		

CEFIXIME

سیفیکسیم

افعال و منافع: آلات تنفس (R.T.I.) آلات بول گردے مثانے (U.T.I.) و پشے کے انفیکشن اور ورم میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام روزانہ ایک خوراک میں یا دو خوراکیوں میں تقسیم کر کے ۷ سے ۱۴ دن تک دی جائے، بچوں کو ۸ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ایک یا دو خوراکیوں میں تقسیم کر کے ۶ ماہ سے کم عمر والوں کو نہ دی جائے۔

منفی افعال: دوا سے حساس الرجک مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: ہاضمہ کی خرابیاں، درد سر، چکر آنا، جلد پر داغ کبھی قولون میں سوزش۔
احتیاط: اپنی سیلین سے حساس مریضوں کو، گردوں کی شدید بیماریوں میں حمل، اور ایام رضاعت میں
آنتوں معدہ کے امراض کی ہسٹری میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

CEFSPAN (BURROUGHS WELLCOME)

سیف اسپان

Cefixime 100mg: caps 4: Rs. 203.00

TOPCEF (TORRENT) 400mg: 2: Rs. 320.00

ٹاپ سیف

CEFOPERAZONE SODIUM سیفو پیرازوسوڈیم

افعال و منافع: آلات تنفس (R.T.I.) کان ناک حلق E.N.T. جلد اور نرم ساحتوں ہڈیوں،
جوزوں، چپے کی نالی، آلات ہضم G.I.T. معدہ آنتوں، آلات بول U.T.I. گردے مٹانے کے انفکشن
میں مفید و مجرب ہے۔ تسمم الدم Septicaemia سرسام، ایسے مریض جن پر دوسری انٹی بائیوٹک
کارگر نہ ہوں یہ مفید رہتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱ سے ۶ گرام روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے ہر ۸ سے ۱۲ گھنٹہ بعد
عضلاتی انجکشن لگایا جائے بچوں کو ۳۰ سے ۱۰۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ۲-۳ خوراکیوں
میں تقسیم کر کے دی جائے۔ ایک سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: ہاضمہ کی خرابیاں، کنڈیڈا انفکشن، اسٹوفیلیا، نیوٹروفیل، لیوکوسائٹ کی کمی و تھراپین
کی کمی، ہو جاتی ہے، خون میں یوریا اور جگر کے افرات، بڑھ جاتے ہیں، کومب ٹیسٹ کا نتیجہ
Positive ہوتا ہے قولون میں سوزش انجکشن کی جگہ درد ہوتا ہے۔

احتیاط: اپنی سیلین سے حساس مریضوں، جگر اور گردوں کی کمزوری میں زیادہ عرصہ تک استعمال سے
بچوں، حاملہ اور مرضہ کو استعمال سے احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: امینو گلائیکوسائیڈ، پیٹاب آدو یہ اور کلورم فینی کال کے ساتھ
اس کا استعمال مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

CEFAZID (BIOCHEM) 250mg Rs. 105.00 ; 500mg Rs. 336.00 سیٹازڈ
FORTUM (GLAXO-ALLENBURYS) فورٹم
 250mg Rs. 111.00, 500mg Rs. 192.00, 1g Rs. 352.00

CEFTRIAZONE

سیف ٹرائکسون

افعال و منافع: زیرین آلات تنفس کے انفیکشن، آلات بول گردے مثانے۔ انفیکشن ورم العنق، سوزاک، جلد کے انفیکشن جراثیمی قسم الدم Septicaemia سرسام آپریشن سے پہلے اور بعد کو حفاظت و علاج کے لئے ہڈیوں جوڑوں کے انفیکشن میں بہترین کام کرتا ہے۔

مقدار و ترکیب: اسے ۲ گرام عضلاتی یا وریدی ایک خوراک میں یا دو بار خوراکوں میں تقسیم کر کے دی جائے دن بھر میں ۳ گرام سے زیادہ نہ دی جائے بچوں کو ۵۰ سے ۵۷ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ہر ۱۲ گھنٹہ بعد دی جائے۔

منفی افعال: سفالوسپورین سے حساس مریضوں پر خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

مضر اثرات: آنٹوں کے غشاء مخاطی میں سوزش، اسہال، مقامی ری ایکشن خون میں خرابی، جلد پر داغ پڑتا۔

احتیاط: جگر اور گردوں کے امراض میں مقدار خوراک ۲ گرام زائد نہ ہو حاملہ اور مرضہ کو احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

CEFAXONE I.M/I.V (LUPIN)
 500mg 1: Rs. 106.76; 1000mg 1: Rs. 213.52
CEFTRAX INJ (DEE PHARMA)
 250mg vial: Rs. 53.00, 1g vial: Rs. 208.00
MONOCEF I.V (ARISRO)
 250mg vial Rs. 53.00 1g vial Rs. 213.07

سیفاکسون

سیف ٹرائکس

مونوسیف

NOSOCEF	(MERIND)	نوسوسیف
vial: 250mg: vial : Rs. 53.30; 1g vial: Rs. 214.10		
OFRAMAX	(RANBAXY)	اوفرامیکس
250mg:Rs.56.00; vial 1g: Rs.225.10		
TOROCEF	(TORRENT)	ٹوروسیف
250mg: Rs. 56.10: vial 1g: Rs. 225.10		
ZEFONE	(ZELTA (CADILA)	زی فون
inj 250mg Rs. 56.25, 1g Rs. 225.00		

CEFAZOLINE SODIUM

سیفازولین سوڈیم

افعال و منافع: آلات تنفس (R.T.I.) تناسلی اعضاء اور سرسام اعضاء بول کے انفکشن میں جلد اور اندرونی ساختوں، ہڈی، جوڑوں کے ورم اور انفکشن میں، تسم الدم Septicaemia ورم نلاف القلب، گرام مثبت اور گرام منفی بیکٹیریا سے پیدا ہونے والے امراض انتہائی باریک جراثیموں سے پیدا ہونے والے، انفکشن کی بہترین اور مانی ہوئی دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ سے ۱۰۰۰ ملی گرام ۸ سے ۱۲ گھنٹہ بعد دیں بچوں کو ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ایک دن میں ۲ سے ۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی اثرات: سیفالوسپورین گروپ سے حساس مریضوں میں معر ہے۔

مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، بخار ہونا، لیو کو سامیٹ اور تھرامبو سائٹ کی کمی اسٹوفیلیا، مٹی قے

بھوک کی کمی S.G.O.T.، S.P.O.T.، لیکٹائٹ یا فاسفیٹ میں اضافہ، جگر کے فعل کا ست ہوتا

احتیاط: حالت حمل جگر کے امراض اور ایک سال سے کم عمر بچوں کو نہ دیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: پیشاب آور دواؤں Diuretics کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

ALCIZON	(ALEMBIC)	ال سی زون
inj 250mg: vial: Rs. 29.25, 500mg vial, Rs. 51.50, 1g vial: 92.50		
AZOLIN	(BIOCHEM)	ایسے زولین
500mg: vial Rs. 49.95 1g: vial: Rs.98.00		

CEFAMEZIN (RALLIS) سی فامی زین
inj 250mg: Rs. 42.12 500mg: Rs. 54.74 1000mg: Rs. 90.87

CEZOLIN (LUPIN) سی زولین
250mg. vial : Rs. 14.06, 500mg vial : rs. 22.36, 100mg: vial. Rs. 39.75

LYZOLIN (LYKA) لائی زولین
500mg vial Rs. 46.18, 100mg vial Rs. 86.14

ORIZOLIN (ALIDAC) اوری زولین
inj; 125mg vial Rs. 9.28; 250mg vial: Rs. 15.27, 500mg: vial Rs. 27.52, 1g. vial Rs. 51.82

PREZOLIN (PREM PHRMA) پری زولین
500mg vial Rs. 27.00 100mg vial Rs. 50.00

PRILEX INJ (IND ANTIBIOTICS) پرائی لیکس انجکشن
500mg: vial Rs. 45.67; IG vial Rs. 81.82

REFLIN (RANBAXY) ریفلین
250mg vial Rs. 26.16, 500mg vial Rs. 45.76, 1g. vial Rs. 83.63

CEFOTOXIME SODIUM سیفو ٹا کسیم سوڈیم

افعال و منافع: تسم الدم Cepticaemia آلات بول و تناسلی اعضاء کے شدید انفکشن
Acute infection زیریں آلات تنفس، کان ناک حلق، جلد اور نرم ساختوں، جوڑوں اور ہڈیوں
کے انفکشن ورم ہر سام و غیرہ میں بہترین کام کرتا ہے۔

مقدار و ترکیب: ہالٹوں کو اسے ۲ گرام عضلاتی یا وریڈی ہر ۱۲ گھنٹہ بعد زیادہ سے زیادہ ۳ گرام ہر ۸
گھنٹہ بعد ۱۲ سال سے کم عمر بچوں کو ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ہر ۱۲ گھنٹہ بعد
دی جائے۔

متقی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو حمل کے دوران، بار بار ہونے والے انفکشن میں نہیں دینا
چاہیے۔

مضر اثرات: خون میں غیر طبعی تبدیلی، ہیپ میں خرابی متگی تے، اسہال سوزش امعاء زیادہ مدت
استعمال سے سوزش اعصاب اور نومولود بچوں میں استعمال سے جسم سفید Grey syndrome

ہو جاتا ہے۔

احتیاط: خون کی کمی میں، زیادہ مدت استعمال کرانے سے، ایام رضاعت گردوں اور جگر کی خرابی میں احتیاط رکھنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، دورہ روکنے والی ادویہ اور پیراسیٹامول کے ساتھ خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

BIOTAX	(BIOCHEM)	ہائیو ٹاکس
inj: 250mg vial : Rs. 24.99, 500mg vial: Rs. 50.69, 1g vial ; Rs. 84.24		
BLUCEF-TM	(BLUECROSS)	بلیو سیف۔ ٹی ایم
inj: 250mg vial: s. 25.10, 500mg vial Rs. 46.50, 1g vial Rs. 84 70		
CEFTEX INJ	(PREM PHARMA)	سیف ٹیکس
250mg vial Rs. 27.00, 500mg vial: Rs. 50.00, 1gm vial : Rs 85.00		
CEFATOX-250 (P&B LABS) 250mg vial Rs. 25.90		سیف ٹاکس ۲۵۰
CEFATOX-GM (P&B LABS) 1gm vial Rs 87.31		سیف ٹاکس اگرام
STERILE CEFOTAXIME (P&B LABS) 1gm vial Rs.90		سیف ٹاکس ایم
CLAFORAN	(ROUSSEL)	کلافوران
inj 1gm: vial Rs. 99.00; 2gm: vial : Rs. 180.00; 250mg: Rs. 29.00		
EVACEF INJ	(NEON)	ایو اسیف
250mg vial Rs. 26.00 1gm vial Rs.98.00		
HALTAX	(HIND ANTIBIOTICS)	ہال ٹاکس
inj 250mg vial Rs. 25.39; 1g vial, Rs. 85.60		
OMNATAX	(HOECHST)	او منا ٹاکس
inj 250mg vial Rs. 29.00; 1g vial, Rs. 99.00		
OMNICEF	(ARISTO)	او منی سیف
inj: 250mg vial: Rs. 24.95, 500mg vial: Rs. 48.75, 1g vial: Rs.95.00		
TAXCEF	(J K PHARMA)	ٹاکس سیف
inj: 250mg vial Rs. 25.75; 500mg vial Rs.51.50; 1g vial Rs. 99.00		
TAXIM	(ALKEM)	ٹاکسم
inj. 250mg vial Rs. 26.95; 1g vial, Rs. 99.10		

TROYCEF

(TROIKAA)

250mg vial Rs 25.13, 1g vial Rs 84.72

رہاں ہف

CEFUROXIME

سہلور واسانم

افعال و منافع: آات علس اور نرم مانتوں کے نطلعن، شدید تعدیہ Acute Infection،
 مام، مری سے قبل جراثیم سے حفاظت کے لئے آات ہال (U.T.I.) کے نطلعن، سوس
 ہڈوں جوڑوں کے نطلعن، دورم، زہکی اور نسوانی اعضاء کے نطلعن اور تعدیہ کے الامنی انجکشن ہیں
 مقدار و ترکیب: ۵۰ ملی کرام، دن میں ۳ بار عضائی لگا میں، شدید نطلعن میں ۱۰۰ ملی کرام، روزانہ
 ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے لگا میں بچوں کے مام میں ۲۰۰ ملی کرام / فی کلو کرام وزن کے حساب
 سے دریدی ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے لگا میں

منفی افعال: سہلا سپورین سے حساس مریضوں کو نہ لگائیں۔

مضر اثرات: انجکشن کے مقام پر درد، الرجی، نظام ہضم میں خرابی کنڈیل کے اثرات اسٹوفیلیا نیوٹروپنا
 لیوکوپیا، خون کی کمی، قمر ابو سائید کی کمی، جگر کے انزائم اور یوریا میں اضافہ کو سبب شست ثبت ہو سکتا
 ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: امینو گلائیکوسائید کے ساتھ اس کے فعل میں تیزی آتی ہے۔

تجارتی مرکبات

CEFOGEN

(ZELTA)

سی فوجن

250mg: vial Rs. 50.60; 750mg: vial Rs. 127.30

CEFTUM

(GLAXO)

سیف ٹم

125mg: 4: Rs.84.04; 250mg: 4: Rs.162.70

FUROXIL

(TORRENT)

فیوروکسل

250mg vial: Rs. 56.50, 750mg vial: Rs. 127.90

SUPACEF

(GLAXO ALLENBURYS)

سوپا سیف

I.M/I.V. inj.: 250mg vial Rs. 55.85; 750mg: vial Rs. 128.10

CEFTIZOXIME

سیفٹی زوکسائم

انفعال و منافع: آلات تنفس کے زیریں اعضاء کے انفکشن (L.R.T.I.) سہٹی سیٹا، قسم الدم، شدید انفکشن، آلات بول اور تناسلی اعضاء کے انفکشن سوزاک ورم باریطون Peritonitis آپریشن کے بعد زخموں کے اندمال اور سرسام وغیرہ کی مفید دوا ہے،

مقدار و خوراک: کاتعین مریض کی حالت اور مرض کی شدت کے حساب سے کیا جاتا ہے۔

منفی افعال: سیفالوسپورین سے حساس مریضوں کو نہیں دینا چاہیے

مضر اثرات: نظام ہضم میں خلل، کنڈیڈ کے اثرات، اسٹوفیلیا نیوٹروفیل لیو کو سائیٹ، قہر امبو سائیٹ کی کی ہو سکتی ہے جگر کے افراز اور بلڈ پوریا میں اضافہ، کومب شٹ کا نتیجہ مثبت، انجکشن کے مقام پر درد ہوتا

احتیاط: گردوں کی حراہی میں، چینی سیلین سے حساس مریضوں میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: پردینی سڈ کے ساتھ دوا کا اثر دیر تک قائم رہتا ہے۔ امینو گلائی کو سائیڈ اور ربول ادویہ کے ساتھ اس کے اثر میں تیزی اور اثر جلد ختم ہو جاتا ہے۔

تجارتی مرکبات

CEFIZOX (BURROUGHS WELLCOME)

سیٹی زاکس

500mg: vial: Rs. 123.01; 1g: vial Rs. 217.55

EPOCELIN (RALLIS)

ای پوسیلین

500mg: 10ml Rs. 123.01; 1g: 10ml Rs. 217.55

CEPHALEXIN

سیفالاکسین

انفعال و منافع: ہڈیوں کے فریکچر، جوڑوں کے ورم درد، اسٹفلوکاکل انفکشن جلد اور نرم ساختوں کے انفکشن زیریں اور بالائی آلات تنفس کے انفکشن آلات بول اور تناسلی اعضاء کے انفکشن اور کان کے اندرونی ورم کی لاثانی دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: اگر ام ہر گھنٹہ بعد بچوں کو ۳۰ سے ۶۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے

مہنور اکوں میں تقسیم کر کے ہر ۶ گھنٹہ بعد۔
 منفی افعال: سیفالوسپورین گروپ سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔
 مضر اثرات: اسہال آنا، متلی، قے، بد ہضمی، درد شکم، جلد پر داغ پڑنا پتی اچھلنا الرجی، شاک مدور
 پہنچنا۔

احتیاط: چینی سیلین سے حساس مریضوں کو گردوں کی خرابی، کومب ٹسٹ کے نتیجہ پر احتیاط برتیں۔
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: مدرات بول ادویہ کے ساتھ عمل میں تیزی اور اثرات جلد فم
 ہو جاتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

ALCEPHIN (ALEMBIC)	ال سے فن کپسول
caps 250mg 4: Rs. 18.65; 500mg. 4. Rs 34.73	
ALCEPHIN DRY SYRUP (ALEMBIC) 40ml Rs.22.32	ال سے فن سرپ
ALEXIN (DABUR)	الکسن
caps: 250mg: 10:Rs.44.58; 500mg: 10 Rs.83.14	
ALEXIN DRY SYRUP (DABUR) 40ml Rs.22.76	الکسن سرپ
ALSPORIN (HOECHST)	ال سپورین
caps 250mg: 4. Rs. 14 38; 500mg: 4 Rs.27.73	
BETASPORE (ARISTO) 250mg. 4 Rs.18 47,500mg.Rs.34 92	بیٹا سپور
BETASPORE DRY SYRUP (ARISTO) 40ml.Rs.23.24	بیٹا سپور سرپ
BICEF (SUN PHARMA)	بائی سیف
caps. 250mg:: 20: Rs. 46.50: 500mg: 4 Rs. 35.20	
BLUCEF TABS (BLUE CROSS)	بلو سیف
tabs 250mg: 10.Rs.48.00: 500mg:10. Rs.88.30	
CEFAMAX (MAS) 250mg: 4:Rs.18.07; 500mg:4: Rs.34.15	سیفامیکس
CEFAMAX DRY SYRUP (MAS) 60ml: Rs.31.83	سیفامیکس سرپ
CEFAMAX PAED. DROPS (MAS) 10ml. Rs.23.45	سیفامیکس ڈراپس
CEFAX CAPS (INGA)	سیفامکس کپسول
250mg: 4: Rs.18.12; 500mg: 4: Rs.34.08	
CEFAX SYRUP (INGA) 60ml: Rs.34.10	سیفامکس سرپ

CEFF (LUPIN) 20x4 Rs 433 60, 500mg 15x4 Rs 605 40	سیف
CEFF DRY SYRUP (LUPIN) 30ml Rs 20 21	سیف سرپ
CEFF KID TABS (LUPIN) 125mg tabs 10 Rs 26 14	سیف کڈ ٹبلٹ
CEFF -250 D.S. (LUPIN) 30ml Rs 34 99	سیف ۲۵۰ ڈی ایس سرپ
CEPHADIL (DUPHAR)	سیفڈل
caps 250mg 4 Rs 18 46, 500mg 4 Rs 34 17	
CEPHALKEM (ALKEM)	سیفال کم
caps 250mg 10 Rs 40.00; 500mg 10 Rs 75.00	
CEPHAXIN (BIOCHEM)	سیفاکسین
250mg 10 Rs 49 00, 500mg 10 Rs 92 50	
CEPHAXIN INJ (BIOCHEM)	سیفاکسین انجکشن
500mg Rs 90 00 1g Rs 175 00	
CEPHAXIN DRY SYRUP (BIOCHEM) 40ml Rs 25.95	سیفاکسین سرپ
CESPOR DRY SYRUP (WIN MEDICARE)	سپس پور سرپ
40ml Rs 22.84	
FACTAGARD (DEE PHARMA)	فیکٹا گارڈ
caps 250mg 10 Rs 49 00 500mg 10 Rs 87.00	
FACTAGARD DRY SYRUP (DEE PHARMA) 40ml Rs 16.60	فیکٹا گارڈ
MAFEXIN CAPS (MALLADI)	میفاکسین
caps: 250mg 10x10 Rs 448 53; 500mg 10x10 Rs 835.74	
MAFEXIN DRY SYRUP (MALLADI) 40ml Rs 22.57	میفاکسین
NEOCEF (GLAXO ALLENBURYS)	نیو سیف
caps 250mg 4 Rs 18 65, 500mg 40 Rs 34.73	
NUFEX (SEARLE) 250mg 4 Rs 21.00; 500mg 4 Rs 39.50	نیو فیکس
NUFEX DRY SYRUP (SEARLE) 40ml Rs 22.74	نیو فیکس
ORIPHEX (ALIDAC)	وری فیکس
caps 250mg 10 Rs 59.00, 500mg 10 Rs 99.00	
ORIPHEX DRY SYRUP (ALIDAC) 40ml Rs 29.77	وری فیکس سرپ
PHEXIN (GLAXO)	فیکسین
caps 250mg 4 Rs 24.17; 500mg 4 Rs 45.04	
PREMSPOR (TATA PHARMA)	پریم اسپور
caps 250mg 4 Rs 17.50; 500mg 4 Rs 33.80	

PRILEX	(HIND ANTIBIOTICS)	پرائی لیکس
caps. 250mg: 10: Rs.41.12; 500mg: 10: Rs. 76.34		
RALCEF	(RALLIS)	رال سیف
RESPORIDEX	(STANCARE)	ریس پوری ڈیکس
caps: 250mg: 8: Rs. 63.62, 500mg: 8: Rs. 83.75		
ROCEPH	(J&K PHARMA)	رو سیف
caps: 250mg: 4: Rs. 17.80; 500mg: 4: Rs. 33.16		
ROCEPH DRY SYRUP	(J&K PHARMA) 30ml: Rs.18.00	رو سیف سرب
SEPHEXIN	(LYKA)	سی پے کسن
caps 250mg: 10: Rs.62.20, 500mg: 10 : Rs. 115.50		
SEPHEXIN DRY SYRUP	(LYKA) 60ml: Rs.41.50	سی پے کسن سرب
SPOREN CAPS	(DAYS) 250mg caps: 4: Rs.18.46	اسپورین کپسول
SPOREN 500 CAPS	(DAYS) 500mg caps: 4: Rs.34.37	اسپورین کپسول ۵۰۰
SPORIDEX	(RANBAXY)	اسپوری ڈیکس
250mg: 10: Rs.54.25, 500mg: 10: Rs.87.95		
SPORIDEX SUSP	(STAN CARE) 40ml: Rs.37 62	اسپوری ڈیکس سرب
ULTRASPORIN	(STANGEN)	الٹراسپورین
10, Rs.18 : 250mg: caps, 10, Rs.32.50; 500mg: caps, 10, Rs.61.25.		

CEPHALORIDIN

سیفالورائیڈین

افعال و منافع: حاد و مزمن سعال بلغمی Acute Chronic Bronchitis پیچہڑوں میں
 انفکشن، جراثیمی نمونیہ، برونکونمونیہ، آپریشن کے بعد کانمونیہ پیچہڑوں کا پھوڑا۔ پیچہڑوں میں پیپ پٹنا
 پیشاب کی نالی کا انفکشن U.T.I. جلد اور نرم ساختوں کا انفکشن تسم الدم Cepticaemia جراثیمی ورم
 غلاف القلب، استقام جراثیمی، سوزاک، آتھک حمی وجع الغاصل ہڈیوں کا ورم اور انفکشن میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۲ سے ۴ گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے ۶ گرام سے زیادہ ایک دن میں نہ
 دیں بچوں کو ۳۰ سے ۵۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے
 گردوں کی خرابی میں ۵۰۰ سے ۲ گرام روزانہ ورم غلاف القلب میں اسے ۳ گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد دیریدی
 آہستہ آہستہ لگائیں۔

منفی افعال: سیفالو سپورین سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: فعل ہضم میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔

احتیاط: گردوں کی خرابی میں تیز مدد بول ادویہ کے ساتھ اور حالت حمل میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

CEPORAN

(GLAXO)

سپوران

Cephalexin inj. 0.5g Rs. 30.57 1g Rs. 57.87

CHLORAMPHENICOL

کلورم فینی کال

افعال و منافع: سرسام، تعفی و جراثیمی رکٹ سیل انفکشن، ٹائی فائیڈ فیور (تپ محرقہ) آنکھ کے انفکشن، گرام منفی جراثیم سے ہونے والا قسم الدم (سہٹی سیسیا) جراثیمی پیچش، اسٹفلوکاکل انفکشن، جراثیمی نمونیہ، بچوں میں آنتوں کی سوزش ورم خجروہ، مالٹا فیور (بروسی لوسس) ٹراکوما کالرا، آنکھ، کان اور جلد کے انفکشن میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے ہر لاکھنہ بعد دی جائے۔

منفی اثرات: بار بار ہونے والے انفکشن، زچگی کے ایام میں حساسیت کے مریضوں میں خراب اثرات رونما ہوتے ہیں۔

مضر اثرات: خون میں فساد ہونا، فعل ہضم میں خرابیاں، عصبی خرابیاں، عصب باصرہ میں درد، نوسولوجیوں کا جسم سفید ہونا، ہڈیوں کا نرم ہونا۔

احتیاط: وقفہ وقفہ سے خون کی جانچ کراتے رہیں، ایام رضاعت، گردوں اور جگر کی خرابی میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، دردوں کو روکنے والی اور پیراسیٹامول کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

CATILAN (HOECHST) 250mg caps 10 Rs 7 17	بینی ان
CHLOROMYCETIN (PARKE DAVIS)	کلورامائی شین کپسول
250mg 10: Rs 20 10; 500mg. 6, Rs 22 30	
CHLOROMYCETIN SUSP (PARKE DAVIS)	کلورامائی شین سرپ
60ml. 26.75	
CHLOROMYCETIN I.M. (PARKE DAVIS)	کلورامائی شین انجکشن
Chloramphenicol 1g vial inj: 1g vial: Rs.3.20	
ENTEROMYCETIN (DEYS)	انترامائی شین کپسول
caps. 250mg: 10, Rs.14 50; 500mg. 6, Rs. 16 20	
ENTEROMYCETIN SYRUP (DEYS)	انترامائی شین سرپ
60ml: Rs.12.94	
ENTEROMYCETIN INJ. (DEYS)	انترامائی شین انجکشن
8ml vial Rs. 12.50	
KEMICETINE CAPS (MAC)	کیمی شین کپسول
250mg 10: caps Rs.14.15; 500mg: 6caps Rs 15.70	
KEMICETINE SUSP (MAC)	کیمی شین سرپ
60ml Rs. 21.15	
KEMICETINE INJ (MAC)	کیمی شین انجکشن
1g of chloramphenicol, Rs. 25.40	
PARAXIN (BOEHRINGER) 250mg: 10: Rs 16.30	پراکسن
RECLOR (SARABHAI)	رنگ لور
caps : 250mg: 10: Rs.15.24 ; 500mg: 6: Rs.16.92	
TYDE-S INJ (NEON) 1g vial Rs.29.00	ٹائیڈ-ایس انجکشن
VENPHENICOL INJ (P&B LABS) 5ml vial Rs.26.98	ون فینی کال انجکشن
VITAMYCETIN (WYETH) 250mg caps; 8caps Rs. 5.14	وٹامائی شین کپسول
VITAMYCETIN SYRUP (WYETH)	وٹامائی شین سرپ
40ml: Rs. 7.89; 80ml Rs. 12.27	

CHLORO TETRACYCLINE	کلورو ٹترا سائیکلین
DEMETHYL CHLOR	ڈیمی تھائل کلور
TETRACYCLINE	ٹترا سائیکلین
OXYTETRACYCLINE	آکسی ٹترا سائیکلین

افعال و منافع: ہر طرح کے انفکشن رکٹ سیل انفکشن کینجران کے غدو کا متورم ہونا، تناسلی اعضاء کے انفکشن، نمونیہ، روہے لگرے Trachoma رد چشم آنکھ دکھنا ورم غدو جراثیمی پتچش، پیشاب کی نالی انفکشن، آلات تنفس کا انفکشن، امراض خبیثہ اور مہاسوں میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ٹترا سائیکلین ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد دن بھر میں ۴ گرام سے زائد نہ دی جائے۔

منفی اثرات: دوا سے حساس، حمل کے آخری ۴ ماہ اور ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: دانتوں کی رنگت میں تبدیلی، پیر کی لمبی ہڈی Fibula کی نمو اور افزائش میں کمی ہاضمہ کی خرابیاں، الرجی ہو سکتی ہے ۸ سال سے کم عمر والوں کو نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں احتیاط رکھنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دودھ، دافع تیزابیت Antacid منرل ادویہ، خورونی مانع حمل ادویہ

تجارتی مرکبات

ACHROMYCIN (CYANAMID) 250mg caps 10: Rs.12.23	ایکرومائی سین
DICICLYCLINE (INDOCO)	ڈائی سی سائی سائیکلین
caps 4, Rs.4.55; 500mg 4, Rs.7.15	
HOSTACYCLINE (HOECHST)	ہوسٹا سائیکلین
250mg: 10, Rs.10.00; 500mg: 4, Rs.7.72	
IDILIN (IDPL) 250mg: 10, Rs.11.88; 500mg 4, Rs.7.29	آئی ڈی لین
LEDERMYCIN (CYANAMID)	لیڈر مائی سین
150mg: 10, Rs 13.50; 300mg: 10, Rs.31.92	

LINEMETT-333 (MERCURY) 333mg 20x6 tabs	Rs 194 74	۳۳۳ میٹ
LINEMETT-500 (MERCURY) 500mg 20x6 tabs	Rs.251.09	۵۰۰ میٹ
OXYSTECLIN (SARABHAI)		آکسی اسٹیکلین
inj. 2ml	Rs. 1.17; 20ml Rs. 10.92	
OXYTET INJ (BIOGENICS)	inj. 30ml vial	آکسی ٹیٹ
RESTECLIN (SARABHAI)	Rs. 10 23	ریشٹی ٹیکلین
250mg: 10 caps	Rs. 12.78; 500mg: 4 tabs	Rs. 8.16
SUBAMYCIN (DEYS) 250mg: caps	10 .	Rs 10.95
SUBAMYCIN TABLETS 500 (DEYS)		سوپامائی سین کپسول
500mg: sugar coated tabs: 4	: Rs. 6 90	سوپامائی سین ٹیبلٹ
TERRAMYCIN SF CAPS (PFIZER)		ٹیرامائی سین ایس۔ ایف کپسول
4caps	Rs. 4.33	
TERRAMYCIN I.M (PFIZER) 10ml	Rs 8.23	ٹیرامائی سین انجکشن
TETRACYCLINE HCL (SARABHAI)		ٹٹراسائیکلین کپسول
500mg caps	Rs. 436.90	
TETRAMAC CAPS (MAC)		ٹٹرامیک
250mg. 8 caps	Rs. 7.68; 500mg: 4caps	Rs. 6.53
THREOCYCLINE (IDPL)		ٹھروسائیکلین
Tetracycline hcl 333mg: caps: 6:	Rs. 8 47	

CIPROFLOXACIN

سائپروفلوکساسین

افعال و منافع: آلات بول گردے مٹانے کے انفکشن U.T.I. کان ناک طلق ENT کے انفکشن، نرم ساختوں اور ہڈیوں کے انفکشن آلات ہضم کے انفکشن ورم سوزاک اور شدید انفکشن میں بہترین کام کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: آلات بول اور آلات ہضم کے انفکشن میں ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی گرام ہر ۱۲ گھنٹہ بعد سوزاک میں ۵۰۰ ملی گرام ایک خوراک دیگر جراثیمی امراض میں ۵۰۰ سے ۷۵۰ ملی گرام ہر ۱۲ گھنٹہ بعد۔
منفی افعال: حمل ایام رضاعت اور دوائے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

معضرات: خفقان، نظام ہضم میں خلل، چکر آنا، درد سر، ہاتھ کانپنا، الجھن دورے پڑنا، جلد پر دہانہ پڑنا، بصارت میں فرق، جوڑوں میں درد، قوت ارادی میں کمی، آنٹوں میں سوزش اسٹیون جانسن علامہ

(رغم قریب قلاع وغیرہ) خون میں تھیلیاں، چکر اور گردوں میں خرابی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: ۱۲ سال سے کم عمر بچوں کو، مرگی، شدید گردوں کی خرابی، دوروں کی بیماری جسم میں پانی کی کمی، G6PD غیر طبعی ہونے میں احتیاط رکھنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: تھیوفیلین، سائیکلو سپورین، دافع تیزابیت شراب اور مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ رد عمل خراب ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

ABACT	(SARABHAI)	ایکٹ
tabs: 250mg: 4: Rs.17.39; 500mg: 4: Rs.32.03		
ABACT INFUSION	(SARABHAI) 100ml Rs 41.18	ایکٹ بوتل
ALCIPRO	(ALKEM)	ال سپرو مہلیٹ
250mg: 10: Rs.42.50; 500mg: 10: Rs.77.90; 750mg: 10: Rs 115.00		
ALCIPRO I.V	(ALKEM) 100ml: Rs.37.50	ال سپرو بوتل
BAYCIP	(BAYER) 250mg 10: Rs.43.14; 500mg: 10: Rs.85	بے سیف
BEKAYCIN	(BOEHRINGER-M)	بی کایا سن
250mg: 10: Rs.40.00; 500mg: 10: Rs.70.10		
BIOCIPTABS	(BIOCHEM)	بایوسپ
250mg: 10: Rs. 43.75; 500mg: 10: Rs 79.00		
BIOCIP INFUSION	(BIOCHEM) 100ml Rs. 29.00	بایوسپ بوتل
CEBRAN-250/500	(BLUE CROSS)	سب ران
250mg: 10: Rs.35.10; 500mg: 10: Rs.65.10		
CEBRAN INFUSION	(BLUE CROSS) 100ml Rs. 34.00	سب ران
CFX	(REMEDIES (INDIA)	سی ایف ایکس
250mg: 10, Rs. 36.90; 500mg: 10, Rs 67.50		
C-FLOX INJ	(PREM PHARMA) 100ml bottle Rs 40	سی فلاکس انجکشن
C-FLOX TABS	(PREM PHARMA)	سی فلاکس مہلیٹ
250mg: 10: Rs 36.00; 500mg: 10: 65.00		
CIFOMED	(AGLOWMED)	سی فوم
250mg: 10: Rs. 41.00; 500mg: 10: Rs 75.10		

CIFRAN	(RANBAXY)	سائی فران ٹبلٹ
250mg: 10: Rs.53.00; 500mg: 10: Rs.89.00	750mg: 2: Rs.38.00	
CIFRAN INFUSION	(RANBAXY)	سائی فران یو ٹل
50ml: Rs.50; 100ml: Rs.50.00		
CIPAD	(ALBERT DAVID)	سی پاڈ
250mg: 10: Rs.60.00; 500mg: 10: Rs.119.50		
CIPIC-250/500	(BIOLOGICAL E)	سی پک
250mg: 10: Rs.73.00; 500mg: 10: Rs.126.50		
CIPLOX	(CIPLA)	سپ لاکس
250mg: 10: Rs.44.00; 500mg: 10: Rs.78.90	750mg: 4: Rs.46.00	
CIPLOX I.V. INFUSION	(CIPLA)	سپ لاکس
50ml: vial Rs.33.45; 100mgL: Rs.47.85		
CIPROBID	(CADILA)	سائبروڈ کپسول
250mg: 10: Rs.40.50; 500mg: 10: Rs.77.70; 750mg: 2: Rs.56.88		
CIPROBID TABS	(CORE)	سائبروڈ ٹبلٹ
250mg: 10: Rs.40.00; 500mg: 10: Rs.75.00		
CIPROBID I.V	(CORE)	سائبروڈ یو ٹل
100ml: Rs.30.00		
CIPRODAC	(ALIDAC)	سائبروڈیک
250mg: 10: Rs.40.50; 500mg: 10: Rs.77.70		
CIPRODAC INFUSION	(ALIDAC)	سائبروڈیک یو ٹل
100ml bottle: Rs.34.00		
CIPROFLOX	(DEE PHARMA)	سائبرو فلاکس
250mg: 4: Rs.49.50; 500mg: 4: Rs.79.80		
CIPROFLOX INFUSION	(DEE PHARMA)	سائبرو فلاکس یو ٹل
100ml: Rs.53.10		
CIPROFLOXACIN TABS	(PREMPHARMA)	سائبرو فلاکس سین ٹبلٹ
250mg: 1 tab: Rs.3.60; 500mg: 1 tab: Rs.6.50		
CIPROGLEN	(GLENMARK)	سائبرو گلن
250mg: 10: Rs.69.95; 500mg: 10: Rs.125.00		
CIPROLET	(STANGEN)	سائبرو لٹ
250mg: 10: Rs.40.00; 500mg: 10: Rs.71.50		
CIPROLET INFUSION	(STANGEN)	سائبرو لٹ یو ٹل
100ml: Rs.58.00		

CIPROMYCETINE (MAC)	سائپروماکین شین
Ciprofloxacin 500mg tabs 4 Rs.33 00	
CIPROSOL (SOL)	سائپرڈسول
250mg 10x10 Rs 595 00; 500mg: 10x4 Rs 438.00	
CIPROSOLS INFUSION (SOL) 100ml Rs.35.00	سائپرڈسول پوئل
CIPROQUIN (KOPRAN)	سائپرڈکوئن
250mg 10x10: Rs 415.00, 500mg: 10x2. Rs 250.10	
CIPROVA (LUPIN)	سائپرڈوا
250mg 4 Rs.24 10 500mg. 10x10: Rs.720 00	
CIPROWIN (ALEMBIC)	سائپرڈون
250mg. 10. Rs 45 00; 500mg 10. Rs.89.00	
CIPROWIN INFUSION (ALEMBIC) 100ml Rs 44 50	سائپرڈون پوئل
CIPROXAN I.V. INJ (BIOGENICS)	سائپرڈکسان پوئل
100ml bottle Rs 35.00	
CONFLOX (CONCEPT)	کن فلاکس ٹیلیٹ
250mg 10. Rs 43.00; 500mg. 10: Rs 77 50	
CONFLOX INFUSION (CONCEPT)	کن فلاکس پوئل
100ml vial Rs.31 00	
CONSFLOX (CFL)	کاس فلاکس
250mg. 10: Rs.39 00; 500mg: 10. Rs.72.00	
FLOCY (NATCO)	فلوسی
250mg 10 Rs.70.00; 500mg: 10: Rs. 120 00	
FLOCY INFUSION (NATCO) 100ml: Rs. 40 00	فلوسی پوئل
FLOXAQUIN-C (THEMIS CHEMICALS)	فلاکساکوئن سی
caps 250mg 4: Rs.15.00, 500mg: 4 Rs.29 50	
FLOXIP (MAX)	فلاکسپ
250mg: 10: Rs 32.50, 500mg 10: Rs.63.00, infusion 200mg. per 100ml, Rs.43 00	
IFICIPRO I.V (UNIQUE) infusion 100ml.Rs 41.79	ای فی سائپرڈ پوئل
LYPRO (LYKA)	لائپرڈ ٹیلیٹ
250mg 4: Rs.117 60; 500mg. 4: Rs. 31.56	

MICROFLOX	(MICRO LABS)	ماکرو فلاکس
250mg: 6: Rs.38.40; 500mg: 6: Rs.70.80		
ORACIP-500	(MERCURY)	اور اسپ
500mg tabs: 10: Rs.79.00		
ORPIC 250/500	(DYES)	آر پک
250mg: 4: tabs Rs. 16.00; 500mg: 4: Rs.28.00		
PANFLOX	(PFIMEX)	پن فلاکس
250mg: 4: Rs. 30.00; 500mg: 4: Rs.48.00		
PENQUIN	(HIND ANTIBIOTICS)	پین کوئن
250mg: 4: Rs.22.00; 500mg: 4: Rs.24.04		
Q-BID	(KAMRON)	کیو بیڈ
250mg: 10: Rs.36.90, 500mg: 10: Rs.69.50, 750mg: 10: Rs.104.90		
QCBI	(PHARMED)	کیو سی بی آئی
250mg: 10: Rs.43.50; 500mg: 10: Rs.79.50		
QUEP 250 FORTE	(NEO PHARMA)	کیو پ ۲۵۰
250mg: 4: Rs.16.93; 500mg: 4: Rs.30.78		
QUINOACT	(NICHOLAS)	کیو نو ایکٹ
250mg: 5: Rs.41.96; 500mg: 5: Rs.70.66		
QLINTOR	(TORRENT)	کوئٹور
250mg: 10: Rs.31.90; 500mg: 4: Rs.31.50		
QUINTOR INFUSION	(TORRENT) 100ml: Rs.26 00	کوئٹور یوئل
RAFLOX	(RALLIS) 500mg: 10: Rs.129.10	راف لکس
RECOCIF	(RECON)	ریکوسف
250mg: 10: Rs.40.00; 500mg: 10: Rs.75.00		
SEFLOX	(JAGSON PAL)	سیف لاکس
250mg: 10: Rs.45.00; 500mg: 10: Rs.85.00; infusion 200mg, per 100ml, Rs.31.00		
STROX	(DABUR)	اسٹراکس
250mg: 10: Rs.69.90; 500mg: 10: Rs.119.95; infusion 200mg per 100ml, Rs.39.95		
SUPRAFLOX	(KHANDELWAL)	سپرافلاکس
250mg: 4: Rs. 23.50; 500mg: 2: Rs. 22.95		

WYSERIN (WYETH)
250mg 4: Rs 26 10, 500mg. 2: Rs.23.10
ZIPCIN (GUFIC)
250mg 4: Rs 29.20, 500mg: 4: Rs.48 80
ZOXAN (FDC)
250mg: 10: Rs 45.35, 500mg: 10: Rs 81 00

وائی سیرین

زپ سن

زوکسان

CLARITHROMYCIN

کلار تھرومائی سین

انفعال و منافع: آلات تنفس کے انفکشن R.T.I. جلد اور نرم ساختوں کے انفکشن میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۲۵ ملی گرام ہر ۱۲ گھنٹہ بعد ۷ دن تک کھلائیں شدید انفکشن میں ۵۰۰ ملی گرام تک دی جاسکتی ہے دن میں ۲ بار ۱۲ دن تک ۱۲ سال سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔
متقی انفعال: C1 یرقان کی ہسٹری رکھنے والے اور ارائی تھرومائی سین ایزی تھرومائی سین کلار تھرومائی سین سے حساس مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔
احتیاط: ورم جگر، جگر کی غیر طبعی حالت، حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔
دواؤں کے ساتھ رد و عمل: تھیوفائی لین ڈیپاکسن، کاربامازپائین، خوردنی مائع انجماد خون ادویہ۔

تجارتی مرکب

CLARIBID (ABBOTT)
Clarithromycin 250mg: tabs. 4: Rs.140 00

کلاری بیڈ

CLOXACILLIN

کلاکسا سیلین

انفعال و منافع: یہ دوا گرام مثبت Gram Positive جراثیم سے پیدا ہونے والے انفکشن، اسٹریپٹوکوکی انفکشن آلات تنفس تناسلی اعضاء کے انفکشن اعضاء بول کے انفکشن U.T.I. جلد اور نرم ساختوں کے انفکشن آپریشن کے بعد کا انفکشن ہڈیوں کے ورم اور دیگر انفکشن میں بہت مفید کام کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: معمولی انفکشن میں ۲۵۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد شدید انفکشن میں ۳۰۰ ملی گرام ہر ۶

محنت بعد بچوں کو ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام / فی کلو گرام کے حساب سے ۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔
منفی افعال: اپنی سیلین سے حساس مریضوں کو الرجک دمہ پتی، اچھلنے، نزلہ دوی بخار میں نہیں دینا چاہیے۔
مضر اثرات: ہضم کی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔

تجارتی مرکبات

BIOCLOX	(BIOCHEM)	ہایو کلاکس
250mg. 10. Rs 26 75 ; 500mg. 10. Rs.49 10		
BIOCLOX INJ	(BIOCHEM)	ہایو کلاکس انجکشن
250mg. vial. Rs.8.60; 500mg. vial Rs.12.35 1g. Rs. 13 00		
CLACIN INJ	(INGA) 1 vial Rs. 12 85	کلا سین انجکشن
CLOXACILLIN INJ	(PREMPHARMA)	کلاکسا سیلین انجکشن
500mg. inj. 5ml vial. Rs 12.50		
KLOX (LYKA) caps	250mg. 12. Rs.29.28, 500mg: 12 89	کلاکس
KLOX DRY SYRUP	(LYKA) 24g: Rs 14.36	کلاکس سیرپ
KLOX INJ	(LYKA) 500mg: vial: Rs.11.43	کلاکس انجکشن
STAPHNIL	(INGA)	اسٹافنیل کپسول
250mg. 12. Rs.24.27, 500mg: 12. Rs.41.30		
STAPHNIL INJ.	(INGA) 500mg vial: Rs.12 50	اسٹافنیل انجکشن

COLISTIN SULPHATE

کولسٹین سلفیٹ

SODIUM COLISTIN

سڈیم کولسٹین

METHANE SULFONATE

میٹھین سلفونیٹ

افعال و منافع: آلات بول کے انفکشن U.T.I. ورم گردہ و مثانہ، ورم نازہ Urethritis کان ناک حلق کے انفکشن E.N.T. آنکھوں کے متعدی امراض، اور گرام نکلیو جراثیم سے پیدا ہونے والے امراض میں مفید ہے۔ زخم قرنیہ، ورم ہاریطون آنٹوں کے انفکشن، آپریشن کے انفکشن سے حفاظت کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ لاکھ یونٹ سے ۸۰ لاکھ یونٹ بچوں کو ۵۰ ہزار سے ڈیڑھ لاکھ یونٹ / فی کلو گرام

وزن کے حساب سے چار خوراکیوں میں تقسیم کر کے دن میں ۴ بار انجکشن گہرا عضلاتی لگائیں۔
 مضر اثرات: جسم میں جھنجھناہٹ یا سوجن کی چھناو دو ابند کرنے پر یہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔
 احتیاط: انجکشن گہرا عضلاتی لگائیں۔

تجارتی مرکب

WALAMYCIN SUSPENSION (WALLACE) ولے مائی سین
 30ml: Rs. 17.00; 60ml Rs.30.00

Co-TRIMOXAZOLE

کو-ٹرائی موکسازول

افعال و منافع: یہ ہمیشہ ٹرائی میتھامپرم اور سلفا میتھامپرم کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ بالائی اور
 زیریں آلات تنفس کے انفیکشن، مردانہ و زنانہ تناسلی اعضاء کے انفیکشن، ولادت وزچگی کے دوران
 ہونے والے انفیکشن، تسم الدم Toxaemia شدید ورم الاذن ورم غار الانف میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۲۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار۔ بچوں کو ۱۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے
 حساب سے دن میں ۲ بار۔

منفی افعال: C/1 جگر کی خرابی میں، خون کی غیر طبعی حالت میں اور دوا سے حساس مریضوں کو
 نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: بائیسے کی خرابیاں۔ جلد پر داغ پڑنا۔

احتیاط: جگر اور گردوں کے امراض میں، دودھ پلانے والی عورتوں کو نہ دی جائے۔

DOXYCYCLINE

ڈاکسائسائیکلین

افعال و منافع: بالائی آلات تنفس کے انفیکشن U.R.T.I. سعال ہلکی Bronchitis پھیپھڑوں
 کی نالیوں کے ورم، مسمومیت، پھیپھڑوں کے پھوڑے، ورم زخرو، ورم قصہ الریہ کان ناک حلق کے
 انفیکشن، ورم لوز تین، ورم غار الانف، ورم الاذن، ورم پستان Mastitis تناسلی اعضاء، آلات بول
 کے انفیکشن ورم تائزہ ورم غد قد امیہ ورم مثانہ ورم حوض الکلیہ، ورم گردہ، پیڑ و کا ورم و دبیلہ، نسوانی
 اعضاء وزچگی کا انفیکشن حمی انفاسیہ نرم ساختوں کا انفیکشن جلنے کٹنے پھوڑے وغیرہ کے متعدی زخم، جنسی

امراض متعدی S.T.D. مسوڑوں کا اور م دانتوں کی تکالیف میں مفید و موثر ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام ہر ۱۲ گھنٹہ بعد، مرض پختہ ہو جانے پر ۱۰۰ ملی گرام یومیہ۔
منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو حمل اور ایام رضاعت میں اور ۸ سال سے کم عمر بچوں کو نہ دی جائے

مضر اثرات: دانتوں کی رنگت میں تبدیلی، پیر کی پٹی ہڈی Febula کی افزائش میں کمی، فوہضم، الرجی
احتیاط: جگر کی خرابیاں، خون کی غیر طبعی کیفیت، علاج کے دوران خون کی جانچ کراتے رہیں۔ زیادہ مدت تک استعمال سے احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

BIODOXI	(BIOCHEM)	ہائیڈاکسی
100mg caps 10: Rs.28.90	100: Rs 289.00	
DOPAMYL	(P&B LABS)	ڈوپال
100mg per ml inj: 20ml vial	Rs.35.00	
DOXT	(DOLPHIN) 100mg caps 4: Rs.9.07	ڈاکسٹ
DOXY-1	(U.S.VITAMIN) 100mg: caps 8, Rs.19.92	ڈاکسی ۱
DOXY-24	(U.S.VITAMIN) caps 6, Rs.16.60	ڈاکسی ۲۴
DOXYPAL	(JAGSON PAL) 100mg, caps 10, Rs.29	ڈاکسی پال
DOXYTERA CAPS	(P&B LABS) 100mg caps, 6, Rs 15.74	ڈاکسی ٹیرا کیپس
DURACYCLIN	(UNICHEM) 100mg caps 4 Rs.6.87	ڈیوراسا کلاکسین
GINADOX	(PHARMASIA) 100mg: caps: 10. Rs.46.00	گیناڈاکس
LYDOX	(LYKA) 100mg: caps 4: Rs 8.03	لائی ڈاکس
MICRODOX	(MICRO LABS) 100mg caps 10. Rs.25.80	مائی کرو ڈاکس
TETRADOX	(RANBAXY)	ٹٹراڈاکس
100mg caps 10: Rs.32.65; tabs: 3: Rs.9.80		
VIBAZINE DT	(PFIZER)	وائی ہازین
100mg. tabs: 6: Rs 60.11; 200mg: 10. Rs. 185.39		
VIVOCYCLINE	(IDPL) 100mg caps 4. Rs. 8.12	ویووسائیکلین

ERYTHROMYCIN

ارائی تھرومائی سین

افعال و منافع: بالائی آلات تنفس کے انفکشن، شدید نمونیہ، ٹرائی کو مونا س اور کلائی مائی ڈیا انفکشن کے سبب ہونے والے انفکشن، چھاجن، ایگزیریا، مہاسے گھنج، صفہ بالوں کی جڑ میں ہونے والے انفکشن میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد ۶ سے ۱۲ سال کے بچوں کو ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد ۶ سال سے کم عمر بچوں کو ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو، یرقان کی ہسٹری والے مریضوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

مضر اثرات: ہاضمہ کی خرابیاں، الرجی،

احتیاط: درم جگر، جگر کے افعال کی خرابی، طویل عرصہ تک، جگر کے امراض کی ہسٹری میں حمل اور ایمرضاعت میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

ALTHROCIN (ALEMBIC) ال تھرو سین مہلیٹ

250mg: 10: Rs 36 10. 500mg: 10: Rs. 69 84

ALTHROCIN CHEWABLE (ALEMBIC) ال تھرو سین چھوڑاے ٹبل

100mg tabs: 10: Rs.15.52

ALTHROCIN PAED DROPS (ALEMBIC) ال تھرو سین ڈراپس

Drops 10ml:Rs.18 28

ALTHROCIN LIQUID (ALEMBIC) 60ml: Rs.26.99 ال تھرو سین لکوز

ALTHROCIN FORTE LIQUID (ALEMBIC) ال تھرو سین فورٹ لکوز

30ml: Rs.23.79

ELTOCIN (IPCA) ال ٹوسن

250mg: 10: Rs.35 56, 500mg. 10: Rs.67 34

ELTOCIN SUSP (IPCA) 60ml Rs.23.03 ال ٹوسن سرپ

ELTOCIN LIQUID (IPCA) 60ml Rs 21 98	ال ٹوسن لکوا
ELUCN (SWIFT)	الوسن
333mg 10x10 Rs.s 575.00; 500mg. 10x10 Rs 680 00	
ELUCN SUSP (SWIFT) 50ml. Rs 29 98	الوسن سرپ
E-MYCIN (THEMIS PHARMA)	ای مائی سین
tabs 100mg. Rs. 11.84 (10) 250mg. Rs. 36 01 (10)	
E-MYCIN DRY SYRUP (THEMIS PHARMA)	ای مائی سین سرپ
syrup 30ml: Rs 9.74 60ml Rs 16.77	
EMTHROCIN (RHONE POULENC) 10: Rs.33 08	ام تھرو سین ٹبلٹ
ERO-B 250/500 (LUPIN) 500mg 10x4. Rs.267.70	ارو بی ۲۵۰/۵۰۰
ERO-B SYRUP (LUPIN) 60ml Rs 2 73	ارو بی سرپ
EROATE-250/500 (LUPIN)	ارو ایٹ ۲۵۰/۵۰۰
250mg. 10. Rs.35.64, 500mg: 10. Rs.67 50	
EROATE-SUSP (LUPIN) 60ml. Rs 27 07	ارو ایٹ سرپ
ERYBEST-250 (BLUE CROSS)	ارائی بیسٹ ۲۵۰
250mg:tabs 10, Rs.35.64	
ERYC (BDH) 250mg. tabs 10. Rs. 36.00	ارائیٹک سرپ
ERYC 50 (BDH) 250mg: tabs: 10. Rs. 31 95	ارائیٹک ۵۰
ERYC DRY.SYRUP (BDH)	ارائیٹک ٹبلٹ
125mg:per 5ml 60ml Rs 25 50	
ERYMERTAB (MERCURY)	ارائی مر ٹبلٹ
250mg. tabs 10, Rs.35.60	
ERYMERSUSP (MERCURY) 45ml: Rs 20.51	ارائی مر سرپ
ERYNATE (HIND ANTIBIOTICS)	ارائی نیٹ
45ml Rs 13 00	
ERYSAFE (U.S VITAMIN)	ارائی سیف
250mg. 10: Rs. 33.06 ; 500mg 6 Rs 33.10	
ERYSTER (HIND ANTIBIOTICS)	ارائی سٹر ٹبلٹ
250mg tabs. 10tabs 33.42	
ERYTHROCIN-FT (ABBOTT)	ارائی تھرو سین ایف ٹی
100mg: 10: Rs.13 48; 250mg: 10. Rs.34 85; 500mg.6:Rs 38 57	

ERYTHROCIN GRANULES (ABBOTT)

125mg. granules 4sachets Rs 12.70

ERYTHROCIN DRY SYRUP (ABBOTT)

45ml Rs21 28

ERYTHROCIN DROPS (ABBOTT)

THROMYCIN TAB. SYP (IDPL)

GENTAMYCIN SULPHATE

ارائی تھرو سین گرینول

ارائی تھرو سین سرب

ارائی تھرو سین ڈراپس

تھرو ماسین ٹیبلٹ سرب

جنٹا مائی سین سلفیٹ

افعال و منافع: گرام منفی Gram- Negative جراثیم سے پیدا ہونے والے امراض، آلات بول کے انفکشن U.T.I. قسم الدم Toxaemia دیگر شدید انفکشن جلد ہڈی اور نرم ساختوں کے انفکشن سرسام Meningitis، آلات ہضم کے انفکشن جلنے سکنے کے انفکشن کی مفید دوا ہے۔
مقدار و ترکیب: ہالغوں کو ۸۰ ملی گرام ہر ۸ گھنٹہ بعد بچوں کو ۶ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔

منفی اثرات: گردوں کی خرابی خون میں پیشاب کی سمیت Uraemia اور حمل میں نہیں دینا چاہیے۔
مضر اثرات: کان کے اور گردوں کے فعل میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔

احتیاط: پارکن سن ڈیزیز، گردوں کی خرابی ضعف عضلات میں نہیں دینا چاہیے۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: D/1۔ مندرات، فروسی مائیڈ ایسٹھاکرائی ٹک ایسڈ، اور مرضی عضلات ادویہ کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

BIOGARACIN

(BIOCHEM) 80mg 2ml vial Rs. 8.45

GARAMYCIN

(FULFORD) 2ml vial Rs. 5.95

G-MYCIN INJ

(BPL) 800mg: 20ml vial Rs 39 20

G-MYCIN INJ PAED

(BPL)

ہیو گراسین

گیر مائی سین

جی مائی سین انجکشن

جی مائی سین انجکشن (بچوں والا)

0 2mg.6ml: Rs. 7.60

GENMAC

(MAC)

Rs. 8.52; 800mg vial: Rs. 41.47

جین میک

GENTARIL (ALKEM)	80mg: inj 2ml: vial, Rs 8 21	جنٹارل
GENTASPORIN (PCI)		جنٹاسپورین
40mg per ml inj; 2ml Rs. 7.68; 10ml Rs. 48 03		
GENTYN (BIOGENICS)		جن ٹائن
40mg of gentamicin base per ml inj. 2ml vial: Rs 8 40		
GENTASWIFT (SWIFT)	80mg vial Rs. 8 15	جنٹاسویفٹ
GENTICYN INJ (NICHOLAS)	80mg. 2ml Rs 6 72	جنٹی سائن
GEROCIN INJ (P&B LABS)	1x2ml vial Rs. 8 13	جیرو سین انجکشن
LYRAMYCIN (LYKA)	2ml Rs. 6 90	لائی ریمائی سین
MERIGENTA INJ (MERCURY)	2.5ml amp. Rs 6 30	میری جنٹا انجکشن
PRIMICIN INJ (HIND ANTIBIOTICS)	2ml Rs 7 10	پرائی مائی سین

KANAMYCIN

کینامائی سین

افعال و منافع: آلات بول (گردہ مثانہ، حالبین) کے انفکشن U.T.I. (پھیپھڑوں، ہوائی نالیوں) کے انفکشن R.T.I. ورم، زخم نرم ساختوں کے انفکشن، اسٹفلو کاکس سے پیدا ہونے والے انفکشن۔
 نومولود کے جراثیمی امراض، قسم الدم Septicaemia وغیرہ کے لئے بہترین مانی ہوئی دوا ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام سے اگرام روزانہ عضلاتی انجکشن دو خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔
 منفی افعال: کینامائی سین سے حساس مریضوں کو، حمل اور ایام رضاعت میں دینا مضر ہے۔
 مضر اثرات: گردوں اور کان میں خراب اثرات پیدا ہوتے ہیں۔

احتیاط: ضعف عضلات میں، پارکن سن، ڈیپریز میں، گردوں کی خرابی میں احتیاط برتیں۔
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: سن کرنے اور بیہوش کرنے والی ادویہ، فروسی مائیڈ، ایسٹھا کرائی تک ایسڈ مرخی عضلات ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

کینامائی سین انجکشن

KANAMYCIN (BIOCHEM)		کان سن
500mg; Rs. 7.95; 1g, Rs. 14 10		
KANCIN (ALEMBIC)	0.5g. Rs. 13.70, 1g Rs. 23.00	کان سلف
KANSULF (BIOCHEM)	.5g, vial: Rs. 7.58, 1g, vial: Rs. 13.10	

LINCOMYCIN HCL لنکومائی سین ہائیڈروکلورائیڈ

انفعال و منافع: ہالائی آلات تنفس کے انفیکشن U.R.T.I. کان کے ورم، کھانسی Bronchitis، جلد اور زیر جلد نرم ساختوں کے انفیکشن، ہڈیوں اور مخ العظام کا ورم، تسمم الدم Septi caemia ورم غلاف القلب وغیرہ میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶۰۰ ملی گرام عضلاتی یا بوتل میں ملا کر وریڈی دن میں ۱ سے ۲ بار، بچوں کو ۱۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے عضلاتی انجکشن دن میں ۱-۲ بار خوردنی طور سے ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو ۳۰ سے ۶۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے دی جائے۔

منفی اثرات: کلن ڈائائی سین اور لنکومائی سین سے حساس مریضوں کو معمولی جراثیمی اور وائرل انفیکشن میں نو مولود کو گردوں اور جگر کے مریضوں میں مینا ہائزم یعنی عمل الجذاب کی خرابیوں میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: اسہال، ورم و سوزش امعاء، ہو سکتا ہے۔

احتیاط: شدید ورم امعاء میں، معمر افراد سوء ہضمی کے مریضوں و مہ اور الرجی، جگر کے امراض حمل اور ایام رضاعت میں، طویل عرصہ تک دوران علاج خون کی جانچ کراتے ہیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: عضلات و اعصاب کے انفعال میں رکاوٹ پیدا کرنے والی دواؤں کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

LINCOCIN	(MAX) 2ml amp. Rs.31.00
LINCOCIN CAPS	(MAX) 500mg: caps: 6: Rs.60.00
LYNX CAPS	(WALLACE) 500mg: caps: 10: Rs.80
LYNX SYRUP	(WALLACE)
125mg per 5ml syrup: 60ml:	Rs.45.00
LYNX INJ.	(WALLACE)
1ml: Rs.13.00, 2ml:	Rs.22.50

لنکوسن انجکشن
لنکوسن کپسول
لنکس کپسول
لنکس سیرپ
لنکس انجکشن

LOME FLOXACIN

لومی فلاکساسین

افعال و منافع: آلات بول (گردہ مثانہ)، آلات تنفس کے انفکشن، وچیدہ اور غیر وچیدہ امراض متعدد پرانی کھانسی Chronic Bronchitis آپریشن سے ہونے والے جراثیمی انفکشن تناسلی اعضاء اور زچگی کے متعدی امراض، جلد اور نرم ساختوں کے انفکشن، امراض خبیثہ S.T.D. مثلاً سوزاک درم نازہ ہڈیوں جوڑوں کے درم و انفکشن کی مفید و موثر دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۴۰۰ ملی گرام صرف ایک خوراک ۲۴ گھنٹہ میں مرض کے مطابق ۷ سے ۱۴ دن تک منفی اثرات: دوا سے حساس مریض کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: متلی قے، درد سر، روشنی سے نفرت چکر آنا، اسہال

احتیاط: آنکھوں میں کوئی تکلیف نہ تو دوا بند کر دی جائے ۱۸ سال سے کم عمر بچوں کو نہ دی جائے دوا کے دوران مشنری چلانے ڈرائیوری کرنے سے احتیاط برتیں۔

دوا کے ساتھ رد عمل: D/1 الوسم اور میکینیشیم سے تیار کردہ دافع تیزابیت ادویہ کے ساتھ نہ دی جائے۔

تجارتی مرکبات

FLOXADAY	(CROSLANDS)	فلاکساڈے
400mg tabs : 6:	Rs.115.00	
FOXIL	(SARABHAI) 400mg: tabs: 5:	فوکسل
LOMADAY	(DR. REDDY) 400mg: tabs: 10:	لوماڈے
LOMEF-400	(TORRENT) 400mg: tabs: 4:	لومیف-۴۰۰
LOMEWON	(MAX) 400mg: tabs: 5:	لومی دن
LOVFLOX	(IPCA) 400mg: tabs: 4:	لومی فلاکس
LOMITAS	(INTASS) 400mg: tabs: 4:	لومی ٹاس
MAHAQUIN	(SEARLE) 400mg: tabs: 4:	مہا کوئن
ONTOP	(SYSTOPIC) 400mg: tabs: 4:	اون ٹاپ

مینوسائیکلین ہائیڈروکلورائیڈ MINOCYCLINE HCL

افعال و منافع: ورم عانہ ورم رحم، ورم قاذفین، تناسلی اعضاء کے ورم اور انفلکشن سوزاک، آتشک مجازی Shancroid آتشک حقیقی Syphilis جنگسوں کا ورم، ورم غدہ قدامیہ، جلد اور نرم ساختوں کے ورم و انفلکشن حاد اور مزمن سعال Bronchitis پھیپھڑوں کے پھوڑے اور دیگر جراثیمی امراض میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: تناسلی اعضاء کے ورم و انفلکشن میں ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۱۴ سے ۲۱ دن تک، سوزاک میں ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۵ دن تک، آتشک میں ۱۰۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۶ دن تک کچھ ران کے ورم میں ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار جب تک آرام نہ آجائے کھلائیں۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو گردوں اور جگر کے مریضوں کو حمل کے نصف آخری ایام میں ۸ سال سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ہاضمے کی خرابیاں، روشنی سے نفرت، ورم قولون، جلد پر داغ پڑنا، جگر میں خرابی ہونا بڑیوں کی نشوونما میں کمی دانتوں کا کمزور ہونا وید میں انجکشن لگانے سے خون چھنے کا خطرہ۔

احتیاط: طویل عرصہ استعمال سے جگر اور گردوں کی جانچ کراتے رہیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دودھ سے بنی اشیاء فولاد کے مرکبات اور دافع تیزابیت ادویہ مینی سلین، ووروں کو روکنے والی ادویہ، کارہامازی پائن، فین نائن، لیتھیم، ڈیہاکسن کے ساتھ استعمال کرانے سے دوا کے فعل میں سستی اور کمی آجاتی ہے۔

تجارتی مرکبات

CYNOMYCIN-100

(LEDERLE)

سائی نو مائی سین ۱۰۰

Minocycline 100mg caps; 4: caps Rs.60.45

CYNOMYCIN-50

(LEDERLE)

سائی نو مائی سین ۵۰

Minocyclin 50mg caps: 6: caps Rs. 47.60

NORFLOXACIN

نار فلاکساسین

افعال و منافع: اعضاء بول (گردہ مثانہ) و آلات تناسل کے انفکشن، سوزاک، جراثیمی آنکھوں کی سوزش، معیادی بخار، آتشک مجازی وغیرہ کی بہت مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: آلات بول کے انفکشن میں ۴۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۳ دن تک سوزاک میں ۸۰۰ ملی گرام کی ایک خوراک، آنکھوں کے شدید ورم میں ۴۰۰ ملی گرام ۲-۳ بار ۳ دن تک، ٹائی فائیڈ میں ۴۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۴ دن تک آتشک مجازی Chancroid میں ۸۰۰ ملی گرام کی ایک خوراک۔

متقی افعال: C/1 حساس مریضوں، حمل اور بچوں کو استعمال نہ کرانا چاہیے۔

مضر اثرات: متلی، درد سر چکر آنا، جلد پر داغ پڑنا، قم معدہ پر جلن درد شکم، اسہال، بھوک کم، نیند میں خلل، بے چینی، الجھن، کبھی دورہ پڑتا۔

احتیاط: ایام رضاعت میں، گردوں کی خرابی میں، دورے آنے کی ہسٹری میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: D/1 نائٹرو فورن ٹائن، خوردنی مانع انجماد خون ادویہ، تھیوفائی لین، سائیکلو سپورین، دافع تیزابیت اور پروبے نی سڈ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

ALFLOX (ALKEM)	200mg: 10. Rs.23.00, 400mg. 10 Rs.45 00	الفلاکس
ANQUIN (LYKA)	400mg. 4 Rs 18 66; 800mg: 1, Rs. 9.82	این کوئن
BIOFLOXIN (BIOCHEM)	400mg, tabs 10. Rs 38 50	بایو فلاکسین
EMFLOX-400 (MALLADI)	400mg tabs 10x10, Rs 440.00	ایم فلاکس ۴۰۰
MERIFLOX (MERIND)	400mg, tabs 10, Rs. 44.20	میری فلاکس
NEONOX 200 (NEOPHARMA)	200mg: dispersible uncoated tabs 4: Rs.12.00	نیو فلاکس ۲۰۰
NORBACTIN (RANBAXY)	200mg. 10: Rs 32.65, 400mg 10. Rs. 41 10; 800mg: 4: Rs 46 08	نار بکٹین

NORBID	(ALEMBIC)	ہارڈ
200mg: 10: Rs. 25.10; 400mg: 10: Rs. 45.00		
NORFLOX	(CIPLA)	ہارڈ فلاکس
100mg, 10: Rs. 15.10; 200mg: 10: Rs. 26.20; 400mg: 10: Rs. 47.00;		
800mg: 4: Rs. 36.10		
NORILET	(STANGEN)	نارلیٹ
400mg: 10: Rs. 47.50; 800mg: 1 tab Rs. 8.00		
NORMAX	(IPCA) 400 mg tabs 10: Rs. 45.65	نار میکس
NOR-U (HIND ANTIBIOTICS) 400mg tabs 4x10: Rs. 142.10		نار یو
NORZED	(DEE PHARMA)	نار زیڈ
400mg, tinidazole 600mg: tabs: 10: Rs. 60 83		
OBAX	(WOCKHARDT) 400mg tabs 10: Rs 49.50	او بی کس
QUINOLOX	(KOPRAN) 400mg tabs 10: Rs 32.50	کیو نو لاکس
SURFLOX TABS	(KANPHA) 400mg tabs 10: Rs. 37.50	سر فلاکس
URIBEN	(CFL) 400mg : tabs 10 39 50	یوری بن
UROFLOX	(TORRENT)	یورو فلاکس
400mg: 10, Rs 40.90; 800mg: 1, Rs. 9.00		
UTIBID	(LUPIN)	یو ٹی بیڈ
400mg 10: Rs. 45 10; 800mg: 1: Rs. 9.00		

PEFLOXIN

پیف لاکسین

افعال و منافع: گرام منفی Gram Negative اور اسفلو کاکائی سے پیدا ہونے والے انفکشن مثلاً ٹائی فائیڈ فیور جراثیمی پیچش۔ Basillary Dysentery، طاعون، سرسام، آتشک، سوزاک، نمونیا، کالرا وغیرہ میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ہانتوں کو پہلی خوراک ۸۰۰ ملی گرام پھر ۴۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار جگر کے امراض، یرقان، جلدھر (استقام) میں ۴۰۰ ملی گرام دن میں ۱ بار گردوں کی خرابی یا ٹیبل ہونے پر ۴۰۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد ورنیدی انفکشن گلو کوزیلوٹن میں ملا کر آہستہ آہستہ چھ جائیں۔

منفی افعال: ۱۶ سال سے کم عمر بچوں کو، دوا سے حساس مریضوں کو حمل، ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: سر درد، درد شکم، متلی تے، الرجی، روشنی سے نفرت، عضلات میں درد خون کو بھانے والے مادے کی کمی۔

احتیاط: علاج کے دوران تیز روشنی سے الٹرا وائلیٹ شعاعوں سے احتیاط برتیں۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: سوڈیم کلورائیڈ کی بوتل کے ساتھ استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

IFIPEF	(UNIQUE) 400mg tabs: 4: Rs 19.00	ای فی پیف
IFIPEF INFUSION	(UNIQUE)	ای فی پیف بوٹل والا
400mg per 5ml inj. 5ml amp.	Rs.48 00	
PEBACT	(SARABHAI) 400mg: tabs: 10 Rs.32.71	پی بی کٹ
PEFBID	(ALEMBIC) 400mg: tabs: 10. Rs 47 50	پیف بیڈ
PEFCIN	(TIDE (TORRENT) 400mg:tabs. 4: Rs.18.95	پیف سین
PEFLOBID	(CADILA) 400mg: tabs:10: Rs.45 00	پیف لو بیڈ
PEFLOBID INFUSION	(CADILA)100ml bottle Rs.36.90	پیف لو بیڈ بوٹل
PEFOCIN	(PHARMASIA)	پی فوسن
400mg film coated tabs: 10: Rs.39 50		
PEFOXAN	(P&B LABS) 400mg. tabs: 10x10T. Rs.450.	پی فوکسان
PELOX	(WOCKHARDT) 400mg: tabs 10 Rs. 47 50	پی لاکس
PELOX INJ	(WOCKHARDT) 400mg.per 5ml amp Rs.40	پی لاکس انجکشن
PELOX INFUSION	(WOCKHARDT)	پی لاکس بوٹل
PIF	(UNICHEM)	پیف
PENTIN	(KANPHA) 400mg tabs: 10 Rs.3 74	پین ٹین
PIFLASYN TABS	(RHONE POULENC)	پیف لاسائن ٹیبلٹ
Pefloxacin 400mg: tabs: 4: Rs.18.12		
PIFLASYN I.V.	(RHONE POULENC)	پیف لاسائن بوٹل
110ml bottle: Rs.36.00		
PROFLOX	(PROTEC) 400mg. tabs 4 Rs.15 60	پروفلاکس
QUCIN	(ARISTO) 400mg tabs: 10: Rs.45 00	کوئی سین
ROLOX	(RECON)	رولوکس
400mg of Pefloxacin. 10 film coated tabs 10: Rs 45 00		

PENICILLINS

پنی سیلین کے مرکبات

BENZATHIN PENICILLIN-G بنزاتھین پنی سیلین جی

BENZYL PENICILLIN بنزائل پنی سیلین

PENICILLIN-G-SODIUM پنی سیلین جی سوڈیم

PENICILLIN (V) پنی سیلین وی

PHENOXY-METHYL-PENICILLIN فینوکسائل می تھائل پنی سیلین

PROCAIN PENICILLIN پروکین پنی سیلین

افعال و منافع: پنی سیلین ایک زبردست دافع جراثیم دوا ہے یہ بیکٹیریا کی نمو اور افزائش کو روکتی ہے۔ اسفلو کاکائی، شرپٹو کاکائی، سمو کاکائی، منجنو کاکائی، خناق، Diphtheria سوزاک، آتشک، بچوں کی موروثی آتشک میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: مقدار خوراک کا تعین مرض اور مریضوں کے حالات انفلکشن کے اثرات انفلکشن پیدا کرنے والے جراثیم پر منحصر ہے۔ عموماً ۱۲ سے ۲۳ لاکھ یونٹ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے ہر ۸ گھنٹہ بعد دی جاتی ہے۔ کم از کم ۱۰ دن تک دینا چاہیے موروثی آتشک ہالوں میں ۲ لاکھ یونٹ / فی کلوگرام وزن کے حساب سے ۲-۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے بچوں میں ۲۵ سے ۵۰ ہزار یونٹ / فی کلوگرام وزن کے حساب سے ۲ خوراکیوں میں عضلاتی انفلکشن لگایا جائے۔

منفی افعال: پنی سیلین سے حساس اور الرجک مریضوں کو استعمال نہیں کرانا چاہیے۔
مضر اثرات: ہاضمے کی خرابی، ری ایکشن ہو سکتا ہے۔

احتیاط: گردوں کی خرابی میں، لگانے سے پہلے ٹسٹ کر لیں، ری ایکشن کے خطرے کے پیش نظر پنی سیلین، ڈی کاکٹرون، ایڈرینالین تیار رکھیں۔

تجارتی مرکبات

BISTREPEN	(ALEMBIC)	بستر پین
1 vial Rs. 8.98; 5 dose vial Rs. 24.44		
CRYSTAPEN V TABS	(GLAXO)	کرشاپین ٹیبلٹ
250mg: tabs 10, Rs.6.74		
DICRYSTICIN-S-FORTE	(SARABHAI)	ڈائی کرشاسین فورٹ
1 dose vial, Rs.11.54		
FORTIFIED PROCAINE PENICILLIN INJ	(SARABHAI)	پروکین پینی سیلین
1 dose vial Rs.4.78		
KAYPEN	(HIND ANTIBIOTICS)	کایا پین
125mg: 10: Rs.8.37, 250mg: 10: Rs. 15.83		
LONGACILLIN	(HIND ANTIBIOTICS)	لانگاسیلین
12 lakh units vial Rs.11.82; 24 lakh units vial Rs.24.34		
PENCOM	(ALEMBIC)	پین کام
12 lakh units: 5 vials, Rs.59.10		
PENIDURE AP	(WYETH)	پینی ڈیورائے پی
vial inj; vial Rs.5.15		
PENIDURE LA6/LA12/LA24	(WYETH)	پینی ڈیورائے پی ۶/۱۲/۲۴
Benzathine Penicillin G 600,000, 1,200,000 & 2,400,000 u inj LA6		
vial: Rs. 7.28, LA 12 vial: Rs. 11.44, LA24 vial Rs.20.34		
PENIVORAL	(FRANCO INDIAN)	پین وورال
Penicillin V pot (equiv to 100,000iu) 65mg; tabs 10: Rs. 4.92; 50 tabs .		
Rs.30.80		
PENIVORAL FORTE	(FRANCO INDIAN)	پین وی رال فورٹ ٹیبلٹ
130mg, tabs 50: Rs. 57.56. 10: Rs.11.12		
PENTIDS	(SARABHAI)	پنڈ
Penicillin G pot 2,00,000u, 4,00,000u & 8,00,000u tabs; pentids 200:		
6 Rs.5.50; 400: 6: Rs.11.25; 800: 4 Rs.13.40		

PIPERACILLIN

پائپر اسی لین

افعال و منافع: یہ ایک نیم مصنوعی چینی سیلین ہے جو بذریعہ وریدی یا عضلاتی انجکشن استعمال کی جاتی ہے۔ آلات جنس، حکم، ہڈیوں اور جوڑوں کے انفکشن میں مفید ہے۔ خطرناک انفکشن زنانہ تناسلی امعاء (رحم اور متعلقات) کے انفکشن میں مفید موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کے لئے ۶-۸ گرام یومیہ عضلاتی یا وریدی شدید انفکشن میں ۱۲ سے ۱۸ گرام یومیہ بچوں کو ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام / فی کلو گرام کے حساب سے دی جائے۔

منفی افعال: چینی سیلین اور سیفالوسپورین سے حساس اور الرجک مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: الرجک ری ایکشن، نظام ہضم میں خرابیاں، ہیپیشیم کی کمی جگر اور گردوں کی خرابی ہو سکتی ہے احتیاط: حالت حمل میں احتیاط برتیں

تجارتی مرکبات

PIPRAPEN INJ

(FDC)

پالی پراپین

Piperacillin (as sod) 1g. and 2G per 10ml; inj. 1G 10 ml vial Rs.80.00
2G vial Rs.149.00

POLYMXIN - B

پالی مکسین

افعال و منافع: سرسام، آلات بول (گردہ مثانہ) کے انفکشن U.T.I. خون میں جراثیمی آلودگی،

آنکھوں میں تعدیہ پیمپروڈوں کے وہا انفکشن جہاں دوسری دوائیں بے اثر ہو جائیں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: سرسام میں ۲ سال سے دائرہ عمر والوں کو ۵۰ ہزار یونٹ کو لے کر لگائیں ۲ سال

سے کم عمر والوں کو ۲۰ ہزار یونٹ یومیہ عضلاتی انجکشن ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے لگائیں۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: بخار، جلد پر داغ، پتی اچھلنا، الرجی، انفکشن کے مقام پر درد، گردوں میں زہریلے

اثرات، اعصاب و عضلات کے فعل میں رکاوٹ جسم میں پانی کے تناسب میں فرق، اسٹوفیلیا ہو سکتی

ہے۔

احتیاط: گردوں کی خرابی میں، علاج ڈاکٹر کی نگرانی میں کرائیں۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: مرخی عضلات ادویہ، بیہوش کرنے والی تھیراپی کے دوران دیکھیں۔

۴۔

تجارتی مرکبات

AEROSPORIN (BURROUGHS WELLCOME) ایرو سپورین
Polymyxin B sulph 500,000u per vial sterile powder; inj vial
Rs 269.60

PRIMAXIN

پرائی ماکسن

افعال و منافع: آلات بول (گردہ مثانہ نالیاں) کے انفکشن U.T.I. زیریں آلات تنفس کے
انفکشن L.R.T.I. حکم کے اندرونی حصے تناسل اعضاء نسوانی جلد نرم ساختوں، ہڈیوں جوڑوں کے
انفکشن کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام دریدی ہر ۶ گھنٹہ بعد دریدی لگائیں

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: متلی تے، دورے آسکتے ہیں۔

احتیاط: گردوں کے فعل کی خرابی میں احتیاط رکھیں۔

ROSOXACIN

روسوکسائین

افعال و منافع: مردوں کے تناسل اعضاء (درم نائزہ، سوزاک) کے انفکشن، عورتوں میں سوزاک
سے ہونے والا درم الحانہ مقعد اور قصبۃ الریہ میں سوزاک کی اثرات نیز سوزاک کے جراثیم کے دفعیہ کے
لئے مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۰۰ ملی گرام صرف ایک خوراک دی جائے۔

احتیاط: گردوں اور جگر کی خرابی میں، منوم و مسکن دواؤں کے ساتھ احتیاط برتیں۔

ROXITHROMYCIN

راکسی تھرومائی سین

افعال و منافع: مونیہ شدید کھانسی، ورم غارالانف، ورم جھرہ، ورم لوز تین اور تناسلی اعضاء کے انفکھن کی مفیہ ترین دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۵۰ ملی گرام دن میں ۲ بار

مضر اثرات: متلی قے، درد نم معدہ، اسہال، جلد پر داغ پڑنا عظم جگر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر کی خرابی حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ارگو میٹیرین کے مرکبات کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

BD-ROX	(PANACEA) 150mg. tabs: 10: Rs. 105.00	بی۔ ڈی راکس
ODIROX	(PROTEC)	او ڈی راکس
150mg: 10: Rs 97.30, 300mg 5. Rs. 95 00		
ROXIBID	(ZELTA (CADILA) 150mg: tabs 4: Rs. 58	راکسی بیڈ
ROXID	(ALEMBIC)	راکسیڈ
150mg. 10 Rs. 109 50, 300mg: 4. Rs. 85.50		
ROXIMOL	(TORRENT) 150mg: tabs: 10: Rs. 109.90	راکسی مول
ROXYROL	(CONCEPT) 150mg. tabs: 4: Rs. 36.75	راکسی رول
ROXITEM	(KOPRAN) 150mg: tabs: 10x6 Rs 585 00	راکسی ٹیم
RULIDE	(ROUSSSEL) 150mg: 4: tabs Rs. 112.50	رو لائیڈ

SISOMYCIN

سسومائی سین

افعال و منافع: نسیم الدم Septicaemia آلات تنفس و آلات بول کے انفکھن میں بہترین کام کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

مضر اثرات: پیشاب میں پروٹین کا اخراج، خون میں نائٹروجن کا اضافہ پیشاب میں کمی، کان بچنا،

حرکات غیر ارادی، چکر آنا، بہرہ پن، نظام عصبی میں خلل، دورے پڑنا آنکھوں کے ذیلے پلا آرنا، حرکت کرنا Nystigma ہو سکتا ہے
احتیاط: گردوں کی خرابی میں احتیاط برتیں۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: امینو گلائی کوسائیڈ، سیفالوسپورین وان کومائی سین، ایملوٹراسین، سپلاشین میٹھو کسائی فیورین، مدربول، بیہوش کرنے والی، گردوں اور کان پر اثر انداز ہونے والی ادویہ کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

ENSAMYCIN (FULFORD) ان سامائی سین
LM/V; 10mg 1ml amp Rs. 13.34; 50mg: 1ml amp Rs. 41.68
SISOPTIN-50 (THEMIS CHEMICALS) سوپ ٹین ۵۰
50mg: 1ml Rs.32.84, 10mg 1ml Rs.9.13

SPIRAMYCIN

اسپائی رامائی سین

افعال و متافع: آلات تنفس کے انفکشن ورم نائزہ Urethritis ورم لثہ، ٹوکسوپلاسموس وغیرہ میں مفید موثر ہے۔
مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۲ گولی دن میں ۲ بار ۱۰ سے ۱۲ سال کے بچوں کو ۱/۲ گولی دن میں ۲ بار۔
منفی افعال: حساس مریضوں کو اور ایام رضاعت میں معر ہے۔
مضر اثرات: متلی تے اسہال جلد پر الرجی کا اثر۔

تجارتی مرکبات

ROVAMYCIN (RHONI-POULENC) 10 tabs Rs.47.74 رودامائی سین
ROVAMYCIN FORTE (RHONE-POULENC) رودامائی سین فورٹ
10 tabs Rs.95.47
SPIRACIN (ELDER) 10: Rs. 50.00 اسپائی راسین
SPIRACIN SUSP (ELDER) 60ml: Rs.30.00 اسپائی راسین سرپ

STREPTOMYCIN

اسٹرپٹومائی سین

انفعال و منافع: ہر قسم کی تپ دق T.B. میں مفید و موثر ہے، ٹی بی کی دوسری دواؤں کے ساتھ استعمال کرنے سے جلد فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جراثیم دقت کو ختم کرتی اور اس کی افزائش کو روکتی ہے۔ ایچ انفلوانزا، سرسام دماغی، طاعون Plague اعضاء بول کے انفکشن بروسی لوسس میں ٹراسانکلین کے ہمراہ دینے سے مفید رہتی ہے۔ ورم باریطون Peri Tonitis اور ورم غلاف القلب میں پینی سیلین کے ہمراہ دینے سے بہت موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو اگر ام یومیہ عضلاتی انجکشن ایک یا دو خوراکیوں میں تقسیم کر کے ۴۰ سال سے زائد مردانوں کو آدمی گرام یا ۳۳ گرام دی جائے بچوں کو ۲۰ سے ۳۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے عضلاتی انجکشن لگائیں۔

منفی اثرات: اسٹرپٹومائی سین سے الرجک مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، انجکشن کی جگہ درد ہونا کان میں سننا ہٹ بہرہ پن، ہاتھ پیروں میں جھنجھاہٹ کبھی گردوں کا مآؤف ہونا۔

SULPHONAMIDES

سلفونامائیڈس

SULFADOXINE

سلفاڈاکسن

SULFAMOXOLE

سلفاموکسول

SULFISOXAZOLE

سلفی سوکسازول

SULPHADIAZINE

سلفاڈایازین

SULPHADIMIDINE

سلفاڈیمیڈین

SULPHAGUANIDINE

سلفا گواناڈین

SULPHAMERAZINE

سلفا میرازین

SULPHAMETHOXAZOLE

سلفا میتھا کسازول

SULPHA METHOXINE

سلفا میتھا کسین

COTRIMOXAZOLE

کوٹرا موکسازول

SULPHINETHOXY

سلفین تھاکسائی

PYRIDAZINE

پائی راڈازین

SULPHAPROXYLINE

سلفا پراکسی لین

SULPHA SOMIDINE

سلفا سومی ڈین

افعال و منافع: آلات بول کے انفلشن ورم غدہ قدامیہ، نمونیہ، بھکڑوں میں ورم سعال شدید، ورم
لوہ تین، ورم الاذن پتہ کی تالی کا ورم ورم مرارہ، جراثیمی پچیش Bascillary Dysentery، ورم
مدین چھالے پڑنا، زخم، پھوڑے پھنسی، سیلولائیٹس، روہے، نگرے Trachoma اسٹریٹو کاکائی سے
پیدا ہونے والے امراض سرسام دہائی سعال مزمن، آلات بول کے مزمن انفلشن میں مفید و موثر ہے
مقدار و ترکیب: پہلی خوراک ۳ گرام پھر اگر ام ہر ۴ گھنٹہ بعد دی جائے آلات بول کے انفلشن
میں آدمی سے اگر ام ہر ۶ گھنٹہ بعد دی جائے بچوں کو عمر کے مطابق۔

منفی افعال: C/1 سلفونامائیڈ سے الرجک مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: متلی تھ، اسہال درد سر، جلد پر داغ پڑنا، جوڑوں میں درد خشکی، بے چینی، نیند نہ آنا،

منشآت و اعصاب میں درد زیادہ عرصہ استعمال کرنے پر خون کے سفید ذرات میں کمی ہوتا۔

احتیاط: بچوں اور بوڑھوں میں احتیاط برقی علاج کے دوران پانی زیادہ پلائیں۔

تجارتی مرکبات

ABURIL	(PARKE DAVIS)	آہل
Sulphadiazine 410mg, Trimethoprim 90mg, tabs 10, Rs 9.19		
ABURIL SUSP	(PARKE DAVIS)	آہل سرپ
Sulpha diazine 205mg, Trimethoprim 45mg susp; 50ml Rs. 11.12		
MADRIBON	(ROCHE)	میڈری ہون
Sulphadiazine 500mg tabs 10 Rs. 11.95		
TRIGLOBE	(ASTRA-IDL)	رائی گلوب
Sulphadiazine 410mg, Trimethoprim 90mg, tabs 10, Rs 8.48		
TRIGLOBE SUSP	(ASTRA-IDL) 50ml Rs. 8.71	رائی گلوب سرپ
ULTROX	(ETHNOR)	الٹراکس
Sulphadiazine 410mg, Trimethoprim 90mg, tabs 10, Rs. 7.54		
UROLUCOSIL	(H. CIBA GEIGY)	یورولوکوسل
Sulphamethizole 500mg tabs, 10 tabs Rs. 5.62		

TRIMETHOPRIM

ٹرائی می تھاپریم

افعال و منافع: عام طور سے یہ سلفا میٹھا کسون کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ بالائی وزیری
آلات کے انفکشن، آلات ہضم اور تناسلی اعضاء کے انفکشن، زچگی کے دوران ہونے والے انفکشن
تسم الدم Septicaemia ورم الاذن، ورم غارالالف E.N.T.I. میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۴۰ سے ۸۰ ملی گرام دن میں ۲ بار یومیہ بچوں کو ۴۰ ملی گرام دن میں ۲ بار چھوٹے
بچوں کو ۲۰ ملی گرام دن میں ۲ بار۔

متقی افعال: C/1 جگر کے فعل کی خرابی میں، خون کی بے اعتدالی، گردوں کی خرابی میں دوا سے
حساس اور الرجک مریضوں میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: فعل ہضم کی خرابی، جلد پر دماغ پڑنا۔

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں، ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

ANTRIMA	(RHONE POULENC)	10, Rs. 8 98	انٹریما
AUBRIL	(H.CIBAGEIGY)	10. Rs 9.58	آبریل
BACITRAN DS TABS	(REMEDIES (INDIA)	Rs 14 10	بے سی ٹران ڈی ایس
BACITRAN SUSP	(REMEDIES (INDIA)	Rs. 10.58	بے سی ٹران سرپ
BACTRIM	(ROCHE)	10x10. Rs. 76.68	بیکٹرم
BACTRIM SUSP	(ROCHE)	100ml Rs. 17.83	بیکٹرم سرپ
BACTRIM D.S	(ROCHE)	10: Rs 15.65	بیکٹرم ڈی ایس
BACTRIM I.M. INJ	(ROCHE)	3ml Rs. 3 91	بیکٹرم انجکشن
BACTRIM I.V. INJ	(ROCHE)	400ml per 5ml inj. 5ml. Rs. 2.14	بیکٹرم وریٹی انجکشن
CENOLPRIM	(CARMINOL)	60ml: Rs. 12 65	سی نول پرم
CIDAL	(DEE PHARMA) tabs 10, Rs. 7.10; susp. 50ml, Rs. 8.00		سی ڈال
CIPLIN	(CIPLA)	10, Rs. 8 45; SUSP: 50ml Rs. 9.78, D.S. : 10: Rs. 15 15	سپ لن
COLIZOLE	(EAST INDIA)	10: Rs. 15.57	کولی زول
COMSAT	(BOEHRINGER)	10: Rs. 15 87	کوم سیٹ
COSULF-DS	(BLUE CROSS)	10: Rs. 15 15	کوسلف ڈی ایس
DICIPRIM	(PREM PHARMA)	50ml bottle: Rs. 10.50	ڈی سی پرم
DUALTACK	(FALMA)	10: Rs. 14 94	ڈال ٹک
DUALTACK SUSP	(FALMA)	50ml: Rs. 9 00	ڈال ٹک سرپ
FORTRIM-A	(BDH)	10: Rs. 8.80	فور ٹریم اے
KOMBINA	(DEYS)	10. Rs. 9.27	کمی ٹا
KOMBINA SUSP	(DEYS)	60ml: Rs. 9.79	کمی ٹا سرپ
MATRIM SS	(MALLADI)	10x10: Rs. 84.33	مٹرم ایس ایس
MATRIM DS	(MALLADI)	10x10: Rs. 151.20	مٹرم ڈی ایس
NEOPRIM SUSP	(STADMED)	50ml: Rs. 11.20	نیو پرم سرپ
ORIPRIM-DS	(CADILA)	10: Rs. 15.35	وری پرم ڈی ایس
ORIPRIM PED SUSP	(CADILA)	100ml: Rs. 14.25	وری پرم پیڈ سرپ
ORIPRIM I.M. INJ	(CADILA)	3ml: Rs. 5.63	وری پرم انجکشن
ORIPRIM I.V. INJ	(CADILA)	5ml: Rs. 2.90	وری پرم وریٹی انجکشن

OTRIM	(BIOCHEM) 10:Rs.18.95	اورٹرم
PENETRIN	(LEDERLE) 50ml: Rs.12.30	پنیٹرن
SEPMAX	(BURROUGHS-WELLCOME) D.S. 10: Rs. 16.21	سپ میکس
SEPTRAN	(BURROUGHS-WELLCOME) 10: Rs. 8.81	سپ ٹران
SEPTRAN PAED SSUSP	(BURROUGHS-WELLCOME) 50ml: Rs. 10.45	سپ ٹران سرپ
SERVOPRIM PEAD TAB/SUSP	(HOECHST) tabs 10: Rs.3.97; susp: 50ml: Rs. 8.37	سرورپ پیم ٹیبلٹ
STAN	(SOL PHARMA) 10x10: Rs.145.70	سٹان
SUMETROL	(THEMIS CHEMICALS) 10:Rs.6.61	سومیتروال
SYNASTAT	(ROUSSEL) 10: Rs. 16.03	سائیٹس ٹیبلٹ
SYNASTAT PAED SUSP	(ROUSSEL) 50ml Rs.10.42	سائیٹس ٹیبلٹ سرپ
TABROL	(ARISTO) 10: Rs.8.90	ٹیبلرال
TPRIM FORTE	(ALKEM) 10: Rs.15.50	ٹیپرم فورٹ ٹیبلٹ
TPRIM SUSP	(ALKEM) 5ml: Rs.9.50	ٹیپرم سرپ
TRIMEXOL TABS	(P&B LABS) 10ml tabs Rs.9.08	ٹرائی میکسول
TRISULFOSE	(WAR.HINDUSTAN) 10: Rs.8.89, 160mg: 10: Rs.16.03	ٹرائی سلفوس
TRISULFOSE SUSP	(WAR.HINDUSTAN) 50ml:Rs.10.53	ٹرائی سلفوس سرپ
ULTROX	(ETHNOR) 6:Rs.11.96	الٹراکس ٹیبلٹ
ULTROX SUSP	(ETHNOR) 30ml:Rs.7.50	الٹراکس سرپ

VANCOMYCIN

ون کومائی سین

افعال و منافع: بہت وسیع الاثر وافع انفکشن دوا ہے۔ خطرناک و مہلک انفکشن ایسے متورم امراض جہاں دوسری دوائیں کارگر نہ ہوں یہ دوا کام کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد یا اگر ۱۲ گھنٹہ بعد بہت آہستہ آہستہ گھنٹہ میں چڑھائیں بچوں کو ۱۰۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ہر ۶ گھنٹہ بعد بہت آہستہ وریڈی لگائیں۔

مضرات: گردوں اور کان کے لئے مضر ہے۔ نیوٹروفیل کی کمی، متلی کھجلی، بخار جلد پر داغ اسٹوفیلیا ہو سکتا ہے۔

احتیاط: گردوں کی خرابی میں، بہرہ پن میں، زیادہ معمر لوگوں کو، حمل کی حالت میں احتیاط برتنا چاہیے۔
 دوران غلات سماعت اور گردوں کے افعال پر نگاہ رکھیں۔
 دواؤں کا رد عمل: گردوں اور اعصاب کو متاثر کرنے والی ادویہ بیہوشی اور مخدر ادویہ کے ہاتھ استعمال معتر ہے۔

تجارتی مرکبات

VANCOCIN-CP (ELI-LILLY RANBAXY)

inj. 500mg vial Rs.365.00

دن کو سن

VANCORID CP

(PANACEA) 500mg vial Rs.295.00

دن کو رڈ

دافع کینسر ادویہ

ANTI CANCER DRUG

CYCLO PHOSPHAMIDE

سائیکلو فاسفاما ئیڈ

افعال و منافع: ہا جکن ڈیزیز اور دیگر مہلک رسولیوں میں، لیوکیما، غدود کا مہلک ورم جسم میں گانگہ رسولیاں بنتا، لمفوسارکوما، مائی لوما (ہڈی کے گودے میں کینسر کا اثر) حجر الفاصل، وغیرہ میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۲۰۰ ملی گرام یومیہ
 منفی اثرات: مٹانے سے خون آنے، حمل، لیو کو سائیت کی کمی، آلات بول کے شدید انفکشن،
 تھراپین کی کمی، میں اس کا استعمال مناسب نہیں۔
 احتیاط: معمر افراد میں زیادہ کمزور مریضوں میں، ذیابیطس کے مریضوں میں خون کے سفید ذرات کی کمی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

CYCLOXAN INJ

(BIOCHEM)

سائیکلو سان انجکشن

100mg: Rs.19.45, 200mg: Rs.34.00, 500mg: Rs.77.50

CYCLOXANTABS	(BIOCHEM)	سائیکلوسان ٹبلٹ
50mg tabs 5x10 Rs. 110		
ENDOXAN-ASTA	(GERMAN REMEDIES)	انڈوکسان ٹبلٹ
50mg tabs 10; Rs. 34.24		
ENDOXAN-ASTA INJ	(GERMAN REMEDIES)	انڈوکسان انجکشن
100mg: vial. Rs. 21.64; 200: Rs. 33.10; 500: Rs. 70.76 1g Rs. 115.08		

FLUTAMIDE

فلوٹامائیڈ

افعال و منافع: غدہ قداسیہ کے بڑھے ہوئے کینسر Advance Prostatic Cancer میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار پو میہ۔

منفی اثرات: شدید ڈپریشن کی حالت میں رگوں میں خون جمنے کی حالت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: مردوں میں پستانوں کا بڑھ جانا، پستانوں کا ڈھیلا ہو جانا، دودھ بہنا، متلی تے، اسہال، بھوک کی زیادتی، نیند نہ آنا، تھکاوٹ محسوس ہونا۔

احتیاط: S/P دوران علاج جگر کے فعل پر نگاہ رکھیں، امراض قلب اور استقاء کے مریضوں میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: وارفارین کے ساتھ اس استعمال ممنوع ہے۔

تجارتی مرکبات

PROSTAMID	(BDH) Flutamide 250mg tabs 10	Rs 250	پروستامید
DROGENIL	(FULFORD) 250mg tabs 30	Rs. 2103.80	ڈروجنیل
PLUTAMIDE	(TORRENT) 250mg tabs: 10	Rs. 435.00	پلوٹامائیڈ

IFOSFAMIDE

آئی فوسفامائیڈ

افعال و منافع: پھیپھڑوں اور خسیوں کے سرطان، نرم ساختوں کا کینسر مہلک رسولیاں ہڈیوں کے کینسر میں مفید و موثر ہے۔

منفی اثرات: لیوکوسائٹ و تھروسیٹین کی کمی میں جگر اور گردوں کی شدید خرابی میں، گردوں کے

آپریشن، حمل اور رضاعت میں اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: پیشاب میں زہریلا اثر Uraemia ورم مثانہ، مثانے سے خون آنا نظام عصمی ٹراپی، الجھن گھبراہٹ، ضدی پن، اندام زخم میں تاخیر دوسر جلد پر دلخ، نظام ہضم کی ٹراپی۔
احتیاط: گردوں کے افعال پر نگاہ رکھیں۔ پیشاب کے اخراج کا دھیان رکھیں، جسم میں پانی کی کمی ہونے کے ورم اور ٹیومر، سیرم البومن میں کمی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکب

HOLOXAN UROMITEXAN (GERMAN REMEDIES) ہالوکسان یورومیٹیکسان
Ifosphamide 1g vial & mesna 200mg each in 3 amps combination
pack: 1 cabi pack: Rs. 379.08

LOMUSTINE

لومسٹین

افعال و منافع: دماغی رسولی، ہائیکن ڈیزیز (غدد لغاویہ طحال، جگر گردوں کا بڑھنا) دماغی رسولی
Brain Tumor اور دوسری رسولیوں میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: بالٹوں اور بچوں کو ۱۳۰ ملی گرام / فی اسکوائر میٹر ہاڈی کے حساب سے ۶ ہفتہ میں
خوراک دی جائے۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں، حمل ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: ہر ہفتہ خون کی جانچ کراتے رہیں دوا کے استعمال سے ۶ ہفتہ بعد بھی جانچ کراتے رہیں، دوا
خالی پیٹ نہ کھلائیں۔

MELPHALAN

میل فالان

افعال و منافع: مع الختام کا ٹیومر، خصیہ الرحم کا کینسر، چھاتیوں کے کینسر اور دوسری مہلک رسولیوں
میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ سے ۴ ملی گرام تا ۱۰ ملی گرام ایک دن نافہ کر کے ۷ دن تک استعمال کرائی جائے
زیادہ سے زیادہ ۱۰ دن۔ ۷ دن کے کورس کے بعد خون کی جانچ کرائی جائے غیر طبعی ہونے پر دوا نہ دی

جائے جب تک نازل ہلڈ نہ ہو جائے۔

منفی افعال: دواسے حساس مریضوں کو، حرام مغز اور مخ العظام کے امراض حمل اور ایام رضاعت، میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: حیض بند ہونا، جلد پر داغ پڑنا، سینہ میں تنگی، ہیملوائی ٹک، اٹیمیا، الرجی، بالوں کا گرنا (حسد) ہو سکتا ہے۔

احتیاط: خون کی جانچ کراتے رہیں۔

دواؤں کا رد عمل: نالی ڈک سک ایسڈ، سائیکلو سپورین کے ساتھ استعمال ممنوع ہے۔

تجارتی مرکب

ALKERAN (WELCOME)

ال کران

Melphalan 5mg tabs: 25: Rs.550.00

MESNA

میسنا

افعال و منافع: پیشاب میں زہریلے اثرات Uraemia جو کہ آئی فوسفامائیڈ fosfamide اور سائیکلو فوسفامائیڈ جیسی دواؤں کے اثر سے پیدا ہوتے ہیں اس کو دور کرنے اور اس سے محفوظ رہنے کے لئے مفید ہے۔

مضر اثرات: سر درد جلد پر داغ پڑنا، ہضم میں خرابی۔

تجارتی مرکبات

MESNA (GERMAN REMEDIES)

میسنا

inj. 3x2 ml: Rs.82.17

MISULBAN

می سل بان

افعال و منافع: مزمن لیموکیما (خون کا سفید ہونا) Chronic Myeloid Leukaemia

میں اور ریڈیم تھیراپی یا ایسے لیموکیما کے مریض جن کا پہلے علاج نہیں ہوا مفید و موثر ہے۔

منفی اثرات: ریڈیم تھیراپی کے دوران، خون میں نیوٹروفیل اور پلے ٹی لیٹ کی کمی یا کسی اور دواسے

علاج کے دوران اس کا استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

مضر اثرات: قہر امین کی کمی، مخ العظام میں کمی، یورک ایسڈ کی زیادتی، متلی تے اسہال، ہونٹوں پر پھٹنا، ورم لث، مسوڑھوں کا ورم ضعف باہ، مردوں میں چھاتیوں کا بڑھنا، موتیابند، برقان، ضعف عضلات جلد کی رنگت بدلنا، بالوں کا گرنا، آنتوں اور پیچیدوں میں قابض و سس بننا، کمزوری، بے چینی وزن میں کمی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: حمل کے آخری ۳ ماہ میں احتیاط رکھیں دوران علاج خون کی جانچ کراتے رہیں۔

MUSTIN HCL

مسمن ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: ہاجکن ڈیزیز، غدولفادیہ کا بڑھنا، پیچیدوں کے کینسر، خصیہ الرحم اور پستانوں کے کینسر، زیر جلد غشاء مخاطی کے کینسر Mycosis Funguies میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اعلیٰ گرام / نی کلو گرام وزن کے حساب سے ۳ سے ۴ دن تک ایک خوراک میں ۸ ملی گرام سے زیادہ نہیں دینا چاہیے انجکشن ۵۰۰ ملی لیٹر نارمل سیلائن میں ملا کر چڑھانا چاہیے عضلاتی انجکشن نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: متلی تے، بخار، لیوکوسائیٹ کی کمی بھوک کی کمی اسہال (دست آنا) جلد پر داغ مخ العظام میں خرابی حیض کی خرابیاں ہو سکتی ہے۔

احتیاط: حمل، ایام رضاعت میں لیوکوسائیٹ کی شدید کمی میں خون میں قہر امین کی کمی، ایسیا میں نہیں دینا چاہیے ۶ ہفتہ سے قبل دوسرا کورس نہ دیں۔

تجارتی مرکب

MUSTINE HCL

(BOOTS)

مسمن ہائیڈروکلورائیڈ

Mustine hcl 10mg inj 10x10 vials Rs. 5500.10

THIOTEPA

تھیوٹیپا

افعال و منافع: لیوکیمیا، پالی سائی جسمیادیرا، ہاجکن ڈیزیز گلیوہ کے کینسر، بلڈ کینسر، پستانوں کا کینسر خصیہ الرحم، رحم، معدہ پانقراس میں ہونے والے کینسر، مہلک رسولیاں Malignant Tumor میں

مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳ سے ۱۵ ملی گرام دن میں ابار، زیر جلد عضلاتی یا وریدی لگا سکتے ہیں۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: الرجی بخ العظام Bone Marrow میں خرابی ہاضمہ کی خرابی، جگر اور گردوں کے فعل میں خلل ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر و گردوں کی خرابی ہڈی کے گودے بخ العظام کی خرابی میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکب

THIOTEPA (LEDERLE)

تھیوٹپا

Thiotepa 15mg per vial inj vial Rs 27 75

VINCRIPTIN

ون کریسٹین

افعال و منافع: شدید لیوکیمیا، غد و لمفاوی کا کینسر، دوسری مہلک گلٹیاں اور کینسر کے علاج میں مفید و موثر ہے۔

احتیاط: حالت حمل میں احتیاط برتیں۔

CYTOCRISTINAQUEOUS

(CIPLA) سائی ٹو کریسٹین اے کو اس

1ml vial Rs 45 27

V.C.R.

(BIOCHEM) 1amp, Rs 48 00

وی۔سی۔آر

VINCRIPTINE

(BIOCHEM) 1mg amp Rs 48.00

ون کریسٹین

ACLARUBICIN

اکلار روبی سین

افعال و منافع: شدید لیوکیمیا، مہلک لمفوما، معدہ پیچہ پڑے، پستان اور خصیۃ الرحم Ovary کے کینسر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام بذریعہ انجکشن دی جائے۔

منفی افعال: قلب کے مریضوں کو اور دوا سے حساس مریضوں کو استعمال نہ کرائیں۔

احتیاط: جگر اور گردوں کے مریضوں کو بخ اعظام Bone Marrow کی خرابی میں متعدی امراض

اور معرلوگوں میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

KLASINOMYCIN (KHANDELWAL) 1 vial: Rs. 302.91 کلاسی نوماکی سین

BLEOMYCIN

بلوماکی سین

افعال و منافع: سرگردن اور جلد کی مہلک گلٹیاں، ناک کی مہلک رسولیاں، پیپھردوں، غدود ماغ اور

اعصاب کی مہلک اور غیر مہلک رسولیوں میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ضرورت کے مطابق ۱۰ ملی گرام یومیہ سے ۱۵ ملی گرام ہفتہ

اور استعمال کر سکتے ہیں۔

منفی افعال: حمل ایام رضاعت، پیپھردوں کے امراض میں دینا منع ہے۔

مضر اثرات: غشاء مخاطی اور جلد کا متورم ہونا، پیپھردوں میں ریشہ دار ساخت بننا۔

احتیاط: معرلوگوں میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: سائی ٹوٹاکسین اور نچتا قیون کے ساتھ نہ بوتل میں اور نہ سرنگ میں

ملا کر دینا چاہیے۔

تجارتی مرکب

BLEOCIN (KHANDELWAL) 15mg inj 1 amp Rs 953.68 بلوسین

DOXORUBICIN

ڈاکسوروبی سین

افعال و منافع: غد د کا کینسر Lymphomas لیوکیما، ہڈیوں اور نرم ساختوں کا کینسر دیگر مہلک

رسولیوں Malignant Tumer میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱.۲ سے ۲.۴ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ایک خوراک وریڈی

بہت آہستہ لگائیں ہر ۳ ہفتہ بعد لگائیں۔

منفی افعال: مخ العظام کے انفکشن اور منہ کے زخم کی حالت میں نہیں دینا چاہیے۔
احتیاط: قلب و جگر کی خرابیوں میں احتیاط لازم ہے۔

تجارتی مرکبات

ADRIAMYCIN (WALTER BUSHNELL) ایڈریامائی سین

inj 10mg Rs.127.00

ADRIM (DABUR) 10mg Rs.204.50: 50mg Rs.967.00 ایڈریم

DOXORUBUCIN (KHANDELWAL) ڈاکسوروبی سین

10mg: Rs. 240, 50mg: Rs.1000 00

DOXORUBUCIN MEIJI (KHANDELWAL) ڈاکسوروبی سین میچی

10mg: Rs.255.00

MITOMYCEIN-C

مٹومائی سین

افعال و منافع: غدہ کا کینسر Adeno Carcinoma لیمف کینسر، خسیوں کے نیو مورو دیگر مہلک
رسولیوں میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶ سے ۱۰ ملی گرام وریدی ہفتہ میں ۲ بار، زیادہ سے زیادہ ۶۰ سے ۱۰۰ ملی گرام، یہ
انجکشن عضلاتی یا زیر جلد نہیں لگانا چاہیے۔

منفی اثرات: جریان خون کار حجان رکھنے والوں، مخ العظام کی خرابی میں نہیں دینا چاہیے۔
احتیاط: لیو کو سامیٹ، قمر اسپین کی کمی منہ کے زخم میں نہ یں۔ ورید کے باہر لگنے سے ساختیں مردہ
ہو جاتی ہیں۔

تجارتی مرکب

MITOMYCIN-CKYOWA (BIOCHEM)

مٹومائی سین سی کیووا

2mg Rs. 90.00 10mg : Rs. 340.00

CHLORAMBUCIL

کلورم بوسل

افعال و منافع: ہائکلز ڈیزیز، غدہ لمفاویہ کا ورم، شدید لیوکی میا، خصبۃ الرحم اور چھاتیوں کے کینسر کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: پرچہ کے مطابق۔

مضر اثرات: پیپھروں میں فائبرین (ریشہ دار ساخت) بننا، جگر میں خرابی بخار، ورم مثانہ، بچوں میں دورے پڑ سکتے ہیں۔

احتیاط: علاج کے دوران خون کی جانچ کراتے رہیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: فینائل یوٹازون کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکب

LEUKERAN

(WELCOME)

لیوکران

2mg. 25tabs: Rs.266.40, 5mg: 25tabs: Rs.499 50

CYTOSIN

سائی ٹوسن

افعال و منافع: شدید لیوکی میا اور غدہ لمفاویہ کے کینسر کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳ سے ۶ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے وریدی ۲ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے ۵ سے ۱۰ دن تک۔

احتیاط: حمل، جگر کی خرابی میں احتیاط لازم ہے۔

تجارتی مرکبات

CYTARABINE KOREA

(SHREE GANESH)

سائی ٹارابین کوریا

100mg/5ml; 5ml amp Rs. 125.00

CYTRABIN

(BIOCHEM)

سائی ٹارابین

100mg. 10x5ml: Rs. 1587.00 500mg amp : Rs. 777.45 1000mg amp
Rs. 1478.25

ETOPOSIDE

اٹوپوسائیڈ

افعال و منافع: پیچھڑوں کا کینسر، غدولغاوی کی مہلک رسولیوں، شدید لیوکیہیا خسیوں کی رسولیاں، مٹانے کے کینسر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام / اسکوائر میٹر باڈی کے حساب سے پہلے، تیسرے اور پانچویں دن دی جائے۔

مضر اثرات: حرام مغز Spinal Cord میں خرابی مکی، قے، اسہال، ورم اعصاب، مقامی طور سے درید کا متورم ہونا۔

دواؤں کا رد عمل: انٹی نیوپلاسٹک، ایجنٹ Anti Neoplastic Agent کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

ASIDE	(SHRE GANESH)	اے سائیڈ
100mg per 5ml inj. 5ml amp: Rs 350 00		
ETOSID	(CIPLA) 5ml inj. 5ml 250 00	اے ٹوسڈ انجکشن
ETOSID CAPS	(CIPLA) 50mG caps. 4. 301.20	اے ٹوسڈ کپسول
LASTET	(KHANDELWAL)	لاس ٹیٹ انجکشن
100mg per 5ml inj; 10x5ml: amp Rs.274.86		
LASTET CAPS	(KHANDELWAL)	لاس ٹیٹ کپسول
caps: 25mg: 1 cap: Rs. 96.39, 50mg: 1 cap: Rs. 189.54, 100mg 1 cap 375 B5		

FLOROURACIL

فلوروارسل

افعال و منافع: بڑی آنت، مقعد، چھاتیوں، معدہ، ہانقراس جگر، رحم، خسیۃ الرحم، اور مٹانے کے کینسر میں مفید ہے۔

مقدار و خوراک: ۱۲ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے دریدی دن میں اہار ۴ دن، ۸۰۰ ملی گرام پورے سے زیادہ نہ دیں۔

منفی افعال: حمل تغذیہ کی کمی، بخ العظام کاڈپریشن، اور شدید انفکشن میں دینا منع ہے۔
 مضر اثرات: اسہال، متلی تے منجاپن، (سفہ) جلد کا متورم ہونا، لیو کو سامیٹ اور قحرا مبین کی کمی۔
 احتیاط: مریض کو اسپتال میں بھرتی رکھ کر علاج کریں

تجارتی مرکبات

FLURACIL (BIOCHEM)	فلوراسل انجکشن
250mg: 5x5ml Rs. 53.00, 500mg 5x5ml, Rs. 96.00	
FLURACIL ORAL (BIOCHEM).	فلوراسل کپسول
5, Flurouracil 250mg caps 10: Rs. 53.00	
5-FU INJ (SHREE GANESH)	فائیو فوائنجکشن
500mg per 10ml ; 10ml vial Rs. 52.00	

FLORAFUR

فلورافر

افعال و منافع: آلات ہضم پستان میں نئی ساختیں بننا، رسولیاں بننا، سرجری کے بغیر، رسولیوں کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ ریڈیم تھیراپی یا دوسری دواؤں کے ساتھ اس کا استعمال مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۸۰۰ سے ۱۲۰۰ ملی گرام روزانہ ۲ سے ۴ خوراکیوں میں۔
 منفی اثرات: حمل، بخ العظام کی خرابی، میں دینا مضر ہے۔
 احتیاط: لیوکیما، ایسیا، قحرا مبین کی کمی، جلد کی رنگت میں تبدیلی، متلی تے میں استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکب

FURATOR (BIOCHEM)	لیورائر
Florafur 200mg: caps : 12: Rs. 75.03	

MERCAPTO PURIN

مرکاپ ٹوپورین

افعال و منافع: شدید لیوکیما، مزمن، لیوکیما، میں مفید ہے۔ مقدار و خوراک: ۲.۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے روزانہ
 منفی اثرات: لیام رضاعت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: جگر میں خرابی، بخار یا جلد پر داغ، سخ العظام کا ڈپریشن بھوک کی کمی، متلی، قے، خون میں ہرک ایسڈ کی زیادتی، آنتوں میں زخم ہو سکتے ہیں۔

احتیاط: خون کی جانچ کراتے رہیں، جگر کے فعل اور یورک ایسڈ پر نگاہ رکھیں، حمل اور گردوں کی خرابی میں منع ہے۔

تجارتی مرکب

PURINETHOL (BURROUGHS-WELLCOME) پوری ہل تھال
50mg tabs 25: Rs. 231.50

METHOTREXATE

میتھوٹریک سیٹ

افعال و منافع: رحم اور بیرونی رحم کا کینسر، رحم کی مہلک رسولیاں، لفاوی لیوکیما مہلک لیوکیما، پھانچوں کا کینسر، گردن اور سر کی جلد کی نیچے بننے والا کینسر اور پھیپھڑوں کے کینسر کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: رحم کے کینسر میں 15 سے 30 ملی گرام یومیہ 5 دن تک، خوردنی یا عضلاتی انجکشن یہ کیس میں 3، 3 ملی گرام / فی میٹر باڈی کے حساب سے خوردنی یا عضلاتی لگائیں۔

ضری اثرات: حمل، گردوں اور جگر کی شدید بیماریوں میں خون کی غیر طبعی حالت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: سخ العظام کی خرابی نظام ہضم میں خرابی جگر کی خرابی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: معمر لوگوں میں احتیاط برتیں، دوران علاج خون جگر گردوں پر نگاہ رکھیں

تجارتی مرکبات

BIOTREXATE (BIOCHEM)

بایو ٹریکسیٹ

5mg amp: Rs. 20.66 : 50mg vial: Rs. 52.56

MTX KOREA (SHRE GANESH)

ایم ٹی ایکس انجکشن

50mg per 2ml inj; 2ml vial Rs. 76.00

MTX TABS KOREA (SHRE GANESH)

ایم ٹی ایکس ٹبلٹ

2.5mg tabs: 100: Rs. 350.00

NEOTREXATE TABS (BIDDLES AWYER)

نیو ٹریکسیٹ ٹبلٹ

2.5mg tabs 10: Rs. 35.89

NEOTREXATE

(BIDDLESAYER)

نیو ٹریکسٹ انجکشن

50mg per 2ml Rs. 47.45

MITOZANTRONE

میٹوزان ٹرون

افعال و منافع: پستان کا کینسر، لمفوما، لیوکیما، مزمن لیوکیما میں مفید ہے۔

منفی افعال: حرام مغزی خرابیوں اور ایام رضاعت میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: قلب میں خرابی، سانس میں تکلیف، وریدوں کا متورم ہونا، جلد پر داغ پڑنا۔

احتیاط: ریڈیو تھیراپی سے پہلے انٹراسائیکلین کے استعمال امراض قلب اور حمل میں احتیاط برتنا

چاہیے دوران علاج خون اور قلب پر نگاہ رکھیں۔

تجارتی مرکب

ONCOTRON

(TDPL)

اون کو ٹران

Mitozantrone 2mg/ml 10ml: Rs.395.00

CARBOPLATIN

کاربو پلاٹین

افعال و منافع: خبیثہ الرحمہ کے کینسر نرم ساختوں کے کینسر کی بہترین دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۴۰۰ ملی گرام / فی مکعب پاؤی میٹر کے حساب سے وریدی بہت آہستہ ۱۵ سے ۶۰

منٹ میں بوتل کے ساتھ استعمال کرائیں۔ ۴ ہفتہ بعد دوبارہ استعمال کرائیں۔

منفی اثرات: شدید گردوں کی خرابی میں حرام مغزی کمزوری، حمل اور ایام رضاعت میں مضر ہے۔

مضر اثرات: گردوں اور کان کے فعل میں رکاوٹ سن پن (حذر)

احتیاط: دوران علاج خون کی جانچ گردوں کے افعال کی جانچ کراتے رہنا چاہیے۔

دواؤں کا رد عمل: امینو گلیائی کو سائڈ اور دوسری گردوں کو خراب کرنے والی ادویہ کے ساتھ نہ

دینا چاہیے۔

تجارتی مرکب

ONCOCARBIN

(TDPL) inj : 150mg: Rs. 850.00

اون کو کراہین

CISPLATIN

سس پلاٹین

افعال و منافع: خسیوں اور نصیۃ الرحم کے ٹیو مرکب کی مفید دوا ہے۔

منفی افعال: گردوں کی خرابی میں حمل اور ایام رضاعت میں، خلل اعصاب، کان کی خرابی جسم میں پانی کی کمی، اور دواسے حساس مریضوں کو استعمال نہ کرائیں۔

احتیاط: خون کے تناسب گردوں کے افعال جسم میں پانی اور نمکیات کے تناسب کا خیال رکھیں، البونیم کے برتنوں سے پرہیز کیا جائے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: امینو گلائکی کو سائیڈ، گردوں اور حرام مغز کو متاثر کرنے والی ادویہ کے ساتھ احتیاط رکھیں۔

تجارتی مرکبات

AQUAPLAT (KHANDELWAL) 10mg: inj: Rs 151.35

انکو پلاٹ

CISPLATIN (BIOCHEM)

سس پلاٹین

10mg: Rs. 110.00, 50mg: vial: Rs. 365.00

KEMOPLAT (DABUR)

کیمو پلاٹ

20ml vial Rs. 83.00, 100ml vial Rs. 337.00

ESTRAMUSTINE
PHOSPHATE

ایسٹرامسٹین
فاسفیٹ

افعال و منافع: غدہ قدامیہ کے کینسر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۶۰ ملی گرام روزانہ ضرورت کے مطابق ۴۲۰ ملی گرام سے ۸۴۰ ملی گرام تک دے سکتے ہیں۔

منفی اثرات: عظام Bone Marrow کی خرابی میں زخم معدہ قلب جگر کے شدید امراض

میں نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکب

ESTRACYT

(MERCK) 140mg: caps: 10 Rs. 22.60 ایسٹراست

ETHINYL OESTRADIAL اتھینیٹائل اسٹریڈائل

افعال و منافع: پستانوں اور غدہ قدامیہ کے کینسر کی تکالیف اور ان کی شدت کو کم کرنے کے لئے استعمال ہے۔

مقدار و ترکیب: فوری طور سے اسے ۳ ملی گرام پھر اہلی گرام روزانہ مرض کو کنٹرول رکھنے کے لئے دینا چاہیے۔

منفی افعال: حمل امراض قلب، امراض دماغی، وریڈوں میں رکاوٹ، ہائی بلڈ پریشر جگر کی خرابی، یرقان حمل، یرقان کی ہسٹری، غیر تشخیصی جریان الرحم حالت حمل میں ایسٹروجن کے ساتھ، شدید کھجلی، اور ہرپیز Herpes کی تکالیف میں اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔

تجارتی مرکب

LYNORAL

(INFAR) 1mg tabs : 10: Rs.17.20

لائی نورال

نان ڈرولون فینائٹل پروپیونیٹ

NANDROLONE PHENYL PROPIONATE

افعال و منافع: عورتوں میں پستانوں کے کینسر کی مفید دوا ہے، اینیسیا، نظام استحالہ میں خرابی، لوہلڈ پریشر، کمزوری، ہڈیوں کی کمزوری میں مفید ہے۔

مقدار و خوراک: ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام عضلاتی ہفتہ وار لگائیں۔

منفی افعال: حمل، ہائی بلڈ پریشر قلب جگر و گردوں کی خرابی، مردوں کی چھاتیوں کے کینسر، غدہ

ندامیہ کے کینسر میں استعمال نہیں کرانا چاہیے۔
احتیاط: مرگی شقیقہ Migrain ذیابیطس اور جسم میں پانی جمع ہونے میں احتیاط رکھنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

DECA-DURABOLIN	(INFAR)	ڈی کا پورابولین
1ml amp. 25mg. Rs.44.50, 50mg: Rs.79.00, 100mg: Rs. 125.50		
DOCABOLIN	(INFAR)	ڈی کا پورابولین
Nandrolone phenyl propionate 25mg desoxy cortico sterone phenyl propionamide 10mg per ml inj; 1ml Rs.32 50		
DURABOLIN	(INFAR)	ڈی کا پورابولین
Nandrolonephenyl propionate 25mg per ml inj; 10mg: 1ml Rs.24 00		
EVABOLIN	(CONCEPT)	ایو ای بولین
Nandrolonephenyl propionate 25mg per ml amp; 1amp Rs.12.96		
GROTHIC	(LYKA)	گرو تھک
Nandrolonephenyl propionate 25mg per ml inj; 1ml Rs 6.95; 5ml Rs 23 08		
METABOL	(JAGSONPAL)	میٹا بول
Nandrolonephenyl propionate 25mg per ml inj; 1ml Rs. 17.50		
MYOBOLON	(TROIKAA).	مایو بولین
Nandrolonephenyl decanoate 25mg per ml inj; 1ml amp: Rs 36 80		
NEURABOL INJ	(CADILA)	نیورو بول
Nandrolonephenyl propionate 25mg per ml inj; 1ml Rs.15.50		

POLYESTRADIOL

پولی اسٹر ایڈیول

افعال و منافع: خدہ قد امیہ کے کینسر میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱۶۰ ملی گرام گہرا عضلاتی انجکشن ہر ۴ ہفتہ بعد لگائیں۔
منفی اثرات: دواسے الہر جک مریضوں، جگر کی خرابی و ریدوں میں خون جمنے اور انیمیا میں دینا مضر ہے۔
احتیاط: مرگی، شقیقہ Migrain گردوں اور قلب کی خرابی میں، ذیابیطس کے مریضوں میں ہائی بلڈ پریشر، دماغ اور پیپڑوں کی عروق کی خرابی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکب

ESTRADURIN

(MERCK)

inj 40mg: 10: Rs. 55.41 ; 80mg: 10: Rs. 70.35

ایسٹراڈیورن

STIL BOESTROL

اسٹیل بیسٹروئل

افعال و منافع: غده قدامیہ کے کینسر میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ابتدا میں ۵۰۰ ملی گرام وریدی انجکشن روزانہ ۵ سے ۱۰ دن تک بعد کو ۲۵۰ ملی گرام روزانہ ۱۰ سے ۲۰ دن تک مرض پر کنٹرول رکھنے کے لئے ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار خوردنی کھلائیں۔

منفی افعال: جگر کی خرابی میں استعمال مضر ہے۔
مضر اثرات: مردوں میں پستانوں کا بڑھنا، نسوانیت پیدا ہونا ہاضمہ کی خرابیاں۔
احتیاط: ذیابیطس شکر میں، احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

HONVAN

(GERMAN REMEDIES)

ہون وان ٹبلٹ

100mg tabs 10: Rs. 81.54

HONVAN INJ

(GERMAN REMEDIES)

ہون وان انجکشن

250mg per 10 amps: Rs. 263.20

TAMOXI FEN CITRATE

ٹاموکسی فین سائٹریٹ

افعال و منافع: پستانوں کے کینسر کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام دن میں ۲ بار خوردنی استعمال کرائی جاتی ہے۔

منفی اثرات: حساس مریضوں کو اور حالت حمل میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: جریان مہلی Viginal Bleeding گرمی کا احساس رحم میں کھلبلی، ہضم کی خرابیاں،

نیو مریٹا، تھرامین کی کمی، بصارت میں فرق ہو سکتا ہے۔

ضیاط: طویل علاج کے دوران خون اور جگر کی جانچ کرتے رہنا چاہیے۔
تجارتی مرکبات

MAMOFEN (KHANDELWAL) 10mg tabs 10: Rs. 29.21
NOLVADEX (ICL) 10mg: tabs 50: Rs. 851.60
TAMOXIFEN LYKA (LYKA) 10mg tabs 10: Rs. 29 00
TAMOXIFEN (BIOCHEM)
10mg: 10: Rs. 25.00, 20mg: 10: Rs. 47.10
TAMOFEN (TORRENT) 10mg tabs 10: Rs 51 90

ایوفین
نولواڈیکس
ٹاموکسی فین
ٹاموکسی فین

ٹاموکسی فین

مدافعتی نظام پر اثر انداز ہونے والی ادویہ

IMMUNO SUPPRESSIVE/

STIMULANT AGENT

AZATHIOPRINE

ازاتھیوپرین

افعال و منافع: گردوں کی تبدیلی میں شدید تحجز الفاصل میں جہاں دوسری دوائیں بے اثر ہوں یہ دوا مفید رہتی ہے۔ یہ جسم میں مدافعتی نظام کو تیز کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: فوری طور پر گردوں کی تبدیلی میں ۳ سے ۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ہر روز ۱ سے ۳ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے۔ تحجز الفاصل میں پہلی خوراک ۱ ملی گرام / فی کلو گرام کے حساب سے ایک خوراک ضرورت پڑنے پر آدمی ملی گرام / فی کلو گرام ۳ سے ۶ ہفتہ کے وقفہ سے دی جائے۔

معراضات: حرام مغزخ اعظام کی عرابی فتور ہضم جلد پر داغ پڑنا جگر میں عرابی ہو سکتی ہے۔
احتیاط: خون کی جانچ کراتے رہیں۔ جگر اور گردوں کی عرابی میں، سورج کی تیز شعاعوں سے اور آنکھوں کی حالت میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کا رد عمل، الہوری ہل اور مرخی عضلات Relaxant کے ساتھ دینا مسخر ہے
تجارتی مرکبات

AZORAN
MURAN

(SEARLE) tabs: 10: Rs.44.46
(BURROUGHS-WELLCOME)

25mg 10 Rs.30.57 50mg: 10: Rs.87.86

اے زوران
اموران

CYCLOSPORIN

سائیکلو سپورین

افعال و منافع: عضوی تبدیلی، مخ العظام کی تبدیلی اور سر خباہہ Psoriasis میں مفید و موثر ہے۔
مقدار و ترکیب: ۳.۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے دن میں ۲ بار پوئل میں ڈال کر
۲۷ ماہ یا ۱۵ سے ۱۵ ملی گرام جسمانی وزن کے حساب سے روزانہ ۵ دن تک بروہ دہن دے سکتے ہیں۔
مضر اثرات: ہاتھوں اور چہرے پر گرمی کا احساس، غیر طبیی بالوں کا ٹکلتا ہاتھ پیر کا پٹنا، گردوں کی
خرابی، جگر کی خرابی، مسوڑھوں کا پھولنا، ہاضمے کی خرابیاں، خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی، تھراپین کی
کئی بائی ملڈ پریشر، انیمیا۔
احتیاط: وہ دیکسین جو زندہ جانوروں سے تیار کی جائے اور مدافعتی نظام کو کمزور کرنے والی ادویہ کے
ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

PANIMUN

(PANACEA)

پانی مون

100mg per ml inj for infusiion: 50ml vial Rs. 6100.00

ZYMMUNE

(CADILA)

زیمی مون

100mg per ml inj. 50ml bottle: Rs. 6170.00

ANTI FILARIAL

دافع فاسیلیریا

ANTI HELMENTICS

دافع دیدان امعاء

**DIETHYL CARBAMAZIN
CITRATE**ڈائی اتھائیل کاربامازین
سائٹریٹ

افعال و منافع: فاسیلیریا، اسٹوفیلیا، کینچوے Round Worms کے علاج کے لئے مفید دوا

-۴-

مقدار و ترکیب: ابتدا میں اٹلی گرام / فی کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے دن میں ۳ بار رفتہ رفتہ مقدار میں اضافہ کر کے ۶ اٹلی گرام / کلو گرام کر سکتے ہیں، علاج ۲۱ دن جاری رکھیں

مضر اثرات: درد سر، چکر آنا بے چینی، آنکھوں میں تناؤ، بخار، الرجی، لو بلڈ پریشر متلی تے کی تکلیف ہو سکتی ہے۔

احتیاط: دودھ پلانے کے ایام میں، معمر افراد گردوں کی بیماریوں میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

BANOCIDE (BURROUGHS WELLCOME) ہائوسڈ ٹبلٹ

50mg: 10: Rs. 2.26: 100mg 10: Rs. 2.95

BANOCIDE SYRUP (BURROUGHS WELLCOME) ہائوسڈ سرب

120mg per 5ml 115ml Rs. 13.34

BANOCIDE PAED SYRUP (BURROUGHS WELLCOME) ہائوسڈ سرب بچوں کا

50mg per 5ml 60ml Rs. 9.76

CARBAMYL FORTE TABS (KOPRAN) کاربامائل فورٹ ٹبلٹ

20x10 Rs. 66.00

CARBAMYL SYRUP (KOPRAN) 5ml syrup, 100ml Rs. 11 کاربامائل سرب**DICARBINGA TABS (INGA)** 10 Rs. 5.50 ڈائی کارب ٹبلٹ**DICARBINGA MITIS (INGA)** 110ml. Rs. 8 95 ڈائی کارب سرب

DICARB-50/100/150

(INGA)

50mg: 10: Rs. 3.25; 100mg: 10: Rs. 4.10; 150mg: 10: Rs. 4.95

ڈاکی کارب ۵۰/۱۰۰/۱۵۰

HELMAZAN

(NOEL) 60ml Rs. 5.65

HETRAZAN

(CYANAMID)

50mg: 10: Rs. 1.90; 100mg: 10: Rs. 2.90

ہیل مازان

HETRAZAN SYRUP

(CYANAMID)

120mg per 5ml : 100ml Rs. 10.75

ہترازان سیرپ

UNICARBAZAN

(UNICHEM) 500 Rs. 48.00

UNICARBAZAN FORTE (UNICHEM)

250mg, Chlorpheniramine maleate 5mg tabs 8 Rs. 6.90, 100 Rs. 65.00

یونی کاربازان ٹبلٹ

یونی کاربازان فورٹ

BIPHENIUM HYDROXY

بی فی نیم ہائیڈروکسی

افعال و منافع: ہک ورم کے علاج کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ سال سے زائد عمر میں ۲۵ گرام واحد خوراک ۲ سال سے کم عمر والوں کو ۱۲.۵

گرام کی ایک خوراک۔

مثقی افعال: تھوے والے مریضوں میں نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: متلی تھوے، شکم کی تکالیف، اسہال آتا۔

تجارتی مرکب

ALCOPAR

الکوپار

ALBENDAZOL

ال بندازول

افعال و منافع: کینچوؤں، راؤنڈ ورم، ہک ورم، دھاگے نما کیڑوں Pinworm تھریڈ ورم، وچ

ورم اور شیپ ورم (گدو دالوں) کے لئے مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: راؤنڈ ورم ہک ورم، پن ورم وچ ورم کے لئے ۴۰۰ ملی گرام کی ایک خوراک

تھریڈ ورم کے لئے ۸۰۰ ملی گرام روزانہ ۳ دن تک شیپ ورم کے لئے ۴۰۰ ملی گرام روزانہ ۳ دن تک

استعمال کریں۔

منفی افعال: حالت حمل میں مضر ہے۔

مضر اثرات: قبض، بھوک کی کمی، متلی کنزوری، چکر آنا۔

احتیاط: جوان عورتوں کو حیض کے ابتدائی دنوں میں احتیاط برتیں، جگر کے فعل کی جانچ کراتے رہیں۔

تجارتی مرکبات

ABZ	(INDOCO) 400mg tab: 1: Rs 7 50	ای بی زیڈ ٹبلٹ
ABZ SUSP	(INDOCO) 200mg per 5ml susp: 10ml Rs 11.50	ای بی زیڈ سرپ
ALBENDOL	(MICRO LABS) 400mg tabs; 1 Rs.9 90	البنڈول ٹبلٹ
ALBENDOL SUSP	(MICRO LABS)	البنڈول سرپ
	200mg per 10ml susp. 10ml: Rs.11.05	
ALMINTH	(TORRENT)	آل منٹھ
	200mg. 2. Rs 7 40, 400mg: 1: Rs.7 40. susp: Albendazole 200mg per 5ml: 10ml. Rs.13	
ALBEZOLE	(KHANDELWAL)	آل بی زول ٹبلٹ
	400mg tabs 1 tabs (strip) Rs 7.11	
ALBEZOLE SUSP	(KHANDELWAL)	آل بی زول سرپ
	200mg per 5ml susp; 10ml Rs.10.84	
ALZAD	(TATA PHARMA) 400mg tabs 1, 9.90	آل زیڈ ٹبلٹ
ALZAD SUSP	(TATA PHARMA)	آل زیڈ سرپ
	200mg, per 5ml susp 10ml, Rs.12.90	
BENDEX	(PROTEC) 400mg, chewable tabs 1, Rs.9.75	بڈیکس ٹبلٹ
BENDEX SUSP	(PROTEC)	بڈیکس سرپ
	200mg per 5ml susp 10ml, Rs.12.00	
BENDOL TABS	(KANPHA) 400mg tabs 4, Rs.30.44	بڈول ٹبلٹ
BENDOL SUSP	(KANPHA)	بڈول سرپ
	200mg, flavoured syrup 10ml Rs.10.43	
NEOMIN	(NEO PHARMA) 400mg tabs. 1tab: Rs 8.00	نیو مین
NOPAR TABS	(MALLADI) 400mg tabs 1, Rs.8.00	نوپار
NOWORM	(ALKEM) 400mg tabs 1, Rs.9.50	نورم ٹبلٹ
NOWORM SUSP	(ALKEM)	نورم سرپ
	400mg/10ml : liquid 10ml, Rs.11.90	

NUBEND	(KOPRAN) 400mg tabs 10x1: Rs 80 61	نو بند ٹبلٹ
NUBEND SUSP	(KOPRAN) 200mg, per 5ml 10ml Rs.11.50	نو بند سرپ
ODAL	(KLAR SEHEN)	او ڈال
400mg tabs. 1	Rs.8.18, susp: Albendazole 5ml per susp 200mg 10ml	
Rs 9 74		
OMNITEL	(PHARMED) 400mg 4: Rs 30 00	او منی ٹل
OMNITEL SUSP	(PHARMED) 10ml: Rs.11.50	او منی ٹل
ULBEN	(MEJDA) 400mg tabs 1, Rs 7 65	ال بن ٹبلٹ
ULBEN SUSP	(MEJDA)	ال بن سرپ
200mg, per 5ml syrup 10ml, Rs.9.95		
WOMIBAN	(BLUE CROSS) 400mg tabs 1, Rs 8 90	وومی بان
ZENTEL	(SMITHKLINE) 400mg tabs 1, Rs.9.35	زن ٹل ٹبلٹ
ZENTEL SUSP	(SMITHKLINE)	زن ٹل سرپ
200mg per 5ml, susp 10ml, Rs.12.35, 50ml: Rs. 53 45		

LIVAMISOL

لوامی سول

افعال و منافع: کینچوؤں راؤنڈورم اور ہک ورم کے لئے مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: راؤنڈورم کے لئے بالٹوں کو ۱۵۰ ملی گرام کی ایک خوراک بچوں کو ۵۰ ملی گرام کی

ایک خوراک ہک ورم کے لئے ۱۵۰ ملی گرام کی ۴ خوراک ہر ۶ گھنٹہ بعد بچوں کو ۹۰ ملی گرام۔

مستمر اثرات: متلی، قے، بخار و در شکم ہو سکتا ہے۔

احتیاط: کاربن ٹرائیکلورائیڈ، ٹرائیکلورواکھن لین، کلوروفارم اور ایقتر کے مرکبات کے ساتھ استعمال

نیک نہ رہتا ہے۔

تجارتی مرکبات

DEWORMIS 50/150	(BIDDLESAWYER)	ڈیوار مس
50mg. 1, Rs.3.10, 150mg: 2: Rs.5.12		
VERMISOL	(KHANDELWAL)	وہی منی ٹبلٹ سرپ
50mg: 1, Rs.3.50: 150mg: 1, Rs 5 00, syrup; levamisole 50mg per 5		
1:ml: Rs.8.00		

MEBENDAZOL

مے بندازول

افعال و منافع: کینچوؤں (راؤنڈ ورم) ایک ورم تھریڈ ورم اور کدو دانوں کی مفید دوا ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام صبح و شام ۳ دن اگر ضرورت ہو تو ۲ ہفتہ بعد دوبارہ دیں، کدو دانوں
 پیپر میں ۲۰۰ ملی گرام صبح و شام ۳ دن بچوں کو بھی یہی خوراک دیں۔
 نقل افعال: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں اس کا استعمال ضرر رساں ہے۔
 مضر اثرات: پیٹ کی خرابیاں۔
 احتیاط: ایام رضاعت میں۔

تجارتی مرکبات

HELMINTOL (MEDLEY) 100mg tabs 6, Rs. 5.10	ہل من ٹال ٹیبلٹ
HELMINTOL SUSP (MEDLEY)	ہل من ٹال سرب
100mg, per 5ml 30ml, Rs. 8.10	
IDIBEND (IDPL) 6: Rs. 5.15 syrup: 30ml: Rs. 5.78	آئی ڈی بند
MEBAGENTABS (FALMA) 100mg tabs 6, Rs 6.23	میا جن
MEBAZOLE (TORRENT) 100mg tabs 6, Rs 3.60	میا زول
MEBEX (CIPLA)	مے بیکس
100mg : tabs: 6: Rs. 8.90, 200mg: 5gm granules Rs 3.98	susp
Medenda zole 100mg per 5ml susp 30ml : Rs. 11.75	
MENDAZOLE (BIDDLES AWYER)	مینڈازول
100mg tabs 6, Rs. 4.56	
PANTELMIN (ETHNOR)	پین ٹل من
100mg tabs 6, Rs. 9.30 syrup: Mebendazole 100mg per 5ml syrup	
30ml : Rs. 14.60	
WORMIN (CADILA PHARMA)	ورمن ٹیبلٹ
100mg tabs 6, Rs. 7.40	
WORMINSYRUP (CADILA PHARMA)	ورمن سرب
100mg per 5ml syrup: 30ml: Rs. 8.70	
ZUMIN (RAPTAKOS) 100mg tabs 6, Rs. 5.50	زومن

NICLOSAMIDE

نکلو سامائیڈ

افعال و منافع: کدو والوں (ٹیپ ورم) کی تمام قسموں کی مفید و مجرب دوا ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۶ سال سے زائد عمر والوں کو اگر ام چبا کر پانی سے کھلائیں دوسری خوراک اگر ام
 گھنٹہ بعد یا ۲ گرام ایک ہی خوراک میں دے سکتے ہیں۔ دوا کے ۲ گھنٹہ بعد تیز مسہل میگ سلف وغیرہ
 ضرور دینا چاہیے۔ بچوں کو اگر ام ۲ حصوں میں تقسیم کر کے گھنٹہ کے وقفہ سے دی جائے۔
 مضر اثرات: ہاضمہ کی خرابیاں، درد سر، کبھی کبھلی ہو سکتی ہے۔

تجارتی مرکب

NICLOSAN (BIDDLES AWYER)

نکلو سان

Niclosamide 500mg tabs 4, Rs.22.75

PIPRAZINE CITRATE

پیرازین سائٹریٹ

افعال و منافع: کینچوؤں (راؤنڈ ورم) اور تھریڈ ورم دھاگے نما کیڑوں کی مفید ترین دوا ہے
 مقدار و خوراک: راؤنڈ ورم کے لئے ۲۰ کلو سے زائد وزن والوں کے لئے شام کو ۳ گرام دی جائے
 صبح کو دست آور دوا دی جائے، اگر ضرورت ہو تو ۲-۳ دن بعد دوبارہ دی جائے۔ تھریڈ ورم کے لئے ۲
 سال تک کے بچوں کو ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۲ بار سے ۴ سال تک ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۷ سے ۱۲
 سال تک ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۱۲ سال سے زائد عمر والوں کو اگر ام دن میں ۲ بار ۷ دن تک دوا کھلائی
 جائے۔

منفی افعال: جگر و گردوں کی خرابی میں اور مرگی کے مریضوں کو دینا مضر ہے۔
 مضر اثرات: چکر آنا، خدر، عضلات کا پھڑکنا، پتی اچھلنا۔
 احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں استعمال سے گریز کریں۔

تجارتی مرکبات

ANTIPAR WITH LAXATIVE (WELLCOME)

انٹی پار سرپ

750mg/ 5ml 30ml Rs. 7.30 115ml: Rs.18.48

ANTIPAR WITH LAXATIVE

(WELLCOME)

انٹی پارسلوف

10g granuls 1 Rs 3 08 *

HELMACID WITH SENNA

(GLAXO)

ہیل ماسٹ

10g: 10g Rs 2.16

PYRANTAL PAMOAT

پائی رن ٹل پامیٹ

افعال و منافع: راؤنڈورم، تھریڈورم اور ہک دورم کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے دن میں ایسا تین دن تک۔

۲ سال سے کم عمر والوں کو ۱۰۰ ملی گرام ایک بار ۳ دن تک ۸ سے ۱۲ سال کی عمر میں ۶۰۰ ملی گرام دن میں ۱ بار ۳ دن تک۔

متنی افعال: حالت حمل میں نہ دی جائے۔

مضرات: معدہ کی خرابی نظام عصبی میں خلل، جلد پر دلخ پڑنا۔

احتیاط: جگر کے مریضوں کو احتیاط لازم ہے۔

تجارتی مرکبات

COMBANTRIN

(PFIZER)

کم بان ٹرین

200mg tabs 2, Rs. 4.13, susp. pyrantel (as pamoate) 250mg per ml
susp. 8ml Rs. 11.79

EXPENT

(TATA PHARMA)

ایکس پینٹ

PYRMOATE TABS

(FRANCO INDIAN)

پائی رومیٹ

250mg tabs 3, Rs. 8 20, susp: 10ml. Rs. 11.60

PYRVINUYM PAMOATE

پائی ری وی نیم پامیٹ

افعال و منافع: پین دورم، تھریڈورم، راؤنڈورم کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲.۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ایک خوراک دو دن تک زیادہ سے

زیادہ ۱۲.۵ ملی گرام ضرورت پڑنے پر ۳ ہفتہ بعد دوبارہ دیں۔

متنی افعال: جگر اور گردوں کے مریضوں میں مضرت ہے۔

SANTONIN CALOMEL

سینٹونین کیلومل

افعال و منافع: تھریڈورم، راؤنڈورم کی مفید ترین دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۸ سال تک کے بچوں کو ۳۰ ملی گرام ۸ سے زائد عمر والوں کو ۳۰ سے ۶۰ ملی گرام ہانوں کو ۶۰ سے ۹۰ ملی گرام دوا شام کو کھانے کے ۲ گھنٹہ بعد دینا چاہیے۔ اور صبح کو دستوں کی دوا دینا چاہیے۔

مضرات: اپنی اچھلنا چکر آنا، درد سر، جلی، تے، اسہال آسکتے ہیں۔

احتیاط: اس دوا کے بعد کیسٹر آئل کا مسہل نہیں دینا چاہیے زیادہ مقدار میں مرگی جیسے دورے پڑ سکتے ہیں۔

TETRAMISOLE HCL

ٹٹرامیسول ہائڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: کینچوؤں، راؤنڈورم اور ہک دورم کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: راؤنڈورم کے لئے ۲.۵ سے ۵ ملی گرام / فی کلو وزن کے حساب سے ایک خوراک ہک دورم کے لئے بھی اسی حساب سے دی جائے ۲ گھنٹہ بعد دوسری خوراک دی جائے اس کے ساتھ صفائی کے لئے قیناف تھالین بھی دی جاتی ہے۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضرات: متلی تے، بھوک کی کمی، درد شکم، درد سر چکر آنا، جلد پر داغ پڑنا۔

احتیاط: اس کو کاربن ٹٹراکلورائیڈ، آئل آف چینو پوڈیم، کلوروفارم اور ایٹھر کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

JETOMISOL-P

(ETHNOR)

جٹومی سول

Tetramisole 150mg. phenolphthalein 60mg: tabs: 1. Rs 4.37

NILCARIS-A

(BDH)

نیل کارس اے

Tetramisole (as hcl) 150mg: tabs: 2. Rs 8.90

NILCARIS-P

(BDH) 50mg tabs: 2. Rs. 7.10

نیل کارس پی

دافع فنگس ادویہ ANTIFUGAL AGENT

AMPHOTERICIN B.

ایمفوٹرایی سین بی

افعال و منافع: یہ ایک زبردست دافع فنگس دوا ہے جو ہر طرح کے فنگس انفکشن میں مفید ہے۔
مضر اثرات: مقامی طور سے جلن کھلی اور جلد پر داغ پڑ سکتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

FUNGIZONE I.V

(SARABHAI)

فنگی زون وریڈی انفکشن

inj; 50mg vial Rs.200.00

CLOTRIMAZOL

کلوٹری مازول

افعال و منافع: ہر طرح کے فنگس انفکشن جلد، ناخن کے انفکشن کنڈیڈا انفکشن، کنڈیڈا مہلی انفکشن
خفہ کادرم اور انفکشن ٹرائی کو مونا س مہلی انفکشن، لیکوریا جراثیمی میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: لیکوریا میں ۱۰۰ ملی گرام کی ٹکیہ سوتے وقت مہل کے خوب اندر رکھوائیں ۶ دن تک

یا ۲ ملیاں ۳ دن تک رکھوائیں، کریم متاثرہ مقامات پر لگائیں۔

مضر اثرات: مقامی طور سے معمولی جلن اور داغ پڑ سکتے ہیں۔

احتیاط: علاج مکمل شفا یابی تک جاری رکھیں۔

تجارتی مرکبات

CANDID-V GEL (GLENMARK)

کنڈیڈی جیل

30g with applicator Rs.25.52

CANESTEN VAGINAL (BAYER) 6 Rs.24.95 کے نس ٹین و جیٹل

IMIDIL VAGINAL TABS (LYKA) امی ڈل

100mg. 6. Rs.14.16 200mg 3: Rs.9.46 500mg: 1: Rs.7.10

SURFAZ VAGINAL TABS (FRANCO) 6 Rs 15.43

TRIBEN VAGINAL TABS (JENBURKT)

vaginal tabs 100mg. 3: Rs.12.50; 500mg: 1: Rs.7.50

سرفاز و جیٹل
ٹرائی بن و جیٹل

ECANOZOL

ایکونازول

افعال و ترکیب: مہل کے کنڈیڈا انفکشن میں ایگزیمیا جلد کا ورم الرجی میں مفید موثر ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱۵۰ ملی گرام سوتے وقت مہل کے جوف میں اندر رکھوائیں کریم متاثرات؛
گائیں ۳ دن تک۔

احتیاط: ٹی بی اور وائرل انفکشن میں آنکھ کان میں، حاملہ اور بچوں کو احتیاط برتن۔

تجارتی مرکبات

COBEDERM.H (SARABHAI)

Halcinonide 1mg econazole nit 10mg. cream 10g Rs 17 90

کو بی ڈرم

ECANOL (SARABHAI)

Econazole nit 1% cream 10g Rs 15 42. 20g, Rs. 19.58

ایکانول

ECODAX-G (JNIQUE)

Beclomethasone diprop 0 025%, econazole nitrate 1%, gentamicin (as sulph) 0 1%, all w/w, Cream 10g, Rs. 15 91

ایکو ڈیکس

ECANOL VAGINAL (SARABHAI)

Econazole nit 150mg. tabs 3 Rs 55 18

ایکانول ویناٹل

FLUCONAZOL

فلو کونازول

افعال و منافع: جلد زیر جلد، مہلی کنڈیڈا انفکشن لیکوریا میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام پہلے دن پھر ۱۰۰ ملی گرام دن میں ابار کھلائیں مہلی انفکشن میں ۱۵۰
ملی گرام دن میں ابار صرف۔

مضی اثرات: دوا سے حساس مریضوں میں حمل اور لیام رضاعت میں نہ کھلائیں۔

مضر اثرات: متلی، تھکے ہوئے سر، جسم پر دلف پڑنا، درد حکم، نفخ حکم اسہال آنا، جگر کے فعل کو تحریک
دیو پختہ، ری ایکشن ہوتا۔

احتیاط: مردوں اور جگر کے فعل کی جانچ کراتے رہیں۔

دواؤں کا رد عمل: فین پیٹن، سائیکلو سپورین، وارفارین، دوسری مائع انجماد خون ادویہ اور ریٹام پی
مین کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں۔

تجارتی مرکبات

ALFLUCOZ	(ALEMBIC) 150mg: caps: 4: Rs.120.00	فلوکوز
CANCRIPT	(BDH)	کین کریپٹ
	caps: 50mg 4: Rs.42.75, 100mg: 4: Rs.82.00, 150mg: 4: Rs.120.00,	
FLUZIDE	(CONCEPT)	فلوزائیڈ
	caps: 50mg: 4: Rs.46.00: 100mg: 4: Rs.88.00 : 150mg: 1: Rs.32.00	
FLUZON	(CADILA)	فلوزون
	100mg: 4: Rs.92.00, 150mg: 2: Rs.66.00	
FLUZON INFUSION	(CADILA)	فلوزون انفیوژن
	200mg per ml inj: 100ml: Rs.80.00	
FORCAN	(CIPLA)	فورکان
	caps; 50mg. 4: Rs 44.00: 150mg: 1caps Rs.31.75; 200mg: 4: Rs.164	
FORCAN INFUSION	(CIPLA)	فورکان انفیوژن
	infusion: 100ml: Rs.75.00	
MYCOREST	(RECON)	مائی کوریسٹ
	caps: 50mg: 5x4. Rs.194.25, 150mg: 1: Rs.28.40	
SYSCAN	(TORRENT)	سیسکان
	caps; 50mg: 4: Rs. 40.90; 100mg: 4 caps Rs.87.60; 150mg. 1:	
	Rs.29.90; 200mg: 4: Rs.163.60	
SYSCAN INFUSION	(TORRENT) 100ml Rs.70.90	سیسکان انفیوژن
ZOCON	(FDC)	زوکون
	tabs, 50mg: 4: Rs. 44.45; 150mg: 1tab Rs.31.75; 200mg: 4: Rs.161.80	
ZOCON INFUSION	(FDC) 100mg Rs.58.35	زوکون

HAMYCIN

ہے مائی سین

افعال و منافع: منہ کے زخم سفید چھالے Thrush جو کہ کنڈیڈا انفکشن کے سبب ہوں ورم مہل، جلد، ہالوں اور ناستوں کے فنگل انفکشن میں مفید ہے۔

مقدار و خوراک: ۲ لاکھ یونٹ کالوشن متاثرہ مقام پر لگائیں دوا کو منہ میں کافی دیر روکے رکھیں، ویبائٹل مہلیٹ ۳ لاکھ یونٹ اسے ۲ نکیہ ویبائٹا میں خوب اندر کو رکھوائیں، مرہم متاثرہ مقام پر دن میں ۲ بار لگائیں۔

منفی اثرات: حالت حمل میں۔

مضر اثرات: کبھی کبھی جلن اور گرمی کا احساس۔

تجارتی مرکبات

HAMYCIN

(HAL)

ہے مائی سین لوشن

Hamycin 200,000u per ml susp. 10ml Rs. 14.86

HAMYCIN OVULES

(HAL)

ہے مائی سین گولی

Hamycin 400,000u, 6 Rs. 15.76

KETOCONAZOLE

کیٹوکانازول

افعال و منافع: جلد کے بالائی حصہ میں ہونے والا ایسٹ yeast انفکشن منہ اور ویبائٹا میں ہونے والا کنڈیڈا انفکشن وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۵ دن تک

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو حمل اور لیام رضاعت میں ۲ سال سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ہضم کی خرابیاں، جلد پر الرجی کے اثرات، درد سر، تھرا سین کی کمی مردوں میں چھاتیوں کا بڑا ہو جانا اور ورم جگر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر کی خرابی میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: مانع افزا جگر ادویہ، دافع تیزابیت، مانع انجماد خون فین ٹائن، ری قام پی سکس اور مائیکو سپورین کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

FUNAZOLE	(KHANDELWAL)	فونازول
200mg tabs 10: Rs.57.90		
FUNGICIDE (TORRENT)	200mg tabs 10: Rs.123.00	فنگی سائیڈ
KETOZOLE TABS (GUFIC)	200mg tabs 10: Rs.110.00	کیٹا کونازول
NIZRAL	(ETHNOR) 200mg tabs 10: Rs.139.50	نیزرال

MICONAZOL

مائی کونازول

افعال و منافع: منہ اور آنٹوں کے کنڈیڈا انفکشن، واو Ring worm مہلی انفکشن Viginal Candi Diasis اور فنگس انفکشن میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ویجیٹل انفکشن میں ۲۰۰ ملی گرام کی مکئیہ ویجیٹا میں رکھوائیں کریم متاثرہ مقام پر دن میں ۲ بار ۷ سے ۱۰ دن تک استعمال کرائیں۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: کھجلی جلن، جلد پر داغ، پتی (شرئی) جلد پر خراش ہو سکتی ہے۔

تجارتی مرکبات

GYNODAKTARIN	(ETHNOR) gel 20g	Rs.27.10	گائوڈاکترین کریم
GYNODAKTARIN OVULE	(ETHNOR)		گائوڈاکترین ویجیٹل مکئیہ
200mg ovule 3:		Rs.17.04	

ITRACONAZOLE

آئی ٹراکونازول

افعال و منافع: یہ ایک زبردست دافع فنگس دوا ہے۔ ہر قسم کے کنڈیڈا انفکشن میں مفید ہے۔

دواؤں کے ساتھ مضر اثرات: مائیکو سپورین، ٹریفینڈین، ایس ٹی می زول، ڈیجاکسن، سلفونائی یوریا، واو فین، ریٹام پی سین، آئی این ایچ. N.H. اور فین ٹائن کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

ITASPOR
SPORANOX

(INTAS)
(ETHNOR)

ای ٹاسپور
اسپورائکس

NYSTATIN

نائی سٹاٹن

افعال و منافع: کنڈی اور موئی لیاں انفکشن میں مفید ہے۔ خصوصاً آنٹوں کے موئی لیاں انفکشن کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ لاکھ یونٹ دن میں ۳ بار مقدار ۱۰ لاکھ تک دی جاسکتی ہے۔
مضر اثرات: زیادہ مقدار میں ہاضمہ کی خرابی دست (اسہال) آسکتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

MYCOSTATIN

(SARABHAI)

مال کو سٹاٹن

Nystain 500,000u, tabs 10: Rss49.18

دافع جذام ادویہ (انٹی لپروسی)

ANTILEPROSY DRUGS

CLOFAZIMINE

کلوفازیمین

افعال و منافع: یہ جذام (کوڑھ) کی مفید دوا ہے وہ مریض جن پر ڈپ سون بے اثر ہوا، لپروسی ایکشن ہو ایسی حالت میں یہ ایک بہترین دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: جذام کے لئے ۵۰ ملی گرام روزانہ یا ۱۰۰ ملی گرام ایک دن کا ناغہ کر کے دی جائے، لپروسی ایکشن میں ۲۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام روزانہ ۳ ماہ سے زیادہ نہ دی جائے۔
منفی اثرات: حمل کے پہلے ۳ ماہ میں مضر ہے۔

مضر اثرات: جلد ہال بلغم کی رنگت میں تبدیلی جلد خشک کھلی، ہاضمہ کی خرابی۔

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں درد شکم، اسہال، ایام رضاعت میں۔

تجارتی مرکبات

CLOFODAP (ASTRA IDL) tabs 100: Rs.94.13

CLOFOZINE (ASTRA IDL)

caps 50mg 100. Rs 109 11 100mg: 100. Rs 197.19

HANSEPRAN (S G PIMCLS)

caps 50mg 10 Rs 8 13, 100mg. 10: Rs. 21.12

LEPROMINE CAPS (P&B LABS)

caps 50mg 10, Rs.9 52; 100mg: 10, 18.10

کلو فوڈاپ
کلو فوزائن

ہنسران

لپرومین

CLOFAZINE

کلو فازین

افعال و منافع: جذام ملٹی بے سٹری پیری، پیراری ایکشن اور برص سفید داغ میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: جذام، پیری کے لئے ۵۰ ملی گرام روزانہ اخوراک یا ۱۰۰ ملی گرام ایک دن کے
وقفے سے ۳۰۰ ملی گرام مہینہ میں اپار، دو اکھانے کے بعد لینا چاہیے۔ علاج ۶ ماہ جاری رکھیں، پیراری
ایکشن میں ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۳ ماہ تک برص کے لئے ۱۰۰ ملی گرام روزانہ یا ہفتہ میں ۳ بار، سورج
کی تیز شعاعیں داغوں کو مٹانے میں۔

منفی افعال: C/1 حل کے پہلے ۳ ماہ میں جگر اور گردوں کے امراض میں۔

مضر اثرات: پیشاب کی رگت میں تبدیلی، جلد کی رگت بدلتا، معمولی اسہال پیٹ کی خرابی، درد سر
ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر اور گردوں کے مریضوں میں احتیاط برتیں۔

DAPSONE

ڈپ سون

فعال و منافع: ہر طرح کے جذام کی مانی ہوئی دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ابتدا میں ۲۵ ملی گرام ہفتہ میں ۲ بار ہر ماہ ۲۵ ملی گرام کا اضافہ کرتے رہیں۔ ۲۰۰ سے
۳۰۰ ملی گرام ہفتہ میں ۲ بار یا ۱۰۰ ملی گرام روزانہ دیتے رہیں۔

مضر اثرات: انیسیا، لیراری ایکشن۔

احتیاط: مقدار خوراک میں احتیاط برتیں۔

ANTI MALARIAL

دافع ملیریا ادویہ

AMODIA QUIN HCL

لاڈو کوئن ہائڈرو کلورائیڈ

افعال و منافع: شدید ملیریا میں مفید و مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ۵ سال سے کم عمر بچوں کو ۱۵۰ ملی گرام کی

ایک خوراک ۵ سے ۱۰ سال کو ۱۵۰ سے ۳۵۰ ملی گرام کی ایک خوراک۔

متقی افعال: دوسری دواؤں کے ساتھ اس کا استعمال ممنوع ہے۔

مضر اثرات: ورم جگر، خون میں سفید ذرات کی کمی، متلی اسہال، کمزوری آنکھ کے طبقہ قریہ میں

دھندلا پن، بصرات میں فرق، جلد اور ناخن کی رنگت میں تبدیلی۔

احتیاط: خون و جگر اور آنکھوں کا ٹسٹ کراتے رہیں۔

تجارتی مرکبات

BASOQUIN SUSP

(PARKE-DAVIS)

باسو کوئن

150mg per 5ml susp 30ml. Rs 3.26

CAMOQUIN (PARKE-DAVIS) 2g tabs 10. Rs 3 41

کاما کوئن

CHLOROQUIN PHOSPHATE کلورو کوئن فاسفیٹ

افعال و منافع: ہر قسم کی ملیریا کی مشہور زمانہ دوا ہے۔ اسمیک ورم جگر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ملیریا سے بچاؤ حفظ و تقدم کے لئے ۳۰۰ ملی گرام ہفتہ میں ابار ۴ ہفتہ تک۔

علاج کے لئے پہلی خوراک ۶۰۰ ملی گرام ۶ گھنٹہ بعد ۳۰۰ ملی گرام روزانہ ۳ دن، امیبائی ورم جگر میں

۳۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار دو دن پھر ۱۵۰ ملی گرام دن میں ابار ۲-۳ ہفتہ۔

متقی افعال: ۵ سال سے کم عمر بچوں کو انجکشن نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: درد سر، غور ہضم، جلد کی رنگت میں تبدیلی و داغ پڑنا، بصارت میں فرق، قریہ میں دھندلا پن، ریختہ میں خرابی، خون کا غیر طبعی ہونا، الرجی، قلبی صدمہ، Shock
احتیاط: زیادہ دن استعمال کرانے پر آنکھ کی جانچ کرائیں انیسیا میں، گردوں اور جگر کی خرابی میں، حمل
ایام رضاعت میں، سرخبادہ Soriasis فساد خون G6PD کی کمی میں احتیاط لازم ہے۔

تجارتی مرکبات

CENOL QUINE SYRUP (CARMINOL)	سی نول کوئن سرپ
60ml Rs.9.90	
CHLOROMET 500 (BDH) 500mg tabs.10: Rs.15.50	کلورومیٹ
CHLOROMET SYRUP (BDH) 60ml: Rs.10.10	کلورومیٹ سرپ
CLO-KIT (INDOCO) 1. kit:Rs.9.45	کلوکٹ
CLOQUIN (INDOCO) 250mg tabs 10, Rs.9.31	کلو کوئن
EMQUIN (MERCK) 150mg tabs 12, Rs 8.10	ایم کوئن
EMQUIN DS TABS (MERCK) 500mg tabs 5, Rs 8.36	ایم کوئن ڈی ایس
LARIAGO TABS/SUSP/INJ (IPCA)	لاریاگو ٹبلٹ۔ سرپ۔ انجکشن
10 Rs 9.31. susp: chloroquine phos 60ml: Rs.10.17, inj: 5ml: Rs 2.68,	
IOQUIN	آئی او کوئن
LA-QUIN (STADMED)	لا کوئن
100mg per 10ml 60ml.Rs.11.86, inj chloroquine 30ml Rs.14.58	
MELUBRIN (RANBAXY) 250mg tabs 10, Rs.5.78	میلوبرن
NIVAQUINE-P (RHONE POULENC)	نوا کوئن پی
150mg tabs 10, Rs.9.31	
NIVAQUINE-P INJ (RHONE POULENC)	نوا کوئن پی انجکشن
2ml: 10amps Rs.24.14: 5ml : 10amps Rs 35.20	
NIVAQUINE-P FLAV SUSP (RHONE POULENC)	نوا کوئن سرپ
60ml Rs.10.93	
PREMOQUIN INJ (PREM PHARMA)	پری ما کوئن
30ml vial . Rs. 11.00	
QUINROS TABS/DS TABS (TATA PHARMA)	کوئن روس
RESOCHIN (BAYER) 10 Rs. 9.31	ری سوچن ٹبلٹ

MEPACRINE

میپا کرین

افعال و منافع: ملیریا اور مکیارڈیا انفکشن میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ملیریا سے حفاظت کے لئے ۶۰۰ ملی گرام فی ہفتہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے، علاج کے لئے ۹۰۰ ملی گرام پہلے دن دوسرے دن ۶۰۰ ملی گرام تیسرے دن ۳۰۰ ملی گرام ۳ دن تک کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی افعال: پرانی ماکوئن کے ساتھ اور حمل کی حالت میں مضر ہے۔

مضر اثرات: سردرد، چکر، تے خون میں بگاڑ پتی اچھلتا، جلد متورم جلد پرداغ پڑتا۔

احتیاط: زیادہ مقدار میں دینے سے دماغ و اعصاب متاثر ہوتے ہیں۔

تجارتی مرکب

MALADIN

(UNIQUE)

میلاڈین

Mepacrine hcl 100mg and 300mg tabs: 100mg: 10 Rs.21.45. 300mg Rs 62.70

PRIMAQUINE

پرانی ماکوئن فاسفیٹ

افعال و منافع: ملیریا خصوصاً P.vivox کے لئے مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: مکمل علاج کے لئے ۵ دن دوا کھلانا چاہیے۔ ۱ سے ۳ سال تک ۲ سے ۵ ملی گرام ۳ سے ۸ سال پہلے ۸ سے ۱۳ ۱۰ ملی گرام ۱۳ سے زائد ۱۵ ملی گرام کلور کوئن کی پوری مقدار کے ساتھ دی جائے۔ ۵ دن دوا کھلانا چاہیے۔

منفی افعال: ہڈی کے گودے (خ العظام) کی خرابی میں ایک سال سے کم عمر بچوں کو G6PD کی کمی اور حالت حمل میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: درد شکم، نم معدہ پر بے چینی، خون کی کمی جسم نیلا ہونا خون میں سفید ذرات W.B.C. کی شدید کمی، ہائی بلڈ پریشر حرکات قلب کا بے ترتیب ہونا۔

احتیاط: کمزور اور نحیف مریضوں خون کے سفید ذرات کی کمی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

PMQ INGA

(INGA) 7 5mg tabs, 10 tabs Rs 7 98 لی۔ ایم کے

PROGUANIL

پروگوانیل

افعال و منافع: طیریا سے حفاظت اور علاج کے لئے موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۳ سال سے زائد عمر والوں کو ۲۰۰ ملی گرام روزانہ ایک سال سے کم عمر کے بچوں کو ۵۰ ملی گرام ۵ سے ۸ سال کے بچوں کو ۱۰۰ ملی گرام ۹ سے ۱۳ سال والوں کو ۱۵۰ ملی گرام علاج ۶ ہفتہ جاری رکھیں۔

مضر اثرات: معدہ میں خرابی منہ میں زخم قلاع، جلد پر ری ایکشن، ہالوں کا گرنا۔
احتیاط: حمل اور لیام رضاعت، گردوں کے نفل ہونے میں احتیاط رکھیں۔

تجارتی مرکبات

LAVERAN

(UNIQUE)

لے وی رہن

PYRIMETHAMINE

پائی ری میتھامین

افعال و منافع: طیریا کے علاج اور حفظا مقدم کے لئے اور ٹوکسو پلازموسس کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: طیریا سے حفاظت کے لئے ۱۰ سال سے زائد عمر والوں کو ۲۵ ملی گرام ہفتہ میں اہد اس سے کم عمر میں ۶.۲۵ ملی گرام ہفتہ میں اہد علاج کے لئے ۲۵ ملی گرام یہ دوا سلفا ڈیازین کے ساتھ دی جاتی ہے۔

متنلی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: نیند میں کمی، لیو کو سامیٹ ٹخون و قہر امین کی کمی متلی، درد شکم تے، اسہال، درد سر، چکر آنا منہ میں خشکی بخار بے چینی، جلد متورم اور رنگت میں تبدیلی۔
احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

DARAPRIM	(BURROUGHS WELLCOME)	ڈی اے ایم
25mg tabs 50x4: Rs.20.00		
LARIDOX	(IPCA) 25mg tabs: 2: Rs.3.84	لاری ڈوکس
PYRALFIN	(LUPIN)	پائی رال فین ملیٹ
Pyrimethamine 25mg Sulfadoxime 500mg tabs: 2: Rs.3.91		
PYRALFIN SUSP	(LUPIN)	پائی رال فین سرپ
Pyrimethamine 12.5mg tabs Sulfadoxime 250mg per 5ml susp 10ml		
Rs.6.74		

QUININE SULPHATE

کوئین سلفیٹ

افعال و منافع: طیریا حاد و مزمن کی اکسیر صفت دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۰۰ سے ۶۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار زیادہ سے زیادہ ۲ گرام دے سکتے ہیں۔

متقی اثرات: حمل پیام رضاعت، ساعت کی کمزوری، آنکھ میں درد کمزوری میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: انیسیا، درد سر، بصدت میں فرق، قے متلی اسہال درد شکم چکر آنا۔

دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، پرائی می تھامین، ڈی جاکسن، مرخی عضلات Relaxant کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

QUIN INGA	(INGA) 300mg 10 tabs Rs.42.00	کوئن انکا ملیٹ
QUIN INGA INJ	(INGA)	کوئن انکا انجکشن
300mg per ml inj 2ml Rs.11.50		

SULPHADOXIN

سلفا ڈاکسن

افعال و منافع: طیریا کے وہ مریض جن پر کلورو کوئن اثر نہ کرے یہ مفید رہتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ہفتوں کو ۵۰۰ ملی گرام ۹ سے ۱۳ سال کی عمر میں ۳۷۵ ملی گرام ۳ سے ۸

سال میں ۲۵۰ ملی گرام ۴ سال سے کم عمر میں ۱۲۵ ملی گرام کی صرف اخوراک دی جائے۔
منفی اثرات: سلفونامائیڈ سے حساس مریضوں کو حمل اور ایام رضاعت میں خراب اثر و نما ہو سکتے ہیں۔
احتیاط: G6PD نوک ایسڈ کی کمی میں احتیاط رکھیں۔

تجارتی مرکبات

CROYDOXIN FM	(BIDDLESAWYER) tabs 2: Rs.3.91	کراپوڈاکسین
LARIDOX	(IPCA) tabs: 2: Rs.3.84	لاریڈاکس
MALOCIDE	(TORRENT) tabs 2, Rs.3.85	میلوسڈ
ONIL-2	(KOPRAN) tabs 50x2, Rs.215.50	اونیلی ۲
RIMODAR	(AFD) tabs 2: Rs.3.83	ری موڈار
SULFAMINE	(LA PHARMA) 25mg tabs 2, Rs.4.50	سلفامین

SULPHAMETHOXY PYRAZINE

سلفامیتھاکسی پائی رازین

افعال و منافع: پیرا سے بچاؤ اور علاج کے لئے مفید دوا ہے۔
مقدار و ترکیب: علاج کے لئے بالغوں کو ۴ گرام بچوں کو ۲۵ ملی گرام / فی کلو گرام کے حساب سے
صرف اخوراک حفظ ماتقدم کے لئے ۴ گرام ہفتہ میں بار بچوں کو عمر کے مطابق۔
منفی اثرات: سلفونامائیڈ سے حساس، جگر و گردوں کے مریضوں کو خون کی خرابی نو مولود حاملہ اور
مرضہ کو دینا منع ہے۔

احتیاط: دوران علاج خون کی جانچ کرتے رہیں۔
مضر اثرات: جلد پرداغ، ورم خجڑہ، کھجلی، ہاضمہ کی خرابیاں، فساد خون ہو سکتا ہے۔



malaria

میشاکلفن

metakelfin

single dose therapy

Especially in the treatment of
of the acute form of the disease

Proven Broad Spectrum Action - Combination with

100% Efficacy

100% Safety

100% Tolerability

100% Reliability

ANTIPROTOZOA

انٹی پروٹوزوا

(اجسام طفیلہ کو روکنے والی ادویہ)

DEHYDROEMETINE

ڈی ہائیڈرو ایمین

افعال و منافع: ای می ہاء اور اسکائی سٹومائی سے پیدا ہونے والے امراض میں مفید ہے ایمبائی ہچس، ایمبائی ورم جگر، دبیلہ جگر، میں مفید کام کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۶ سے ۱۰ دن تک ضرورت پر ۱۵ دن تک استعمال کرائیں معمولی حالت میں ۱۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

منفی افعال: شدید عضوی بیماریوں میں اور حمل میں منع ہے۔

احتیاط: ای می ٹین استعمال کرنے والوں کو ۵ دن سے پہلے نہ دی جائے۔

ڈائی آیوڈو ہائیڈرو کسائی کیو نولین

DI IODOHYDROXY QUINOLINE

افعال و منافع: ایمبائی ہچس، گیارڈا ٹفکشن، ای بک کولائی۔ انفکشن ایمبائی تونج کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار یومیہ ۲۰ دن تک بچوں کو ۳۰ سے ۴۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے ۲۰ دن تک دی جائے۔

منفی افعال: شدید عضویاتی خرابیاں، جگر کی خرابی حمل کے ابتدائی ۳ ماہ ایام رضاعت آنکھوں میں تکلیف کی حالت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ہانسنے کی خرابیاں، لیو کو سامیٹ کی کمی، پتی (شرٹی) بدن پر چھالے پڑنا، نظام عصبی میں غلط، پیشاب سیاہ آنا، مرگی جیسے دور بے پڑنا، آنکھوں میں درد ہونا۔

احتیاط: حمل، عصبی کمزوری، عصب ہا صرہ میں خرابی، تھائرایڈ کی خرابی میں اور مانع بلڈ پریشر دواؤں

کے ساتھ احتیاط رہیں۔

DILOXANIDE FURATE

ڈلوکسانائیڈ فیوریت

افعال و منافع: ایسی ٹمن سے زیادہ موثر دفاع امیبا دوا ہے لیکن دوسری دواؤں مثلاً مینٹری ٹائیڈزول کے ہر کمزور یا موثر ہوتی ہے۔ امیبائی ہیچس، درد شکم کے لئے مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ہانٹوں کو ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار یومیہ ۱۰ یون تک، بچوں کو ۲۵۰ ملی گرام / فی کو گرام وزن کے حساب سے دن میں ۳ بار، کئی خوراکوں میں تقسیم کر کے دینا چاہیے۔
مضر اثرات: نفع شکم خلل، ہضم۔

تجارتی مرکب

FURAMIDE

(KNOLL)


فیورائیڈ

Diloxanide furoate 500mg; tabs. 10 Rs.6.49

FURAZOLIDINE

فیورازولیڈین

افعال و منافع: یہ ایک وسیع الاثر دفاع بکریا دوا ہے جو آنتوں کے بیشتر طفیلی اجسام کو دفع کرتی ہے۔ جراثیمی ہیچس اور اسہال کے لئے مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۴ سے ۸ دن تک بچوں کو ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۴ سے ۸ دن تک۔
مضر اثرات: ہانٹے کی خرابیاں، پیشاب کی رنگت سیاہ
احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں، خون کے سفید ذرات W.B.C کی کمی میں میٹری ٹائیڈزول کے ساتھ دینا زیادہ بہتر ہے۔



آئی ڈو کلور ہائیڈروکسائی کیو نولین

iodo chloro hydroxy quinoline

افعال و منافع: ایبائی پیچش مزمن یا حاد دونوں حالتوں میں مفید ہے۔ آنتوں میں ورم اسہال گرمائی بچوں کے دست لگانے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار کھانے کے بعد ۱۰ دن تک ایک ہفتہ بعد ضرورت ہو تو دوبارہ یہی کورس کلائیں۔

منفی اثرات: عظم غدہ درقیہ، آلو ڈین سے الرجی، جگر اور گردوں کی کمزوری میں نہیں دینا چاہیے۔
احتیاط: طویل علاج سے، عصب ہاصرہ کی خرابی میں احتیاط برتیں۔

METRNIDAZOLE

میٹری نائی ڈازول

افعال و منافع: ایبائی پیچش Amoebic Dysentery آنتوں کے ایبائی امراض، جگر کا ایبائی زڈ اور گیار ڈا انفکشن میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱ سے ۳ سال کے بچوں ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار یومیہ ۴ سے ۷ سال کے بچوں کو ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۴ بار ۸ سے ۱۰ سال میں ۴۰۰ ملی گرام ۱۰ سال سے اوپر ۸۰۰ ملی گرام دن میں ۴ بار ۵ دن تک گیار ڈا انفکشن میں یہ علاج ۳ دن جاری رکھا جائے۔

منفی اثرات: خون کی غیر طبعی حالت میں صبی امراض میں حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں اور ایام رضاعت میں مضر ہے۔

مضر اثرات: ہاضمے کی خرابیاں، زبان میلی، ذائقہ خراب لیو کو سامیٹ کی کمی پتی اچھلنا (شرٹی) جلد پر سرخ دانے نظام صبی میں خلل، پیشاب گدلا، زیادہ دن استعمال سے مرگی کی طرح کے دورے پڑ سکتے ہیں۔
احتیاط: دافع بلڈ پریشر ادویہ کے ساتھ اس کی مقدار کم دیں حالت حمل میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: شراب خوردنی مانع انجماد خون ادویہ، فینوباربیٹون، سیٹی ڈین، فین ٹائن ڈائی

سلفی روم کے ساتھ دینا نقصان دہ ہے۔
(تجارتی مرکبات کے لئے نظام ہضم کی ادویہ کے تحت میسٹری ناڈازول دیکھئے)

QUINIDOCHELOR

کوئینوڈوکلور

افعال و منافع: یہ امیبا پروٹوزوا اور اس کے سسٹ کو دور کرتی آنتوں کی خراش بار بار اور درد کے ساتھ اجابت آنے، حاد و مزمن امیبائی پیچش ورم قولوں بچوں کے اسہال، پروٹوزوا، بیکٹریا اور فنگس سے پیدا ہونے والے اسہال میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے کے بعد ۱۰ دن تک ۱۰ دن کے وقفہ سے دوبارہ یہی کورس دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: آیوڈین سے حساس مریضوں کو جگر خراب ہونے بصارت کی خرابی غده درقہ کے افزائ کی زیادتی میں اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: عصب باصرہ میں درد، بصارت میں فرق، معدہ میں خراش ہو سکتی ہے۔

احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکب

ENTERO QUINOL

(EAST INDIA)

انٹرو کینال

quinodochlor, 250mg: tabs 20, Rs.8.50

SECNIDAZOL

سیکنیڈازول

افعال و منافع: امیبا، گیارڈا، و۔ ٹرائی کو موناس سے پیدا ہونے والے امراض اور جراثیمی و بیکٹریا انفکشن میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: آنکھوں کے امیبائی، گیارڈا، ٹرائی کو موناس اور جراثیمی۔ انفکشن میں صرف ۲ گرام کی ایک خوراک دینی جائے، جگر کے امیبائی ورم اور پھوڑے میں ۵۰۰ گرام دن میں ۱ بار ۵ دن تک دی جائے

امیبائی دہیلے الکھد Liver Absces میں ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۵ دن تک یا ۲ گرام روزانہ ۲ سے ۳ دن تک۔

منفی افعال: خون کی غیر طبعی حالت میں نظام عصبی کی خرابیوں میں شاذ اذول سے حساس مریضوں میں استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

مضر اثرات: ذائقہ اور ہاضمہ میں خلل، متلی، بھوک کی کمی، تھکنا، کمزوری لیو کو سائیٹ کی کمی، پی اچھلنا، کھجلی، چہرے پر سرخی۔

احتیاط: علاج سے قبل اور بعد خون کی جانچ کرائیں، عصبی الجھن بے چینی پریشانی ہو تو دوا بند کر دی۔ شرابی، حاملہ اور مرضہ کو استعمال نہ کرائیں۔

دواؤں کا رد عمل: دارقارین، ڈائی سلفی ریم کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

AMID (ELDER) 500mg tabs 4. Rs 48 00

SAGENTYL-DS (SYSTOPIC)

1000mg tabs: 2. Rs.31 80

SECNIL (RHONE-POULENC)

500mg tabs: 4. tabs Rs.35.00

SECNIL FORTE (RHONE-POULENC)

1g tabs: 2tabs Rs.35 00

SECZOL (INTAS)

500mg tabs; 4 tabs Rs.32 00

SECZOL DS (INTAS) 1gm : tabs. 2: Rs.27 80

TAGERA (UNICHEM)

500mg 4 Rs 31 00 1g 2 Rs.31 00

اسے
سے کیٹل ڈی ایس

سیکل

سیکل فورٹ

سیکل زول

سیکل زول ڈی ایس
ٹیرا

دافع ٹی بی ادویہ

ANTI TUBERCULAR DRUGS

CYCLOSERINE

سائیکلوسیرین

افعال و منافع: ٹی بی کے وہ مریض جن پر دوسری دوائیں بے اثر ہو جائیں تو یہ دوا کام کرتی ہے ٹی بی کی نمبر (۱) لائن کی دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ ملی گرام ہر ۱۲ گھنٹہ بعد ۲ ہفتہ تک شدید حالت میں ۵۰۰ ملی گرام بھی دی جاسکتی ہے۔ بچوں کو ۱۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے دی جائے۔

منفی اثرات: گردوں کی شدید خرابی میں، مرگی، ڈپریشن، بے چینی، گھبراہٹ نفسیاتی عوارض شراب کے عادی افراد میں اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: درد سر، چکر، ہاتھ پیر کا پھلنا، دورے پڑنا، نفسیاتی الجھن ڈپریشن، جلد پر داغ پڑنا، انیمیا، اور جگر کے ٹسٹ کا غیر طبعی ہونا۔

احتیاط: الرجی یا عصبی نظام کی خرابی میں دوا بند کر دیں، گردوں کی خرابی میں مقدار خوراک کم کریں، خون جگر اور گردوں کے افعال پر نگاہ رکھیں حمل اور رضاعت کے ایام میں دوا استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

CYCLOSERINE

(PANACEA)

سائیکلوسیرین

CYCLORINE

(LUPIN)

سائیکلورین

250mg : caps 6: Rs.183.72

ETHAMBUTOL

ای تھم بیوٹال

افعال و منافع: ہر قسم کی ٹی بی کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ۲۴ گھنٹہ میں ایک خوراک دینا

ہا ہے۔ اگر دوبارہ یہ علاج کرنا پڑے تو مقدار و خوراک ۲۵ ملی گرام / فی کلو گرام دیں دو ماہ بعد مقدار کم کر دیں۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو، عصب ہا صرہ کی تکلیف میں نہیں دینا چاہیے۔
مضر اثرات: بصارت کو کمزور کرتی ہے۔

احتیاط: علاج سے قبل آنکھوں کی جانچ کرایس، گردوں کی خرابی حاملہ و مرضہ کے استعمال میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

کبوٹکس

COMBUNEX (LUPIN)

800mg isoniazid 300mg tabs 10 Rs.25.27

COMBUTOL (LUPIN) 10 Rs 29.16

DEMBUTOL 200/400/800 (DEYS)

۸۰۰/۴۰۰/۲۰۰ ڈی بوٹال

200mg 800mg 6 Rs.10.18

ET-400/800 (WOCKHARDT)

ای ٹی ۴۰۰/۸۰۰

tabs 400mg 10 Rs.7.98, 800mg: 10 Rs.15.08

INABUTOL FORTE (THEMIS CHEMICALS) 10 Rs.14.79

اینا بوٹال

LYBUTOL (LYKA) 10: 800mg 10 Rs.14.26

لائی بوٹال

MYAMBUTOL (LEDERLE)

میم بوٹال

400mg 10 Rs 13 00 800mg. 10 Rs 24 00

MYCOBUTOL (CADILA)

مائی کو بوٹال

800mg. 10 Rs 19.55 1g: 10 Rs.24.01

MYCONEX-800 (CADILA)

مائی کو نکس ۸۰۰

Ethambutol 800mg isoniazid 300mg, tabs 10 Rs.19.51

MYCONEX-600 (CADILA)

مائی کو نکس ۶۰۰

Ethambutol 600mg isoniazid 300mg; tabs 10 Rs.11.67

THEMIBUTOL (THEMIS CHEMICALS)

تھیم بی بوٹال

800mg 10 Rs 25 75; 1g: 10 Rs 31.92

THEMIBUTOL PLUS (THEMIS CHEMICALS) تھیم بی بوٹال پلس

Ethambutol hcl 800mg, isoniazid 300mg; tabs. 10 Rs 27 40

ETHIONAMIDE

ای تھیونامائیڈ

افعال و منافع: پھیپھڑوں کی ٹی بی کی مفید ترین دوا ہے جب دوسری دوائیں ٹیل ہو جائیں یا خراب اثرات رونما ہوں تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ سے ۷۵۰ ملی گرام روزانہ کھانے کے بعد ۲-۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دوسری دافع ٹی بی کے ساتھ ملا کر دینا چاہیے۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو حمل اور جگر کی کمزوری میں نہیں دینا چاہیے۔
مضر اثرات: درم جگر بھوک کی کمی، متلی تے، ذائقہ خراب شدید لوبڈ پریشردماغی الجھن، خشکی، دورے، عصبی کمزوری، قوت شامہ میں خلل، بصارت میں فرق دواشیاء نظر آتا، چکر آتا، خدر، ہاتھ ہر کانپنا ضعف پاؤں، کثرت حیض چہرے پر مہاسے اور بالوں کا گرنا۔
احتیاط: دوران علاج جگر کے فعل کی جانچ کراتے رہیں۔

تجارتی مرکبات

ETHIOCID

(THEMIS CHEMICALS)

ای تھیوسڈ

Ethionamide 250mg tabs 10 Rs 124 60

MYOBID

(PANACEA)

مایوبڈ

Ethinomide 250mg tabs 10 Rs 135 00

ISONIAZID (I.N.H)

آئی سونیاژڈ

افعال و منافع: ہانگوں اور بچوں کی ٹی بی کے علاج اور اس سے حفاظت کی مانی ہوئی دوا ہے۔ دوسری دواؤں کے ساتھ زیادہ موثر رہتی ہے۔

مقدار و ترکیب: بچوں کو ۳ سے ۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ہانگوں کو ۳۰۰ ملی گرام ایک خوراک میں یا کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو جگر کی شدید بیماریوں میں مضر ہے۔

مضر اثرات: جگر میں خرابی عصب باصرہ میں خرابی، نفسیاتی الجھن خون کا غیر طبعی ہونا۔

احتیاط: شراپیوں اور گردوں کی خرابی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

COXRID	(NICHOLAS)	کاس رڈ
1 tab isoniazid 300mg 1 tab ethambutol 800mg: 1 pack: Rs.4 25		
GOCOX COMP	(IPCA)	گوکاس کمپوٹ
Isomazid 300mg, Rifampicin 450mg, Vit B6 10mg tabs, 4 tabs		
Rs.23.91		
ERBAZIDE	(MAC)	اربا زائیڈ
100mg 1000 Rs 35 50, 400mg: 10 Rs 3 90		
IPCAZIDE LIQUID	(IPCA)	ایکازائیڈ لکویڈ
Isoniazid IP 100mg, Vit B6 IP 5mg, per 5ml 100ml Rs.9.61		
IPCACIN KID TABS	(IPCA)	آپ کاسین کڈ ٹبلٹ
Isoniazid 100mg, Rifampicin 100mg, Vit B6 5mg tabs 10: Rs 14 36		
IPCAZIDE TABS	(IPCA)	آپ کازائیڈ
Isoniazid 100mg Vit B6 5mg kid tabs 10: Rs.2 51		
ISOKIN TAB	(WARNER) 100: Rs.5.92	آئی سوکن ٹبلٹ
ISOKIN-TF	(WARNER)	آئی سوکن ٹی ایف
Isoniazid 300mg thiacetazone 150mg; tabs 10 Rs 3 85		
ISONEX	(PFIZER) 300mg: 1000. Rs.444.71	آئی سوئیکس
ISORIFAM	(BIOCHEM) 10 Rs.64 00	آئی سویری قام
R-CINEX	(LUPIN)	آر سی ٹیکس
Isoniazid 300mg, Rifampicin 450mg caps: 4 Rs.22.49		
RIFADIN-INH	(TATA PHARMA)	ریفاڈین
Isoniazid 300mg, Rifampicin 450mg tabs; 4: Rs 23.73		
RIFATER	(TATA PHARMA)	ریفاٹر
Isoniazid 80mg, Rifampicin 120mg tabs, Pyrazinamide 250mg tabs, 10. Rs 23 68		
RIFINEX	(KOPRAN)	ریفائنکس
Isoniazid 300mg, Rifampicin 450mg caps; 10. Rs.65.86		
RIMACTAZID	(H.CIBAGEIGY)	ریماکٹازڈ
Isoniazid 300mg, Rifampicin 450mg tabs, 8. Rs.44 94		

RIMPINAH

(LYKA)

Rifampicin 450mg, Isoniazid 300mg caps

رہم پناہ

RINIZIDE

(LUPIN)

Isoniazid 100mg, Rifampicin 150mg, Pyrazinamide 375mg caps, 10
Rs 33 85

رہائی نائی زائیڈ

SIOZIDE

(ALBERT DAVID)

Isoniazid 100mg, vit B6 5mg per 5ml, liq 114ml Rs 9 78

سایو زائیڈ سر

TIBIRIM-INH

(STANCARE)

Isoniazid 300mg, Rifampicin 450mg tabs, 3 Rs 18 89

تیرم آئی این ایچ

TRICOX

(THEMIS CHEMICALS)

Isoniazid 100mg, Rifampicin 225mg, Pyrazinamide 500mg tabs, 10
Rs 55 34

ٹریکس

**PARA AMINO SALICYLIC
ACID (P.A.S.)**پیرا امینو سلی سیلک ایسڈ
(پاس)

افعال و منافع: جب دق (ٹی بی) کے جراثیم کو ختم کرنے اس کے اثرات کو کم کرنے کی مفید دوا
دوا ہے یہ ہمیشہ (INH) آئی سو نیازاڈ کے ساتھ استعمال کرائی جاتی ہے یہ ہر قسم کی ٹی بی میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: اگر دم دن میں ۳ بار یا ۶ گولی دن میں ۲ بار کھانے کے بعد۔
مضی افعال: گردوں کی خرابی، سرگی، بغیر نمک کی غذا کھانے والوں کو دینا مضر ہے۔
مضر اثرات: متلی تے، اسہال، تھاراکسین کی کمی کے سبب گھٹیکا Goitre ہو سکتا ہے۔
دواؤں کے اثرات: پروبے نی سڈ، انٹی کو اگولیف سلی سیلف ریفا م پی سین کے ساتھ اثرات
خواب ہو سکتے ہیں۔

PYRAZINAMIDE

پائی رازی نامائیڈ

افعال و منافع: ہر قسم کی ٹی بی کی مفید دوا ہے علاج کی مدت کو مختصر کر دیتی ہے۔
مقدار و ترکیب: ضعف جگر، تقری مجر الفاصل پیام رضاعت میں دینا مناسب نہیں۔
مضر اثرات: جگر میں خواب اٹھید کرتی ہے۔

احتیاط: اس کو دوسری دافع ٹی بی دواؤں کے ساتھ دینا چاہیے۔ حمل ڈیپٹس میں احتیاط برقی،
 اور Liver فنکشن اور، پورک اسڈسٹ کراتے رہنا چاہیے۔
 دواؤں کا رد عمل: مدارات بول اور سلفی پائی رازون کے ساتھ نقصان دہ ہے۔

تجارتی مرکبات

LYNAMIDE	(LYKA)	لائی ٹامائیڈ
500mg 10 Rs.13 39, 750 10: Rs.20.48		
PIRALDINA	(PHARMED)	پائی رال ڈینا
200mg 10. Rs 9.90 : 500mg: 10: Rs 17.99: 750mg: 10: Rs.26 76. 1g		
10 Rs 35 42		
P-ZIDE	(CADILA)	پی زائیڈ
tab 500mg 10 Rs 18 06 750mg 10: Rs.32.50 1000mg 10. Rs 35 42		
PYRAPHASE 500/750	(KOPRAN)	پائی رافیس
500mg. 10, Rs.18 06 750mg 10 Rs 26 88		
PYZINA	(LUPIN)	پائی زینا
500mg: 10 Rs 21.86 750mg: 10: Rs.34 40		
PZA-CIBA-500/750	(H CIBAGEIGY)	پی۔زی۔ای۔ای
500mg 10 Rs.23.10, 750mg: 10 Rs 34 40		

RIFAMPICIN

ریفام پی سین

افعال و منافع: ٹی بی کے ایسے مریض جن پر ائی سونیازائیڈ (I.N.H) بے اثر ہو جائے، پیپیردوں کی
 ٹی بی، سرسام دتی جذام اور دق کے اثرات کو ختم کرنے کی بہترین دوا ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۳۵۰ سے ۶۰۰ ملی گرام دن میں ۱ بار کھانے سے ۱ گھنٹہ پہلے یا ۲ گھنٹہ بعد دی
 جائے بچوں کو ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے۔
 منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو، یرقان، حمل ایام رضاعت وہی اور نفسیاتی مریضوں کو
 استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: فتور ہضم، جلد پر داغ، بخار، جگر کے مریضوں میں تھرامین ولیو کو سائیٹ کی کمی، اسنو

فیلیما بھمن پریشانی خشکی، درد سر، چکر آنا، حرکات غیر ارادی عضلات کی کمزوری مارجی ہو سکتی ہے۔
احتیاط: یرقان، خرابی جگر معمر اور نقص تغذیہ کا شکار افراد میں احتیاط برتیں۔
دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد خون ہووے، ڈیجی ٹالس، شکر کی مقدار کم کرنے والی دویہ مانع حمل گولیاں،
ڈیوائی سلفی رام، فین ہائن، کارنی سون، سائیکو سیرین، کوئی ڈین اور منوم دویہ کے ساتھ دینا معسر ہے۔

تجارتی مرکبات

COXCIDE INH	(DEE PHARMA) 6	Rs 25 50	کاسائڈ
FAMCIN	(IDPL)		قام سین
150mg. 4. Rs. 7.58, 300mg 4: Rs 15 07, 450mg 3. Rs 18 42, 600mg 3 Rs 24 37.			
FAMCIN H	(IDPL) 10	Rs. 39 43	قام سین ایچ
GOCOX	(IPCA) 450mg	4 Rs 26 16	گو کوکس
GOCOX COMP	(IPCA)		گو کوکس کمپوٹ
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg vit B6 10mg tabs 4 Rs 23 91			
ISORIFAM	(BIOCHEM)		آئی سوریفام
Rifampicin 450mg, isoniazid 300mg caps 10 Rs. 60 80			
ISO-RIPHARMED	(PHARMED)		آئی سوریفامڈ
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg caps 4 Rss 25 06			
R-CIN	(LUPIN)		آر سین
caps; 150mg 4 Rs 9 05; 300mg 4 Rs 18.50, 450mg. 3: Rs. 18.42, 600mg: 3: Rs. 27.26			
R-CINSYRUP	(LUPIN) 200ml	Rs 70 52	آر سین سیرپ
R-CINEX	(LUPIN)		آر سی ٹیکس
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg, caps 4 Rs 25.04			
R-CINEX Z	(LUPIN)		آر سی ٹیکس زی
Rifampicin 225mg isoniazid 150mg pyrazinamide 750mg tabs. Box o 10x5x2: Rss. 711.00			
RIFA 1-6 ADULT	(CONCEPT)		ریفا لٹ
RIFACOM	(INDOCO)		ریفا کوم
Rifampicin 450mg, isoniazid 300mg tabs: 4: Rs 26 29			

RIFACOM EZ	(INDOCO)	kit: Rs.18 00	ریفاکام ای زیڈ
RIFACOM-Z KIT	(INDOCO)	1 kit: Rs.13.00	ریفاکام زیڈ کٹ
RIFADIN-INH	(TATA PHARMA)		ریفازین
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg: tabs 4: Rs.25.52			
RIFAMPILA	(ALBERT DAVID)	4: Rs.15.46	ریفامپلا
RIFAKIN	(WARNER HINDUSTAN)		ریفاکن
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg 4: Rs.14.00			
RIFAMYCIN	(BIOCHEM)		ریفامائی سین
Rifampicin 450mg caps: 4: Rs.9.78			
RIFINEX	(KOPRAN)		ریفی ٹیکس
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg caps 10x4: Rs.252.00			
RIFINEX PLUS	(KOPRAN)		ریفی ٹیکس پلس
Rifampicin 150mg, isoniazid 100mg: pyrazinamide 500mg tabs: 10x6: Rs.269.27			
RIMACTANE	(H CIBAGEIGY)	4: Rs.26 85	ریمیکٹین
RIMACTANE SYRUP	(H.CIBAGEIGY)	150ml. Rs.67.29	ریمیکٹین سرپ
RIMACTAZID	(H.CIBAGEIGY)		ریمیکٹازڈ
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg; tabs 10x8: Rs.511.20			
RIMACTAZID+Z	(H.CIBAGEIGY)		ریمیکٹازڈ - زیڈ
10 composite packs of 3x3 tabs R.331 80			
RIMPAZID-450	(CADILA)		ریمپازڈ ۴۵۰
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg tabs 10: Rs.63.53			
RIMPIN	(LYKA)		ریمپن
300mg 4: Rs.12 08 450mg: 10: Rs.43 98			
RIMPIN SYRUP	(LYKA)		ریمپن سرپ
Rifampicin 100mg per 5ml, 60ml Rs.15.82			
RIMPINAH	(LYKA)		ریمپنا
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg; tabs 4: Rs.16.21			
RINIZIDE	(LUPIN)		رینی زائیڈ
Rifampicin 150mg, isoniazid 100mg, pyrazinamide 375mg caps 10, Rs.38 39			

RIPHARMED	(PHARMED)	ری فارمڈ
300mg. 4: Rs.17.89: 450mg: 4: Rs.26.23		
RIPHARMED SYRUP	(PHARMED)	ری فارمڈ سرپ
150ml Rs.51.09		
TIBICIN SUSP	(THEMIS CHEMICALS)	ٹی بی سین سرپ
Rifampicin 100mg per 5ml susp; 60ml Rs.15.20		
TIBIKIT PLUS	(STANCARE)	ٹی بی کیٹ پلس
1kit: Rs.15.28		
TIBINEX-450	(THEMIS CHEM)	ٹی بی ٹیکس ۴۵۰
Rifampicin 450mg, isoniazid 300mg; caps 10: Rs.64.08		
TIBIRIM	(RANBAXY)	میریم
300mg; 450mg: 3: Rs.11.70		
TIBIRIM-INH	(RANBAXY)	میریم آئی۔ این۔ ایچ
Rifampicin 450mg INH 300mg 3: Rs.18.78		
TRICOX FORTE	(THEMIS CHEMICALS)	ٹرائی کوکس فورٹ
Rifampicin 225mg, isoniazid 150mg, pyrazinamide 500mg tabs: 10. Rs.55.34		
WOKEX-4	(WOCKHARDT)	ووکیکس ۴
Rifampicin 450mg, isoniazid 300mg 1 tab, pyrazinamide 750mg 2 tabs, ethambutol 800mg 1 tab, vit B6 5mg 1 tab. Blister strip: 10. Rs.143.40		
ZLCOX KIT	(GLAXO)	زوکاکس کٹ
Rs. 13.65		

STREPTOMYCIN

اسٹرپٹومائی سین

افعال و منافع: ٹی بی کی مخصوص و مشہور دوا ہے پھیپھڑوں آنٹوں غد میں ورم ٹی بی کے اثرات دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۷۵۰ گرام یا ۱ گرام عضلاتی انجکشن یومیہ لگائیں۔

منفی افعال: دوا سے الرجک مریضوں کو، کان کے ورم، انفکشن میں نہ دیں۔

احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ چھوٹے بچوں جگر اور گردوں کی خرابی میں شدید ضرورت پر ہی استعمال کرائیں۔

تجارتی مرکبات

AMBISTRYN-S (SARABHAI) 1g vial: Rs.8.60 ایم بیس ٹرین

COMYCIN SYRUP (GLAXO) کو مینی سین سرپ
STREPTO-ERBAZIDE (MAC) per vial inj: Rs.5.96 اسٹریپٹو ار بازا ایڈ

THIACETAZONE

تھیاسیٹازون

افعال و منافع: پیپھروڈس کی ٹی بی کی لائن نمبر (۲) کی دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ابتدائی خوراک ۵۰ ملی گرام روزانہ خوراک ۱ سے ۲ ہفتہ بعد مقدار میں اضافہ کرے ۲۰۰ ملی گرام تک کر دینا چاہیے۔

منفی افعال: جگر کی خرابی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: بھوک کی کمی، متلی، قے، مخ العظام کی خرابی، لیو کو سائیٹ W.B.C کی کمی شدید ایبیا، جلد پر داغ پڑ سکتے ہیں۔

احتیاط: دوران علاج خون اور جگر کی جانچ کراتے رہیں۔

تجارتی مرکب

ISOKIN FORTE (WARNER) آئی سوکن

Isoniazid 300mg Thiacezone 150mg tabs 10 Rs.3.85

ANTIVIRAL DRUGS

دافع وائرس ادویہ

ACYCLOVIR

اے سائی کلوویر

افعال و منافع: یہ ہرپیز وائرس کی مخصوص دوا ہے۔ سادہ ہرپیز Herpes Simplex جس میں

جلد پر چھوٹی کی شکل میں دانے نکلتے ہیں عشاء معاطی اور جلد کا وائرس انفکشن تناسلی اعضاء کا ہرپیز انفکشن

Herpes Genital تمام جسم پر دانے پھیل جائیں Herpes Zoster کی بہترین دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: تناسلی اعضاء کے انفکشن میں پہلی خوراک ۲۰۰ ملی گرام ہر ۴ گھنٹہ بعد دن میں ۵ بار

دس دن تک دی جائے مرض کی شدت کم ہونے پر ۲۰۰ گرام دن میں ۴ بار ۶ ماہ تک دی جائے۔ شدید انفیکشن میں ۸۰۰ ملی گرام دن میں ۴ بار ۷ دن ۲ سال تک کے بچوں کو ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۵ بار ۲ سال سے زائد عمر میں ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۵ بار۔

احتیاط: گردوں کی خرابی میں مقدار خوراک کم کر دینی چاہیے حمل میں احتیاط برتیں۔
دواؤں کا رد عمل: پرودینی سڈ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

CYCLOVIR	(CADILA)	ساکلودیر
200mg/tab: 10: Rs.199.00		
CYCLOVIR OINT	(CADILA)	سائی کلوویر مرہم
HERPERAX OINT	(MICRO LABS)	ہرپی ریکس مرہم
3% w/w oint 5g Rs. 50.70		
HERPERAX TABS	(MICRO LABS)	ہرپی ریکس ٹبلٹ
200mg tabs 6 Rs. 108.10		
HERPEX (TIDE)	200mg tabs 10: Rs.210.00	ہر پیکس
ZOVIRAX	(BURROUGHS-WELLCOME)	زووی ریکس ٹبلٹ
inj for infusion 250mg vial Rs.775.14		

PROTEIN HYDROLYSATE پروٹین ہائیڈرولائیسیٹ

افعال و منافع: وائرل انفیکشن میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ ملی لیٹر عضلاتی انفیکشن دن میں ۱ یا ۲ بار شدید حالت میں ہر ۶ گھنٹہ بعد لگائیں۔

منفی افعال: شدید الرجک افراد کو اور ٹی بی کے مریضوں کو نہ دی جائے۔

تجارتی مرکبات

NULIP	(GUFIC) inj: 2ml: Rs.6.50	نولپ
--------------	---------------------------	------

RIBAVIRIN

ریباوائرین

افعال و منافع: شدید وائرل ورم جگر میں، آلات تنفس کے وائرل انفکشن کے لئے مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳-۴ بار یومیہ بچوں کو ۱۰ ملی گرام / کلو گرام کے حساب سے
کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔

منفی افعال: دوائے حساس مریضوں کو اور حمل میں دینا مناسب نہیں۔

احتیاط: خون کی کمی گردوں اور جگر کی خرابی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

VIRAZIDE

(LUPIN)

ورازائیڈ کپسول

100mg, 4, Rs 113.37, 200mg, 4, Rs.233.74

VIRAZIDESYRUP

(LUPIN) 30ml, Rs 81.47

ورازائیڈ مرپ

ZIDO VUDIN

زائیڈو ووڈین

افعال و منافع: H.I.V. وائرس انفکشن کی روایتی اور تسکین دہ دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۶ بار۔ پھر ۱۵۰ ملی گرام ۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے بچوں
کو ۱۸۰ ملی گرام / فی مربع میٹر جسم کے حساب سے ۳ ماہ سے کم عمر بچوں کو نہ دی جائے۔

منفی افعال: نیوٹروفیل اور ہیموگلوبین کی کمی میں ایام رضاعت میں استعمال سے احتیاط برتنی۔

مضر اثرات: خون میں نیوٹروفیل اور لیو کو سائیت کی کمی، جلد پر داغ، درد شکم، بخار، خدر (سن
ہن)، بھوک کی کمی، عضلات میں درد نیند کی کمی۔

احتیاط: دوا کے دوران ہر ۴ ہفتہ بعد خون کی جانچ کرائے رہیں، ایسیا میں مقدار و خوراک کم کریں، جگر
اور گردوں کے امراض میں معمر اور حاملہ کو احتیاط برتنی۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع درد دوائیں، جگر کے افراز کو روکنے والی دوائیں، پروپینی سڈ،
میٹھا ذروں کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

RETROVIR (WELLCOME)

100mg. caps. 10 Rs.535.25

ریٹروویر

ZIDOVIR (CIPLA)

100mg: caps : 10: Rs.185.31

زیڈو ویر

دافع زہر اور تریاتی ادویہ

DRUGS ANTIPOISONS &

ANTIDOTES

LEUCOVORIN CALCIUM

لیوکووورین کیلسیم

افعال و منافع: یہ میتھوٹریکسیف اور فلوک ایسڈ کو تحلیل ہونے سے رکھتی ہے میگالوبلاستک انیمیا میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۷۵ ملی گرام بذریعہ یو سی چھائیں ۱۲ گھنٹہ میں پھر ہر ۶ گھنٹہ بعد ۱۲ ملی گرام عضلاتی نکاتیں، انیمیا میں ۱ ملی گرام یومیہ عضلاتی یا خور دنی۔

منفی افعال: پرانی شش انیمیا اور وٹامن B12 کی کمی والے مریضوں کو مضر ہے۔

مضر اثرات: انجکشن کے بعد بخار ہو سکتا ہے کبھی ری ایکشن بھی ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

FERBON KOREA (SHREE GANESH)

3mg 1ml amps: Rs.26.00, 15mg 1ml amps: Rs 100.00

فریون

LEUCOVORIN CALCIUM (BIO CHEM)

3mg per ml inj. 10 amps: Rs.243.75

لیوکووورن

نالکسون ہائیڈروکلورائیڈ NALOXONE HCL

انفعال و منافع: افیون اور اس کے مرکبات کے استعمال سے ہونے والا ڈپریشن، دل بیٹھنا۔ پٹا زو کین، ڈیکسٹرو پروپاکسی فین وغیرہ سے ہونے والی کمزوری گھبراہٹ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کے لئے ۵.۴ ملی گرام زیر جلد عضلاتی یا وریدی ہر ۲-۳ منٹ پر ضرورت کے مطابق لگائیں یا بوتل میں ڈال کر بچوں کو ۱۰ ماگرو گرام / فی کلو وزن کے حساب سے لگائیں۔

مضر اثرات: متلی قے، پسینہ کی زیادتی، وجع القلب، بلڈ پریشر میں اضافہ دورے پڑنا سینہ میں تنگی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: حمل کی حالت میں، افیون کے عادی افراد میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

NARCOTAN

(TROIKAA)

نارکوتان

5x2ml (20mg) amp: Rs.175.00, 5x1ml (40mg) amp: Rs.400.00

پائی ری ڈین الڈو کسائیم میتھوڈائیڈ

PYRIDINI ALDOXIME, METHIODIDE

انفعال و منافع: ارگن فاسفورس کے زہریلے اثرات کا تریاق ہے۔

مقدار و ترکیب: آکسیجن اور اثر و پین سے دم گھٹنے سانس رکنے کی حالت دور کرنے کے بعد ۱ سے ۲ گرام عضلاتی یا وریدی ۵ فیصدی ۱۰ ملی لیٹر نارمل سیلائن یا واٹر میں ملا کر ۱۵ سے ۳۰ منٹ میں چڑھائیں ضرورت پر دوبارہ دیں۔

مضر اثرات: خشکی، چکر آنا، بصارت میں فرق، متلی سینہ میں درد، درد سر، ہوا کی شدید خواہش عضلاتی کمزوری۔

احتیاط: جگر کے مریضوں میں احتیاط برتیں۔

PRALIDOXIME

پرائیڈاکسائم کلورائیڈ

افعال و منافع: پیراٹھیان اور میتھائل پیراٹھیان کے زہر کو دور کرنے میں مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: اگر ام دن میں ۱ بار ویدی بہت آہستہ لگائیں شدید حالت میں ۱ سے ۲ گرام سوزیم کلورائیڈ سولیوشن میں ۳۰ منٹ میں چڑھائیں۔ بچوں کو ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام / کلوگرام وزن

کے حساب سے دن میں ۱ بار

منفی اثرات: عضلات کی کمزوری اور نفاہت میں نہ دینا چاہیے۔

مضر اثرات: چکر آنا دو تصادیر دکھائی دینا، خشکی در دسرمندہ میں گرمی قے وجع القلب، رگوں میں کھنچاؤ اور پھیل جانا حرکات قلب کا بے ترتیب ہونا، سانس اور بلڈ پریشر میں اضافہ۔

احتیاط: دوا کے استعمال سے پہلے انروپین کا استعمال ضرور کر لینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

NEOPAM

(TROIKAA)

نیوپام

(PAM) 25mg per ml inj 20ml amps Rs.152.00

PAM-A INJ KOREA

(SHREE GANESH)

پام اے انجکشن

500mg per 20ml inj. vial 20ml: Rs.160.00

PAM-A TABS KOREA

(SHREE GANESH)

پام اے ٹبلٹ

500mg tab: 1: Rs.20.00

معاون تشخیص مرکبات

DIAGNOSTIC REAGENT

درم جگر بی وائرس ٹسٹ کے لئے HEPATITIS .B. LATEX
AGGLUTINATION, QUICK TEST ہے

اس سے بی وائرس سے ہونے والے درم جگر کی جانچ بہت جلد اور آسانی سے ہو جاتی ہے تفصیلات کے لئے لٹریچر دیکھئے۔

تجارتی مرکبات

HEPALEX

(BIOGENICS)

ایپالکس

Hepatitis B Latex Agglutination Quick Test

IODAMIDE

آیوڈاماائیڈ

افعال و منافع: مردوں، بیزو Pelvis اور پیشاب کی نالی کی جانچ Pyelography کے لئے اور یہ شکم، خون کی رگوں اور غدود و لفاوی کی جانچ میں کام آتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ سے ۳ ملی لیٹر / فی کلوگرام وزن کے حساب سے۔

منفی اثرات: جگر مردوں و قلب کی کمزوری مانی لوما عظم غدود رقیہ میں دیتا معر ہے۔

تجارتی مرکبات

UROMIRO 24% INFUSION

(PHARMED)

یورو میرو میسل

IOHEXOL

آیو ہیکسال

افعال و منافع: یہ پانی لوگرانی، سسٹی موگرانی، آنتوں کی جانچ، قہر ابوگرانی، ہڈیوں کی جانچ، یوروگرانی، پیشاب کی نالیوں کی جانچ، عروق قلب کی جانچ میں مستعمل ہے۔

ترکیب و استعمال، منفی اور مضر اثرات، احتیاط کے لئے دوا کے ساتھ کا پرچہ دیکھئے۔
تجارتی مرکب

OMNIPAQUE 140

(NYCOMED)

او مٹی پیک

IOPANOIC ACID

آپوپے نو ایک ایسڈ

افعال و منافع: مرارہ (پتہ) Gall Bladder اور اس کی نالیوں کی جانچ کے لئے مستعمل ہے۔
مقدار و خوراک: ۳ گرام
منفی افعال: جگر کی کمزوری، عظم غدود رتہ قلب و گردوں کی خرابی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

CISTOBIL TABS

(PHARMED) 6: tabs: Rs 14 67

سسٹو بل ٹیبلٹ

IOPAC

(DEYS) 6: Rs. 54.00

آپو پیک

IOPHEN DYLATE

آپو فین ڈائی لیٹ

افعال و منافع: پائی لو گرائی، وین لری کیو لمر گرائی، بطون قلب کی جانچ اور رحم میں بچے کی جانچ کے لئے مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب، مضر اثرات و احتیاط کے لئے دیکھئے پرچہ ترکیب استعمال۔

تجارتی مرکب

MYODIL

(GLINDIA)

مایو ڈیل

MEGLUMINE DIATRIZOATE میگ لومین ڈیا ٹرائی زو ایٹ

افعال و منافع: انجیو گرائی (عروق کی جانچ، یورو گرائی (عروق کلیہ کی جانچ) میں مستعمل ہے۔
مقدار و خوراک، منفی و مضر اثرات و احتیاط کیلئے دیکھیں ساتھ والا پرچہ۔

تجارتی مرکبات

ANGIOGRAFIN 65%

UROGRAFIN

UROVIDEO 76% INJ

1x20ml: Rs.117.54

(GERMAN REMIDIES)

(GERMAN REMIDIES)

(PHARMED)

انجیوگرافین
یوروگرافین
یوروویڈیو انجکشن

میگلو مین آیوڈوپامائیڈ MEGLUMIN IODOPAMIDE

افعال و منافع: پتہ کی پتھری اور پتہ کی نالیوں کی جانچ کے لئے مستعمل ہے۔

منفی اثرات: دوران خون اور قلب کے فعل کی کمی میں، آیوڈین سے حساس اور غدہ درقیہ کے اضافہ میں جگر اور اردوں کی خرابی میں نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

BILIGRAFIN I.V. FORTE 50% (GERMAN REMEDIES) لی گرافین

250mg per ml amp 10x20ml Rs.792.45

UROMIRO 24% INFUSION

(PHARMED)

یورو میرو

میگلو مین آیو تھالمیٹ MEGLUMINE IOTHALMATE

افعال و منافع: پیشاب کی نالیوں کی جانچ، دماغی عروق کی جانچ و رید شکم کی جانچ اور طی کے افعال کی

جانچ قلبی عروق کی جانچ طحال کی جانچ ران کی و رید کی جانچ میں مستعمل ہے۔

ترکیب استعمال: منفی، مضر اثرات کے لئے کہنی کا پرچہ دیکھ کر استعمال کریں۔

تجارتی مرکب

CONRAY-280 INJ

inj; 20ml Rs.146.23

(RHONE POULENC)

کون رے انجکشن

PRO PYLIODONE

پرو پائی لیوڈون

پیمپروں کی بڑی عروق کی جانچ کے لئے مستعمل ہے۔

(ترکیب استعمال، مضر و منفی اثرات و احتیاط کے لئے پرچہ ترکیب استعمال ملاحظہ فرمائیں)

تجارتی مرکب

DIONOSIL

(GLINDIA)

ڈائیوسل

SODIUM IOTHALMATE

سوڈیم آئیو تھال میٹ

استعمالات: گردوں کی عروق وریڈ شکم (اور طی) جوف صدر کی عروق، عروق قلبیہ طحال اور ران کی وریڈوں کی جانچ میں مستعمل ہے۔

(مقدار منفی و مضر اثرات کے لئے ساتھ کا پرچہ ترکیب استعمال دیکھئے۔)

تجارتی مرکب

CONRAY 420 INJ (RHONE POULENC) 20ml Rs 180 | ۲۲۰ روپے کون رے

ٹیو برکیولین پیوریفائیڈ پروٹین ڈرائی ویٹو

TUBERCULIN PURIFIED PROTIEN DERIVATIVE

افعال و منافع: یرضی بی کی تشخیص کے لئے یہ انجکشن لگایا جاتا ہے۔

(ترکیب استعمال مقدار منفی و مضر اثرات کے لئے پرچہ ترکیب استعمال دیکھئے)

تجارتی مرکب

OLD TUBERCULIN

(BHAGAT)

اولڈ ٹیو برکیولین

اندرونی غدود کے افراز کو تحریک دینے والی ادویہ

ENDOCRINE SYSTEM

ANABOLIC DRUGS

DE SOXY CORTI COSTERON ڈی سکسی کارٹی کاسٹیرون

افعال و منافع: معمر افراد میں طاقت اور نئی توانائی پیدا کرنے کو بلند پریش کے مریض، ہڈیوں کی کمزوری، اضمحلال، سنسٹی نقاہت میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ ملی گرام ہفتہ وار شدید حالت میں ۲۰ ملی گرام ہفتہ میں اپار دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: حمل، ہائی بلڈ پریش، قلب و جگر و گردوں کی خرابی میں مردوں کی چھاتیوں کے کینسر، غدہ قدامیہ کے کینسر، جسم میں پانی رکھنے میں استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

احتیاط: مرگی شقیقہ Migraine، ذیابیطیس میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکب

DOCABOLIN (INI) 10ml per ml inj 1ml Rs.25 00 ڈوکابولین

ETHYLESTRE NOL

ایتھائل ایسٹری نال

افعال و منافع: مزمن بیماریوں کے سبب ہونے والی کمزوری، پوٹین کے انجذاب میں کمی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۲ سے ۴ ملی گرام ۱۰ سے ۲۰ کلوزن کے بچوں کو آدھی ملی گرام دن

میں ۱ بار ۲۰ سے ۳۰ کلو کو ۱ ملی گرام ۳۰ کلو سے زائد وزن والوں کو ۵ ملی گرام یومیہ۔

منفی افعال: حمل، غدہ قدامیہ اور چھاتی کے کینسر، جگر کی شدید خرابی میں دینا منع ہے۔

تجارتی مرکب

ORABOLIN

(INFAR) 2mg tabs 10 Rs 19.70

اورابولین

NANDROLONE

نان ڈرولون

افعال و منافع: مردوں کی خرابی، زہریلی دواؤں، غذاؤں سے ہونے والا اینیسیا اے پلاسٹک اینیما، پستان کے کینسر طویل بیماریوں کے سبب ہونے والی کمزوری اور اینیسیا میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۲۰۰ ملی گرام ہفتہ میں ۱ بار

منفی افعال: حمل غدہ قدامیہ اور مردوں کی چھاتیوں کے کینسر میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: جسم میں پانی جمع ہونا، ورم حج Oedema عورتوں میں مردانہ خصوصیات پیدا ہونا کیلیسیم میں اضافہ۔

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں، ہائی بلڈ پریشر مرگی شقیقہ، ذیابیطیس کے مریضوں میں احتیاط برتیں دوران علاج پروٹین کی مقدار بڑھائیں۔

تجارتی مرکبات

DECADURABOLIN	(INFAR) Rs 125 50	ڈیکاڈیورابولین
DECANEURABOL	(CADILA)	ڈیکانیدوربال
25mg per ml inj 1ml amp	Rs 39 90	
DECA-NEUROPHENINJ	(SWIFT)	ڈیکانیدورفین
25mg amp	Rs 49 99, 50mg amp	Rs 83 99
METADDEC	(JAGSONPAL)	میٹاڈیک
25mg 1amp	Rs 42 50, 50mg 1amp.	Rs.74 25
MYOBOLIN	(MAX)	مایوبولین
25mg per ml amp	Rs 36.80	

نان ڈرولون فینائل پروپائی نیٹ

NONDROLONE PHENYL PROPIONATE

افعال و منافع: مزمن بیماریوں کے سبب ہونے والی کمزوری، آپریشن چلنے اور حادثات کے سبب ہونے والی نقاہت، نظام استحالہ Metabolism کی خرابیاں ہڈیوں کی کمزوری میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہالغوں کو ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام عضلاتی ہفتہ وار یا ۲ ملی گرام کھانے کے ساتھ ۶ سے ۱۲ سال کے بچوں کو ۵ سے ۱۵ ملی گرام عضلاتی انجکشن ہفتہ وار یا ۲ ملی گرام ہفتہ میں ۲ بار۔
 منفی افعال: حمل چھاتیوں اور غدہ قدامیہ کے کینسر میں دینا منع ہے۔
 مضر اثرات: سوج، ورم Oedema عورتوں میں مردانہ خصائل پیدا ہونا، میٹیم میں اضافہ۔
 احتیاط: عروق قلبیہ میں تنگی C.C.F. جگر اور گردوں کی خرابی میں ہائی بلڈ پریشر، مرگی، شقیقہ اور زہائیس میں احتیاط لازم ہے۔
 دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد خون اور محرک جگر ادویہ کے ساتھ دینا مناسب نہیں۔

تجارتی مرکبات

DOCABOLIN	(INFAR) 25mg, 1ml amp	Rs 32 50	ادو کا بولین
DURABOLIN	(INFAR) 25mg 1ml	Rs 24 00	ڈیور ابولین
EVABOLIN	(CONCEPT) 1amp:	Rs. 12 98	ایو ابولین
GROTHIC	(LYKA) 1ml.	Rs 6.95, 5ml Rs 23 08	گروٹھک
METABOL	(JAGSONPAL)		میٹابول
Nadrolone phenylpropionate 25mg 1ml. Rs. 17.50			
NEURABOL INJ.	(CADILA)		نیورو بول

OXY METHOLONE آکسی میتھولون

افعال و منافع: اے پلاسٹک انیسیا میں بطور معاون ادویہ مستعمل ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۲ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے علاج ۲ سے ۶ ماہ جاری رکھیں۔
 منفی افعال: حمل میں، مردوں کی چھاتیوں اور غدہ قدامیہ کے کینسر میں، عورتوں کے مخصوص اعضاء کے کینسر میں جگر و گردوں کی خرابی میں خراب اثر ہوتا ہے۔
 مضر اثرات: جگر میں ٹیو مر کا خطرہ، یہ قان ورم جگر، عورتوں میں مردانہ خصائل، قبل از وقت بچے کی پیدائش، بندش حیض خون میں شحمی اور کیلیم کے اجزا میں اضافہ۔
 احتیاط: امراض قلبیہ زہائیس ورم غدہ قدامیہ میں احتیاط رکھیں دوران علاج جگر کے فعل کی جانچ

کرائیں۔

دواؤں کا رد عمل: کارنی سون کے مرکبات اور مانع انجماد خون ادویہ۔

تجارتی مرکب

ADROYD (PARKE DAVIS) 500mg: tabs: 100 Rs.256.50 ایڈروائڈ

STANOZOLOL

اسٹے نوزولول

افعال و منافع: ایک زبردست محرک اور مقوی جسم دوا ہے جسم میں نئی اسٹنگ پیدا کرتی ہے۔ پروٹین کی کمی، ہڈیوں میں کمزوری اور اضمحلال، اندمال فریکچر میں تاخیر، عام جسمانی کمزوری، بیماریوں، کے بعد کی نقابت پیشاب کا خون میں سرایت کرنا، اسے پلاسٹک انیمیا، آپریشن کے بعد کی نقابت میں مفید ہے۔ مقدار خوراک: ۲ سے ۳ ملی گرام دن میں ۱۲ یا ۳ بار کھانے کے ساتھ کھلائیں۔

منفی افعال: غدہ قداسیہ کے کینسر میں مردوں عورتوں کی چھاتیوں کے کینسر میں، حمل، مردوں کی خرابی ورم گردہ، ذیابیطس میں دینا معطر ہے۔

معطر اثرات: جگر میں خرابی، عورتوں میں مردانہ خصوصیات، قبل از وقت بلوغت جلد پر دھبے پڑنا، بد ہضمی، تشنج عضلات، درد سر، عورتوں میں جسم پر بالوں کی زیادتی آواز باریک، جلد چکنی بالوں کا گڑنا، مہاسے لگنا، لڑکیوں میں بطور کا بڑا ہونا جنسی خواہش میں اضافہ، حیض کا بے ترتیب آنا مومے زیر ناف کا قبل از وقت لگنا، فریسوس، معمر افراد میں غدہ قداسیہ کا بڑا ہونا پیشاب میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔

احتیاط: جگر گردوں اور قلب کے امراض میں حیض کی بے اعتدالی میں پیشاب میں شوگر اور جگر کے ٹسٹ کے نتائج میں، غدہ قداسیہ کے مہلک امراض میں اور بچوں میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: خوردنی مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ خراب رد عمل ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

MENABOL (CFL PHARMA)

Stanozolol 2mg: tabs: 10. Rs.28.00

NEURABOL CAPS (CADILA)

Stanozolol 2mg: caps: 10. Rs.14.60

مینابول

نیورابول

دافع ذیابیطس ادویہ

ANTI DIABETIC DRUGS

SOLUBLE NEUTRAL انسولین INSULINE

یہ انسولین تیل کے غدہ ہائپر اس سے تیار کی جاتی ہے ۳۰ سے ۸۰ یونٹ / فی ملی لیٹر میں ملتی ہے۔
افعال و منافع: ذیابیطس شکاری، نو عمروں کی ذیابیطس میں مفید ہے، انسولین پر انحصار کرنے والے (IDDM) مریضوں کے لئے نعمت ہے۔

مقدار و ترکیب: ہالٹوں اور بچوں کو عمر، مرض کی کیفیت کے لحاظ سے متعین کرنا چاہیے یہ زیر جلد
نو رویدی لگائی جاتی ہے زیر جلد ۳۰ منٹ میں اثر کرتی ہے اس کا اثر ۶ سے ۸ گھنٹہ تک رہتا ہے وریڈی
انجکشن صرف ہنگامی حالت میں لگائیں انجکشن کے ساتھ ہی کھانے ناشتہ کا انتظام رکھیں۔

منفی اثرات: خون میں شکر کی مقدار کم ہونے پر دینا خطرناک ہے۔
مضر اثرات: اچانک خون میں شکر کی مقدار کم ہو جانا، مقام انجکشن پر الرجی ورم جلد پر داغ پڑنا
مدد کی کیفیت ہونا۔

احتیاط: اگر انسولین تبدیل کر کے لگانا پڑے تو بہت احتیاط سے لگائیں جگہ بدل کر لگائیں حمل کی
حالت میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: کارٹی سون کے مرکبات خوردنی مانع حمل ادویہ، غدہ درتہ کے ہارمون
تھیازائیڈ، بول ادویہ اور زیادہ مقدار میں دینے سے شدید رد عمل ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

HUMAN ACTRAPHANE (TORRENT)

40iu per ml inj. 10ml Rs 159.18

ہوسن اکٹرافین

HUMAN ACTRAPID (BOOTS)

40iu per ml inj; 10ml vial Rs 170 00

ہیومن ایکٹراپڈ

HUMAN MIXTARD (BOOTS)

40iu per inj; 10ml vial Rs.170.00

ہیومن مکس ٹارڈ

HUMAN NORDISULIN (BOOTS)

40iu per ml inj, 10ml vial Rs 159 86

ہیومن نارڈی سولن

INSULIN (BOOTS)

40iu 10ml Rs 33 50 80iu 10ml: Rs 54.55

ان سولن

MIXTARD (BOOTS)

40iu per ml inj 10ml vial Rs.102 96

مکس ٹارڈ

انسولین زنک سسپنشن INSULIN ZINC SUSPENSION

افعال و منافع: ہر قسم کی ذیابیطس شکاری میں مفید ہے ۸۰/۴۰ یونٹ / ملی لٹر میں ملتی ہے۔

مقدار و ترکیب: مریض کی ضرورت کے مطابق زیر جلد انجکشن لگانے سے ۲ گھنٹہ میں پورا اثر ہوتا

ہے ۲۴ گھنٹہ برقرار رہتا ہے یہ وریڈی نہیں دینا چاہیے۔

منفی افعال: خون میں شکر کی مقدار کم ہونے پر دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: شکر کی مقدار گھٹ جانا، جلد اور آنکھوں پر رری ایکشن ہو سکتا ہے۔

احتیاط: انسولین کی تبدیلی، انفکشن، حمل جگر و گردوں کی خرابی ذہنی اور دماغی الجھن میں احتیاط لازم

ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: کارٹی سون کے مرکبات، خوردنی مانع حمل ادویہ، تھائی رائیڈ ہارمون،

تھیازائیڈ مدرات بول کے ساتھ دینا خراب اثر کرتا ہے۔

تجارتی مرکبات

HUMAN MONOTARD (BOOTS)

40iu 10ml vial Rs 176.80, 100iu 10ml: Rs.431 34

ہیومن مونوٹارڈ

INSULIN ISOPHANE (NPH) (BOOTS)

40iu per ml inj; 10ml Rs.33 50

انسولین آئی سو فین

انسولین زنک لنٹے

INSULIN ZINC (LENTE) (BOOTS)

40iu, 10ml Rs 33 50 80iu, 10ml Rs 54 55

LENTARD

(BOOTS)

لنٹارڈ

Highly purified insulin zinc suspension (porcine) 40iu per ml inj,

10ml vial Rs 105 84

MIXTARD

(BOOTS)

کسٹارڈ

40iu per ml inj 10ml vial Rs 102 96

MONOSULIN

(BOOTS)

مونوسولین

40iu per ml inj 10ml vial Rs 102 30

MONOTARD MC (TORRENT)

مونوتارڈ ایم سی

40iu per ml inj, 10ml Rs 138 03

RAPIDICA

(SARBHAI)

رے پی ڈی کا

40iu per ml inj 10ml vial Rs 86 98

ZINULIN

(SARABHAI)

زنولین

40iu per ml inj 10ml vial Rs 86 96

آئی سوفین انسولین کرشالین پروٹامین انسولین

**ISOPHANE INSULIN CRYSTALLINE
PROTAMINE INSULINE**

یہ بھی نمل کے غدہ ہانقراس سے تیار کی جاتی ہے ۴۰ یونٹ / ملی لٹر کی طاقت میں آتی ہے۔

افعال و منافع: ہر قسم کی ذیابیطس شکر کی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہانقوں اور بچوں کو ضرورت اور مرض کے مطابق مقدار کا تعین کریں۔ زیر جلد

انجکشن لگایا جاتا ہے ۲ گھنٹہ میں پورا اثر ہوتا ہے ۱۸ سے ۲۸ گھنٹہ تک برقرار رہتا ہے وریڈی ہرگز نہیں

لگاتا چاہیے۔

منفی افعال: شکر کی مقدار کم ہونے میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: بصارت میں فرق خون میں شکر کی مقدار گھٹ جانا، مقامی الرجی، صدمہ کی کیفیت۔

احتیاط: تبدیلی انسولین میں، انجکشن حمل، جگر گردوں کی خرابی نفسیاتی الجھن میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: کارٹی سون کے مرکبات، خوردنی مانع حمل ادویہ، تھائی رائکسین، تھیازائیڈ، مدرات

بول، بیٹا بلا کنگ ایجنٹ MAOI کے ساتھ دینا خراب اثر کرتا ہے۔

تجارتی مرکبات

ACTRAPID	(ORRENT)	10ml Rs.102.18	اکٹراپڈ
ACTRAPID-MC	(ORRENT)		اکٹراپڈ ایم سی
HUMAN INSULATARD	(BOOTS)		ہیومن ان سولے ٹارڈ
10ml vial: Rs.170.00			
ILETIN-R	(LILY RANBAXY)		آئی لے ٹن۔ آر
40iu per ml inj. 10ml vial: Rs.54.64			
ILETIN-N	(LILY RANBAXY)		آئی لے ٹن۔ این
40iu per ml inj. 10ml Rs.54.80			
ILETIN-L	(LILY RANBAXY)		آئی لے ٹن۔ ایل
40iu per ml inj. 10ml vial: Rs.65.08			
INSULATARD	(BOOTS)		ان سولے ٹارڈ
10ml vial: Rs.104.68			
INSULIN PROTAMINE ZINC	(BOOTS)		ان سولن پروٹامن زینک
10ml: Rs.33.50			
RAPIDICA	(SARABHAI)		رے پی ڈی کا
40 iu per ml inj. 10ml vial. Rs.86.98			

خوردنی دافع ذیابیطیس ادویہ

ORAL ANTI DIABETICS

CHLORPROPAMIDE

کلور پروپامائیڈ

افعال و منافع: ذیابیطیس شکر کی جس میں کوئی تہیدگی نہ ہو وہ ذیابیطیس جو غذا سے کنٹرول نہ ہو سکے مفید ہے۔ یہ جسم میں انسولین کی مقدار میں اضافہ کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۱ بار ناشتہ کے فوراً بعد ۳ سے ۷ دن بعد نتائج کے لحاظ سے مقدار میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔ اس کے ساتھ انسولین و دیگر خوردنی ادویہ کی مقدار میں کمی کر دیں۔

منفی اثرات: حمل، آپریشن، البص، انفکشن، شدید چوٹ، جگر گردوں اور غدہ درقیہ کی خرابی میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: یرقان، جلد پر داغ پڑنا، قہر امبین اور لیو کو سامیٹ کی کمی انیمیا، فتور ہضم ہو سکتا ہے۔
احتیاط: شرابیوں، خون میں شکر کی کمی میں، انسولین کے بعد اور شراب کے ساتھ احتیاط رکھیں۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع انجماد خون ادویہ MAOI سیلی سائی لیٹ اور بیٹا بلا کر سے اثرات میں اضافہ ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

CHLORFORMIN	(CADILA) 10, Rs.3.20	کلور فارمین
COPAMIDE	(DEYS) 250mg tabs 10: Rs.5.25	کوپامائیڈ
DIABINESE	(PFIZER)	ڈیابے نیز
tabs 100mg: 10: Rs.4.79	250mg; 10; Rs.7.60	

GLIBENCLAMIDE

گلائی بن کلامائیڈ

افعال و منافع: یہ ایک اہم دافع ذیابٹس دوا ہے۔ یہ بیٹا سیل کو تحریک پہنچا کر غدہ ہانقراس سے انسولین کے اخراج میں اضافہ کرتی ہے۔
ذیابٹس کی نمبر (۲) کی دوا ہے جو مریض انسولین پر انحصار نہیں کرتے (NIDDM) کے لئے ایک نعمت ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲.۵ ملی گرام دن میں ۱ بار ناشتہ کے ساتھ ضرورت کے مطابق مقدار میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: متلی، تے معدہ میں بیماری پن، لیو کو سامیٹ اور قہر امبین کی کمی، انیمیا، یرقان، مٹھی ورم جگر دواسے ری ایکشن ہو سکتا ہے۔

احتیاط: ضعف و قہمت میں قلب کے خطرناک مریضوں میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، بیٹا بلا کر، ہائی گوانائیڈ، کلورم فینی کال، فین فلورامین، MAOI، مائی کو نازول، فینا کل بوتازون، سیلی سیلیف سلفن پائرازون فاسفامائیڈ، ٹراسا نکلین، کارٹی سون کے

مرکبات، مدرات بول، ایسٹروجن، فینو تیازون، تھائراکسین کے ساتھ رد عمل خراب ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

BETANASE	(ALIDAC)	مائیس
Glibenclamide 5mg tabs 10:	Rs.1.56	
DAONIL	(HOECHST)	ڈائل
Glibenclamide 5mg tabs 10:	Rs 3.90	
EUGLUCON	(BOEHRINGER).	یو گلو کون
Glibenclamide 5mg tabs 10:	Rs 3 90	
GLUCORED	(SUN PHARMA)	گلو کورڈ
Glibenclamide 2.5mg metformin 400mg. tabs. 10.	Rs.6 50	
SEMI DAONIL	(HOECHST)	سی ڈائل
Glibenclamide 2.5mg tabs 10:	Rs.2.60	
SEMI EUGLUCON	(BOEHRINGER)	سی یو گلو کون
Glibenclamide 2.5mg tabs 10:	Rs.3.37	

GLICLAZIDE

گلائی کلازائیڈ

افعال و منافع: ذیابیطس شکر کی لائن نمبر ۲ کی دوا ہے انسولین پر انحصار نہ کرنے والوں (NIDDM) کے لئے بہترین دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۶۰ ملی گرام یومیہ دو خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے ضرورت کے مطابق ۸۰ سے ۳۲۰ ملی گرام تک دی جاسکتی ہے۔

منفی اثرات: کوما اور خون میں تیزابی مادوں KETOSIS میں نوجوان مریضوں میں جگر اور گردوں کی شدید بیماریوں، حمل اور ایام رضاعت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: خون میں شکر کی مقدار کم ہو جانا، ہضم کی خرابیاں، سردرد، ری ایکشن تھکاوٹ سستی۔

احتیاط: مریضوں کو خون میں شکر کم ہونے سے آگاہ کر دینا چاہیے انسولین کے ساتھ بہت احتیاط سے دیں دواؤں کا رد عمل: شراب، پانی رازول کے مرکبات سیلی سائی لیٹ، فینائیل یوٹازون سلفا نومائیڈ، مانع

انجرا خون پینا بلا کر، MAOI، نٹراسائیکلین، کلوروم فینی کال باریٹون کے مرکبات کے ساتھ اثرات خراب ہوتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

DIABEND (MICRO LABS)

ڈیابنڈ

Gliclazide 80mg tabs 6 Rs.52.80

GLIZID (PANACEA)

گلائی زائیڈ

Gliclazide 80mg tabs 10 Rs.49.00

GLIPIZIDE

گلائی پی زائیڈ

افعال و منافع: ذیابیطس شکاری کے وہ مریض جو انسولین پر منحصر نہیں ہیں (NIDDM) ان کے لئے ایک بہترین ذوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲.۵ سے ۵ ملی گرام یومیہ کھانے سے ۳۰ منٹ پہلے ضرورت پر ۲.۵ ملی گرام ہر ہفتہ کے حساب سے اضافہ کیا جاسکتا ہے زیادہ سے زیادہ ۲۰ ملی گرام روزانہ ۲-۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دینا چاہیے، معمر افراد کو مقدار کم دیں۔

منفی اثرات: حمل، بے چینی، ذیابیطس کو ما، نو عمر مریضوں کو، جگر گردوں اور کلاہ گردہ کے مریضوں کو دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: متلی اسہال ری ایکشن، چکر آنا، نم معدہ پر درد قبض خشکی سردی کی شکایت ہو سکتی ہے۔

دواؤں کا رد عمل: ڈائی کو مارڈل MAOI سلفونامائیڈ فینائل بیوٹازون، کلوروم فینی کال، پروپینی سڈ، سیلی سیلے سے دوا کے اثرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اڈرینالین، کارٹی سون کے مرکبات مانع حمل ادویہ کے ساتھ اثرات کم ہو جاتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

GLIBETIC (LA PHARMA)

گلائی بیٹک

Glipizide 5mg tabs 10: Rs.7.00

19a

GLIDE	(FRANCO INDIAN)	گلائڈ
Glipizide 5mg tabs 10	Rs. 5 80	
GLUCOLIP	(WALLACE)	گلوکولپ
Glipizide 5mg tabs 10	Rs 8 50	
GLUCOTROL	(JENBURKT)	گلوکوٹرول
Glipizide 5mg tabs 20	Rs 17.30	
GLYNASE	(U S. VITAMIN)	گلائی نیس
Glipizide 5mg tabs 10	Rs 8 69	

GLUCAGON

گلوکاگون

افعال و منافع: خون میں شکر کی شدید کمی کی حالت میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۰.۵ سے ۱ ملی گرام زیر جلد عضلاتی یا وریدی انجکشن لگائیں۔
 منفی اثرات: خون میں گلائی کو جن کی زیادتی میں انسولین اور وارفارین کے ساتھ دینا خطرناک ہے۔
 احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں۔

تجارتی مرکب

GLUCAGON	(TORRENT)	گلوکاگون
Glucagon as Hcl 1mg per ml inj	vial Rs.330.00	

METFORMIN

میٹ فارمین

افعال و منافع: یہ دوا ہائپر اس کے فعل میں اضافہ کرتی ہے۔ قرہ افراد کی ذیابیطس شکر، ایسی ذیابیطس جو غذا اور جسمانی ورزش سے کنٹرول میں نہ آ سکے انسولین پر انحصار (IDDM) کرنے والوں کو بطور معاون دی جاتی ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۲ بار کھانے کے فوراً بعد مقدار آہستہ آہستہ بڑھائی جاسکتی ہے زیادہ سے زیادہ ۳ گرام دے سکتے ہیں۔
 منفی اثرات: ذیابیطس کو مابین خون میں حیرانی مادے کی زیادتی میں جگر اور گردوں کے شدید امراض میں قلبی عروق کی تنگی میں شراہوں میں اور آکسیجن کی کمی دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: ہاضمے کی خرابی۔

احتیاط: دیگر دافع ذیابیطیس دواؤں کے ساتھ حمل میں شدید انفکشن، چوٹ اور آپریشن سے احتیاط لازم ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب و رات بول مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

DIAPHAGE (WALLACE)

500mg; 10: Rs.6.40 850mg; 10: Rs.10.70

GLYCIPHAGE (FRANCO) 0.5g; tabs 10: Rs.6.30

GLYCOMET (USV) 500mg; tabs 10: Rs.6.25

GLUFORMIN (BOEHRINGER)

Metformin 500mg; tabs: 10: Rs.6.50

METMIN (JENBURKT)

Metformin 500mg; tabs: 10: Rs.6.95

ذیابیطیس

گلائیسیل

گلائیسیل

گلو فارمین

میٹ من

PHENFORMIN

فین فارمین

افعال و خواص: ذیابیطیس کی ابتدائی اور ثانوی حالت میں مفید ہے۔

انسولین کے ساتھ بطور معاون استعمال کرائی جاتی ہے۔ مستقل دعارضی، بالٹوں نو عمروں کی ذیابیطیس میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ ملی گرام ۱ سے ۴ مرتبہ روزانہ مریض کی ضرورت کے مطابق ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام روزانہ ناشتہ کے ساتھ دینا چاہیے۔

منفی اثرات: بچوں کی ذیابیطیس میں خون میں تیزابی اثر کو، انفکشن فائفرانا Gangrene آپریشن کے دوران یا بعد، قلب و جگر و گردوں کی خرابی میں آکسیجن کی کمی میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: فتور، ہضم تیزابیت پیدا ہونا۔

احتیاط: بھوک کے وقت خون میں شکر کی مقدار کم ہونے اور حمل میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: شراب مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

CHLORFORMIN	(CADILA)	کلور فارمین
Chlorpropamide 50mg, phenformin hcl 25mg, tabs 10	rs 2 90	
DBI	(U S VITAMIN)	ڈی بی آئی
Phenformin hcl 125mg, tabs 10	Rs 6 96	
DBI-TD	(U S VITAMIN)	ڈی بی آئی۔ ٹی ڈی
Phenformin hcl 50 mg caps, 15	Rs 16 80	

TOLBUTAMIDE

ٹالبو ٹامائیڈ

افعال و منافع: ذیابیطس شکری پختہ جو مزمن ہو چکی ہو مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۱ گرام دن میں ۲ بار ۴ سے ۵ دن تک بعد میں ۰.۵ گرام سے ۲ گرام تک مریض کی ضرورت کے مطابق دی جائے دوا کھانے کے بعد کھلائیں۔

منفی افعال: خون میں تیزابیت Ketosis نو عمروں کی ذیابیطس جگر گردوں اور کلاہ گردہ کے امراض بے چینی، الجھن ذیابیطس کو مایوس مضر ہے۔

مضر اثرات: ہاضمے کی خرابیاں حساسیت، قہر اسہل اور لیو کو سامیٹ کی کمی انیسیا۔

دواؤں کا رد عمل: پینا بلا کر، پروجینی سنڈ ہائی کوٹائیڈ، کلورم فینی کال فین فلورامین MAOI فینا کل ہیڈنازون سلی سلیٹ شراب، سلفن پائی رازین اور نٹراسا نکلین کے ساتھ دوا کے اثر میں تیزی آتی ہے۔ کارٹی سون کے مرکبات مدرات بول، دست آور لادو یہ اسٹروجن کونٹیک ایسڈ فینو تھیازین، تھائی راکسین سے اثر میں کمی ہوتی ہے۔

تجارتی مرکب

RASTINON	(HOECHST)	ریسٹنٹان
Tolbutamide 0.5g: tabs 10,	Rs.6.50	

کارٹی سون کے مرکبات

CORTICOSTEROID

BECLLO METHASONE ڈیپرو پینوٹ DIPRO PIONATE

ایکلو میتھاسون ڈیپرو پینوٹ نیٹ
افعال و منافع: یہ ایک دافع ورم کارٹی سون کا مرکب ہے جو بذریعہ ناک بطور نسوار استعمال کیا جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کے دمہ، بلغمی دمہ کے پرانے مریضوں کے لئے مفید و موثر ہے۔
مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۱۰۰ ماگروگرام یا ۲ بار سوگھائیں ۲۴ گھنٹوں میں ۲۰ بار تک سوگھائیں
ہیں شدید حالتوں میں ۶۰۰ سے ۸۰۰ ماگروگرام تک یومیہ دے سکتے ہیں
شفی افعال: دمہ کے شدید دورے میں دوا سے حساس مریضوں کو استعمال نہیں کرانا چاہیے۔
احتیاط: کارٹی سون تھیراپی کے ساتھ اس کا دینا خطرناک ہے موت تک ہو سکتی ہے۔
لہذا کارٹی سون تھیراپی سے قبل اس کو روک دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

BECLATE INHALER (CIPLA) بیک لیٹ ان ہیلر
50mcg, Rs. 100 86, 200 doses, 100mcg 200metered doses Rs.128.00.
200mcg. Rs.156 80
BECLATE ROTACAPS (CIPLA) بیک لیٹ روٹاکیپ
100mcg 30rotacaps: Rs.24.75 200mcg 30: Rs.36.93

BETA METHASONE

بٹا میتھاسون

افعال و منافع: شدید دمہ الرجی، نزلادی بخار، تھیر الفاصل، خطرناک انفکشن میں انٹی بائیوٹک کے ساتھ، اور لو بلڈ پریشر میں مفید رہتی ہے۔
مقدار و ترکیب: ابتدا میں ۵۰ ملی گرام سے ۵ ملی گرام تک یومیہ دے سکتے ہیں رفتہ رفتہ کم کرنا

چاہیے۔
منفی اثرات: ٹی بی میں، مقامی انفکشن، زخم معدہ، نفسیاتی عوارض ہڈی نرم ہونے، گردوں کی خرابی
 ذیابیطس شکر، گلا کو ماہائی بلڈ پریشر، عضلات کی کمزوری، انجماد خون کی صلاحیت میں کمی عروق قلبیہ میں
 انقباضی کیفیت اور حمل میں دینا خطرہ سے خالی نہیں۔
مضر اثرات: جسم میں پانی اور نمکیات کا رکنا، ہضم، عضلات و اعصاب جلد آنکھ غد پر برا اثر پڑتا
 ہے۔ قوت مدافعت کمزوری ہوتی ہے۔
احتیاط: کارٹی سون کے مرکبات کو رفتہ رفتہ بند کرنا چاہیے۔
دواؤں کا رد عمل: سیلی سیلیٹ، فینو باربی ٹون، فین ٹائٹن خوردنی دافع تیزابیت ادویہ کے ساتھ دینا
 مناسب نہیں۔

تجارتی مرکبات

BENICORT INJ (P&B LABS)	بہنی کارٹ انجکشن
inj 3x1ml Amp. Rs.16.19	
BENICORT ORAL DROPS (P&B LABS)	بہنی کارٹ ڈراپس
15ml Rs.11.23	
BENICORT TABS (P&B LABS) 25X10 Rs.98.46	بہنی کارٹ ڈراپس
BETACORTIL (PFIZER) 1mg: 10: Rs.4.72	بٹاکارٹیل
BETNILAN (GLAXO)	بٹنی لان ٹیلٹ
0.5mg: 10: Rs.4.96; 1mg: 10 Rs.5.10	
BETNESOL (GLAXO)	بٹنی سول ٹیلٹ
0.5mg: 10: Rs.4.95, 1mg: 10: Rs.9.57	
BETNESOL INJ (GLAXO)	بٹنی سول انجکشن
4mg per ml inj 6x1ml: Rs.5.61	
BETNESOL ORAL DROPS (GLAXO) 15ml:Rs.10.41	بٹنی سول ڈراپس
CELESTONE (FULFORD)	کیلسٹون ٹیلٹ
0.5mg: 10's Rs.5.50, 1mg: 10's Rs.10.91	
CELESTONE PEDIATRIC DROPS (FULFORD)	کیلسٹون ڈراپس
10ml: Rs.10.41	

CELESTONE INJ	(FULFORD) 2ml: Rs.13.82	کھلون انجکشن
CORTIL	(MICRO LABS)	کھول
SOLUBET	(LUPIN) 1mg. 10x10: Rs.61.20	سالو بٹ
SOLUBET INJ	(LUPIN) 4mg per ml inj 3x1ml:Rs.61.20	سالو بٹ انجکشن
SOLUBET ORAL DROPS	(LUPIN)	سالو بٹ ڈراپس
STEMIN	(SWIFT)	اٹے من
0 5mg. 15x10: Rs.99.90, 1mg: 15x10: Rs 189.90		
STEMIN INJ	(SWIFT) 1ml amp Rs.6.60	اٹے من انجکشن
STEMIN ORAL DROPS	(SWIFT) 15ml Rs.13.98	اٹے من ڈراپس
SYSTACORT	(SYSTOPIC)	سٹاکارٹ
0 5mg. 10: Rs.3.90, 1mg. 10: Rs.7.63		
WALACORT	(WALLACE)	ولے کارٹ
Betamethasone 0 5mg tabs 10: Rs.4.15		

CLOBETASONE

کلو بیٹاسون

افعال و منافع: یہ بیرونی استعمال کے لئے کارٹی سون کا مرکب ہے، معمولی انگریزا، جلد کا متورم ہونا، ایسے امراض جن میں دوسری دوائیں بے اثر ہو چکی ہوں اس کا استعمال مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: متاثرہ مقام کو اچھی طرح صاف کر کے دن میں ۳-۴ بار دوا لگائیں۔
 منفی اثرات: انفکشن کے سبب جلد کا متورم ہونا، ہرپیز، چکن پاکس، فنکس کنڈیڈا، بیکٹریا سے ہونے والا انفکشن اور پمفیگس میں اور دوا سے حساس مریضوں کو استعمال نہ کرائیں۔
 احتیاط: انفکشن کی حالت میں مناسب انٹی بائیوٹک کے ساتھ استعمال کرائیں، علاج ۷ دن سے زیادہ جاری نہ رکھیں۔

(تجارتی مرکبات کے لئے بیرونی استعمال کی دوائیں Tropical Preparation دیکھئے)

DEXAMETHASONE

ڈیکسامیٹھاسون

افعال و منافع: صدمات، انفکشن، خون میں زہریلے اثرات، شدید، ری ایکشن، الرجی، تھیرا، الفاصل، جلدی بیماریوں، میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳ سے ۶ ملی گرام تک ضرورت کے مطابق۔

منفی اثرات: ٹی بی میں، ہرپیز سہیلکس، فنگل انفکشن ذیابیطیس ہڈیوں کی کمزوری نفسیاتی الجھن، گلوکوما، زخم معدہ ہائی بلڈ پریشر قلب میں تنگی، رگوں میں خون جمنے کا رجحان گردوں کی کمزوری میں دینا مضر ہے۔
مضر اثرات: بسم میں پانی رکنا، فتور ہضم، عضلات و اعصاب غد و نظام استحالہ Metabolism کی خرابیاں ہو سکتی ہے۔

احتیاط: کارٹی سون کے مرکبات کے ساتھ قوت مدافعت پیدا کرنے والے انجکشن (ویکسین سیرم) نہیں دینا چاہیے دوا آہستہ آہستہ بند کریں۔

دواؤں کا رد عمل: ایلیڈرین، فینوباربیٹون، فین ٹائن ریٹام پی سین مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ دینا نقصان دہ ہے۔

تجارتی مرکبات

ڈیکاڈان انجکشن

DECDAN INJ (MERIND)

4mg per ml inj 2ml Rs. 10 19

ڈیکاڈان ٹبلٹ

DECDAN TABS (MERIND)

0 5mg tabs 10, Rs 2 47

ڈیکسونا انجکشن

DEXONA INJ. (HEALTH CARE (CADILA)

4mg per ml inj 2ml. Rs 9 81

ڈیکسونا ٹبلٹ

DEXONA TABS (HEALTH CARE (CADILA)

0 5mg tabs 10 Rs 2 37

DEXONA ORAL DROPS (HEALTH CARE (CADILA) ڈیکسونا ڈراپس

10ml Rs 5 91

آئی ڈی زون

IDIZONE (IDPL)

tabs: 10. Rs.2 44, inj. Dexamethasone 4mg per Rs 9 58

MYCIDEX INJ (MAC) Rs.10 40

مائی سی ڈیکس

MYCIDEX TAB (MAC) 10 Rs 3 36

مائی سی ڈیکس ٹبلٹ

STEDEX INJ (SWIFT) 2ml vial Rs 9 32

اسٹی ڈیکس

WYMESONE (SWIFT) 10 Rs 2 65

وائی می سون

WYMESONE INJ (SWIFT) 2ml. Rs 10 29

وائی می سون انجکشن

ہائی ڈروکارٹی سون ایسی ٹیٹ

HYDRO CORTISONE ACETATE

اضلاع و منافذ: تحجر الفاصل (بڈیوں کا پھرتا) الرمی، بلغمی جمل کے متورم اور متفتح ہوتے میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی گرام ۵ ملی لٹر محلول میں زیر جلد یا جوف صدر میں لگایا جائے۔ وریڈی یا عضلاتی نہیں لگایا جائے۔

منفی افعال: نی بی کے اثرات، ہرہیز سمپلکس، فنکشن انکھن ذیاطیس بڈیوں کا انحصار، نفیانی انحصار، گلوکوما، زخم معدہ و ضعف عضلات ہائی بلند پریشمر مروق قلبیہ میں غلی، انجماد خون کار حیان، ضعف اردو میں دینا نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: بڈیوں میں انحصار ہونا، جسم میں پانی نمکیات کا عدم توازن زخم معدہ ہو سکتا ہے۔ احتیاط: کارٹی سون مرکبات کے ساتھ ایسوتھی پیدا کرنے والے مرکبات استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

CORT-S (NEON)

4mg per ml inj 2ml vial Rs.8 00

EFCORLIN PELLETS (GLAXO)

EFCORLIN INJ (GLAXO)

HYDROCORTISONE INJ (ROSSEL)

5x2ml Rs 41 00

WYCORT INJ (WYETH)

5ml Rs.22 00

کارٹ ایس

ایف کارلن
ایف کارلن انجکشن
ہائیڈروکارٹی سون انجکشن

والی کارٹ انجکشن

میٹھائل پرینسولون ایسیٹیٹ

METHYL PREDNISOLONE ACETATE

افعال و منافع: بلغمی دمہ، شدید الرجی، جلدی امراض، تھیراٹھاسل، غشاء مخاطی کے ورم میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: دمہ الرجی میں ۸۰ سے ۱۲۰ ملی گرام جلدی امراض میں ۴۰ سے ۱۲۰ ملی گرام بڑے
 جوڑوں کے درد میں ۱۰ سے ۴۰ ملی گرام چھوٹے جوڑوں کے درد میں ۴ سے ۱۰ ملی گرام۔
 منفی اثرات: ہرپیز کمپلکس میں، پوٹوں کے ورم نفسیاتی الجھن ٹی بی، زخم معدہ کھنگ سڈروم،
 آنٹوں کے آپریشن اور وحیدگی میں ہڈیوں کے انکسار ضعف گردہ ذیابیطیس ہائی بلڈ پریشر مقامی اوزر فیکس
 انفکشن میں نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

DEPO-MEDROL	(MAX)	ڈپو میڈورال
Methylprednisolone acetate 40mg per ml inj 2ml:	Rs.42 00	
SOLU-MEDROL	(MAX)	سولو میڈورال
500mg 8ml amp Rs 440 00, 1g. 16ml amp	Rs.715.00	
UNIDROL	(UNISEARCH)	یونی ڈرول
40mg per ml inj 2ml vial	Rs.62 00, 1ml vial	Rs 37 50

PREDNISOLONE

پرینسولون

افعال و منافع: دمہ شدید الرجی، لیوکیما، تھیراٹھاسل، کولے گن ڈیزیز جلد کا متورم ہونا گردوں کی
 بیماریاں، ورم قولون، چھالے پڑنا ورم امعاء جلد میں گانگھیں پڑنا مفاصلی ورم غلاف القلب کمر کی ہڈی میں
 ورم، ہیملو لائی ٹک انیمیا قمر امین کی کمی کے سبب زیر جلد نرف الدم میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: خوراک کا تعین مرض کی کیفیت کے مطابق، مختصر مدت کے لئے ۲۰ سے ۳۰ ملی
 گرام ابتدائی چند دن تک پھر آہستہ آہستہ ۲.۵ سے ۵ ملی گرام کم کرتے رہیں تھیراٹھاسل کے لئے ۷.۵
 سے ۱۰ ملی گرام یومیہ ۱ سے ۳ ہفتہ تک دی جائے۔
 منفی اثرات: شدید انفکشن میں اس انفکشن کی خصوصی دوا کے ساتھ دی جائے۔

مضر اثرات: موتیابند، گلوکوما، ہڈیوں کی خرابی، زخم معدہ بچوں میں نشوونما میں کمی۔
احتیاط: حمل، دیاہلیس اور مدافعتی انجکشن سے احتیاط رکھیں۔

تجارتی مرکبات

DELTACORTAL	(PFLIZER)	ڈیلٹاکارٹل
5mg 10 Rs 11 50, 10mg. 10. Rs 21 65		
HOSTACORTIN	(HOECHST)	ہوسٹاکارٹن
Prednisolone 5mg 10. Rs 3 35		
WYSOLONE	(WYETH)	والی سولون
5mg 10. Rs 4 94 10mg. 10. Rs 14 00 20mg. 6. Rs. 16.00		

TRIAMCINOLONE

ٹرائم سی نولون

افعال و خواص: دمہ الرجی، جلدی امراض، تھیراٹک (جوڑوں کا پھرتا) مفاصلی اور ام کلاہ گردہ کی خرابیاں کو لے گن ڈیزیز (نرم ساختوں میں خرابی) میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۳۳ کلوگرام وزن سے زائد وزن والوں کو ۸ سے ۱۶ ملی گرام یومیہ دن میں ایک متعین وقت پر دی جائے ۳۳ کلو وزن سے کم کو ۴ سے ۱۲ گرام یومیہ، اتفاق ہونے پر مقدار کم کر کے ۱ سے ۲ ملی گرام موثر مقدار تک دینا چاہیے۔ انجکشن ۲.۵ سے ۱۵ ملی گرام جوڑوں کے درمیان یا ۲ سے ۳ ملی گرام زیر جلد لگائیں، وریدی نہیں لگانا چاہیے عضلاتی انجکشن ۴۰ سے ۶۰ ملی گرام گہرا کوہے پر لگائیں پولن الیٹھما (الرجک دمہ) میں ۴۰ سے ۱۰۰ ملی گرام کا ایک ہی انجکشن لگائیں بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔
احتیاط: فنکشنل اور وائرل انفکشن میں اس کے ساتھ مخصوص دوا ضرور دینا چاہیے حاملہ اور مرضہ کو

احتیاط، زیادہ دن استعمال نہ کریں

مضی اثرات: زخم معدہ، آنتوں میں خرابی، ہائی بلڈ پریشر، ہڈیوں کی کمزوری، دیاہلیس میں استعمال نہ کرانیں، مدافعتی انجکشن (ویکسین، سیرم) ساتھ میں نہ دیں۔

مضر اثرات: زخم معدہ آنتوں کی خرابی، ہائی بلڈ پریشر، ہڈیوں میں کمزوری دیاہلیس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ طویل عرصہ علاج سے کلاہ گردہ کے فعل میں کمی آتی ہے۔

تجارتی مرکبات

KENACORT	(SARABHAI)	کیناکورٹ ٹبلٹ
Triamcinolone 4mg tabs. 10. Rs 15.00		
KENACORT INJ	(SARABHAI)	کیناکورٹ انجکشن
10mg and 40mg 1ml vial Rs.37.21; 10mg. 1ml s.19 17		
LEDERCORT	(LEDERLE) 4mg tabs 10: Rs 14.74	لیڈرکورت
TRICORT-10	(CADILA)	ٹرائی کورت ۱۰
10mg per ml inj 1ml amp Rs.11 00		
TRICORT-40	(CADILA)	ٹرائی کورت ۴۰
40mg per ml unj 1ml amp Rs.26 98		

غده درقیہ و انتی غده درقیہ ادویہ

THYROID, ANTI THYROID DRUGS

CARBIMAZOL

کاربیمازول

افعال و منافع: مرض گھٹیکا Goitre، غده درقیہ کے پھول جانے غده درقیہ کے آپریشن کی تیاری کے لئے مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: ہالٹوں کو ۱۵ سے ۳۵ ملی گرام روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے بعد کو ۲.۵ سے ۲.۵ ملی گرام روزانہ ۱۲ ماہ تک بچوں کو ۵.۵ سے ۷.۵ ملی گرام ابتدا میں کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔
منفی اثرات: ہوائی نالی کی رکاوٹ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، سکی، درد سر، جوڑوں میں درد و عظام میں کمزوری، فتور مضمر، حمل میں بچے کو Goitre بن سکتا ہے حلق میں جلن و سوزش۔

احتیاط: منہ میں زخم ہونے پر دوا روک دینا چاہیے، حمل میں استعمال سے گریز کریں۔

تجارتی مرکبات

NEO-MERCAZOLE

(NICHOLAS)

نیو مرکازول

Carbimazole 5mg ; tabs 100, Rs.82.90

THYROZOLE

(CADILA)

تھائیروزول

Carbimazole 5mg; tabs 100, Rs.20.60

IODINE COLLOIDAL

آیوڈین کولائیڈل

افعال و منافع: سادہ اور زہریلے مرض گھٹیکھا Goitre میں، اندمال زخم میں، وائٹوں اور ساختوں کی مضبوطی میں۔ دودھ کی مقدار کم کرنے، آیوڈین کی کمی، حتمی اور بے وقوفی Cretinism میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۳۰ ملی گرام پانی میں ملا کر کھانے کے بعد دن میں ۲ بار پلائیں۔
منفی افعال: آیوڈین سے الرجی یا ناقابل برداشت ہونے پر استعمال نہیں کرانا چاہیے۔
مضر اثرات: ذائقہ میں معدنی اثر، تھوک کی زیادتی، ناک آنکھ حلق سے رطوبت کا اخراج اسہال آسکتے ہیں۔

احتیاط: مضر اثرات میں دوا روک دیں۔

تجارتی مرکب

COLLOSOL IODINE ORAL

(DUPHAR)

کلوسول آیوڈین

Iodine 8mg per 5ml liquid 115ml: Rs.11.80

THYRO GLOBOLIN

تھائر و گلوبولین

افعال و منافع: تھائی رائکسین کی کمی کی حالت میں اس کے بدل کے طور پر دی جاتی ہے جسم میں تھائی رائکسین کی کمی، حتمی اور بے وقوفی Cretinism چہرے پر تھج دورم میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ابتدا میں بہت کم مقدار میں دیں رفتہ رفتہ مقدار میں اضافہ کریں مرض پر قابو پانے کے لئے ۳۲.۵ ملی گرام سے ۱۹۵ ملی گرام تک روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دیں۔
منفی اثرات: امراض قلب، الارینٹالین کی کمی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: درد سر بے چینی پسینہ کی کثرت، گھبراہٹ وجع القلب، آنٹوں کی حرکات میں تیزی
حیض کا بے ترتیب آنا قلب کا قلیل ہونا۔

احتیاط: زیادہ مقدار میں غدہ درقیہ کے افراز کی زیادتی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

PROLOID

(PARKE DAVIS) tabs 50: Rs.76.60

پرو لائیڈ

THYROXIN SODIUM

تھائی راکسین سوڈیم

افعال و منافع: حلق دے دقتی، چہرے پر درم، مرض گھٹو Goitre تھائی رائیڈ ایکسٹریکٹ کی کمی،
غدہ درقیہ کی خرابی یا عدم موجودگی میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ابتدا میں ۵۰ سے ۱۰۰ ملگرام، رفتہ رفتہ مقدار میں اضافہ کیا جائے مرض پر قابو
پانے کے بعد مستقل علاج کے لئے ۱۵۰ سے ۳۰۰ ملگرام یومیہ دے سکتے ہیں۔

متنفی افعال: غدہ درقیہ میں زہریلا اثر، ہارٹ ایکٹ، اور ایڈرنیالین کی کمی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: حرکات قلب کا بے ترتیب ہونا، وجع القلب تشنج عضلات درد سر، رخساروں پر سرخی،
بے چینی پسینہ کی زیادگی، اسہال وزن میں کمی۔

احتیاط: قلب میں خرابی Myocardial Infarction اور نیالین کی کمی ایام رضاعت میں احتیاط
برتن۔

دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، کارہامازی پائن، فین ٹائن، انسولین، خوردنی دافع، زیابطیس
ادویہ، پروپرانولول دافع ڈپریشن ادویہ کے ساتھ اس کا اثر خراب ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

ELTROXIN
ROXIN

(ALENBURYS) 0.1mg; tabs 100, Rs.25.00
(CADILA) 100mcg; tabs 100: Rs.11.05

الٹراکسین
روکسن

درم و سہج دور کرنے والی جراثیم کش مدر بول ادویہ

ANTI SEPTIC & DIURETICS

BENZ THIAZIDE

بنز تھیازائیڈ

افعال و منافع: یہ دوا تنہا یا ہائی بلڈ پریشر کو روکنے والی ادویہ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ معمولی اور درمیانی درجہ کے ہائی بلڈ پریشر، درم و سہج قلب میں تنگی جگر میں املاء گردوں کا علامہ Nephrotic Syndrome میں مفید و مجرب ہے۔

مقدار و ترکیب: سو جن Oedema میں ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے ہائی بلڈ پریشر میں ۲۵ ملی گرام دن میں ۲ بار یومیہ۔

منفی افعال: خون میں پوٹاشیم کی زیادتی میں گردوں کے فیل ہونے میں اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: حملی، اسہال، تھج اعضاء ضعف، جلد پر داغ پڑنا، درد سر، خون غیر طبیعی، منہ خشک۔

احتیاط: ضعف جگر و گردہ میں، ذیابیطیس، خون میں تیزابی مادے کی زیادتی، نفرس حمل ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: پوٹاشیم کے استعمال کے دوران، پوٹاشیم کے مرکبات، لیسٹیم ڈیجیٹالس انڈو میٹھاسون ہائی بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ ان کے ساتھ دینا نقصان دہ ہے۔

BUMETANIDE

بومی ٹانائیڈ

افعال و منافع: درم Oedema عروق قلبیہ میں تنگی اور رکاوٹ استقاء ذقی، گردوں کی خرابیاں Nephrotic Syndrome ہائی بلڈ پریشر، حاملہ کی سو جن، خون میں زہریلا مادہ شامل ہونے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱ سے ۳ ملی گرام یومیہ زیادہ سے زیادہ ۳۰ ملی گرام، ہائی بلڈ پریشر میں ۰.۵ سے ۱ ملی گرام دن میں ۱ بار بچوں کو ۰.۳ سے ۰.۶ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے دیں۔

منفی اثرات: جگر کا کوما، جسم میں پانی کی شدید قلت، پیشاب بند ہونا، گردوں کی خرابی کے سبب پیشاب بند ہو تو دوا نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: زیادہ دن استعمال سے جسم میں پانی کی قلت پیشاب کی زیادتی عضلات میں درد، جلد پر داغ یا بٹیس کے مریضوں میں ہلڈ شوگر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

احتیاط: زیادہ دن استعمال کے دوران سیرم الکٹرو لائٹ کی جانچ کراتے رہیں پیشاب کی ٹالیوں کی رکاوٹ میں حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: دافع ہلڈ پریش اور مد رات بول ادویہ کے ساتھ خراب اثرات پیدا ہوتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

BUMET

(MONTARI)

بیو مٹ

Bumetanide 1mg : tabs: 10: Rs.4.22

CHLORTHALIDONE

کلور تھالی ڈون

افعال و منافع: قلب جگر و گردوں کی خرابی کے سبب ہونے والا ورم، ہائی ہلڈ پریش، حالت حمل کا ورم ناکسہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام یومیہ مرض پر کنٹرول ہو جانے پر ۱۰۰ ملی گرام ہفتہ میں ۲ یا ۳ بار ورم کی حالت میں ۲۰۰ ملی گرام صبح کو ایک خوراک ہائی ہلڈ پریش میں ۱۰۰ ملی گرام یومیہ زیادہ عرصہ علاج کے لئے ۵۰ ملی گرام ہفتہ میں ۲ یا ۳ بار۔

منفی اثرات: گردوں کے فیل ہونے کی حالت میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: آنٹوں و معدہ کی خرابیاں جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی قلبی حرکات کا بے ترتیب ہونا، روشنی سے نفرت جلد پر داغ نقرس خون کا غیر طبعی ہونا بے چینی بصارت میں فرق ضعف باہ۔ لو ہلڈ پریش چکر آنا اور برقان ہو سکتا ہے۔

احتیاط: حمل، ایام رضاعت، نقرس، ذیابٹیس، جگر گردوں کے فعل میں خرابی، معمر افراد میں، دوا کے ساتھ پوٹاشیم کی اضافی مقدار دینا چاہیے۔

دواؤں کا رد عمل: دافع بلند پریشردوائیں، ڈیجی ٹیلس، لٹھیم، انسولین خوردنی دافع ذیابیطیس دوائیں دافع درم ادویہ (Nsaids) نقصان دہ ہیں۔

تجارتی مرکبات

CLOTHALTON	(S.G. PHARMA)	کلو تھالٹن
15mg tabs 10. Rs.3 45		
HYTHALTON	(S.G. PHARMA)	ہائی تھالٹن
40mg tabs 10 Rs.25 47		
CATAPRES DIU	(GERMAN REMEDIES)	کیٹاپریس
0 1mg tabs 10. Rs.7 73		

CLOPAMIDE

کلوپامائیڈ

افعال و منافع: قلبی عروق میں تنگی (C.C.F) کے سبب ہونے والا درم، تنج، جگر گردوں کی نرابی معمولی اور درمیانی ہائی بلند پریشردوائیں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ہائی بلند پریشردوائیں ۵ سے ۲۰ ملی گرام یومیہ درم میں ۱۰ سے ۵۰ ملی گرام یومیہ صرف صبح کو کھلائیں۔

متقی افعال: جگر اور گردوں کی شدید بیماریاں، شدید درم گردہ، پوٹاشیم کی کمی، ایڈین، ڈیزیز حمل اور ایمر ضاعت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی تے، ہلکا درد سر، منہ خشک اسہال تشنج عضلات بے چینی، الجھن، نامردی، لو بلند پریشردوائیں میں گراوٹ ہیملاتی ٹک ایسیا، زیر جلد زنف الدم آنکھوں کے سامنے پتھے اڑنا۔

احتیاط: ذیابیطیس، نفیس، مددات بول کا استعمال، گردوں جگر کے لیل ہونے میں اس کا استعمال ممنوع ہے۔
دواؤں کا رد عمل: لٹھیم، ڈیجی ٹیلس دافع درم و درم ادویہ NSAID مرکزی نظام عصبی کو کمزور کرنے والی ادویہ، پروبے نی سڈ، کلورڈایازی پاکسائیڈ کے ساتھ مضر ہے۔

تجارتی مرکب

BRINALDIX	(SANDOZ)	بری نال ڈیکس
Clopamide 20mg tabs: 100. Rs 70.25		

ڈائی پوٹاسیم ہائیڈروجن سائٹریٹ

DIPOTASSIUM HYDROGEN CITRATE

افعال و منافع: خون میں تیزابیت کا اثر، پیشاب میں جلن، سلفونامائیڈ کے استعمال سے گردوں میں رکاوٹ لگنے، ابال سے ہونے والی خون میں تیزابیت میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۰ گرام ایک پیالی پانی میں ملا کر دن میں ۳ بار۔

منفی اثرات: زیادہ مقدار میں، اینڈ ریٹل کی کمی میں، گردوں کے نکل ہونے میں، چوٹ ضربہ سقط، سردی صوبیہ کھانسی میں نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: پانی میں حل کر کے استعمال کرائیں، گردہ اور کلاہ گردہ کی خرابی میں پانی کی شدید کمی میں تشویش مناسبات میں پوٹاسیم کے مرکبات کے ساتھ احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

ALKANIL INGA SYRUP

(INGA)

الکال انکارپ

110ml Rs 12 76

DIPOSOL

(STADMED) 114ml Rs 9 78

ڈپوسول

ڈائی سوڈیم ہائیڈروجن سائٹریٹ

DI SODIUM HYDROGEN CITRATE

افعال و منافع: بخار کی تیزی، گرم گردہ و مثانہ، پیشاب میں رسوب آنا، پیشاب میں جلن سخت گرمی میں کام کرنا، سلفونامائیڈ دویہ کے ساتھ حالت حمل میں خون میں زہریلے مادے کو دور کرنے کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۰ گرام سے ۲۰۸ گرام دن میں ۳ بار پانی ملا کر ۱۲ سال تک کے بچوں کو نصف خوراک ۲ سال کے بچوں کو چوتھائی خوراک۔

منفی اثرات: سوڈیم سے پرہیز والے مریضوں میں ہائی بلڈ پریشر اور قلب کے نکل ہونے میں۔

احتیاط: میتھیٹامین مینڈی لیٹ استعمال کرنے والے مریضوں میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

ALKACITRATE	(CARMINOL)	الکاساٹریٹ
100ml Rs 12 60		
ALKANIL-PSYRUP	(INGA) 110ml Rs. 12.76	الکانل
ALKASOL	(STADMED) 100ml: Rs. 16 00	الکاسول
CITAL	(INDOCO) 100ml Rs. 16.50	سیٹال
CITRALKA LIQUID	(PARKEDVIS)	سائیٹرل کا
114ml Rs. 19 69		
ORICITRAL	(PHARMA RESEARCH)	لوری سائٹرل
100ml Rs 18 00, 450ml. Rs 55.00		
SALZER	(PREMPHARMA)	سالڈر
100ml Rs. 20 50		
SIOCITRATE (ALBERT DAVID)	114ml. Rs. 11.62	سیو سائٹرٹ

FRUSEMIDE

فروسی مائیڈ

افعال و منافع: قلب، پھیپھڑوں، گردوں اور دماغ میں پانی جمع ہونے Oedema اور بلڈ پریشر - مفید ہے۔ ہاتھ پیروں اور منہ پر ورم میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اوڈیما میں ۲۰ سے ۸۰ ملی گرام دن میں ایک بار ایک دن نانڈ کر کے صرف صبح کو ہائی بلڈ پریشر میں ۴۰ ملی گرام دن میں ۱ بار بچوں کو ۲ سے ۴ ملی گرام فی کلو گرام کے حساب سے۔

منفی اثرات: جگر کی خرابی غشی (Coma) کی حالت لو بلڈ پریشر خون میں پانی نمکیات کی کمی۔ ایڈی کنڈیز Addison میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ہضم کی خرابیاں بے چینی جلد پر داغ خون کی غیر طبعی کیفیت کھلی، سستی کاہلی میٹیم کی کمی نفسیاتی الجھن سماعت کی خرابی، ورم ہائفراس ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں ذیابیطس خون میں تیزابیت، ورم غدہ قداسیہ نقرس حمل اور رضاعت میں۔

دواؤں کا رد عمل: پوٹاسیم کے مرکبات لیٹھیم کے مرکبات لیٹھیم، ڈی جی ٹیس امینو گلو کو سائیڈ سفالو

سپیرین دافع ورم ہادیہ (NSAID) بلڈ پریشر کم کرنے دافع ذیابیطیس اور مرخی عضلات ادویہ کے
ماتحت دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

AMIFRU-40	(ELDER)	10 Rs 10 85	ایمی فرو
AQUAMIDE	(SUN PHARMA)	10 caps Rs 22 10	ایکھو لائیڈ
DIUOCONTIN-K CONTINUOUS	(MODI-MUNDI PHARMA)	10 tabs Rs 24 75	ڈی کون ٹین
FRUMIL	(GENO)	10 Rs 6 80	فرومل
FRUSELAC	(LUPIN)	10 Rs 31 22	فروسی لیک
FRUSENEX	(GENO)	40mg 10 tabs Rs 2 40, 100mg 10 tabs Rs 6 88	فروسی ٹیکس
LASILACTONE 50	(HOECHST)	10, Rs 28 89	لاسی لکٹون
LASIRIDE	(HOECHST)	10 Rs 7 12	لاسی رائیڈ
LASIX	(HOECHST)	40mg tabs 10 Rs 3 55	لاسکس مبلٹ
LASIX INJ	(HOECHST)	10mg per ml inj 10x2 ml Rs 24 66	لاسکس انجکشن
SPIROMIDE	(SEARLE)	10: Rs.28 56	سپائیرو مائیڈ

ہائیڈروکلور تھیازائیڈ

افعال و منافع: یہ دو اگردوں سے نمکیات اور پانی کے اخراج میں اضافہ کرتی ہے۔ جس سے بلڈ پریشر کم ہو جاتی ہے۔ قلب و گردوں کے سبب ہونے والا ورم Oedema قبل از حیض تناؤ ذیابیطیس سادہ ہائی بلڈ پریشر اور دودھ کو کم کرنے کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ورم و تھج میں ۲۵ سے ۷۵ ملی گرام یومیہ دو خوراکوں میں پہلی خوراک صبح ناشتہ کے بعد دوسری دوپہر کھانے کے بعد ہائی بلڈ پریشر میں ۲۰ سے ۵۰ ملی گرام دن میں ابار متقی افعال: جگر کی خرابی کو، پیشاب بند گردوں کے قیل ہونے میں استعمال مضر ہے۔
مضر اثرات: پوٹاسیم کی کمی، جلد پر دلغ پڑنا، روشنی سے نفرت، نقرس خون کا غیر طبعی ہونا۔

احتیاط: ذیابیطس، جگر اور گردوں کی خرابی، نقرس، حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: بلڈ پریشر کم کرنے والی، ڈیجیٹلٹس سے اجتناب کریں۔

تجارتی مرکبات

BIDURET

(CROYDON) 10: Rs.12.09

لی ڈورسٹ

ESIDREX

(H. CIBAGEIGY)

ایسی ڈریکس

50mg; tabs 10x10: Rs.61.04

ہائیڈروفلومیٹھیزائیڈ HYDRO FLUMETHIAZIDE

افعال و منافع: یہ عموماً اسپائرولکون کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، جسم میں پانی جمع ہونا، تھج، ورم Oedema، استقامتی عروق قلبیہ میں تنگی گردوں کی سستی میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ہائی بلڈ پریشر میں ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام کھانے کے ساتھ ایک خوراک میں یا کئی خوراکیں میں تقسیم کر کے بچوں کو ۳، ۳ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے دیں۔

منفی اثرات: گردوں کی شدید خرابی، دوا سے حساس مریضوں کو دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: پوناشیم کی کمی، جلد پر داغ پڑنا، روشنی سے نفرت، نقرس خون کا غیر طبعی ہونا، الجھن۔

احتیاط: ذیابیطس، جگر اور گردوں کی خرابی، نقرس، حمل ایام رضاعت میں احتیاط برتیں، دوران علاج پوناشیم کی اضافی مقدار دیں۔

دواؤں کا رد عمل: بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ، لیجیم ڈیجیٹلٹس کے ساتھ نہ دیں۔

تجارتی مرکبات

ALDACTIDE

(SEARLE) 25mg tabs. 10: Rs.14.33

الڈاکٹائیڈ

MANNITOL

منی ٹال

افعال و منافع: یہ مدرات بول کے ساتھ بطور معاون استعمال کی جاتی ہے۔ گردوں کے فیل ہونے، گردوں کی زہریلے مادوں سے حفاظت تیز دواؤں مثلاً کاربن ٹرائکلورائیڈ وغیرہ کے خراب اثرات دور کرنے کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام (۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی لٹر) ۲۴ گھنٹوں میں وریدی دیا جائے
زیادہ سے زیادہ ۱۰۰۰ ملی لٹر دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: گردوں کے خراب ہونے کے سبب پیشاب کا بند ہونا، پیپروں میں شدید تنؤ، غی
جریان خون جسم میں پانی کی شدید کمی، نمکیات کے تناسب میں کمی دینا مضر۔

احتیاط: علاج کے دوران جسم میں پانی نمکیات Electrolytes پر دھیان رکھیں۔

POLY THIAZIDE

پالی تھیازائیڈ

افعال و منافع: یہ ایک غیر سیمابی مدربول دوا ہے، بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱ سے ۲ ملی گرام پور میہ، بلڈ پریشر کم کرنے کیلئے ۲ سے ۴ ملی گرام۔

منفی اثرات: پیشاب بند ہو جانے، تھیازائیڈ سے حساس مریضوں کو دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: بھوک کی کمی، بے چینی مٹی، تھکاوٹ، ہاتھ پیروں میں تشنج، اسہال قبض، پر کان، چکر آنا

سین، درد سر، جسم کی رنگت پیلی، لیوکوسائٹ، قمر امین کی کمی، روشنی سے نفرت جلد پر داغ پڑنا پتی

اچھلتا، بولبلڈ پریشر، بلڈ شوگر میں کمی، کمزوری، بے چینی۔

احتیاط: جسم میں پانی اور نمکیات پر نگاہ رکھیں، سیرم ایوڈین کو چیک کرتے رہیں۔

دواؤں کا رد عمل: شراب، باربیٹون کے مرکبات اور غشیات کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

SPIRONOLACTONE

اسپائیرونولکٹون

افعال و منافع: ہائی بلڈ پریشر، قلب کی کمزوری گردے اور جگر کے سبب ہونے والا ورم

Oedema، عورتوں میں بالوں کی زیادتی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام کھانے کے ساتھ روزانہ ۱ خوراک میں یا ۲-۳ خوراکیں

میں تقسیم کر کے۔

منفی اثرات: پیشاب بند ہو جائے، پوٹاشیم کی زیادتی، گردوں کی شدید خرابی اور عدم کارکردگی دوا

سے حساسیت کی حالت میں استعمال نہ کریں۔

مضر اثرات: مردوں میں پھتالوں کا بڑا ہوتا، ہضم کی خرابیاں، جلد پر داغ خشکی درد سر، اجمن ہو جاتی ہے۔

احتیاط: حمل میں احتیاط رکھیں دوران علاج سیرم پانی نمکیات کی جانچی کراتے رہیں نوجوانوں کو زیادہ ان استعمال نہ کرائیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: پوتا سیم کے مرکبات، لیٹھیم، ایجی ٹیس، بلڈ پریشر کم کرنے والی دوا، یہ کے ساتھ اس کا استعمال مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

ALDACTONE	(SEARLE)	ال اکتون
100mg 10 Rs 58 83		
AQUAMIDE	(SUN PHARMA)	اکوامائیڈ
caps 10x10 Rs 220 00		
FRUSELAC	(LUPIN) 10x10 Rs 300 40	فروسی لیک
LACTONE	(SUN PHARMA)	لکٹون
25mg 10x10 Rs 110 00 100mg. 6 Rs 25 20		
LASILACTONE 50	(HOECHST) 10 Rs 28 84	لاسی لکٹون ۵۰
LASILACTONE 100	(HOECHST) 10. Rs 53 94	لاسی لکٹون ۱۰۰
SPIROMIDE	(SEARLE) tabs 10 Rs 28 27	سپائرومائیڈ

TRIAM TERENE

ٹرائم ٹیرین

افعال و منافع: قلب و جگر، گردوں کی خرابی کمزوری کے جب ہونے والی سوجن، استقاء، Oedeme معمولی اور اوسط درجے کے ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اولیٰ ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار کھانے کے بعد ہائی بلڈ پریشر میں ۵۰ ملی گرام دن میں ۲ بار۔

منفی افعال: پوتا سیم کی زیادتی، گردوں کی شدید خرابی میں اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی اسہال، تشنج، کمزوری، جلد پر داغ، درد سر، مت خشک خون کی غیر طبیعی حالت ہوتا۔

احتیاط: جگر و گردوں کی عدم کارکردگی میں، ذیابیطیس، خون میں تیزابیت، نقرس، حمل اور رضعت سے
ایام میں احتیاط برتیں۔
دواؤں کا رد عمل: پونا شیم کے مرکبات اور رات کا استعمال، لیتھیم، ڈیجی ٹالس، انڈومیتھ سین بند
پریشر کم کرنے والی ادویہ کے ساتھ اس کا استعمال ضرر رساں ہے۔

VASOPRESSIN

واسوپریسین

افعال و منافع: ذیابیطیس سادہ، بلند پریشر میں فوری اضافہ کے لئے، آپریشن کے دوران ہونے والے
صدما، آنتوں کی سستی، نفخ شکم، ہرہیز زائٹر، متعدد پھنسیاں، غذائی نالی کے شدید جریان خون کی
لاجواب دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ذیابیطیس سادہ میں ۵ سے ۱۰ یونٹ زیر جلد یا عضلاتی دن میں ۲-۳ بار لگائیں۔
منفی اثرات: مرگی، وجع القلب، ہائی بلند پریشر، مفاصلی تکالیف حمل و دم گردہ میں دینا خطرناک ہے۔

تجارتی مرکب

PETRESIN KOREA

(SHREE GANESH)

پٹری سن کوریا

in 20 u / ml Rs. 130.00

XIPAMIDE

زیپامائیڈ

افعال و منافع: قلب و جگر و گردوں کی خرابی اور وجع المفاصل کے سبب ہونے والا اورم Oedema
حمل کے آخری ایام میں ورم و حج میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام ایک خوراک صرف صبح کو، بلند پریشر کم کرنے والی دوا کے
ساتھ مقدار کم دی جائے۔

منفی افعال: جسم میں پانی اور نمکیات Electrolyte کی کمی میں، گردوں کی خرابی اور صدمہ
Coma کی حالت میں نہیں دینا چاہیے۔

مستمر اثرات: خون میں پونا شیم کی کمی، ہضم کی خرابی اور پکر آنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں، نقرس جگر اور گردوں کی خرابی میں ذیابیطیس ورم غده قد امیہ اور ایام

رضاعت میں احتیاط رکھیں دوران علاج پوٹاشیم کی مقدار میں اضافہ کر دیں۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ، ذیابیطیس، لیتھیم کے ساتھ خراب اثرات
مرتب ہوتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

XIPAMID

(GERMAN REMEDIES)

زپامائیڈ

Xipamide 20mg tabs: 10: Rs.23.42

انٹرا پیروی ٹونیل ڈیالائیسس سلوشن

INTRA PERITONEAL DIALYSIS SOLUTION

افعال و منافع: گردوں کے ٹیل ہونے خون میں پوٹاشیم کی زیادتی، زہریا تیز ادویہ کے اثرات کا
گردوں کے ذریعہ اخراج کرنا، جسم میں پانی اور نمکیات کا تناسب درست کرنے قلب اور گردوں کے
فعل میں رکاوٹ جب کہ عذرات ٹیل ہو جائیں، گردوں اور جگر کے سبب ہونے والا اورم Oedema
اور کوما کی حالت میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: واحد ایکسینج سے ۲ لٹر پانی کا اخراج کیا جاسکتا ہے، عموماً ۱۲ سے ۳۰۔ ایکسینج مرض
کے حساب سے لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

منفی اثرات: ورم باریطون ناسور مقعد، آنت کا اپریشن شکم کے امراض میں دینا مضر ہے۔

احتیاط: وریڈی راہ سے یہ سلوشن نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکب

INTRAPERITONEAL DIALYSIS

(LACTATE BPC 540 ml)

Mount Mettur 540 ml: Rs.9.00

Krishna Keshav 1000ml: Rs.31.00

انٹرا پیروی ٹونیل ڈیالائیسس

METHENAMINE MANDELATE میتھی ٹامین مینڈی لیٹ

افعال و منافع: درم کردہ، درم مٹانہ، دیگر امعاء بول کے نقلہن میں مفید و موثر ہے۔ پیشاب کو براہیں اثرات سے پاک کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: اگر ام دن میں ۲ بار کھانے کے بعد ۶ سے ۱۲ سال کے بچوں کو ۰.۵ گرام دن میں ۲ بار دی جائے۔

منفی افعال: گردوں کی خرابی میں دینا نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: معدہ آنتوں کے فعل میں خرابی جلد پر داغ پڑتا۔

احتیاط: علاج کے دوران الکلائن (کھاری) دواؤں اور غذاؤں سے پرہیز رکھیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: سلفونامائیڈ، اسکاربک ایسڈ اور ایسینیم کلورائیڈ کے ساتھ خراب نتائج نکلتے ہیں۔

MANDELAMINE

(PARKEDAVIS)

مینڈلائین

tabs 0.5g 40, Rs 35 80 1g 20, Rs 34 47

NALIDIXIC ACID

نالی ڈک سک ایسڈ

افعال و منافع: یہ دوا گرام منفی Gram Negative جراثیم سے پیدا ہونے والے آلات بول کے نقلہن میں اور دستوں میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: اگر ام دن میں ۴ بار ۷ دن تک بچوں کو ۶۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے کلائیں۔

منفی افعال: دروں کی ہسٹری، حساسیت، حمل کے پہلے ۳ ماہ میں اور ۳ ماہ سے کم عمر کے بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: نظام ہضم اور نظام عصبی اور بصارت میں خلل جلد پر داغ خون میں غیر طبعی کیفیت دور سے روشنی سے نگر تہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی، سانس کی کمزوری میں علاج کے دوران سورج کی تیز شعاعوں سے بچیں۔

دواؤں کا رد عمل: مائع انجماد خون ادویہ، پروپینی سڈ، نائٹرو فورن ٹان اور انٹی ٹیکلریا کے ساتھ دینا نقصان دہ ہے۔

تجارتی مرکبات

GRAMONEG (RANBAXY)	گرامونیک
500mg tabs 4, Rs. 18 72	
GRAMONEG SUSP (RANBAXY)	گرامونیک سرپ
300mg, per 5ml susp 30ml, Rs. 18 50; 60ml, Rs. 32.00	
NADIX ACUTAB (TROIKAA)	ناڈکس اکیوٹیب
300mg disp tabs: 6: Rs 16.50	
NEGADIX (CFL) 500mg: tabs 10, Rs 50 75	ناڈکس
ULIX P (BLUE CROSS)	یولکس
150mg, dispersible flavoured tabs: 150mg 17 00	
URODIXIC (DEEPHARMA)	یوروڈیک
500mg, phenazopyridine hcl 50mg: tabs: 6. Rs. 23.10	
UTIDIX (PHARMASIA)	یولیڈکس ہلیٹ
500mg tabs: Rs. 596 20 per box.	
UTIDIX SUSP (PHARMASIA)	یولیڈکس سرپ
300mg per 5ml susp. 30ml: Rs 26.87	

NITROFURANTOIN

نائٹرو فورن ٹان

افعال و منافع: درم مثانہ، درم گردہ، حوض گردہ، تناسلی و بولی اعضاء کے انفکشن کی مفید اور موثر دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام روزانہ ۴ مرتبہ کھانے کے ساتھ بچوں کو ۶ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی اثرات: شدید جھس بول گردوں کے فعل کی خرابی ایک ماہ سے کم عمر بچوں کو دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: جلد پر داغ برقان اسنو فلیا، جاڑا بخار سینہ میں درد سانس میں سختی، کھانسی عسبی درد ہضم کی خرابیاں خون میں غیر طبی کیفیت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: کھاری دواؤں سے اجتناب کریں۔

دواؤں کا رد عمل: میکنیشیم ٹرائی سیل کیٹ، پروپینی سڈ سلفن پائی رازین کوئی نولون کے ساتھ نہیں دینا

پا ہے۔

تجارتی مرکبات

FURADANTIN	(SMITHKLINE)	فورانٹین ٹبلٹ
50mg 10 Rs 4 90, 100mg 10 Rs 5 40		
FURADANTIN SUSP	(SMITHKLINE)	فورانٹین سرب
25mg, per 5ml susp 60ml, Rs 7.55		
NEPHROGESIC	(ETHNOR)	نفروجے سک
50mg tabs, 10. Rs 15 59		

OIL OF SANDAL WOOD آئل اف صندل وڈ

افعال و منافع: آلات بول کے انفکشن پیشاب کی جلن سوزاک میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۳۰ ملی لٹر سے ۱۵۰ ملی لٹر شکر میں ملا کر کھلائیں اوپر سے دودھ چلائیں۔

PHENAZO PYRIDINE فینازوپائی ری ڈین

افعال و خواص: اعصاب بول کی اندرونی جھلی (خشاء مخاطی) کے ورم آلات بول کے شدید انفکشن، ورم حوض گردہ ورم مثانہ، ورم غدہ قدامیہ اور نائزہ کے ورم و شدید درد میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار کھلائیں۔

مضی افعال: پیشاب بند ہونے، گردوں کی خرابی، حمل ایک ماہ سے کم عمر بچوں اور دوا سے حساس مریضوں میں مہلک ہے۔

مضر اثرات: ہضم کی خرابیاں، الرجک، ری ایکشن، خون میں خرابی، نیولائی تک انیمیا، اور لیوکوسائٹ کی کمی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں پیچیدوں کی تکلیف میں احتیاط برتیں۔
 دواؤں کا رد عمل: منکحہم لڑائی سلی کیٹ، پروڈیسیڈ، سلفن پاکی رازون کوئی لولون کے ہر اودینا
 ناسن دہ ہے۔

تجارتی مرکبات

NEPHROGESIC (ETHNOR) tabs 10 Rs 15 59
 PYRIDIUM (WARNER)
 200mg tabs, 10 Rs 14 50

نرو ہے سک
 پائی ری لایم

SULPHAMETHIZOLE

سلفامیتھی زول

افعال و منافع: آلات بول گردہ مشانہ پیشاب کی نالیوں کے انفکھن میں مفید و موثر ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۴ بار
 مضر اثرات: حلی سے، درد شکم، بھوک کی کمی، درم ہا نفرا س، ضعف سر درد، چکر آنا بخار، الرجف
 ری ایکشن روشنی سے نفرت، گردوں کا علامہ، جان سن علامہ کا خطرہ۔
 احتیاط: حمل، ایام رضاعت، گردوں اور جگر کی خرابی میں احتیاط برتیں۔
 دواؤں کا رد عمل: خودنی مانع انجماد خون ادویہ، فین ٹائن میٹھوڑیکسیٹ کے ساتھ مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

SULPHAMETHIZOLE (WARNER)
 500mg tabs 10. Rs. 8 34
 UROLUCOSIL (PARKE DAVIS)
 500mg tabs 10. Rs. 5.62

سلفامیتھی زول

یورولوکوسل

آلات بول کی مسکن درد ادویہ

URINARY ANTI SPASMODIC

ATROPINE SULPHATE اثر وچین سلفیٹ

افعال و منافع: یہ چھوٹے اور نرم عضلات کے تشنج اور درد کو سکون پہونچاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۰.۲۵ سے ۲ ملی گرام زیر جلد یا عضلاتی انجکشن لگائیں۔

متفی افعال: گلوکوما، میں سخت نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: منہ خشک، کھانے میں دشواری، قبض، جلد خشک، جلد پر داغ دھاریاں، وجع القلب،

خفقان، حرکات قلب بے ترتیب، پتلی کا پھیلنا۔ روشنی سے کراہیت پتلی باہر کو نکلنا، زیادہ مقدار میں بخار

سینہ میں درد بے چینی پیدا کرتی ہے۔

دواؤں کا رد عمل: کوئی نی ڈین، دافع ذرپ ریشن دوائیں اور انٹی ہشامین کے ساتھ دینا مضر ہے۔

DICYCLOMINE HCL ڈائی سائی کلو مین

افعال و منافع: معدہ آنتوں اور آلات بول کے درد معدہ آنتوں میں تشنج و خراش وجع الغواد،

عسر طمث، وجع الکلیہ، Renal Colic اسہال بچش میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶ ماہ تک کے بچوں کو ۵ ملی گرام یا ۱۰ پونڈ ۶ ماہ سے ۲ سال تک ۱۰ سے ۲۰ پونڈ ۲ سے

زائد ۲۰ سے ۴۰ پونڈ دن میں ۳ بار قبل از غذا ہالغوں کو ۲۰ ملی گرم گولی دن میں ۳ بار انجکشن ۲۰ ملی

گرام عضلاتی ہر ۸ گھنٹہ بعد لگا سکتے ہیں۔

متفی افعال: پیشاب کی رکاوٹ میں، آنتوں کے فعل کی سستی میں ضعف اور جگر کی خرابی میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: منہ خشک کھانے میں دشواری زیادہ مقدار سے آنتوں میں سوزش، آنکھوں کے آگے دھبے۔

احتیاط: گلوکوما، اور حمل میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کا رد عمل: الکوحل کے مرکبات اور شراب کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

CLOMIN (CORE) 500mg. tabs 10	Rs.5.80	کلومین ٹبلٹ
CLOMIN DROPS (CORE) 10ml	Rs.11.50	کلومین ڈراپس
COLIMEX TABS (WALLACE) 500mg. tabs. 10	Rs 6.20	کولی مکس ٹبلٹ
CYCLOPAM TABS (INDOCO)		سائیکلوپام ٹبلٹ
Dicyclomine Hcl 20mg, Paracetamol 500mg. tabs 10	Rs.7.30	
CYCLOPAM INJ (INDOCO) 2ml amp	Rs 9 39	سائیکلوپام انجکشن
CYCLOPAM SUSP (INDOCO) 30ml,	Rs.6.99	سائیکلوپام سرب
MEFTAL-SPAS (BLUE CROSS) 10,	Rs.12.50	میف ٹل اسپاس
NEUROSPAS (SWIFT) caps 10,	Rs.11.72	نیورواسپاس کپسول
NEUROSPAS FORTE (SWIFT) caps 10,	Rs 15 35	نیورواسپاس فورٹ
NEUROSPAS DROPS(SWIFT) 15ml:	Rs 14.92	نیورواسپاس ڈراپس
REZIPEN (CONCEPT) 10.	Rs.16.50	ریزی پن
ZE-SPAS (KEE PHARMA) 10:	Rs.11.50	زی اسپاس

PANCURONIUM BROMIDE پین کیورونیم برومائڈ

افعال و منافع: مرارہ اور گردوں کا شدید درد، قنات غذائی میں تشنج و درد عسر طمث میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۰.۰۲ سے ۰.۰۴ ملی گرام ۳ بار یومیہ ۵ سے ۷ سال کے بچوں کو ۰.۰۵ ملی گرام ۸ سے ۱۱ سال کو ۰.۰۵ سے ۰.۱ ملی گرام ۱۱ سے ۱۳ سال ۰.۱ ملی گرام دن میں ۳ بار۔
 منفی افعال: گلوکوما، معدہ آنتوں میں تسدد، جگر کی خرابی، ورم غدہ قدامیہ بندش بول اور الرجک مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: بلغمی دمہ، حمل، ۱۳ ماہ ۵ کلو وزن سے کم بچوں کو احتیاط لازم ہے۔

تجارتی مرکبات

BARALGAN (HOECHST) 10	Rs.5.62	بارل گان ٹبلٹ
BARALGAN INJ (HOECHST) 2ml amp	Rs.3.26	بارل گان انجکشن
NEUROSPAS INJ (SWIFT) 2ml amp.	Rs 3.73, 5ml amp. Rs 4.95	نیورواسپاس

FLAVOXATE

فلے ووکسیٹ

افعال و منافع: پیشاب کا تکلیف سے آنا (عسر البول) بار بار اور جلن سے آنا (ڈیڈ) پر درد، ورم مثانہ ورم غدہ قدامیہ ورم نائزہ مثانے کی نالی میں ورم و تکلیف ہونا آپریشن، کیچھر کے استعمال سے ہونے والے درد و ورم میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار

منفی افعال: غذائی نالی اور آلات بول گردے مثانے اور نالیوں میں رکاوٹ کی حالت میں دینا خطرناک ہے۔

احتیاط: گلوکوماصل کے ابتدائی ۳ ماہ میں اور ۱۲ سال سے کم عمر میں احتیاط رکھیں۔

تجارتی مرکبات

FLAVOXATE

(ELDER)

فلے ووکسیٹ

200mg tabs 10 Rs 62.45

URISPAS

(WALTER BUSHNELL)

یوری اسپاس

200mg, tabs 10 Rs. 72.10

OCTINUM MUCTATE

آکٹی نم مکتیٹ

AMIDO SULPHONATE

امائی ڈو سلفونیٹ

افعال و منافع: عضلات میں تشنج، قولنجی درد، Colic pain مرارہ (پتہ) کا درد، وجع الکلیہ Renal Colic حوض کا درد، وضع حمل کی تکلیف میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶۰۰ سے ۱۲۰۰ ملی گرام ۳۰۳ بار یومیہ انجکشن ۶۰ سے ۱۲۰ ملی گرام عضلاتی ۳ بار دیا جاسکتا ہے۔

منفی افعال: وریڈی انجکشن، گلوکوزیا نارمل میٹابولزم میں ملا کر بہت آہستہ لگائیں۔

تجارتی مرکبات

NEO-OCTINUM

(BOEHRINGER-M)

نید آکٹی نم

dragees, 10 Rs. 15 00

NEO-OCTINUM DROPS

(BOEHRINGER-M)

نید آکٹی نم ڈراپس

80mg per ml 10ml Rs. 15. 10

NEO-OCTINUM INJ

(BOEHRINGER-M)

نید آکٹی نم انجکشن

80mg, per ml, 1ml Rs. 3 89

PITOFENONE HCL

پٹوفنی نون ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: سچے اور گردے کا شدید درد، معدہ و آنتوں کا شدید درد اور حیض کے تناؤ اور درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۵ سے ۱۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۵ سے ۷ سال کے بچوں کو ۲.۵ ملی گرام ۸ سے ۱۱ سال تک ۲.۵ ملی گرام بالغوں کو ۵ ملی گرام عضلاتی یا وریدی۔

مفتی افعال: گلوکوما، معدہ آنتوں میں رکاوٹ جگر کی خرابی، ورم غدہ قدامیہ پیشاب میں رکاوٹ میں دینا سخت نقصان دہ ہے۔

احتیاط: دمہ بلغمی میں، حمل میں ۳ ماہ یا ۵ کلو وزن سے کم بچوں میں سخت احتیاط رکھیں۔

تجارتی مرکبات

BARALGAN

(HOECHST) tabs 10 Rs. 5.62

بیرل گان

SPASMIZOL-K

(IDPL) TABS: 10; Rs 5.13

اسپاس میزول

پی پائی پری ڈی نوای تھا کسی کاربو میٹھا کسی بنزوفینون

**P. PIPERIDIONOETHOXY O.CARBO
METHOXY BENZO PHENONE HCL**

افعال و منافع: وجع الکلیہ (درد گردہ) وجع الرحم، حیض کے درد سے آنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ ملی گرام یا گولی دن میں ۳ بار۔

احتیاط: دوا سے حساس مریضوں کو گلوکوما، معدہ آنتوں کے تسدد جگر کی خرابی ورم غدہ قدامیہ بندش بول دمہ بلغمی، حمل اور ۳ ماہ سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

MAXIGAN

(UNICHEM)

MAXIGAN INJ

(UNICHEM)

NOVIGAN

(STANGEN) tabs 10: Rs. 10 00

TRIGAN

(CADILA) 10: Rs 5.77

TRIGAN INJ

(CADILA)

3ml, Rs 2 40 5ml Rs 4.72, 30ml: Rs.20.20

میکی گان ٹیبلٹ
میکی گان انجکشن

نودی گان


ٹرائی گان ٹیبلٹ
ٹرائی گان انجکشن

Relieve



Abdominal Pain

SPASMO-PROXYVON



The fastest
antispasmodic
that is safe too

جسم میں پانی نمکیات اور غذائی اجزاء کی کمی کو پورا کرنے والے مرکبات

FLUID, ELECTROLYTES & NUTRIENT COMPOUND

APROTNIN

اپروٹنن

افعال و منافع: چوٹ لگنا، شدید صدمات، بیہوشی، ورم بارہ پٹون ورم بانقرا اس شدید جریان خون آپریشن کے بعد کی کمزوری وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: پہلی خوراک ۵ لاکھ KIU آہستہ وریڈی یا بوفل میں ملا کر پھر ہر ۴ گھنٹہ بعد ۲ لاکھ K.I.U لگائیں، زچگی، اعضاء نسوانی سے جریان خون کی صورت میں ۱۰ لاکھ K.I.U پہلی خوراک پھر ۲ لاکھ ہر گھنٹہ بعد یہاں تک کہ خون بند ہو جائے۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو، عروق و مویہ میں تسدد کی حالت میں دینا خطرناک ہے۔
مضر اثرات: قلبی صدمہ، حرکات قلب بے ترتیب ہونا، شری (پتی اچھلنا) سینہ میں درد و جلد پر داغ، جسم کی رنگت بدلنا، سانس میں تنگی مٹلی، ہاضمے کی خرابیاں، وریڈوں میں خون جھنا اور متورم ہونا۔
احتیاط: دوا استعمال کرنے سے قبل اتنی ہشامین کا استعمال کریں گردوں کی کمزوری میں سخت احتیاط برتن۔

دواؤں کا رد عمل: ہپارین اور سکسی نائل کولین کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکب

PROTOSOL INJ

(SHREE GANESH)

پروٹوسول

Aprotinin B P 500,000 KIU per 50ml vial Rs. 115.00

DEXTRAN

ڈکسٹران

افعال و منافع: جریان خون کے سبب خون میں کمی اور غلظت، صدماتی کیفیت، چوٹ، آپریشن ایکسیڈنٹ چلنے اور آپریشن کے سبب ہونے والا جریان خون شدید ضعف و نقاہت میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: شدید صدماتی حالت میں پہلی بوفل ۵ منٹ میں دوسری ۳۰ سے ۴۵ منٹ میں

شدید جریان خون میں ۲ بوتل ایک ساتھ چھائیں۔ آپریشن سے قبل یا دوران میں بوتل کی رفتار ۱۰ سے ۲۰ بوتل فی منٹ رہنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

DEXTRAN 70	(RALLIS) 540ml bottle Rs 61 86	ڈکسٹران
LOMODEX	(RALLIS)	لوموڈیکس
10% I V infusion 540ml	Rs 150 28	
PREMODEX INJ I.P.	(PREM PHARMA)	پری موڈیکس
10% Premodex inj IP 500ml	Rs.37 00	

DEXTROSE

ڈیکسٹروز

افعال و منافع: جسم میں پانی گلوکوز اور نمکیات کی کمی، مٹائی کو جن کا زیادہ اخراج آپریشن سے قبل اور بعد کی کمزوری، اسہال، قے، اور پسینہ کی زیادتی غذائیت کی کمی، تیزابیت ضعف و نقاہت کی حالت میں اس کا استعمال ایک نعمت ہے۔

مقدار و ترکیب: ضرورت کے مطابق وریدی لگانا چاہیے۔

متقی افعال: خون کی بوتل کے ساتھ، اعصابی ریشوں کی ٹوٹ پھوٹ سرجری دماغی اور نخاعی جریان خون میں نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

DEXTROSE INJ 2.5%	(KRISHNA KESHAV) 500ml	ڈیکسٹروز بوتل ۲.۵ فیصدی
	Rs.23.00	
DEXTROSE INJECTION 5%		ڈیکسٹروز بوتل ۵ فیصدی
ALBERT DAVID	540ml Rs 25.00, 1000ml Rs.31 38	
DUPHAR	540ml Rs 8 15	
KRISHNA KESHAV	500ml Rs.30 00 1000 ml Rs 31.00	
STADMED	540ml Rs 20.43	
ÀLEMBIC	540ml	
TABLETS INDIA	540ml, 1000ml	
PREM PHARMA	500ml Rs.32 00; 1000 ml Rs.42.00	

ڈیکسٹروز الکترولائٹ DEXTROSE ELECTROLITE

افعال و منافع: جسم میں پانی و نمکیات کی کمی کو پورا کرتی ہے۔، تے، اسہال پینے کی کثرت آنٹوں کے زخم جٹنا، معدہ کے منہ کا بند ہونا، خون میں تیزابیت وغیرہ میں اس کا استعمال مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: مریض کی ضرورت کے مطابق وریڈی استعمال کرائیں۔

منفی اثرات: ذیابیطس سادہ، پوٹاشیم کی زیادتی، گردوں کے شدید امراض، کلاہ گردہ کی خرابی پیرا قنارائیڈ کے افزائ کی کمی میں اس کا استعمال مناسب نہیں۔

تجارتی مرکبات

DEXTROLYTE-G

(TABLETS INDIA)

ڈیکسٹروز لائٹ

PREMOLYTE-G

(PREMPHARMA)

پرمولائٹ

500ml · Rs 35 00

ڈیکسٹروز سوڈیم کلورائیڈ DEXTROSE SODIUM CHLORIDE

ڈیکسٹروز سوڈیم کلورائیڈ

افعال و منافع: جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی شدید تے اسہال معدہ سے رطوبت کا اخراج جسم سے پانی اور خون کے نکل جانے کمزوری ضعف و قناعت میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: مریض کو ضرورت کے مطابق بذریعہ وریڈی دیا جاتا ہے۔

منفی اثرات: گردوں کی کمزوری، قلب و جگر و گردوں کے امراض اور ضعف کے سبب ہونے والا درم استقام Odema میں دینا معترض ہے۔

تجارتی مرکبات

DEXTROSE 5% & SODIUM CHLORIDE 0.9%

ALBERT DAVID

540 ml Rs 21 00 , 1000 ml · Rs 31.00

ALEMBIC

540 ml,

ALKEM

540 ml,

DUPHAR

540 ml Rs 8 35

KRISHNA KESHAV

500 ml Rs.30.10, 1000 ml, Rs.31 00

STADMED
TABLETS INDIA
PREM PHARMA

540 ml Rs 20 25
540 ml, 1000 ml
500 ml Rs 32 00, 1000 ml Rs 42 00

FRUCTOSE SODIUM CHLORIDE

فرکٹوز سوڈیم کلورائیڈ

افعال و منافع: چوٹ، حادثات، آپریشن کے بعد کی کمزوری خون میں ذیابیطیس تیزابیت گردوں کی خرابی خون میں یوریا اور نائٹروجن کی زیادتی شراب کے اثرات بد جسم میں پانی و نمکیات کی کمی Dehydration کا علاء، شدید تھکاوٹ و اسہال میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: مریض کی ضرورت کے مطابق

تجارتی مرکبات

FRUCTOSE SODIUM CHLORIDE (DRUGS INDIN) فرکٹوز سوڈیم
FRUCTODEX (RAPTAKOS) فرکٹوڈیکس

HAEMACCEL

ہیملکسل

افعال و منافع: حادثات ایکسڈنٹ، آپریشن کے سبب کثیر مقدار میں خون کا اخراج ہونا، ورم باریطون، ورم بانقرا اس کے سبب پلازما کا ضیاع، تھکاوٹ و اسہال ذیابیطیس کو جسم میں نمکیات کی کمی وغیرہ کے لئے بہت بہترین ہے۔

مقدار و ترکیب: دوا کی مقدار اور رفتار کا تعین مریض کی حالت کے مطابق متعین کیا جائے۔

منفی اثرات: قلبی صدمہ، مستقل رہنے والے ہائی بلڈ پریشر میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: حساسیت، جلد کا سرخ ہونا، شری لرزہ، کبھی سینے میں درد اور بلڈ پریشر کم ہونا۔

احتیاط: پوری بوتل ایک ہی وقت میں چڑھائیں، بوتل جسمانی حرارت کے برابر گرم ہو، بوتل کے

ساتھ اسٹور کیا ہو خون نہیں دینا چاہیے زیادہ مقدار میں نہ دیں، سلوشن صاف ہو۔

دواؤں کا رد عمل: ڈیجی ٹالس کا استعمال اس کے ساتھ ممنوع ہے۔

تجارتی مرکبات

HAEMACCEL

(HOECHST)

Rs. 137 00

بھ سب

HERMIN

ہر مین

افعال و منافع: پروٹین کی کمی آپریشن کی کمزوری بے چینی، مختلف امراض لمبی بیماریوں کے سبب ہونے والی پروٹین کی کمی کو پورا کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ سے ۸۰۰ ملی لیٹر ہر ۲۳ گھنٹہ بعد وریڈی ڈرپ کے ذریعہ۔

احتیاط: جگر کے ناکارہ ہو جانے، قلب کے فیل ہونے گردوں کی کمزوری میں احتیاط رکھیں۔

POTASSIUM CHLORIDE & پوٹاشیم کلورائیڈ ڈیکسٹروز
DEXTROSE

افعال و منافع: تھکاوٹ و اسہال میں جہاں پوٹاشیم کی نمایاں کمی ہو، آپریشن کے بعد اگر ۴۸ گھنٹہ تک وریڈی راہ سے غذائیت نہ ہو نچانا مقصود ہو عارضی طور سے جسم کا مفلوج ہونا ڈیجیٹالس کے اثرات بد میں مفید ہے۔

POTASSIUM CHLORIDE پوٹاشیم کلورائیڈ

افعال و منافع: پوٹاشیم کی کمی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔

مقدار و ترکیب: خوردنی راہ سے، ہنگامی ضرورت پر وریڈی استعمال کی جاتی ہے۔

مضر اثرات: زیادہ مقدار میں اور غیر ضروری استعمال سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
دماغی ایجنس لوہڈ پریش اور E.C.G. غیر طبی۔

تجارتی مرکبات

POTASOL

(INDOCO) 100ml bottle Rs 8.11

POTINOL LIQUID

(CARNIMOL)

100ml Rs 12 00; 200ml Rs.21 00

K-GRAD

(WODKARDT) 6: Rs.6.70

پوٹاشیم

پائٹال

کے گارڈ

132

KAY-CIEL

(STADMED) 228ml Rs 23 50

کے سیل

KEYLYTE

(WALLACE) 200ml Rs 22 50

کے لائٹ

RINGER LACTATE SOLUTION رنجر لکٹیت سلوشن

افعال و منافع: جلنے، شدید انفکشن، ورم ہاریطون قے دستوں کے سبب جسم میں پانی اور نمکیات کی Dehydration میں دینا ضروری ہے۔

مقدار و ترکیب: مریض کی ضرورت کے مطابق وریدی راہ سے ڈرپ لگائیں۔

افعال منفی: ایڈسین ڈیزیز، خون میں کھاری پن کی زیادتی میں اس کا استعمال مناسب نہیں۔

تجارتی مرکبات

RINGER LACTATE INJ. I.P. (TABLETS INDIA) رنجر لکٹیت انجکشن

540 ml Rs.21, 50

SODIUM BI CARBONATE سوڈیم بائی کاربونیٹ انجکشن INJECTION

افعال و منافع: گردوں کی خرابی کے سبب ہونیوالی خون میں تیزابیت، پچش و ستوں ذیابیطیس نقص تغذیہ زہروں کا اثر، سلفونامائیڈ کا استعمال پانی اور نمکیات کی کمی میں اس کا استعمال مفید رہتا ہے۔

مقدار و ترکیب: مریض کی ضرورت کے مطابق وریدی راہ سے دیا جائے۔

منفی افعال: جگر کے امراض، صدمات قلب کے فعل میں کمی، میں اس کا استعمال نہیں۔

تجارتی مرکبات

CARMINOL LIQ.

(CARMINOL LABS)

کاری نول لکلوڈ

100ml. Rs. 12 95

SODIUM BICARBONATE INJ (PREM PHARMA) سوڈیم بائی کاربونیٹ انجکشن

10ml amp. Rs.3 00

SODIUM LACTATE INJ سوڈیم لکٹیٹ انجکشن

افعال و منافع: خون میں الکلائن پانی اور نمکیات کی کمی کو پورا کرتا ہے۔
نقص تغذیہ سلفا تھیراپی کے واسطے سبب ہونے والی Dehydration میں اس کا استعمال
زندگی بخش ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ سے ۱۰۰۰ ملی لیٹر مریض کی ضرورت کے مطابق۔
منفی افعال: جگر کے امراض صدمات وغیرہ میں استعمال نہ کریں۔

تجارتی مرکبات

SODIUM LACTATE INJ (PREM PHARMA) سوڈیم لکٹیٹ انجکشن
500ml Rs.33.00, 1000ml Rs.43.00

SODIUM CHLORIDE سوڈیم کلورائیڈ

افعال و منافع: لوگنا، بیہوشی، شدید تھکاوٹ اسہال کالرا، خون میں زہریلے اثرات مدرات کے استعمال
سے ہونے والی نمک اور پانی کی کمی میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔

تجارتی مرکب

SODIUM CHLORIDE SOLN 0.0% سوڈیم کلورائیڈ سلوشن
ALBERT DAVID 540ml: Rs.21.00, 1000ml: Rs 31 00

خور دنی پانی نمکیات کی کمی دور کرنے والے مرکبات

ORAL-ELECTROLYTES

افعال و خواص: جسم میں تھکاوٹ اور بیماریوں کے سبب ہونے والی کمزوری عضلات کی انہضن
میں مفید ہیں۔

PEDITRAL (SEARLE) 29 gm Rs. 8.98
ELECTRAL (F.D.C.) 35 gm Rs 10.95

بڑی ڈال پیکٹ
الکترولائیٹ ڈور

دافع وجع المفاصل گٹھیا ادویہ

ANTI RHUMATIOD DRUGS

D. PENICILLAMINE

ڈی پینی سیلامین

افعال و منافع: تھجر المفاصل (جوڑوں کا پتھرا جانا) بچوں کی گٹھیا، وجع المفاصل و لسن ڈیزیز معدنیات کے سبب ہونے والا جوڑوں کا درد خون و پیشاب میں خرابی مزمن درم جگر و مرارہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: تھجر المفاصل میں پہلے ۴ ہفتہ تک ۱۰۰ ملی گرام روزانہ دن میں ۲ بار دوسرے ۴ ہفتوں میں ۲۵ ملی گرام تیسرے ۴ ہفتوں میں ۱۵۰ ملی گرام بچوں کو ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام یومیہ ۲-۴ ہفتہ بعد ۱۵ سے ۲۰ ملی گرام کا اضافہ و لسن ڈیزیز میں ۲۵ ملی گرام سے ۱۰۰۰ ملی گرام یومیہ معدنی زہروں کے اثر میں ۹ گرام سے ۸ گرام روزانہ دینا چاہیے۔

منفی افعال: شدید پی سیلین کے ری ایکشن میں عضلاتی کمزوری گردوں کی خرابی میں نہیں دینا چاہیے۔
مضر اثرات: ہضم کی خرابی بھوک کی کمی، بخار، ہڈیوں میں درد، ورم غد دلفاویہ الرجی، تے حلی ایبائی ڈکاریں اور اسہال آتا۔

احتیاط: دوا سے آدھے گھنٹہ پہلے اور بعد کوئی غذا استعمال نہ کریں۔ دوران علاج خون کی جانچ کراتے رہیں۔

دواؤں کا رد عمل: تانبہ فولاد، گولڈ کے مرکبات اور دافع طیریا ادویہ کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

AURANOFFIN

اورانوفین

افعال و منافع: وجع المفاصل اور تھجر المفاصل میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ابتدا میں ۳ ملی گرام دن میں ۲ بار ۳ سے ۶ ماہ کھلائیں اگر افاقہ کم محسوس ہو تو دن میں ۳ بار دیں۔

منفی اثرات: آنسو کی خرابی، جلد کا درم، ہڈیوں کے گودے کی نشوونما میں کمی، خون کی غیر طبعی

ت، گردوں کے امراض، جگر کے شدید امراض حمل اور ایام رخصت میں نہیں دینا چاہیے۔
 مضر اثرات: اسہال متلی، تے، درد شکم آنتوں میں زخم، ورم جلد پر داغ کھجلی، قلاع، (منہ پکنا) جھج
 صف ذائقہ خراب، آنکھ دکھنا گردے کی خرابیاں، پیپروں میں تکلیف ہو سکتی ہے۔
 احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں دوران علاج خون پیشاب کی جانچ کراتے رہیں حمل کی استعداد
 والی خواتین کو علاج کے دوران اور ۶ ماہ بعد تک مانع حمل ادویہ استعمال کراتے رہیں۔
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع ملیریا سیرم ویکسین، فینائل پیوٹازون اور آکسی فین پیوٹازون نہیں
 دینا چاہیے۔

تجارتی مرکب


GOLDAR (ALIDAC) Auranofin 3mg tabs 10. Rs. 114 70 گولڈار

AURO THIO MALATE SODIUM

اروتھیوے لیٹ سوڈیم

افعال و منافع: حجر الفاصل، بچوں کی گھٹیا، جسم پر گھٹیا لگانے سے کورکتی ہے۔ سونے (Gold) کا مرکب ہے۔

مقدار و ترکیب: مریض کے حالات کے مطابق ہفتہ میں ۱ بار عضلاتی انجکشن لگائیں ۶ ماہ میں ۱ گرام
 تک دوا دی جاسکتی ہے۔



مرخی عضلات، پٹھوں کو نرم کرنے والی ادویہ

MUSCLE RELAXANT

ایٹراکیوریم بی سائی لیٹ ATRACURIUM BISYLATE

افعال و منافع: یہ ایک زبردست مرخی اور مسکن عضلات دوا ہے آپریشن کے وقت خصوصاً رحم مادر کے آپریشن شکاف قیصری میں مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳ سے ۶ گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے وریدی بوتل کے ساتھ آہستہ آہستہ دی جاتی ہے۔

احتیاط: ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں عضلات، داعصاب کے امراض ضعف، قلبی امراض جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکب

TRACRIUM

(BURROUGHS WELLCOME)

ٹراکیوریم

10 mg per inj; 5x2ml Rs.333.90

BACLOFEN

بکلوفین

افعال و منافع: سر کے عضلات کی سختی اور تشنج میں شریانیں کا ورم نخاعی تکالیف کے سبب ہونے والا تشنج، نئی ساختوں، چوٹ، نخاعی دھاؤ کے سبب ہونے والی مفلوجی حالت دماغی حادثات سے ہونے والے تشنج میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار، مقدار رفتہ رفتہ بڑھائیں زیادہ سے زیادہ ۳۰ سے ۷۵ ملی گرام دی جاسکتی ہے۔ بچوں کو ۵ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو اور ایام رضاعت میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: سانس میں کمزوری، دورے، نشہ طاری ہونا، خشکی حرکات غیر ارادی چکر دور دوری

ایکشن، جھیرا ہٹ، بکواس کرنا، تور، ہضم، بستر پر پیشاب نکل جانا۔
احتیاط: دماغی بیماریوں، مرگی، نفسیاتی الجھن، زخم معدہ، بجلی تنفس جگر اور گردوں کی خرابی، بڑھاپے
مسل کے ابتدائی ۱۲ میں احتیاط رکھیں دوا اچانک بند نہ کریں۔

تجارتی مرکب

LIORESAL

(HINDUSTAN CIBA GEIGY)

پوری سال

CARISOPRODOL

کیری سو پروڈول

افعال و منافع: تجربہ الفاصل، ہڈیوں اور کمر کے مہروں میں درد شدید نقرس کمر کا درد، عرق النساء
مہیج، چوٹ، گردن کا اکثر ناہڈی کی نرم ساختوں کا اور م دماغی تناؤ، درد سر، جڑوں کا اکثر نا آپریشن کے بعد
منانات کی سختی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۵ سے ۱۰ سال کی عمر میں ۷۵ ملی گرام ۲ بار ۵ سال سے
کم عمر میں دینا جائز نہیں۔

منفی افعال: خون کی خرابی دوا سے حساس الرجک مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: پھر آنا خشکی متلی، غم معدہ پر درد، دلغ پڑنا و جمع القلب لوبڈ پریش، رمی ایکشن ہو سکتا ہے۔
احتیاط: حمل ایام رضاعت میں احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: شراب اور دوسری نظام عصبی کو کمزور کرنے والی ادویہ کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

CARISOMA (WALLACE) 350mg tabs 10: Rs 28

CARISOMA COMPOUND (WALLACE)

Carisoprodol 175mg, Paracetamol 350mg, Caffeine 32mg tabs 10
Rs. 16 60

CHLOMEZANON

کلومی زانون

افعال و منافع: کمر کے عضلات کا درد ناک تشنج ورم عسر الطمث (حیض کے درد) میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ تا ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار
 مضر اثرات: متلی، غشی، زہر، چہرہ آلودگی، ناک بہا، جلد پر داغ برکان، غمی، غلغلہ، غمی ہو سکتا ہے۔
 احتیاط: نمل، چہرہ اور گردن کی خرابی میں۔
 دواؤں کا رد عمل: MAOI شراب، نظام مسمی کو مفلوج کرنے والی دوا ہے۔

تجارتی مرکبات

MYOSPAS	(WIN MEDICARE)	ماری پاس
100mg tabs 10	Rs 25 00	
NEUROPHEN COMPOUND	(SWIFT)	نوروفین کمپاؤنڈ
100mg tabs 10	Rs 20 55	
SYSTAFLAM	(SYSTOPIC)	سیسٹا فلام
500mg tabs 10	Rs 39 80	

CHLORZOXAZONE

کلورزوکسازون

افعال و منافع: موقع چوٹ و فیرو کے جب ہونے والے عضلات کے درد جوڑوں کا درد مسمی درد،
 بے چینی درد سر گردن کا اکثر ناپشت کا درد، ریزہ کے مہروں کا درد، دور، پیڑو کے عضلات کے درد میں
 سفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی گرام ۳-۴ بار رو میہ۔
 منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو، حمل اور جگر کی خرابی میں دینا منع ہے۔
 مضر اثرات: اگر دوا سے الرجی ہو تو دوا بند کر دینا چاہیے۔
 دواؤں کا رد عمل: شراب کے ساتھ مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

BRENLAX	(KOPRAN) tabs 10	Rs 29 10	برین لکس
DUBLACTIN-MR	(TABLETS INDIA) tabs 6	Rs 27	ڈبلاکٹین ایم آر
DUODIL	(DUPHAR) 10	Rs 10.71	ڈیوڈیل

FLAMAR-P	(INDOCO)	قلمی
(Chlorzocazone 250mg, paracetamol 300mg tabs 10	Rs 22 00	
LOBAKTABS	(GENO) 10	لوپک
Rs 24 10		
MOBIZOX	(CROSSLANDS) 6	موبیزوکس
Rs 24 10		
PARAFLAX	(ETHNOR) 10	پارافلاکس
Rs 22 95		
PARAFON	(EHTNOR) 20	پارافون
Rs 49 00		

MEPHENSENIN

مے فن سین

افعال و منافع: متدی مسکن درد بخور سرخی عضلات اثر کرتی ہے۔ درد بخور، سوچ چوت، غیر
دری، منع اسفصل تجربہ الفاصل چھونے اور بڑے جوڑوں کے درد کو سکون پہنچاتی ہے صرف برونی
شمال کے لئے۔

مقدار و ترکیب: مرہم مقاصد پر لگا کر مالش کریں یہاں تک کہ دوا جذب ہو جائے۔
متلی افعال: کئی پھی جلد پر کھلے زخموں اور خدائی ملی پر نہ لگائیں۔

تجارتی مرکبات

FLAMAR CREAM	(INDOCO) 20g	Rs 11 90	قلم کریم
KILPANE CREAM	(BIDDLE SAWYER) 28g	Rs 26 85	کل پن کریم
PARBUDOL GEL	(MERCURY) GEL, 20g	Rs 14 60	پاربڈول جیل
RELAXYL	(FRANCO INDIAN) 30g	Rs 15 79	ری لیکساکل کریم

METHO CARBAMOL

میتھو کاربامول

افعال و منافع: سر کے عضلات میں شدید کھینچ، پرانے درد، صبی تکلیف ہڈیوں اور جوڑوں کی
تکلیف میں مفید موثر ہے۔

مقدار و خوراک: معمولی تکلیف میں ۵ سے ۱ گرام دن میں ۴ بار شدید تکلیف میں ۱۰ سے ۴
گرام دن میں ۴ بار بڑھ ۲۳ سے ۲۸ گھنٹہ بعد مقدار کم کر دیں، شدید حالت میں وریدی عضلاتی انجکشن
۱ سے ۲ گرام لگائیں لے لے نس میں ۲ سے ۳ گرام وریدی ہر آدمے گھنٹہ پر لگائیں جب تک مریض
خوردنی دوا نہ آجائے۔

منفی افعال: یہ فی Coma دماغی کمزوری مرگی اور ضعف عضلات میں نہیں دیتا چاہیے۔
مضر اثرات: منگی چکر لٹور ہضم بھارت میں فرق، درد سر، چہرہ سرخ، غنودگی ہلڈ پریش کم سانس
 میں خفی بھی دورہ بھی آسکتا ہے۔
احتیاط: دریدی انجکشن ۳ ملی لٹر / امٹ سے کم میں نہ لگائیں، عمل ہمام رضاعت جگر اور گردوں کی
 لرابی میں احتیاط رکھیں۔
دواؤں کا رد عمل: شراب دیگر مرخی و عضلات و اعصاب ہادیہ کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

FLEXINOL	(PROTEC) 10	Rs 14 75	ملکسی نول
IBUGESIC-M	(CIPLA)		اب ہے سک
Methocarbamol 750mg, Ibuprofen 400mg tabs 6 tabs Rs 17 40			
ROBIFLAM	(KHANDELWAL) 6	Rs 17 24	روبی لیم
ROBINAX	(KHANDELWAL) 10ml inj	Rs 12 29	روبی ٹکس انجکشن
ROBINAX TABS	(KHANDELWAL)		روبی ٹکس ہلڈ
Methocarbamol 0 5g tabs 10 Rs 14 92			
ROBINAXOL	(KHANDELWAL)		روبی ٹاکسال
Methocarbamol 350mg, paracetamol 250mg tabs 10 Rs 13 53			

ORPHENADRINE CITRATE آر فیناڈرین سائٹریٹ

افعال و منافع: مقامی مسکن درد مرخی عضلات دوا ہے، سوچ چوٹ کھیلوں کی چوٹ کشیچہ کا درد،
 درد سر اور سر کے عضلات میں درد و کشیچہ میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۳۵ ملی گرام دن میں ۲ بار۔
منفی افعال: درم فہہ قداسیہ، ضعف عضلات اور گلو کو مایں دیتا مضر ہے۔
مضر اثرات: منگی ٹنگ بھارت میں فرق، چکر آنا، خفی غنودگی ضعف، ہضم کی خرابیاں جگر اور گردوں
 کے امراض میں مضر ہے۔
دواؤں کا رد عمل: مانع افرا جگر ہادیہ، شراب اعصاب کو مفلوج کرنے والی ہادیہ MAOI مانع

زہریشن، پروپاکسی رین، اسٹیرائڈ ہارپی ٹون اور فینائل پروٹازون کے ساتھ معطر ہے۔

تجارتی مرکبات

ORPHAMOL	(TORRENT) tabs 10' Rs. 7 50	آر فامول
ORPHIPAL	(BIDDLE SAWYER) 10' Rs. 12.90	آر فپال

PANCURONIUM BROMIDE چین کیورونیم برومائڈ

افعال و منافع: آپریشن کے لئے بیہوشی کے دوران اور مصنوعی تنفس جاری رکھنے والے مریضوں کے عضلاتی تشنج کو دور کرنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: فوری طور پر ۴۰ سے ۱۰۰ مائیکروگرام / فی کلوگرام وزن کے حساب سے وریدی انجکشن لگایا جائے پھر ۱۰ سے ۴۰ مائیکروگرام دیا جائے۔

مثقی اثرات: عام بیہوشی کی حالت میں اور دوا سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

احتیاط: ضعف فریبی، پولیو جسم میں پانی کی کمی Dehydration گردوں کی خرابی، قلب و جگر کے امراض ہائی بلڈ پریشر اور حمل میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: امینو گھائی کو سائڈ، لیٹھیم انٹی بائیوٹک، میکنیٹیم سالت، پروکینامائیڈ کوئی فی ڈین کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

NEOCURON INJ	(NEON) 10x2 ml amp Rs. 166.50	نہ کیورون انجکشن
PANCONIUM	(KHANDELWAL) 2ml amp: Rs. 16 40	پان کونیم
PANURON	(TROIKAA) 5x2ml amp Rs. 85 80	پان نورون
PAVULON	(INFAR) 1x2ml amp Rs. 17.00	پاؤولان

پائی پر کیورونیم برومائڈ PIPER CURONIUM BROMIDE

افعال و منافع: آپریشن کے لئے بیہوشی لانے کے لئے استعمال ہے۔ سر کے عضلات کو ذہیلا کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۰.۰۷ سے ۰.۸۵ ملی گرام / فی کلوگرام وزن کے حساب سے۔

معجزات اثرات : جس میں شوریٰ بند پر اثر می آئے۔ نفسی حرکات سے مراد ہے۔

۱۔ حق میں نہ ہو تو اس کی طرف سے مستعمل نہیں جائے۔

زوناؤں کا رد عمل: ہمیشہ بہت بھرپور پیہم، فحش چٹن اور گھڑنی سون کے ساتھ خراب اثر کرتی

تجداتی مرکب

ARDJAN

(THEMIS CHEMICALS)

Copyright © 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

4mg per 2ml vial I V inj 2ml Rs 62.30

SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE سکسی تائل کو لین کلورائیڈ

افعال و منافع: چھوٹے آپریشن کے نئے اصحاب مصنوعات کو سن کرنے، تھوڑی سی عملی ڈالنے بدھوں کو صحیح کرنے بجلی کی سٹاک، مصنوعات کو مستقل حیلہ رکھنے کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: مریض کی عمر، وزن اور ضرورت کے مطابق عموماً ۲۰ سے ۳۰ ملی گرام عضلاتی انجکشن دیر ۵۰۰ ملی گرام گلوکوز یا سوڈیم کلورائیڈ میں ملا کر دیا جاتا ہے۔

متنی افعال: پڑنا، شکر کی زیدتی، آنکھوں کے آپریشن، تیز رفتاری میں اس کا استعمال ممنوع ہے۔

معطر اثرات: عضلات میں درد، پیشاب میں ہیوگلو جین کا اخراج، حرارت جسمانی میں اضافہ، ری ایکشن، سینہ میں درد، آنکھوں میں دباؤ، Tension آنکھوں کی حرکات لطیفہ بن، درطوبت معدہ میں اضافہ۔

احتیاط: بچوں اور حاملہ سے احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کا رد عمل: بخود آسکین یا نئی کوئی نسخہ دلوں کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

MIDARINE

(BURROUGHS WELLCOME)

مذہب

50mg per ml in 2ml ampoules: Rs. 9.63

SCOLINE INJ (GLAXO)

50mg/ml 10ml vial Rs 24 65

ایسکولین انجکشن

TIZANIDINE

ٹائی زانی ڈین

افعال و منافع: یہ دوا سر کے عضلات کو اسیلا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ ٹائین زیادہ جلدی جلدی میں ٹائی کے جب ہونے والا تشنج، نئی سائنسوں کے بننے، ایکسیڈنٹ دماغی اعصاب عضلات کے تشنج میں ملتا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ ملی گرام دن میں ۳ بار، ابتدا میں ۶ ملی گرام سے زیادہ نہیں رفت رفت مقدار ٹوراک میں اضافہ زیادہ سے زیادہ ۳۶ ملی گرام پورے ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔

مضر اثرات: خشکی، الجھن، چکر آنا، منہ خشک، حلی، ہضم کی خرابیاں، بلڈ پریشر میں کمی ضعف نیند کی کمی جلد میں درد۔

احتیاط: دوا سے الرجک مریضوں میں، جگر و گردوں کی کمزوری میں دوا کے بعد دار انجوری کرنا اور مشغری جانا منع ہے۔

دواؤں کا رد عمل: دافع، بلڈ پریشر اور ریول اوپ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

SIRDALUID

(SANDOZ) 6 tabs Rs 40 00

مرالڈ

TUBOCURARIN CHLORIDE

ٹیوبوکیورارین

افعال و منافع: رچی اور ہڈیوں کی درنگی کے لئے بیہوشی طاری کرنے عضلات کو اسیلا کرنے میں مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۵ سے ۲۵ ملی گرام دریدی بچوں کو ۳ سے ۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے۔

مضی افعال: الرجک مریضوں کو، مہلک میزجلادوں میں، قبل از وقت پید ہونے والے بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ہلڈ ہیش کم ہونا، چہرے پر سرخی، سینہ میں درد ہو سکتا ہے۔
دواؤں کے ساتھ رد عمل: پردہ الولول، فردسی مائیڈ، منیال، آئی سو فلورین ہلڈ وسمین انٹی ہلڈ بکس۔

تجارتی مرکبات

TUBARINE (BURROUGHS WELLCOME) نوہارین
1.5ml amp x 10 Rs.178.87

وہلی تھامیٹ بروڈائیڈ VALETHAMATE BROMIDE

افعال و منافع: اعصاب و عضلات کے تشنج کو دور کرتی ہے، درد، فم معدہ کا درد زخم معدہ و امعاء
عضلاتی درد تشنج جیس کے درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار

متنی افعال: گلوکوما اور م غده قداسہ میں نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

EPIDOSIN (TTK PHARMA) اے پی ڈوسن


8mg. per ml inj. 1ml Rs 7.38

OSDIL (TROIKAA) آس ڈل

8mg per ml inj. 5x1 ml amps: Rs.36 75

VALOSIN (SIGMA LABS) ولوسن

8mg per ml inj. 10x1ml. Rs.46.40



NEURO**حرک اعصاب و عضلات****MUSCULAR STIMULENTS****NEOSTIGMINE****نیو آسٹگمین**

افعال و منافع: عضلات کی کمزوری و دوستی لاغری میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۵-۳۰ ملی گرام دن میں ۳ بار خوردنی طور سے، دیرپے اثر و پھین کے ساتھ اسے ۵ ملی گرام۔

متنی افعال: معدہ و آنتوں اور پیشاب کی نالیوں کے تسدد (رکاوٹ) میں نہیں دیتا ہوا ہے۔

مضر اثرات: حلی، تھوک کی زیادتی، اسہال و قہج ہو سکتا ہے۔

احتیاط: ہنسی دم، قلبی امراض بے چینی مرگی اور پارکنسن کے مرض میں نہیں دیتا ہوا ہے۔

دواؤں کا رد عمل: مرخی عضلات ادویہ سائیکو سپورین اور ہالوٹھمین کے ساتھ نہیں دیتا ہوا ہے۔

تجارتی مرکبات**DIASTG INJ****(LIFE)****ڈیاسٹک**

50x1ml (0.5mg) Rs 87.02, 50x1ml (2.5mg) Rs 198.92, 12x1ml

(0.5mg) Rs 20.89, 12x1ml (2.5mg) Rs 47.73

MYOSTIGMIN INJ**(NEON)****مایوسٹگمین**

0.5mg amp 10x1ml Rs 39.45, 2.5mg amp 5x5ml Rs 63.00

PROSTIMINE**(ROCHE)****پراسٹیمین ٹیبلٹ**

15mg tabs, 10 tabs Rs 36.49

PROSTIMINE INJ**(ROCHE)****پراسٹیمین انجکشن**

0.5mg, 1ml Rs 1.73; 2.5mg · 1ml Rs 2.72

TILSTIGMIN**(TABLETS INDIA)****ٹیلسٹگمین ٹیبلٹ**

15mg tabs 10 Rs 40.45

TILSTIGMIN INJ**(TABLETS INDIA)****ٹیلسٹگمین انجکشن**

0.5mg per ml inj 1ml. Rs 3.98, 5ml Rs 10.91

غیر کارٹی سونی دافع ورم و درد ادویہ NO STERIODAL ANTI INFLAMMATORY DRUGS (NSAID)

ASPIRIN

اسپیرین

افعال و منافع: دافع بخار، دافع ورم مسکن درد دوا ہے، وجع المفاصل کے درد و ورم کو دور کرتی ہے وجع القلب میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۷۰۰ ملی گرام ہر ۴ گھنٹہ بعد شدید وجع المفاصل میں ۳۰۵ سے ۷ گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے ۱۲ سے ۱۶ سال کے بچوں کو ۳۳۰ ملی گرام ۷ سے ۱۲ سال تک ۲۷۰ ملی گرام ۳ سے ۶ سال تک ۱۷۵ ملی گرام ۱ سے ۳ سال تک ۹۰ ملی گرام دینا چاہیے۔

منفی افعال: زخم معده، خون کے رقیق ہونے، جریان خون ایام رضاعت، اسپرین سے حساس مریضوں، انجماد خون کی خرابی میں اور حمل و ولادت کے ایام زچہ بچہ کے جریان خون میں دینا خطرناک ہے۔
مضر اثرات: الرجی، ہاضمہ کی خرابیاں ہو سکتی ہے۔

احتیاط: سینے کے درد، جگر گردوں کی خرابی، بد ہضمی معمر افراد چھوٹے بچوں اور حمل کے آخری ماہ میں احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد خون و دافع ذیابیطیس ادویہ، میٹھوٹراکسٹ کارٹی سون کے مرکبات دافع تیزابیت کے ساتھ خراب اثر کرتی ہے۔

تجارتی مرکبات

COLSPRIN 100	(RECKITT & COLMAN)	کول اسپرین
100mg tabs 14. Rs 2 05		
DISPRIN	(RECKITT- COLMAN) 10 tabs · Rs 2 00	ڈسپرین
E-PRIN	(ELDER)	ای پرن
Aspirin 325mg enteric coated tabs 10: Rs 2.46		
EQUAGESIC	(WYETH) 10· Rs.6 89	ایکو جے سک

ڈیکسٹرو پروپاکسی فین DEXTRO PROPOXY PHENE

افعال و منافع: ہر طرح کے جسمانی درد و بواسطہ درجے کے درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶۵ سے ۱۰۰ ملی گرام۔

منفی افعال: حساسیت والے افراد، جگر کی خرابی اور گلوکوما میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: چکر آنا، متلی، قے قبض جلد پر داغ پڑنا۔

احتیاط: جگر گردوں اور پھیپھڑوں کی خرابی میں خلل دماغ چھوٹے بچوں اور حاملہ کو احتیاط لازم ہے۔

دواؤں کا رد عمل: شراب اور مرکزی عصبی کو کمزور کرنے والی ادویہ بنروڈیازین پیتھاباکر کاربامازہ

پائن فین نائن اور وارفین کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

ANADEx	(CONCEPT) 12 Rs.7.82	انڈیکس
BREN-PX	(KOPRAN) 10x10: Rs 124 80	برین پی ایکس
BUTA-PROXYVON	(WOCKHARDT)	بوتہ پروپاکسی ون
caps 8, Rs 12.30		
COMBIGESIC	(UNILIDS) caps Price N/A	کمبیجے سک
CORBUTYL	(ROUSSEL) 10: Rs 9 36	کاربوتیل
IBU-PROXYVON	(WOCKHARDT) caps 6. Rs 8.50	ایبو پروپاکسی ون
PARVON	(JAGSON PAL) caps 10 Rs.10 75	پارون
PARVON FORTE	(JAGSON PAL) 10 Rs.17.30	پارون فورٹ
PARVON-N	(JAGSON PAL) 10 Rs 5 43	پارون این
PROXYTAB	(WOCKHARDT) 6 Rs 6.83	پروپاکسی ٹیب
PROXYVON	(WOCKHARDT) caps 8 Rs 9.05	پروپاکسی ون
SUBDU	(U S V & P) caps: 8. Rs.7.02	سب ڈیو
SUDHINOL	(RANBAXY) tabs. 10 Rs 11 53	سڈھینول
SYSTAFLAM	(SYSTOPIC) tabs 10x10 Rs.140 00	سیسٹا فلام
WALAGESIC	(WALLACE) caps 10 Rs 11.30	والیجے سک
WYGESIC	(WYETH) caps 6 Rs 7 04	والیجے سک

DICLOFENAC SODIUM ڈکلو فینک سوڈیم

افعال و منافع: وجع امفاصل (مٹھیا) تھرا الفاصل، جوزوں (کا پتھر اجاتا) کمر کے مہروں میں درم فیر مٹھیا کی درد درم شدید نقرس، چوٹ آپریشن دانت کا درد پیڑو کے درم درد حیض کی تکالیف میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۷۰ سے ۵۰ ملی گرام ۲-۳ خوراکوں میں ۱۰۰ ملی گرام یومیہ دیا جاسکتا ہے بچوں کو ۳، ۵ سے ۵ ملی گرام / فی کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے کئی خوراکوں میں تقسیم کر کے، شدید درد میں کھانے سے پہلے لینا چاہیے۔

مضر اثرات: درد فم معدہ، ڈکاروں اور تیزابیت کی زیادتی متلی درد سر چکر داغ پڑنا کھلی جسم پر ابھار نمودار ہونا، آلات ہضم سے جریان خون زخم معدہ جگر اور گردوں کے افعال میں خرابی۔

احتیاط: امراض معدہ و امعاء میں معدہ آنتوں کے زخم میں قلب و جگر گردوں کی خرابی ایام حل رخصت کم سن بچوں اور مسمر افراد میں احتیاط رکھیں۔
دواؤں کا رد عمل: لیجیم، ڈیباکسن کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

DIC-SR (DEE PHARMA) 100mg S.R. tabs; 10: Rs.13.10	ڈک ایس آر
DIC-FA (DEE PHARMA) 46.5mg tabs; 10: Rs.7.10	ڈک ایف اے
DIC INJ (DEE PHARMA)	ڈک انجکشن
25mg per ml inj. 3ml amp: Rs.3.80	
DIC TOP GEL (DEE PHARMA) 30g tube: Rs.23.80	ڈک ٹاپ جیل
DICLOFAM (MAX) 50mg tabs; 10 Rs.7.06	ڈکلو فام ٹیبلٹ
DICLOFAM INJ (MAX) 25mg per ml inj; 3ml Rs.2.67	ڈکلو فام انجکشن
DICLOFEN INJ (BIOCHEM)	ڈکلو فین انجکشن
25mg/ml, excipients q.s. inj; 3ml Rs.3.05	
DICLOFEN-MR (P&B LABS) 10 tabs Rs.24.67	ڈکلو فین ایم آر
DICLOFENAC SOD. INJ (PREM PHARMA)	ڈکلو فینک
3ml amp. Rs.4.00, 30ml vial : rs.17.50	

DICLOGESIC	(TORRENT)	ڈکلو جے سبک
Diclofenac sod 50 mg Paracetamol 500mg tabs 10	Rs 14 90	
DICLOMAX 25/50	(TORRENT)	ڈکلو میکس
25mg 10 Rs 4 30, 50mg 10 Rs 7 92		
DICLOMAX GEL	(TIDE (TORRENT) 30g	ڈکلو میکس جیل
DICLOMAX INJ	(TIDE (TORRENT) 3ml amp	ڈکلو میکس انجکشن
DICLOMOL TABS	(WIN MEDIARE)	ڈکلو مول
Diclofenac sod 50mg, paracetamol paracetamol IP 500mg tabs 10	Rs 13 90	
DICLOMOL INJ	(WIN MEDICARE)	ڈکلو مول
10 ampoules	Rs 30 60	
DICLOMOL SR TABS	(WIN MEDICARE)	ڈکلو مول ایس آر
100mg tabs 10x10	Rs 134.70	
DICLONAC	(LUPIN) 50mg tabs 10	ڈکلو نیک
DICLOTAL D.T.	(BLUE CROSS)	ڈکلو ٹال ڈی ٹی
100mg caps 10	Rs 14 00	
DICLOTAL C.R.	(BLUE CROSS)	ڈکلو ٹال سی آر
100mg caps 10	Rs 14 00	
DICOFEN-50	(KANPHA) 50mg tabs 10, Rs 7 09	ڈکوفین ۵۰
DIFEN INJ	(SOL) 3ml inj. 5x3ml	ڈائی فین انجکشن
DIFEN GEL	(SOL) 30g	ڈائی فین جیل
DIFEN SR	(SOL) caps 10x10, Rs 131 60	ڈائی فین ایس آر
DIFISAL	(KOPRAN)	ڈائی فی سال
50mg tabs 10x10, Rs. 73.33		
DIPROMOL	(BDH) 10: Rs.13.25	ڈی پرو مول
DOFLEX	(JAGSANPAL) 50mg tabs: 10	ڈا فلیکس
DUOFLAM GEL	(SIGMA LABS) 25g tube	ڈیو فلام جیل
DYNAPAR-EC	(TROIKAA)	ڈائی ناپار ایس آر
50mg enteric coated tabs 10: Rs.7.10		
DYNAPAR	(TROIKAA)	ڈائی ناپار انجکشن
5x3ml amp Rs 13.50, 30ml vial: Rs.17.00		

FENACON	(MODI-MUNDI)	فیناکون ٹیبلٹ
100mg c r tabs 10	Rs 15 95	
FENACON GEL	(MODI-MUNDI) 20g tube.	فیناکون جیل
FENAPLUS	(MODI-MUNDI) tabs: 10:	فیناپلس
FENSAIDE	(NICHOLAS) 50mg, tabs. 10	فین سائیڈ
FENSAIDE GEL	(NICHOLAS) 30g, Rs. 23 30	فین سائیڈ جیل
FENSAIDE INJ	(NICHOLAS) 3ml inj 3ml: Rs. 3 69	فین سائیڈ انجکشن
FLAMARIN TABS	(FALMA)	فلے مارین ٹیبلٹ
50mg tabs, 10	Rs 6.50	
FRENAC	(WAVE) tabs: 10. Rs. 9.20	فری نیک
INAC 50	(RECON) 50mg e-c tabs 10	این ایک ۵۰
INAC-TR	(RECON)	این ایک ٹری آر
100mg timed release caps 10:	Rs 17 70	
INAC INJ	(RECON) 3ml amp: Rs. 3.95	این ایک انجکشن
INAC GEL	(RECON)	این ایک جیل
JONAC GEL	(GERMAN REMEDIES) 30g: Rs 12.57	جون ایک جیل
JONAC TABS	(GERMAN REMEDIES)	جون ایک ٹیبلٹ
50mg, tabs 10.	Rs 4 30	
JONAC INJ	(GERMAN REMEDIES)	جون ایک انجکشن
3ml inj 1 amp	Rs. 3 00	
HALORAN GEL	(HIND ANTIBIOTICS)	ہالوران جیل
1 16% Gel 20g	Rs. 16.12	
HALORAN-50	(HIND. ANTIBIOTICS)	ہالوران ۵۰
50mg tabs 10x10	Rs. 80.70	
MAXREL	(DEYS) 10: Rs. 7.50	میکس ریل
MOBINAK	(CROSLANDS)	موبل نیک
50mg e-c tabs 10	Rs. 9.50	
MOVONAC	(BOEHRINGER-M)	مووونیک
50mg e. c tabs, 10	Rs. 5.73	
NAC-50	(SYSTOPIC) 50mg e.c tabs 10:	نیک ۵۰
NACLO-TR	(NATCO) 100mg caps 10: Rs. 14 95	نیک ٹری آر
NACLO INJ	(NATCO) 3ml amp. Rs. 3.10	نیک ٹری آر انجکشن

NACPOT	(NATCO)	50mg tabs 10.	Rs.14 00	نیکپاٹ
OSTEOFAM	(INDOCO)	50mg. tabs 10	Rs.5 70	اسٹیفام
OSTEOFAM INJ	(INDOCO)	5x3 ml	Rs 14 85	اسٹیفام انجکشن
POWERGESIC	(JENBURKT)	tabs, 10	Rs 26.95	پاورجیسک
RELAXYL TABS	(FRANCO-INDIAN)			ریلاکس ٹیبلٹ
		50mg e-c tabs 10	Rs 6 96	
SOLUNAC	(SYSTOPIC)			سولونیک
		46 5mg dispersible tabs 10	Rs 9 20	
SYSTAFLAM	(SYSTOPIC)	10:	Rs 36 10	سیسٹا فلام
TROMAGESIC	(THEMIS CHEMICALS)			ٹروماجیسک ٹیبلٹ
		50mg e c tabs, 10	Rs 3.75	
TROMAGESIC INJ.	(THEMIS CHEMICALS)			ٹروماجیسک انجکشن
		3ml amp	Rs 2 64	
VOLNIGEL	(GROSLANDS)	30g	Price N/A	ولونی جیل
ULTRA-K	(GROSLANDS)			الٹرا کے
		50mg tabs, 10.	Rs 18 65	
VOVERAN	(H. CIBA- GEIGY)			ووورن ٹیبلٹ
		50m tabs 10	Rs 7 30	
VOVERAN INJ	(H. CIBA- GEIGY)			ووورن انجکشن
		3ml inj 25's	Rs 70 00	
VOVERANSR	(H. CIBA- GEIGY)			ووورن ایس آر
		10x10.	Rs 118 00	
VOVERAN EMULGEL	(H. CIBA- GEIGY)			ووورن ایمل جیل
		50g	Rs 34 41	
ZODIC-P	(DEE PHARMA)	tabs:6	Rs.24.50	زڈیک پی
ZOFEN-K	(GUARDIAN)	50mg. 10	Rs 19.50	زوفن کے

FLURBI PROFEN فلوربی پروفن

افعال و منافع: وجع المفاصل، نحر المفاصل، (جوڑوں کا پھرتنا) کر کے مہروں میں درم دور دلوں

”سوزش کی تلافی میں مفید ہے۔“

مقدار و ترکیب: ۱۵۰ سے ۲۰۰ ملی گرام ۳-۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔

منفی افعال: زخم معدہ میں مضر ہے۔

مضر اثرات: بدبھسی متلی، تے، معدہ آنتوں سے جریان خون اسہال منہ میں زخم پتی اچھلنا شرعی، یرقان، غمی، خون میں تھراہمین اور سفید ذرات W.B.C کی شدید کمی اے پلاسٹک انیمیا، گردوں میں خرابی ہو سکتی ہے۔

دواؤں کا رد عمل: فرد سی مائیڈ، مانع انجماد خون ادویہ، ڈی جاکسن، ٹالیدو مائیڈ اور دافع تیزابیت کے ساتھ نقصان دہ ہے۔

تجارتی مرکبات

ARFLUR	(FDC)	آر فلور
50mg 10 Rs 15 10; 100mg 10 Rs 29 25		
FLUROFEN	(HOECHST) 100mg tabs 10 Rs 22 50	فلوروفین
FROBEN	(BOOTS) 100mg tabs 10 Rs.29 60	فروبین

IBUPROFEN

آئی بوپروفن

افعال و منافع: تخمر الغاصل، کمر کے مہروں کا درد دورم، جوڑوں کے درد ورم کندھوں کا درد نرم ساختوں کا ورم، موج چوٹ کا درد، حیض کا درد (عسر طمث) دانتوں کی تکالیف، درد شقیقہ، عصبی اور عضلاتی درد اور بخار کی اکسیر صفت دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۲۰۰ سے ۱۸۰۰ ملی گرام بومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے بچوں کو ۲۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو زخم معدہ میں نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: ہضم کی خرابی، درد سر، چکر آنا، اسہال تے متلی، جلد پر داغ معدہ میں۔ درد و جلن، یرقان، ورم جگر، ہاتھ پیروں اور منہ پر ورم گردوں میں خرابی، بڑھاپے W.B.C کی کمی۔

احتیاط: دمہ جگر اور گردوں کی خرابی میں، جریان خون، امراض قلب، اور حاملہ کو احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: اسپرین مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ نقصان دہ ہے۔

تجارتی مرکبات

ACTIMOL-F	(PHARMED)	آئی مول مہلیٹ
Ibuprofen 400mg, paracetamol 400mg tabs 10 Rs 13.80		
ACTIMOL-F SUSP	(PHARMED) 50ml	آئی مول سرپ
ARINAC	(BOOTS) 10	آر اینک
ARMIX TABS	(BPL) 10 tabs	آر میکس
BESTOPHEN-I	(BIOLOGICAL E) 10	بیسٹو فین
BREN	(KOPRAN)	برین
200mg 10 Rs 4.82, 400mg. 10 Rs.7.58; 600mg: 10 Rs 11.40		
BRENSUSP	(KOPRAN) 60ml	برین سرپ
BRENFED	(KOPRAN) 10x10	برین فینڈ
BRENLAX	(KOPRAN) tabs 10x10	برین لیکس
BRUDESIC	(DEYS) 200mg. Rs.3.79; 400mg Rs 6.74	بروڈی سک
BRUFEN	(BOOTS)	برو فین
200mg 10. Rs 3.80 ; 400mg: 10 Rs. 6.76 ; 600mg 10: Rs 7.6		
COMBIFLAM TABS	(ROSSEL) 10	کسبی فلیم مہلیٹ
CORFLAM	(CORE) 10	کار فلیم مہلیٹ
CORFLAM PEAD SUSP	(CORE) Rs 12.00	کار فلیم سرپ
CROCIN-IBU	(DUPHAR) tabs 10	کرو سین ایبو
DORFEX	(PFIMEX) tabs 10	ڈاؤر فیکس
DUOFLAM	(SIGMA LABS) tabs 10	ڈوا فلیم
EMBRU	(MALLADI)	امبرو
200mg: 10x10; Rs.45.00; 400mg: 10x10 Rs.72.00		
EMFLAM	(MERCK)	ایم فلیم مہلیٹ
200mg: 10 Rs.3.79; 400mg: 10; Rs.6.74; 600mg: 10: Rs.9.87		
FEBRAFEM	(ASTRA-IDL) tabs: 10	فہر ایم
FENCETA	(ALKEM) tabs 10	فین سی اے
FENLONG-400	(SOL) caps 10x10	فین لانگ
FLAMAREST TABS	(FALMA) tabs 10	فلیم آریسٹ
FLAMFORT	(PHARMASIA) tabs: 10	فلیم فورٹ
FLEXON	(ARISTO) tabs 10	فلیکسون مہلیٹ

IBODIK SUSP	(PREM PHARMA)	ایبڈک سرپ
60ml bottle Rs. 12.30		
IBUACT	(DEE PHARMA) tabs 10. Rs 9 80	ایبواکٹ ٹبلیٹ
IBUCLIN	(STANGEN) tabs 10. Rs 8 25	ایبوسیلین ٹبلیٹ
IBUCON 200/400 PLUS	(CONCEPT)	ایبو کون ٹبلیٹ
200mg: 10 Rs.8.25 ; 400mg: 10: Rs.12.00		
IBUFLAMAR 200/400	(INDOCO)	ایبو فلامر ٹبلیٹ
200mg: 10: Rs.3.81 ; 400mg : 10: Rs.6.87		
IBUGESIC SUSP	(CIPLA) 50ml: Rs.6 50	ایبو جے سک سرپ
IBUGESIC	(CIPLA)	ایبو جے سک
200mg: 10: Rs.3 80; 400mg: 10: Rs.6.74; 600mg: 10 Rs.9 44		
IBUGIN	(GLAXO)	ایبو جن
200mg: 10: Rs.3.68; 400mg: 10: Rs.6.50		
IBUPLUS	(SYSTOPIC) 10: Rs.12.63	ایبو پلس
IBU-PROXYVON	(WOCKHARDT) caps. 6 Rs.7.90	ایبو پراکسیون
IBU-PR	(PHARMASH) caps: 10: Rs. 12 75	ایبو پی آر
IBURIN	(UNISEARCH)	ایبورین
400mg. 10: Rs.6.69; 600mg: 10: Rs 9.70		
IMOL	(RECON) 10: Rs.12.90	آئی مول ٹبلیٹ
INFLAPEN CAPSULES	(GLAXO ALENBURYS)	ان فلیپن کپسول
caps 10: Rs.8.51		
LEDERFLAM PLUS	(LEDERLE) 10 Rs.8.17	لیڈر فلام پلس ٹبلیٹ
LOBAK	(GENO) tabs 10: Rs.24.10	لوبیک
NEUROPHEN FORTE	(SWIFT)	نوروفین فورٹ
caps 10x10 : Rs.85.40		
NEUROPHEN-P SUSP	(SWIFT) 50ml: Rs.11.75	نوروفین فورٹ
NORSWEL	(HEALTH CARE (CADILA)	نورسویل
10: Rs.6.54		
NOVIGAN	(STANGEN) 10: Rs.10.00	نودی گان
P-FEBRIN	(NEO PHARMA) tabs: 4: Rs.5.00	پی فبرین ٹبلیٹ
PARBUDOL SUSP	(MERCURY) 50ml: Rs.10.05	پاربڈول سرپ
PARBUDOL TAB	(MERCURY) 20x6 tabs: Rs. 144.74	پاربڈول ٹبلیٹ

(REMEDIES (INDIA)		پر دین ٹول سرپ
PROFENTOL SUSP		
60ml Rs 10 05		
PROMOL	(BDH) tabs 10 Rs 10 60	پرومول
RIBUFENGEL	(BOOTS) gel 30g Rs 21 16	ریوفین جیلی
RUMANIL	(INGA)	ریومانل ہلیٹ
200mg 10 Rs 4 95, 400mg 10 Rs 7 80, 600mg 10 Rs 12 50		
SUBDU	(U S VITAMIN) caps 8 Rs 7.02	سبڈو
TABALON	(HOECHST) tabs 10 Rs 6.75	تابولون
TRIBUSYNTH	(ASTRA-IDL) tabs 10 Rs 8 17	تری بوسینٹھ
XTRAGESIC	(CROSLANS) 6 Rs 8 50	ایکسٹرا جے سک
ZUPAR	(GLAXO ALENBURY) caps 10 Rs 8 34	زوپار

INDOMETHASINE

انڈو میتھاسین

افعال و منافع: زیر دست محلل ورم و تشنج و مسکن درد دوا ہے۔

جہاں دوسری دوائیں بے اثر ہوں یہ دوا موثر رہتی ہے، وجع الغاصل (جوڑوں کے درد) تھکے الغاصل (جوڑوں کا پھرنا) جوڑوں میں نئی ساختوں کے پیدا ہونے سے جوڑوں کے اکٹھے ہونے کے مہروں میں درد شدید نقرس عضلات و عظام میں چوٹ و درم غصاریف میں ورم و درد، کندھوں کا ٹنجد ہونا، Frozen Shoulder اور کمر کے درد میں عجیب الفلح چیز ہے۔

مقدار و ترکیب: ۷۵ سے ۱۵۰ ملی گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں منقسم کر کے دوا غذا کے ساتھ یا فوراً بعد استعمال کرائیں۔

منفی افعال: زخم معدہ کے مریضوں کو اسپرین سے حساس مریضوں کو حمل اور ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: خور ہضم پکڑ آتا۔

احتیاط: پارکن ویزیز، نفسیاتی عوارض اور بچوں میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: سیلی سیلٹ، لیٹھیم، کلرٹی سون کے مرکبات، رات، چٹا بلا کر اور پروجنی سنڈ کے مریض نقصان دہ ہے۔

تجارتی مرکبات

INDICIN	(IDPL) 25mg caps 10	Rs 4 70	آئی ڈی سین
INDOCAP	(JAGSONPAL) 25mg caps 10	Rs 8 10	انڈو کیپ
INDOFLAM	(RECON) 25mg caps 10	Rs 7 96	انڈو فلام

ISOPRO PYLAN TIPYRIN آئی سو پرو پائل این ٹی پائی رین

افعال و منافع: وجع المفاصل، تخریف المفاصل (مٹھیا، جوڑوں کا پتھرا جانا) جوڑوں میں نئی ساختوں کے سبب ہونے والا درد، نقرس، موج، غصہ ریف، غشاء العظام و دیگر عضلات و عظام کے درد میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱۵۰ سے ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۴ بار

KETO PROFEN

کیٹو پرو فین

افعال و منافع: مٹھیا، جوڑوں کا پتھرا جانا، ہڈیوں کے جوڑوں کا جڑ جانا ساخت بننے کے سبب ہونے والا درد سر کے مہروں میں درد ورم عضلات و عظام و حوض کے درد میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۴ بار کھانے کے ساتھ۔
متقی افعال: زخم معدہ، امراض قلب جریان خون کے اور دوا سے الرجک سرینوں کو نہ دیں۔
مضر اثرات: متلی قم معدہ پر درد جلن، اسہال پیٹ کی خرابیاں آتے، چکر آنا درد سر، جلد پر داغ پڑنا، بھوک کی کمی، ورم تھج oedoma جسم میں پانی رکنا، معدہ میں زخم بننا، قات غذائی سے جریان خون، ڈپریشن، بھارت میں فرق وری ایکشن ہو سکتا ہے۔
دواؤں کا رد عمل: اسپرین اور مانع انجماد خون ہادیہ کے ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں۔

تجارتی مرکبات

OSTOFEN	(TORRENT)	استوفین
50mg caps 10	Rs 8 90	
PROFENID-CR	(RHONE POULENC)	پروفینڈ
100mg controlled release caps 10	Rs.30.25	

KETO ROLAC TROMETHAMINE

کیٹورولیک ٹرو میتھامین

افعال و خواص: اپریشن کے بعد ہونے والا معمولی اور شدید درد، شدید درد گردہ، چوٹ کینسر کے درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: خوردنی، ۱۰ ملی گرام دن میں ۳ بار فوری سکون کے لئے ۳۰ ملی گرام عضلاتی بنیں۔

منفی افعال: حساس مریضوں کو زخم معده کے مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: متلی، بد ہضمی، درد فم معده، اسہال، قبض، نفخ، شکم زخم معده، مقعد سے خون آنا، قلاع (بے پکن) خشکی، چکر درد سر، خشکی بے چینی ڈپریشن نیند کی کمی سانس میں تنگی دم، پیشاب بار بار آنا، بھنبی پی اچھٹا لگنا، و بصرات میں فرق ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جریان خون کی حالت میں، مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ، گردوں کے امراض سرخ ذرات RBC کی کمی میں پروٹین والی دواؤں اور غذاؤں کے ساتھ احتیاط رکھیں۔

تجارتی مرکبات

DOLAC	(CADILA)	10mg tabs 10: Rs. 17.70	ڈولاک
KELAC	(INTAS)	10 tabs: Rs 18 00	کیلاک مہلیٹ
KENALFIN TABS	(GUFIC)	10mg tabs 10: Rs 18 10	کینال فین مہلیٹ
KETANOV	(RANBAXY)	10mg tabs 10: Rs 19 70	کیٹانو مہلیٹ
KITONIC TABS	(NICHOLAS-PHARMAL)	10mg tabs 10: Rs 18 00	کیٹانک مہلیٹ
KITOWIN	(DEE PHARMA)	10mg tabs 10: Rs 18.70	کے ٹوون
NODINE	(PROTEC)	10mg tabs 10: Rs 17.73	نوڈن
TOROLAC	(LUPIN)	30mg/1ml inj Rs. 18.00	ٹورولیک
TORVIN	(TIDE (TORRENT)	10mg: tabs: 10: Rs. 18 90	ٹورون مہلیٹ
TRONAL INJ	(BIOLOGICAL E)	30mg/1ml inj Rs. 10	ٹرونال انجکشن
TRONAL TABS	(BIOLOGICAL E)	10mg: 10: Rs. 10	ٹرونال مہلیٹ
ZOROVON	(SUN PHARMA)	10mg tabs: 10: Rs 18	زورون مہلیٹ

ZORQVON INJ (SUN PHARMA)

زورون انجکشن

30mg per ml inj 1 amp Rs 9.10

MEFANAMIC ACID

مفنی ٹامک ایسڈ

افعال و منافع: عضلاتی، چوٹ کا درد، دانتوں کی تکالیف، درد سر، ہڈیوں کے جوڑوں میں درد، جوڑوں کے پتھر اجانے اور حیض کی تکالیف میں مفید ہے بچوں میں دافع بخار اثر کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے کے ساتھ یا فوراً بعد بچوں کو سرپ پلائیں ۷ دن سے زیادہ دوا نہ کھلائیں۔

منفی اثرات: معدہ کے زخم و درم میں حمل، گلو کو ما گردوں و جگر کے امراض، آنکھوں کے درم میں اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: اسہال جلد پر داغ، گردوں کی خرابی خون میں تھرا سین کی کمی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: مزمن شری Urticaria اور دمہ میں پانی کی کمی میں اور یوڑھے افراد میں احتیاط رکھیں۔ دوران علاج خون کی جانچ کراتے رہیں۔

دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، سلفونائی لوریا پائی ڈیٹا ئن کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

DYSMEN (SIGMA LABS)

ڈس من

250mg, dicyclomine hcl 10mg tabs: 10: Rs. 10 65

LENAGESIC (TATA PHARMA)

لے نا جے سک

250mg, acetaminophen 500mg tabs 10: Rs. 8 00

MEFTAL (BLUE CROSS) 250mg tabss 10: Rs. 9.90

PLACENTIR FX (ALBERT DAVID) 2ml Rs. 5 99

میف ٹال
پلاسٹن ٹریکس
پان اسٹان کپسول

PONSTAN KAPSEALS (PARKEDAVIS)

250mg: 10: Rs. 12 40; 500mg: 10: Rs. 18.50

ZE-SPAS (KEE PHARMA)

زی اسپاس

250mg, with dicyclomine hcl 10mg: tabs: 10: Rs. 11.50

NAP ROXEN

ناپروکسن

افعال و منافع: وجع المفاصل، نحر المفاصل (جوزوں کا درد، پتھراجلا) جوزوں میں نئی ساخت بنانا، کمر کے مہروں میں درد و درم شدید نقرس، عضلات و عظام میں نئی ساختوں کے سبب درد و درم اور جینٹ کے درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار یومیہ مرض کو کنٹرول میں رکھنے کے لئے ۲۵۰ ملی گرام سوتے وقت درد جینٹ اور دیگر دردوں کے لئے ۵۰۰ ملی گرام پہلی خوراک پھر ہر ۸ گھنٹہ بعد ۲۵۰ ملی گرام بچوں کو ۱۰ ملی گرام / ۲ خوراکیوں میں تقسیم کے شدید نقرس میں ۷۵۰ ملی گرام پہلی خوراک پھر ہر ۸ گھنٹہ بعد ۲۵۰ ملی گرام دی جائے۔

منفی افعال: زخم معدہ اور حساسیت کے مریضوں کو اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔
مضر اثرات: فور ہیم، غذائی مٹی میں جریان خون، زخم معدہ قبض معدہ میں جلن درد شکم، حلی درد سر، چکر آنا خستگی، کھجلی جلد پر دلخ پڑنا، کان بجنا جسم پر درم Oedema درم گردہ پر کان درم جگر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: زخم معدہ، ہضم کی خرابی، جگر اور گردوں کے امراض استقاء، القلب ہائی بلڈ پریشر و زخموں، حاملہ یا مریضات اور مرگی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کا رد عمل: پردیسی سڈو فیک تیزابیت سوزیم ہائی کلرڈ خوردنی مائع نمک بخار خون ہودیہ فین ٹائن ایجووٹیکٹ سلفونامائیڈ دافع ذیابیطین اور دیگر پول ہودیہ کے ساتھ ضرر رساں ہے۔

تجارتی مرکبات

NAPROSYN (SEARLE) 250 mg tabs: 10: Rs. 26.58
XENORD (RALLIS) 275mg tabs 10x10: Rs. 316.50

ناپروکسن
زیڈیڈ

NIMESULIDE

نی می سولائیڈ

افعال و منافع: نحر المفاصل (جوزوں کا پتھراجلا) جوزوں میں درد، کنسر کا درد، آجینٹس کے بعد کا درد کھیل کودات کی جوت ٹاک کان ملن کا درد کھج عروق احشاء نوبائی کی تکلیف میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار

متنی افعال: زخم معده میں جگر کی خرابیوں حمل اور لیام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: دوسرے متلی تے، معده میں جلن اسہال جلد پر داغ کھجلی چکر آنا نیند کی زیادتی۔

احتیاط: معمر افراد میں اور گردوں کے فعل کی کمی میں احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: دہل پورک ایسڈ، مالبوٹامائیڈ، فردی مائیڈ میٹھوٹرکسیت، خوردنی مانع الجملہ خون

ادویہ کے ساتھ خراب اثرات رونما ہوتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

NIMESEL	(WAVE)	نی میل
100mg. tabs 10	Rs. 27 00	
NIMIND	(INDOCO) 10 tabs	نی مائنڈ
	Rs 22.00	
NIMULID	(PANACEA) 100mg. tabs 10	نی مولڈ
	Rs 29 50	
REMULIDE	(RECON) 100mg. tabs. 10	ری مولڈ
	Rs. 24 00	

OXYPHEN BUTAZONE آکسی فین بیوٹازون

افعال و منافع: وجع الغاقل، تھج الغاقل (جوڑوں کا درد پتھرا جانا) ہڈیوں کی جھلی میں درد و درد نقرس و گردن کے مہروں میں درد و درد میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

متنی افعال: ہاتھ پر درد مٹج (Oedema) ہائی بلڈ پریشر، اسپرین اور دوسری دافع درد و دواؤں NSAID سے الرجی میں ضعف قلب، زخم معده اور ۱۴ سال سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: زخم معده، جگر کی کمزوری، خون میں تھیلی، جلد پر داغ پڑنا اور دشکم بخار طلق میں خراش پڑنا۔
احتیاط: جگر اور گردوں کے شدید امراض، درد، حمل، اور لیام رضاعت، طویل عرصہ تک دوا کے استعمال سے احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: مانع الجملہ خون دوائیں، دافع ذیابیطس دوائیں، فین مائن سلفونامائیڈ، ڈیہاکسن کاربی سوکے مرکبات اور دوسری دافع درد NSAIDS کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

ALGIRIL TABS	(P&B LABS) 10 tabs Rs 7 80	ال جیل
BUTAPROXYVON	(WOCKHARDT) caps 8. Rs. 8 40	بچہ پراسکون
BUTADEx	(CADILA) tabs 10: Rs. 4 09	بچہ پراسکون
COMBIGESIC	(UNILODS)	کمیجے سک
JAGRIL	(JAGSONPAL) 10. Rs. 4 05	جاگ ریل
PHENABID	(IDPL) 100mg tabs 10. Rs 3 80	فینابڈ
REPARIL	(FDC) 100mg tabs 10. Rs 2 28	ری پے ریل
REDUCIN	(UNIQUE) tabs 10 Rs. 4.45	ریڈیو سن
SIORIL	(ALBERT DAVID) 100mg tabs 10. Rs 5 40	سایورل
SUGANRIL	(S G. PHARMA) 100mg tabs 10 Rs 6 39	سگازل
SYSTAFLAM	(SYSTOPIC) 10 Rs 14.10	سیسٹا فلام
TROMALGIN	(LA PHARMA) 10 Rs 4.71	ٹرومال جین

PHENYL BUTAZONE

فینا نکل بیوٹازون

انفعال و منافع: وجع المفاصل، تھک المفاصل ہڈیوں کی جھلی میں ورم، ریزہ کے مہروں میں درد ورم
 تقریباً ریزہ کے مہروں کا اکثر چاتا کر کے درد میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ابتدا میں ۲۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار کھانے کے بعد دودھ سے لینا چاہیے۔
 منفی انفعال: زخم معدہ کے مریضوں میں سخت مضر ہے۔
 مضر اثرات: حلی، قے، یورڈ، نف، جلد پر دلخ، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔
 احتیاط: قلب و گردوں کے امراض اور ہائی بلڈ پریشر میں احتیاط لازم ہے۔
 دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد و خون، دافع ذیابیطیس، فین مائن، سلفونامائیڈ، ڈیپاکسن کارنی سون کے
 ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

ACTIMOL	(PHARMED) 10. Rs. 6.50	اکٹی مول
ARTHOZOLIN TABS	(REMEDIES INDIA) Rs. 5 91	ارٹھوزولین

ESGIPYRIN (S G PHARMA)
 3ml 5 amps Rs 14 56, 5ml 5amps Rs 19 62
PARABUTAZONE (LIFE) 10 tabs Rs 3 53
PHENORIN (JAGSONPAL)
ZOLANDIN (S G PHARMA)
 100mg 10 Rs 4 46, 200mg 10 Rs 8 35

ایکسپائرین

پیرا بٹازون

فینورین

زولاندین

PIROXICAM

پائی راکسی کام

افعال و منافع: شدید وجع المفاصل، تخریب المفاصل، نئی ساختوں کلور ہوردمہروں کے دردورم نقرس، اعصاب و عضلات کی دردناک انٹلٹن کشیج چوٹ آپریشن حیض کے درد میں مفید موثر ہے۔
 مقدار و ترکیب: گھٹیا کی درد میں ۲۰ ملی گرام روزانہ مایک خوراک نقرس حیض اور شدید عضلاتی درد میں ۳۰ ملی گرام ایک خوراک ۲ دن تک پھر ۲۰ ملی گرام روزانہ ۷ سے ۱۴ دن تک انجکشن کی مقدار بھی اسی طرح بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

منفی افعال: حساس مریضوں کو سینہ میں دردورم و تھج جو دافع درد دلوں سے پیدا ہو اور زخم مہر میں اس کا شمل خراب اثر کرتا ہے۔

مضر اثرات: فور ہضم ورم تھج، نظام عصبی میں خرابی ضعف خاتمیت کان بچنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ احتیاط: و، آپریشن، جگر اور گردوں کے افعال میں خرابی، جریان خون اور انفکشن، ضعف قلب ہائی بلڈ پریشر، مسل رضاعت میں اور ۱۲ سال سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد خون لودیہ، دافع دردورم NSAID دافع ذیاطیس اور لیجیم کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

BREXIC (WOCKHARDT)
 10mg 6 Rs 7 32 20mg 6 Rs 12 47
DOLONEX (PFIZER)
 caps 10mg 10 Rs 19.20, 20mg 20 Rs 27 56

بریک سک

ڈولونیکس کپسول

DOLONEX I.M. (PFIZER)

Piroxicam 20mg per ml inj. 1ml amp Rs 7 48, 2ml amp Rs 13 95

INFLAVAN 10/20 (LA PHARMA)

10mg 10 Rs 3 81, 20mg 10 Rs 4 88

MINICAM GEL. (BLUE CROSS) 30g Rs 21 00

MINICAM D.T. (BLUE CROSS) 20mg tabs 10 Rs 23 50

MODACT-20 (MERIND) 20mg caps 10 Rs 25 33

MOVON-20 (IPCA) 20mg caps 10 Rs 14 00

PIRICAM (ALIDAC)

10mg 10 Rs 5 10 20mg 10 Rs 8 75

PIROX GEL (CIPLA) 30g Rs 22 65

PIROX - 10/20 caps (CIPLA)

10mg 10's Rs 16 25, 20mg 10 Rs 25 20

PIROX DISTABS (CIPLA) 20mg tabs 10's Rs 27 60

PIROX INJ. (CIPLA)

20mg per ml inj 1ml Rs 5 60 2ml Rs 9 59

SERRATIO PEPTIDASE

سراٹو پیپ ٹی ڈیس

افعال و منافع: آپریشن چوٹ، ایکسیڈنٹ کے سبب ہونے والا درد و زخم، زخم، زکام، لگنا، ہلکی دھڑکیاں میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۳ سے ۱۰ ملی گرام کھانے کے بعد۔

مثلی افعال: انجماد خون کی شکایت جگر اور گردوں کی شدید خرابی میں اس کا استعمال مضر ہے۔
مضر اثرات: ہائے کی خرابی، بد ہضمی، بھوک کی کمی سے متلی ہو سکتی ہے۔
احتیاط: دوائے حساس مریضوں کو نہ دیں، مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ نہ استعمال کریں۔

تجارتی مرکبات

BIDANZEN (BIDDLESAWYER) 5mg tabs 10 Rs 33 80

FLANZEN (SIGMA LABS)

tabs 2 5mg 10 Rs 17 98, 5mg 10 Rs 32 62, 10mg 10 Rs 56 06

KINETO (SYSTOPIC) 5mg tabs 10 Rs 35 80

MAXILASE FORTE (TABETS INDIA)

SERPA (KAMRON)

5mg 10 Rs 32 50, 10mg 10 Rs 58 90

ZEDASE (GUARDIAN (CROSLANDS))

5mg tabs 10 Rs 35 00

کائی نے نو

میٹزی لیس فورٹ

سرپا

زیڈیس

NUTRITION

طاقت بخش ادویہ

GINSENG

جن سینگ

افعال و منافع: یہ ایک کوریائی بوٹی ہے جو مقوی اعطائے ریسرڈ شریف ہے۔ کمزوری، بے چینی،
جراثیمی اور ذہنی تھکاوٹ، بیماری و دواؤں کے جب ہونے والی کمزوری دور کرتی ہے۔

مقدار: ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار

تجارتی مرکبات

BIOVITAL (MICRO LABS) Rs 36 00

GINSEC (DUPHAR)

250mg 10 Rs 42 00 . 500mg 6 Rs 42 00

GINTONA (LYKA) 10caps Rs 43 80

GLENGENG TONIC (GLENMARK) 180ml Rs 50 90

GLENGENG-500 (GLENMARK)

Korean ginseng powder 500mg caps 10 Rs 66 52

JENSHENG (BIOLOGICAL E) 250mg 10 Rs 47 50

TRINERGIC (UNICHEM) 10 Rs 45 00

REVITAL (RANBAXY)

10 caps Rs 49 50, 30 Rs 138 75

REVITAL LIQUID (RANBAXY) 100ml Rs 55

WINOFIT GINSENG (WOCKHARDT) 240ml Rs 26 45

WINOFIT GINSENG CAPS (WOCKHARDT)

panax ginseng 75mg & other herbal ingredients caps 30 Rs 58 00

بایو ویٹل

جن سیک

جن ٹونا

گلین سینگ

گلین سینگ کپسول

جن شینگ

ٹرائی نرگ

ریوٹی ل کپسول

ریوٹی ل سرپ

وینوفٹ سرپ

وینوفٹ سرپ

مستہبی (بھوک بڑھانے والی) ادویہ

APITITIC STIMULANTS

CYPRO HEPTADINE سائپر وپٹاڈین

افعال و منافع: بھوک کی کمی، عام جسمانی کمزوری، آپریشن لمبی بیماریوں کے جب ہونے والی کمزوری جیسے کو دور کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: بچوں کو ۵ ملی لٹریا گولی ہفتوں کو ۱۰ سے ۲۰ ملی لٹریا ۲ گولی دن میں ۲ بار
منفی افعال: گھم کوہا، پیشاب رکھنے آنتوں میں رکاوٹ اور حساس مریضوں کو استعمال نہیں کرنا
ہوئے۔

تھیٹ: اس کے استعمال کے بعد ذرا پیوری کرنا مشنری چلانے سے احتیاط رکھیں۔

تجارتی مرکبات

APITAMINE LIQUID	(TABLETS INDIA)	سے پناہ سین لکوز
200ml Rs 35 00		
CARMIPHOS SYRUP	(CARMINOL)	کارمی فاس سرپ
200ml Rs 23 40		
CIPLACTIN	(CIPLA) 110ml Rs 10 95	پلاکٹین سرپ
CIPLACTIN TABS	(CIPLA) 4mg tabs 10 Rs 2 77	پلاکٹین ٹبلٹ
CYDINE	(CFL) 200ml Rs 30 80	سائیڈین
CYP-L	(ALBERT DAVID) 200ml Rs 30 69	سائپ ایل
CYPON SYRUP	(GENO) 200ml Rs 32 00	سائی پون سرپ
CYPROWAL (WALLACE)	175ml Rs 28 90	سائپر ووال
MAGNADYN	(PFIMEX)	میگناڈین
Cyproheptadine hcl 2mg L-lysine monohydrochloride 150mg. per ml		
syrup 120ml Rs 15 00, 200ml Rs 26 00		
MERIZYME DROPS	(MERCURY) 15ml Rs 15 90	مریزیڈ ڈراپس

PERITOL

(THEMIS CHEMICALS)

4mg tabs 10: Rs.7.50

پیری ٹول ٹبلیٹ

PRACTIN TABS

(MERIND) 4mg tabs; 10: Rs.4.77

پراکٹین ٹبلیٹ

HAEMATINIC**مولد خون و فولاد کے مرکبات**

افعال و منافع: خون کی کمی، فولاد کی کمی، نقص تقدیرہ حمل، مرض پلاگرا، خون کا اخراج دودھ پلانے، ہک ورم سکرہنی کے سبب ہونے والی خون کی کمی، میگالوبلاستک، انیسیڈائی مارکٹ انیسیا وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اسال تک ۵ بوند دن میں ۲ بار ۲ سے ۵ کو ۵ سے ۲ مل لیٹرنالوں کو ۱۵ سے ۳۰ مل لیٹرنالوں دن میں ۱ بار گولی صبح و شام کھانے کے بعد انجکشن ۲ مل لیٹرنالوں صرف عضلاتی لگائیں۔
منفی افعال: گردوں میں ورم جگر کے شدید امراض وٹامن بی ۱۲ کی کمی کے سبب ہونے والے انیسیا میں اس کا استعمال معتر ہے۔

احتیاط: گردوں کے فیل ہونے جگر کی خرابی شدید متعدی امراض حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں احتیاط لازم ہے۔ انجکشن گہرا عضلاتی لگائیں وریڈی اگر دیتا ہو تو پہلے ٹسٹ کر لیں۔

تجارتی مرکبات**ANEMIDOX**

(MERCK) caps 30: Rs.23.54

اے نی ڈاکس

ASTYFER

(TABLETS INDIA) tabs 2x15: Rs.57.44

ایسٹ فر ٹبلیٹ

ASTYFER LIQUID

(TABLETS INDIA) 200ml: Rs.37

ایسٹ فر لکویڈ

AUTRIN

(LEDERLE) 30: Rs.18.19

آٹرن

BLOSYN

(GULFIC) 30: Rs.20.76

بلوسائن

BLOSYN

(GULFIC) 300ml: Rs.36.20

بلوسائن لکویڈ

CALPRO ZE CAPS

(NEON) caps: 30: Rs.37.00

کال پرو زی

CAPSOVT (CAP)

(PHARMED) 10: Rs.8.00

کپ سوٹ

CENOLPLEX

(CARMINOL LABS)

سنو پلکس

200ml bottle: Rs.30.00

CILFER-12F ORAL

(DUPHARO 120ml: Rs 9 21

سل فر

CONVIRON-TR

(RANBAXY) 10: Rs.15.20

کان دی ران

DEFERON LIQUID	(DEYS) 110ml Rs.11.60	ایفران
DEXORANGE PLUS	(FRANCO-INDIAN)	دیکسورج
200ml Rs 38.70		
FACICAP	(KAMRON) 200ml. Rs.29.50	فیس کیپ سرپ
FACICAP CAPS	(KAMRON) caps 10. Rs.9.50	فیس کیپ کھول
FALBITONE PLUS TONIC	(FALMA)	فال بی ٹون
200ml Rs 32.95		
FALBITONE PLUS CAPS	(FALMA)	فال بی ٹون
300mg: 3x10. Rs.33.00		
FECONTIN-Z	(MODI-MUNDI PHARMA) 10: Rs.13.50	فی کون ٹین زی
FEFOL-Z SPANSULE	(SMITHKLINE) 30: Rs.36.15	فی فول زی
FERINOVA CAPS	(LUPIN) caps 10: Rs.5.00	فیری نووا کھول
FERINOVA DROPS	(LUPIN) 10ml: Rs.12.00	فیری نووا ڈراپس
FERINOVA SYRUP	(LUPIN) 210ml: Rs.12.00	فیری نووا سرپ
FERRADOL	(PARKEDAVIS) 454g: Rs.27.00	فیراڈول
FERROCIN	(P&B LABS) 110ml Rs.14.29	فیروسین
FERROSTAN LONGULES	(SOL) caps 10x10: Rs.60	فیروسٹان
FERROUS FUMARATE TABS IP	(J&J DECHANE)	فیرس لیوی ریٹ
500 Rs.25.00		
FERRUM FOL	(KHANDELWAL) 10: Rs.16.94	فیرم فول
FESOFOR-Z SPANSULE	(SMITHKLINE) 30: Rs.29.66	فیسو فور زی
FESOVIT ELIXIR	(SMITHKLINE) 100ml: Rs.13.56	فیسوٹ سرپ
FESOVIT SPANSULE	(SMITHKLINE) 30: Rs.19.13	فیسوٹ کھول
GLOBAC	(ALIDAC) 60: Rs.50.00	گلوبیک
GLOBAC LIQUID	(ALIDAC) 200ml: Rs.33.40	گلوبیک سرپ
HEAM UP	(CADILA) 200ml: Rs.33.40	ہیم اپ
HEAM UP GEMS	(CADILA) 100: Rs.88.10	ہیم اپ کھول
HAEMATINGA CAPS	(INGA) 30: Rs.18.50	ہے ٹنگا کھول
HAEMATINGA LIQUID	(INGA) 225ml: Rs.29.50	ہے ٹنگا سرپ
Hb PLUS	(TOTTENT) caps: 10: Rs.5.22	ایچ بی پلس
Hb RICH	(TOTTENT) 200ml: Rs.31.90	ایچ بی ریچ
HEMATRINE	(SANDOZ) caps 30: Rs.30.10	ہیما ٹرین

HEMFER	(ALKEM) 200ml Rs 34 50	ہیملر
HEMSYNERAL-TD	(U S VITAMIN) caps 10 Rs 5 83	ہیم سائیٹی رال
HEPASULES	(BIOLOGICAL E) caps 10 Rs 9 40	ہیپاسیول
HEPATOglobin	(RAPTAKOS) 300ml Rs 45 10	ہیپاگلوبین
HEPP FORTE	(LUPIN) 200ml Rs 33 40	ہیپ فورٹ
IBEROL	(ABBOTT) 30: Rs.17 20	ای بی رال کپسول
IBEROL-500 LIQUID	(ABBOTT) 150ml. Rs 27 58	ای بی رال لکویڈ
IMFERON	(RALLIS) 10ml vial Rs.12 86	ایم ای رال انجکشن
INCREMIN SYRUP	(CYANAMIDE) 180ml Rs 22 92	انکریمن
IROSPAN-Z	(PHARMASIA) caps 10 Rs 8 59	آئی رو سپان زیڈ
JECTOFER	(CFL) amp Rs.12 70	جیکٹوفر
J.P. TONE	(JAGSONPAL) 200ml Rs 28 20	جے پی ٹون
LIVOGEN CAP	(GLAXO ALLENBURRYS)	لوو جین
LYSIRON	(ETHNOR) 20ml Rs 17 14	ای لی سورن
NEO-FERRUM INFANTS	(DUPHAR)	نیو فیرم
14ml (with dropper) Rs 3 40		
NORI-A	(BURROUGHS WELLCOME) 500 Rs.18 91	نوری اے
NLRTIFIL	(WARNER HINDUSTAN) 300ml Rs 37 30	نوٹری فل
OSIFORT-F	(SYSTOPIC) caps 10 Rs 10 00	اوسی فورٹ
PENTAVITE	(NICHOLAS) 300ml Rs 25 77	پینٹاویٹ
PHOSFOMIN IRON	(SARABHAI) 250ml Rs 16 35	فاسفومین آئرن
PROBOFEX	(WOCKARDT) 180ml. Rs 18 60	پروبو فیکس
PROBOFEX CAPS	(WOCKARDT) caps 30 Rs 28 50	پروبو فیکس کپسول
PROFERIN	(INDOCO) caps 30 Rs 20 63	پروفرین
RARICAP	(ETHNOR) 40 Rs 25 00	ری ری کیپ کپسول
R.B.TONE	(MEDLEY) 225ml Rs 32 55	آر بی ٹون
REDIPLEX	(WARNER HINDUSTAN) 10 Rs 7 99	ریڈی پلکس
REDITONE PLUS	(BLUE CROSS) 10 Rs 9 90	ریڈی ٹون
RUBRAPLEX	(SARABHAI) 240ml Rs 21 40	ریبرا پلکس
SIXAPP	(FRANCO INDIAN) 280ml Rs 23 64	سکس ایپ
TONIAZOL	(BOEHRINGER) 300ml Rs 17 92	ٹونیازول
TONOFERON	(EAST INDIA) 450ml Rs 41 94	ٹونو فیرن سرپ

TONOFERON DROPS (EAST INDIA) 15ml Rs 9 14 نوٹو فیرون ڈراپس
ULTIRON TR (STANCARE) caps 10 Rs 12 50 الٹی ران
VITCOFOL IRON CAP (FDC) caps 30 Rs 13 11 وٹ کو فول کپسول
VITCOFOL SYRUP WITH IRON (FDC) 180ml Rs 14 58 وٹ کو فول سیرپ

HUMAN ERYTHRO POIETIN

ہیومن رائی تھرو پوائیٹین

انفعال و منافع: مردوں کے فیل ہونے کے سبب ہونے والا انیمیا میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۵۰ یونٹ / فی کلو گرام کے حساب سے وریدی آہستہ آہستہ ۱ سے ۲ منٹ میں لگائیں۔

احتیاط: تسد عروق، قلبی بیماریاں، دورے پڑنا، نقرس کی ہسٹری حمل اور ایام رضاعت اور بچوں کو احتیاط برائیں۔

تجارتی مرکب

HEMEX

(HALL) 2ml vial Rs 1890 00

ہے بیکس

وہ دوائیں جو عام طور سے قے متلی پیدا کرتی ہیں

الوپری نال، انٹی بائیوٹک، برومو کریپٹن، سائی ٹوٹاکسک، ڈی جاکسین،
 گولڈ کے مرکبات فولاد۔ لووڈوپا، دافع درد ورم ادویہ اسٹروجن، الفیم کے
 مرکبات۔ پینی سیلایم۔ کوئی نی ڈین سلفا سالازین۔ تھیوفائی لین۔
 تھیازائیڈ۔

پروٹین، خلاصہ جگر اور غذائیت والے مرکبات

PROTENS, LIVER EXTRACT

AND SUPPLEMENTS

افعال و منافع: پروٹین کی کمی، خون کی کمی ضعف نقابت بیماریوں کے بعد کی کمزوری کساح (سوکھا) میں مفید ہیں۔

منفی افعال: ان مریضوں کو جن کے جسم میں فولاد کی مقدار زائد ہو متعدد امراض گردوں میں ورم جگر کے حادثہ امراض حمل کے ابتدائی سہ ماہ میں نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: انجکشن کو لہے پر گہرا عضلاتی لگائیں مٹی ڈوز ہمیشہ عضلاتی لگائیں وریڈی انجکشن سے پہلے ٹسٹ ضروری کر لیں۔

تجارتی مرکبات

AMINOZYME	(STADMED)	200ml	Rs 32 00	امینوزائم سیرپ
AMINOZYME TABS	(STADMED)	10	Rs 6 30	امینوزائم ٹبلٹ
CALPRO SYRUP	(NEON)	200ml	Rs.36 00	کال پرو سیرپ
CENOLPRO POWDER	(CARMINOL)	200gms	Rs 45 00	سینول پرو پوڈر
ECOPROT PLUS	(JENBURK)			ایکوپروت پلس
ENERJAL	(MEJDA)	50gm	Rs 7.50	انرجل
GEFRICH	(MEJDA)	200g	Rs. 58 25	جیفرک
GLENTONAS SYRUP	(GLENMARK)	200ml	Rs. 19 91	جے لن ٹوناس سیرپ
GRD	(CADILA)	powder 200g	Rs 58.25	جی۔ آر۔ ڈی
HYPROBEX LIQUID	(P&B LABS)	200ml.	Rs.34 50	ہائی پرو بیکس سیرپ
LIVOGEN	(ALLENBURYS)	450ml	Rs.49 56	لوو جن
NEOGADINE ELIXIR	(RAPTAKOS)			نیو گڈین الیکٹر
300ml		Rs 24.90	15-30ml b.i.d before meals	
NEO-HEPATEX	(BIOLOGICAL E)	10ml	Rs.13.05	نیو ہپے ٹیکس انجکشن

NURRISH LIQUID	(SMITHKLINE) 200ml: Rs.30	نورش لکوز
PROFETON	(MERCURY) 200ml: Rs.29.90	پروفنٹن
PROLIQ	(PHARMASIA) 200ml: Rs.35.70	پرولیک
PROSOYAL	(FDC) 200g Rs.45.00	پروسویال
PROTINULES	(ALEMBIC) 200g: Rs.59.50	پروتینولس
PRONUTRIN	(CFL) 200ml: Rs.24.10	پرونوٹرن
PRONUTRIN CAPS	(CFL) 10: Rs.8.65	پرونوٹرن کپسول
PROSUP	(MEDLEY) 200ml: Rs.27.80	پروسپ لکوز
PROTOFER	(DEE PHARMA) 200ml: Rs.30.00	پروفوٹر
PROTOMEAL	(BIOGENICS) 180ml : Rs.27.50	پروتومیل
SHARKOFERROL	(ALEMBIC) 450g: Rs.32.16	شارک فیروول
SOYAL	(FDC) 500g Rs.75.00	سویال
SYU	(AFD) 200g: Rs.48.00	سیو
VITONEX	(JAGGAT-PHARMA) 125ml: Rs.14.90	وٹونیکس

VITAMINS

وٹامن کے مرکبات

VITAMIN A

وٹامن اے

افعال و منافع: یہ روغن میں حل ہونے والا وٹامن ہے جسم میں جمع ہو سکتا ہے، وٹامن اے A اور ٹمبی اجزاء کے ہضم و جذب کی کمی سے آنکھوں میں خرابیاں مثلاً رمد چشم، التهاب قرنیہ شب کوری Night Blindness آنکھیں خشک رہنا، Xerophthalmia میں مفید ہے۔ اس کی کمی سے جسم میں انکھن کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے۔

نپاتی سے، بالوں کا خشک اور گھردرا ہونا، جلد میں خشکی اور سختی جگر بڑا، ای ایس آر E.S.R. سیرم کیلیم، سریم الکلائن اور فاسفیٹ کے لیول میں اضافہ۔

مقدار و ترکیب: ۲۲۵۰ یونٹ یومیہ بالٹوں کو حاملہ اور مرضہ کو ۴۰۰۰ یونٹ یومیہ دینا چاہیے۔

متقی افعال: ۲۵۰۰۰ یونٹ یا اس سے زائد حمل کی حالت میں دینے سے بچے میں پیدا نشی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔

مرکبات

AQUASOL A CAPS	(U.S. VITAMIN)	ایکواسول کپسول
Vit. A 50,000iu, caps 30: Rs.35 50		
AQUASOL A PARENTRAL	(U.S. VITAMIN)	ایکواسول انجکشن
Vitamin A 50,000 i.u. per ml 2ml Rs.6 82		
AROVIT (ROCHE)	Vit. A 50,000iu tabs: 10: Rs.11.11	ارووت ٹیبلٹ
AROVIT INJ (ROCHE)		ارووت انجکشن
Vit A 100,000iu per 2ml Rs.3.00		
AROVIT DROPS (ROCHE)		ارووت ڈراپس
Vit A 100,000 u per ml (30drps) 7.5ml: Rs.21.15		

VITAMIN B. COMPLEX

وٹامن بی کمپلکس

افعال و منافع: یہ کئی وٹامن کا مرکب ہے جس میں وٹامن بی ۱ بی ۲ بی ۳ بی ۵ بی ۶ اور بی ۱۲ شامل ہوتے ہیں۔ یہ وٹامن ناقص غذائیت کمزور بچوں اور بالوں کے لئے مفید ہیں جن بچوں کی نشوونما صحیح نہ ہو کمزوری دور کرنے جسم میں طاقت اور توانائی پیدا کرنے کے لئے استعمال کرنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

ANEUDOX 12 INJ	(P&B LABS)	اے نیوڈوکس انجکشن
3ml inj; 1x3ml Rs 4 90		
ANEUDOX 12 TABS	(P&B LABS)	اے نیوڈوکس ٹیبلٹ
10tabs Rs 2 49		
BECELAC	(PFIMEX) 10x10 Rs 155 00	بے سی لیک کپسول
BECOSULESCAPS	(PFIZER) 10 Rs 8 07	بیکاسیول کپسول
BECOSULES SYRUP	(PFIZER) 120ml: Rs12 90	بیکاسیول سرپ
BENALGIS	(FRANCO-INDIAN)	بنال جس
Vit B-1 75mg, tabs. 10. Rs.10 20		
BENEURON	(FRANCO-INDIAN)	بی نیورون
250: Rs.37.97		
BEPLEX FORTE	(ANGLOFRENCH) 10 Rs 7 86	بپلکس فورٹ ٹیبلٹ

BEPLEX FORTE ELIXIR (ANGLOFRENCH)	پاکس فورٹ سیرپ
100ml Rs 21.39	
BEPLEX FORTE INJ (ANGLOFRENCH)	پاکس فورٹ انجکشن
11ml vial & 1.1 ml amp Rs 20.51	
BERIN INJ (GLAXO)	برین انجکشن
Vitamin B1 IP 100mg per ml inj; 10ml Rs. 14.00	
BERIN TABS (GLAXO) 500: Rs. 350.00	برین ٹبلٹ
BESTOPLEX LIQUID (REMEDIES (INDIA)	بیسٹوپلکس سیرپ
200ml Rs. 23.25	
BETAVITE FORTE (NICHOLAS) 10. Rs. 10.13	بیٹا وائٹ
BETHADOXIN-12 (BIOLOGICAL E) 220ml Rs 30.17	بتھاڈاکسن سیرپ
BETHADOXIN-12 INJ (BIOLOGICAL E) 2ml Rs 4.50	بتھاڈاکسن انجکشن
BETONIN (BOOTS) 200ml. Rs. 17.98	بٹونین سیرپ
BETONIN CAPS (BOOTS) 10. Rs. 11.00	بٹونین کپسول
B.G. PROT (MERIND) 200ml Rs 25.10	بی جی پروٹ
HYCIBEX (CAP) (PHARMED) 10. Rs. 9.00	ہائی سی بی کس کپسول
HYCIBEX (SYR) (PHARMED) 200ml. Rs 24.00	ہائی سی بی کس سیرپ
KANPLEX FORTE TABS (KANPHA)	کان پاکس فورٹ ٹبلٹ
NEUROBION-INJ-TAB (MERCK)	نیرو بیاں انجکشن ٹبلٹ
Rs 4.87 tab 10.2.50	
KANPLEX FORTE SYRP (KANPHA)	کان پاکس سیرپ
200ml Rs 25.56	
LAVIEST (FRANCO-INDIAN) caps 10. Rs 14.54	لیوسٹ کپسول
BIVINAL FORTE WITH VIT C (ALEMBIC)	بیو وینال کپسول
B-LONG (ELDER) tabs: 10. Rs. 15.50	بی لانگ
CARMIPLEX SYRUP (CARMINOL) 100ml: Rs. 18.00	کارمی پاکس
COBADEX FORTE (GLAXO) 10: Rs. 9.85	کوباڈیکس
DEYPLEX CAPS (DEYS) 100: Rs. 61.58	ڈے پاکس
ELDERVIT CAPS (ELDER) caps: 10. Rs. 8.86	ایلڈر وٹ
ELSOMA (ROUSSEL) 300ml: Rs 21.84	ایل سوما
FALPLEX CAPS (FALMA) caps: 10: Rs. 9.80	فال پاکس کپسول
FALPLEX SYRUP (FALMA) 60ml: Rs. 9.20	فال پاکس سیرپ

NUTROLIN B PED. TABS	(CIPLA) 10: Rs. 11.20	نورولین
OLIAD BATH OIL	(SWIFT) 100ml: Rs. 56.90	ولی ایڈ باتھ آئل
OPTINEURON	(LUPIN) 3ml: Rs. 5.12	اپنی نورون
PALADAC	(PARKEDAVIS) 115ml: Rs. 19.80	پے لڈیک
PEDIC DROPS	(STADMED) 10ml vial: Rs. 9.52	پڈک ڈراپس
PENTAVITE	(NICHOLAS) 300ml: Rs. 25.77	پنٹا وٹ
PHOSFOMIN	(SARABHAI) 250ml: Rs. 16.07	فاسفومین
POLYBION	(MERCK) 10: Rs. 7.83	پولی بایون ٹیبلٹ
POLYBION INJ	(MERCK) 1amp: Rs. 2.31	پولی بایون انجکشن
POLYBION SYRUP	(MERCK) 100ml: Rs. 14.13	پولی بایون سیرپ
PREMOBION	(PREM PHARMA)	پری موبیون
2ml amp Rs. 5.00; 10ml vial: Rs. 15.00		
PYRICONTIN	(MODI MUNDI PHARMA)	پیری کونٹین
REGILAC-B	(PHARMASIA) 10: Rs. 17.03	ریگی لک بی
SAN-GA-REE ELIXIR	(P&B LABS)	سان گی ری سیرپ
THERAGRAN-M	(SARABHAI) 10: Rs. 11.27	تھیرا گران ایم
STAMINE INJ	(STADMED) 3ml amp Rs. 4.50	سٹامین انجکشن
STRESS CAPS	(CYANAMID) 30: Rs. 28.49	سٹریس کیپس
VBC-12 INJ	(NEON) 10x2ml amp: Rs. 33.80	وی بی سی 12 انجکشن
VITAPLEX	(EAST INDIA) 110ml: Rs. 6.96	ویٹا پلکس
VITNEURIN	(GLAXO) 2ml amp: Rs. 4.15	ویٹنورین

VITAMIN B12

وٹامن بی ۱۲

افعال و منافع: بڑی خوروں میں اس کی کمی ہوتی ہے حمل کے ایام میں وٹامن بی ۱۲ اور فولک ایسڈ کی نیدہ ضرورت پیش آتی ہے اس کی کمی سے میگالوبلاستک اینیمیا، دماغی کمزوری، نشوونما میں کمی پیدا ہوتی ہے جانوروں کے گوشت وغیرہ میں اس کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔

تجارتی مرکبات

ELDERVIT-12	(ELDER) Rs. 11.11	ایلدرو وٹ
NEUROXIN-12 INJ	(ALIDAC) 10ml vial: Rs. 13.79	نوروکسین
TRINEUROSOL	(MERIND)	ٹرائی نیوروسول

Vit B1 100mg, B6 5mg B12 50mg: tabs: 12: Rs.1.79

TRINEUROSOL DROPS (MERIND) 15ml:Rs.3.33

TRINEUROSOL-H INJ (MERIND)

5ml vial Rs.23.51

VICTOFOL DROPS (FDC) drops 15ml: Rs.5.28

VICTOFOL INJ (FDC) vial: Rs.13.76

VITEXID (SIGMA LABS) 10: Rs.16.50

ڈرائیو رو سل ڈرائیو
ڈرائیو رو سل انجکشن

ڈرائیو رو سل ڈرائیو
ڈرائیو رو سل انجکشن
والی ٹیک سٹ

VITAMIN C

وٹامن سی

افعال و منافع: اسکروی، مسوڑھوں کا پھولنا نزلہ زکام میں مفید ہے۔

تجارتی مرکبات

ASCORBIC ACID (NEON)

اسکاربک ایسڈ

Ascorbic acid 100mg/ml inj 5x5ml amp Rs.27.75

CEBION (MERCK) tabs 10: Rs.13.96

کی بیان ٹیبلٹ

CEBION DEOPS (MERCK) 30ml Rs.11.66

کی بیان ڈرائیو

CELIN (GLAXO) 500mg: 10: Rs.7.75

کی لین

CITRAVITE (PHARMED)

سائٹراوائٹ

450mg chewable tabs: 10: Rs.14.00

LIMCEE (SARABHAI) 10: Rs.10.26

لمی

SORVICIN (EAST INDIA)

سروی سین

500mg tabs: 10, Rs.4.81: Drops vitamin C I.P. 100mg per ml drops
15ml Rs 6.33

TILDOXON INJ (TABLETS INDIA)

ٹیلڈاکسن انجکشن

Ascorbic acid 100mg per ml inj. 5ml amps. Rs.32.00

VITAMIN -D

وٹامن ڈی

افعال و منافع: یہ روغن میں حل پذیر وٹامن ہے، بچوں کے مرض کساح، ہڈیوں کی کمزوری نشوونما
نہ کی ہڈیاں خمیدہ ہوتا، گردوں کی خرابی میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔

تجارتی مرکبات

CALCIROL	(CADILA)	کلیسی رول
Vit-D3 60,000 iu granules 1g: sachet, Rs.5.50		
OSTOCALCIUM B-12 SYRUP	(GLAXO)	آسٹو کیلشیم
160ml: Rs.12.06		
OSTOCALCIUM TABS	(GLAXO) 50	آسٹو کیلشیم ٹبلٹ
Rs.12.06		

VITAMIN E

وٹامن ای

افعال و منافع: یہ بانجھ پن کو دور کرنے والا عنصر Anti Sterility Factor بھی کہلاتا ہے۔ عضلات کی کمزوری و تشنج حوینات منویہ کی نشوونما میں کمی شحمی اجزاء کے انجذاب میں کمی اور بانجھ پن کو دور کرنے میں مستعمل ہے۔ اس کی کمی سے تولیدی صلاحیت میں کمی عاداتی اسقاط، بندش حیض اور صفر رحم و رات میں بیروں میں انٹنشن کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۳۰ ملی گرام یومیہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے مرض کی حالت میں زائد مقدار دینا چاہیے ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام بچوں کو ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام یومیہ

تجارتی مرکبات

EVION	(MERCK)	ای وی یان
Vit E 100mg, 200mg, 400mg, 600mg; pearls. Vitamin E deficiency		
100mg: 10: Rs.7.38; 200mg: 10: Rs.12.83; 400mg: 10: Rs.22.85		
600mg: 10: Rs.32.43 PEAD DEOPS 50mg: per ml 15ml Rs.16.66		
TOCOFER	(TORRENT)	ٹوکوفر
Vit E 200mg, 400mg peals. 200mg: 10: Rs.12.82; 400mg: 22		
VITEOLIN	(ALLENBURYS)	وی ٹیولین

Vitexid*

Offers the Right Dose of Vitamin E (25 mg)

کیلیسیم کے مرکبات

CALCIUM PREPARATION

افعال و منافع: ہڈیوں کی کمزوری، ہڈیوں کے نرم اور پکڑ دار ہونے گردوں سے کیلیسیم کے اخراج اور آنتوں سے انجذاب کی کمی سے پیدا ہونے والے عوارض کو دور کرتے ہیں۔

مقدار و ترکیب: پیکنگ کے ساتھ درج ہدایت کے مطابق۔

منفی افعال: جسم میں کیلیسیم فاسفیٹ میکنیشیم کی زیادتی میں حمل اور ایام رضاعت اور وزن کی زیادتی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: گردوں میں خرابی، فاسفیٹ کی زیادتی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: گردوں میں پتھری اور گردوں کی خرابی میں احتیاط رکھنا چاہیے۔

دواؤں کا رد عمل: ڈیجی ٹالس، تھیازائیڈ والی مدر ادویہ المونیم، میکنیشیم والی دافع تیزابیت، ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

MACALVIT SYP. INJ. (SANDOZ)

210ml Rs.34.58 inj 15ml Rs.11.30

OSCAL-12 INJ

(P&B LABS) 15ml: Rs.14.53

OSCAL-12 TABS

(P&B LABS) 10: tabs Rs.4.80

OCIUM

(MICRO LABS) 10: Rs.10.00

SANDOCAL-500

(SANDOZ) 20 tabs Rs.34.00

SHELCAL-250

(ELDER) tabs: 20: Rs.31.10

SHELCAL-500

(ELDER) 15: Rs.30.35

SHELCAL SYRUP

(ELDER) 150ml: Rs.32.10

SIGMA-CALVIT

(SIGMA LABS) 15ml: Rs.25.00

TRICAL-D 250

(SIGMA) 10: Rs.11.65, 150ml: Rs.29.41

TROYCAL

(TROIKAA) tabs 30: Rs.28.50

میکال وٹ سرپ۔ انجکشن

اوسکال انجکشن

اوسکال ٹیبلٹ

اوسیم

سندوکال

شیل کال ٹیبلٹ ۲۵۰

شیل کال ٹیبلٹ ۵۰۰

شیل کال سرپ

سگما کال وٹ

ٹریکال ڈی

ٹرویکال

VITAMINS & MINERALS حیاتینی اور معدنیاتی مرکبات

افعال و منافع: نقص تغذیہ بیماری آپریشن کے بعد کی کمزوری حمل اور ایام رضاعت چلنے دل و دماغ اور جگر کی کمزوری، کمزور اور سوکھا روگ میں جٹا بچوں میں اور انٹی بائیوٹک علاج کے دوران اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عصبی کمزوری تناؤ آنکھوں کا خشک رہنا، جلد اور آلات تنفس کے انفیکشن اینیما بیکٹریائی تشنج عضلات میں اس کا استعمال مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ذرا پس اسان سے کم عمر بچوں کو ۵ بوندوں میں ۲ بار بڑے بچوں کو ۱۰ بوند سرپ بچوں کو ۵ ملی لٹریالٹوں کو ۵ ملی لٹردن میں ۲ بار، گولی کپسول انجکشن ضرورت کے مطابق۔
احتیاط: جسم میں پانی کی شدید کمی میں وریڈی راہ سے دینا چاہیے کیلشیم کے اخراج کی حالت میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

ABDEC DROPS	(PARKEDAVIS) 15ml Rs. 13.70	ایڈیک ڈراپس
AQUAMIN	(PFIMEX) 200ml: Rs 28 97	ایکوامن
ASTYMIN FORTE	(TABLET INDIA) 2x10: Rs.76.00	اسٹائمن
ASTYMIN LIQUID	(TABLET INDIA)	اسٹائمن لکویڈ
110ml: Rs 35.27; 200ml: Rs 49 50		
ASTYMIN C DROPS	(TABLET INDIA)	اسٹائمن ڈراپس
15ml Rs.22 90		
BASITON FORTE	(SARABHAJ) 10: Rs.8.71	بے سٹون فلیٹ
BEETRION	(FRANCO-INDIAN) 10mg 10: Rs.6.91	بے ٹریون
CALRON	(EAST INDIA) 280ml Rs.18.36	کالرون
CARMIPLEX SYRUP	(CARMINOL) 200ml Rs.33.60	کارمی پلکس
CENOL FERRUM SYRUP	(CARMINOL)	سی نول فیرم
200ml: Rs.23 40		
DI-CALCII-PLEX	(KHANDELWAL)	ڈی کیلسی پلکس
112ml: Rs.19.71		
EBEXID	(SIGMA LABS)	ای بیکس سڈ
tabs: 18x10. Rs.207 00		

PRENATAL CAPS	(CYANAMID) 60: Rs.26.03	ہیٹی ٹی کپسول
SANTEVINI	(SANDOZ) 360ml: Rs.21.75	سائی وائی
SANVITONE	(UNI-SANKYO) 10: Rs.10.55	سان وی ٹون
VIZ CAPS	(KANPHA) 10: Rs.9.00	ویز کپسول
FILIBON	(LEDERLE) 50 caps Rs.43.26	فلی بون
GROMIN	(MEDLEY)	گرومین
170ml. Rs.22.80 Children above 1 year 5ml Adults 10ml both bid after meals.		
KINETONE	(BOOTS) 300ml. Rs.21.14	کینی ٹون
MITTAVIN	(BOEHRINGER)	مٹون
caps 30: Rs.27 07; 100: Rs.81.26		
MULTIVITE FM CAPS	(GLAXO)	ملٹی وائیٹ
NUTRISAN	(SANDOZ) caps. 30: Rs.13.55	نوزی سان
NUTROSEC	(TABLETS INDIA) 10: Rs.27.27	نوزو سک
NUTROSEC LIQUID	(TABLETS INDIA)	نوزو سک لکویڈ
110ml Rs.38 30; 200ml: Rs 23 85		

AMINO ACID INFUSION امینو ایسڈ یو فل

انفعال و منافع: جلتے چوٹ لگتے، ایکٹیوٹ کینسر، ورم پارٹون آسٹوں کے آپریشن ہانسنے کی خرابیاں، زخم اسٹار، مہلک اور لمبی بیماریوں کے سبب خون میں ٹائٹروجن کے تناسب کو درست کرنے کی ضروری دور کرنے اور توانائی کے لئے مفید ہے۔

مقدار ترکیب: ۲۰۰ سے ۸۰۰ ملی لیٹر دریدی یومیہ لگائیں بچوں کو عمر کے مطابق ابتدا میں ۱۵ سے

۲۰ یومیٹری منٹ بعد کو ۳۰ سے ۴۰ یومیٹری منٹ کے حساب سے چڑھائیں۔

نتیجہ انفعال: قلب بلور جگر کے باؤف ہونے پر نہیں دیتا ہے۔

احتیاط: یو فل تیز چلنے پر خراب علامات نمودار ہوتی ہیں اس کی احتیاط رکھنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

AMINODRIP	(WOCKHARDT)	امینو ڈرپ
200 ml -Rs.110 00, 500ml : Rs.220		

AND

ASTYMIN-3

(TABLETS INDIA)

ایس ٹائی من

200ml. Rs. 184 17

AMINOCORE-5S (CORE HEALTH CARE LTD)

اے مینوکور ایس ایس

500ml. Rs 220.00

دافع فرہبی (موٹاپا) دور کرنے والی ادویہ

ANTI OBESITY

DEX FEN FLORAMINE

ڈیکس فین فلورامین

افعال و منافع: فرہبی دور کرنے میں معاون ہے اس کے ساتھ اگر غذائی احتیاط برتی جائے تو نتائج بہتر ہوتے ہیں۔

مقدار و ترکیب: ۳۰ ملی گرام روزانہ دو خوراکیوں میں تقسیم کر کے صبح و شام ۳ ماہ استعمال کرائیں مثنیٰ اثرات، گلوکوما، بھوک کی کمی میں ڈپریشن، نفسیاتی عوارض شراب منشیات کے عادی حمل لیام رضاعت میں اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: منہ خشک، متلی قبض، اسہال چکر آنا، پیشاب کی زیادتی درد سر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: حرکات قلبیہ کی بے ترتیبی میں، جگر اور گردوں کی خرابی میں ہائی بلڈ پریشر میں دو ایک دم بند کرنے میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: MAOI ادویہ مسکن دافع بلڈ پریشر خونی ڈپریشن اور ٹریفی سائی کلک کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکب

ASOMERIDE

(SERDIA) 15mg 10: Rs 108 52

آسو میرائیڈ

GLUCOMANNAN

گلوکومانن

افعال و منافع: ذیابیطس شکر میں بطور معاون، خون میں شحمی اجزاء کی زیادتی، فرہبی اور قبض میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اگر ام ایک گلاس پانی میں حل کر کے، ۱۰ منٹ تک کھانے سے قبل استعمال کیا جائے۔

تجارتی مرکبات

DIETMANN (CADILA) ڈائٹ مین
 Glucomannan (fiber gel poly saccharide) 1G per sachet granules. 1G
 sachet 1 packet Rs.8.10

FENFLURAMINE

فین فلورامین

افعال و منافع: فرہی موٹاپا بھوک کی زیادتی کو کم کرتی ہے۔
 مقدار و ترکیب: فرہی کی نوعیت مریض کی قوت کے مطابق عموماً ۱۲۰ ملی گرام پورمہ کئی خوبیاں
 میں تقسیم کر کے دی جائے۔
 مضر اثرات: متلی قے۔
 منفی افعال: امراض قلب و جگر اور ہائی بلڈ پریشر میں نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

FLABOLIN-40 (WOCKHARDT) 40mg; cap 10 Rs 22.50 فلے بولین
SLIMERAX (BIDDLESAWYER) 20mg tabs 10 Rs 11 70 سلی ریگس

SUGAR SUBSTITUTE

شکر کے متبادل

SPARTAME SACCHARINE SODIUM

ایس پارٹیم سکرین سوڈیم

افعال و منافع: ذیابیطیس کے مریضوں کو شکر کی جگہ مشاس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
 مقدار: ۱ سے ۲ گولی دودھ یا چائے میں حل کر کے۔

تجارتی مرکب

ASPASWEET (INTAS) ایس پاسویٹ

Aspartame 18mg tabs: 100: Rs.19 50

ONE-UP (TORRENT) ون اپ

18mg pallets 100. Rs.32.00

RALSWEET**(RALLIS)**

رال سویت

9mg: tabs: 100: Rs.15.35

SUGAR FREE TABS**(CADILA)**

شوگر فری ٹیب

18mg tabs: 50: Rs.50; 100: Rs.34.00

SWEETEX PELLETS**(KNOLL)**

سوئی ٹیکس پی لیت

مصنوعی جنسی ہارمون

SEX HARMONES**(SYNTHETICS)****ALLY LONESTRENOL**

الائی لونسٹرول

افعال و منافع: محافظ حمل دوا ہے، حمل بچے کی پرورش کے ساتھ کوئی ہارمونی رد عمل پیدا نہیں کرتی، اسقاط مندرہ، عاداتی اسقاط حمل، قبل از ولادت کا ذب درد مشیمہ کے نہ بننے، استخاضہ اور قبل از حیض تناؤ اور درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اسقاط مندرہ میں ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار ایک ہفتہ عاداتی اسقاط میں ۲۰ ملی گرام یومیہ حمل کے پانچویں ماہ تک عدم مشیمہ میں ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام روزانہ یہاں تک کہ حمل قرار پا جائے استقرار حمل کے بعد ۱۰ ملی گرام روزانہ ۴ ماہ تک استخاضہ میں ۱۵ ملی گرام یومیہ عسر طمث میں ۱۰ ملی گرام یومیہ ۳ دن قبل حیض دینا چاہیے۔

منفی افعال: بہتان یا نسوانی اعضا کا کینسر جگر کی خرابی غیر تشخیصی مہلی جریان خون۔

مضر اثرات: ہاضمے کی خرابیاں، تھلی، تے۔

احتیاط: ذیابیطس مرگی، آدھاسیس (فتقہ) میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

ANIN**(SWIFT)** 5mg tabs 10: Rs.39 60

اے ن

FETUGARD (BIDDLES AWYER) 5mg tabs 10 Rs 39.75

فیتو گارڈ

FULTERM**(MICRO LABS)** 5mg: Rs. 29 05

فل ٹرم

MAINTANE
NIDAGEST

(JAGSONPAL) 5mg tabs 10: Rs.30.10
(SYSTOPIC) 5mg tabs: 10: Rs.25.25

مین ٹین
ڈا ایسٹ

کور یونک گوناڈوٹروپین

CHORIONIC GONADO TROPIN

افعال و منافع: یہ مردانہ زنانہ تناسلی اعضاء خصوصاً خصیۃ الرحم اور مردانہ خسیوں کو تقویت اور تحریک پہونچاتی ہے۔ حیض کا زیادہ دن آنا، غیر طبعی حیض آنا، ابتدائی اور ثانوی بندش حیض کا ریوٹیم کی عدم کارکردگی، بلوغت میں کمی، بیضہ انش کی عدم پیدائش، جنسی افعال میں کمی، عادتِ اسقاط خسیوں کا قہلی میں نہ آنا مردوں میں نسوانی خصوصیات، ورم خصیہ مردوں اور عورتوں میں جنسی سرد مہری میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ سے ایک ہزار یونٹ عضلاتی ہفتہ میں ۲ یا ۳ بار لگائیں اسے ۲ ماہ تک استخاضہ میں ۱۵۰۰ سے ۵۰۰۰ یونٹ جب تک خون بند نہ ہو جائے۔ ابتدائی اور ثانوی بندش حیض اور بیضہ انش کی عدم پیدائش میں ۱۰۰۰ یونٹ روزانہ حیض کے ۳ اوں ۵ اوں اور ۶ اوں دن دینا چاہیے۔
منفی اثرات: زیادہ مقدار میں بیضہ انش پر خراب اثر پڑتا ہے۔
مضر اثرات: درد شکم، بخار (الرجک ری ایکشن)۔
احتیاط: سلوشن تیار کرتے ہی لگا دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

CHORIOMON

(PANACEA)

کور یو من

2000 iu amp. Rs.465.00, 5000 iu amp. Rs.722.00

CORION 1000 IU

(WIN MEDICARE)

کور یون

1000 iu; 1 amp Rs.557.75

GONADOTRAPHIN LH

(BIOCHEM) Rs.225 00

گوناڈوٹروپین

GONOTROP-C

(MODI-MUNDI PHARMA)

گوناڈوٹروپ

1 amp Rs.557 75

MAINTANE
NIDAGEST

(JAGSONPAL) 5mg tabs 10: Rs.30.10
(SYSTOPIC) 5mg tabs: 10: Rs 25.25

مین ٹین
پراجیسٹ

کور یونک گوناڈوٹروپین

CHORIONIC GONADO TROPIN

افعال و منافع: یہ مردانہ زنانہ تناسلی اعضاء خصوصاً نصیبہ الرحم اور مردانہ خسیوں کو تقویت اور تحریک پہونچاتی ہے۔ حیض کا زیادہ دن آنا، غیر طبعی حیض آنا، ابتدائی اور ثانوی بندش حیض کا ریوٹیم کی عدم کارکردگی، بلوغت میں کمی، بیضہ انٹی کی عدم پیدائش، جنسی افعال میں کمی، عادی استقامت خسیوں کا قبلی میں نہ آنا مردوں میں نسوانی خصوصیات، ورم خصبہ مردوں اور عورتوں میں جنسی سرد مہری میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ سے ایک ہزار یونٹ عضلاتی ہفتہ میں ۲ یا ۳ بار لگائیں اسے ۲ ماہ تک استخاضہ میں ۱۵۰۰ سے ۵۰۰۰ یونٹ جب تک خون بند نہ ہو جائے۔ ابتدائی اور ثانوی بندش حیض اور بیضہ انٹی کی عدم پیدائش میں ۱۰۰۰ یونٹ روزانہ حیض کے ۴ اوپر ۵ اوپر اور ۶ اوپر دن دینا چاہیے۔

منفی اثرات: زیادہ مقدار میں بیضہ انٹی پر خراب اثر پڑتا ہے۔

مضر اثرات: درد شکم، تھکاوٹ، بخار (الرجکری ایکشن)۔

احتیاط: سلوشن تیار کرتے ہی لگا دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

CHORIOMON

(PANACEA)

کور یو من

2000 iu amp. Rs.465.00, 5000 iu amp Rs.722.00

CORION 1000 IU

(WIN MEDICARE)

کور یون

1000 iu; 1 amp Rs.557.75

GONADOTRAPHIN LH

(BIOCHEM) Rs.225.00

گوناڈوٹروپین

GONOTROP-C

(MODI-MUNDI PHARMA)

گوناڈوٹروپ

1 amp. Rs.557.75

PREGNYL	(INFAR) Rs.312.50	ہر ایک مل
PROFASI	(SERUM INSTITUTE) 10,000 iu l. Rs.545.46	ہر دوساکی
PUBERGEN	(UNI-SANKYO)	ہر دوساکی
5000 iu 1 amp: Rs.280.00		

BROMOCRIPTINE

برومو کریپٹن

افعال و منافع: بندش حیض، دودھ بہنا، عورتوں کا عقر (ہاںچہ پن) دودھ کی پیدائش کو روکنا پارکنسنز ڈیزیز میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ ملی گرام روزانہ ہمراہ طعام رفتہ رفتہ مقدار بڑھائی جائے۔

مضر اثرات: متلی، تے، بور دسر، قبض چکر آنا، بلڈ پریشر اور خشکی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: استقرار حمل ہوتے ہی دوا بند کر دیں، زخم معدہ میں، ڈرائیوری اور مشنری چلانے سے، ذیابیطس جگر اور گردوں کی خرابی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

BROM-INGA	(INGA) tabs: 10: Rs.70.77	بروم انگا
PRAVIDEL	(SANDOZ)	پراویڈیل
PROCTINAL	(BIDDLE SAWYER)	پراکٹینال
1.25mg 10: Rs 68.00, 2.5mg 10: Rs.107.50		
SEROCRYPTIN	(SERUM INSTITUTE)	سیرو کریپٹن
2.5mg tabs: 5: Rs.61.28		

CLOMIPHENE CITRATE

کلو می فین سائٹریٹ

افعال و منافع: ہارمون کی خرابی کے سبب ہونے والا ہاںچہ پن حیض کی خرابیاں دور کرنے میں مفید ہے۔

کی پیدائش میں اضافے کے لئے مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: ہاںچہ پن میں ۱۵ ملی گرام روزانہ حیض ختم ہونے سے پانچویں دن سے دسویں دن

تک مردوں میں حویات منویہ کی کمی یا فقدان کے لئے ۲۵ ملی گرام روزانہ ۶ سے ۹ ماہ استعمال کرائیں۔

متنی افعال: غیر طبعی جریان خون، حمل جگر کی خرابی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: جسم میں گرمی کی لہریں محسوس ہونا، درد، شکم بے چینی آنکھوں کے آگے دھبہ، مہلکین کا پڑا ہونا، ایک ساتھ کئی بچوں کی پیدائش کا امکان۔

احتیاط: دو اثر دوا کرنے سے قبل حمل کی جانچ کرائیں، معالج کی نگرانی میں استعمال کرائیں۔

تجارتی مرکبات

CLOFERT	(SIGMA LABS)	کلورٹ
25mg 10 Rs 26 90	50mg 5 Rs 26 90	
CLOMITROP	(MODI-MUNDI PHARMA)	کلومی ٹروپ
FERTOMID	(CIPLA)	فرٹومید
25mg 10 Rs 28 85	50mg 5 Rs 27 70	
FERTO TAB	(BIDDLESAWYER)	فرٹو ٹیب
25mg 10 Rs 27 25	50mg 10 Rs 52 30	
INDOVUNAL	(BIOGENICS)	انڈو وونال
caps 25mg 10 Rs 25 25	50mg 10 Rs 50 00	
OMICITE	(TORRENT)	ومی سیٹ
50mg tabs 10 Rs 50 90		
OVA FAR	(INFAR)	وفا فار
50mg tabs 5 Rs 31 30		
REJUN	(UNI-SANKYO)	ری جن
tabs 25mg 10 Rs 25 27	50mg 5 Rs 22 96	
SIPHENE	(SERUM INSTITUTE)	سپی فین
Clomiphene citrate 50mg tabs 5 Rs 28 10		

DANAZOL

ڈانازول

افعال و منافع: ہائپر پین رحم کی خفاء حاملی میں خرابی پستانوں میں رشیہ دار دوا، سولیاں بننا، استخاضہ، قبل از بلوغت مردوں میں چھاتیوں کے بڑے ہو جانے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: رحم کی خرابی اور ہائپر پین میں ۲۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام پوسہ ۳ سے ۶ ملے تک چھاتیوں کی رسولی مردوں میں چھاتی کے بڑا ہونے میں ۱۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام روزانہ ۲ سے ۳ ملے تک استخاضہ میں ۲۰۰ ملی گرام پوسہ ۳ ملے تک قبل از بلوغت ۱۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام روزانہ مریض کی عمر اور

وزن کے حساب سے۔

منفی افعال: تناسلی اعضاء میں جریان خون، حمل ایام رضاحت قلب و جگر کے درم خون کی غیر طبعی حالت میں دینا معسر ہے۔

مضر اثرات: متلی چکر آنا، جلد پر دماغ پشت میں درد، چہرہ سرخ، عضلات میں تشنج، حرکت و مقوی ہوا اثر کرتی ہے۔ جسم میں پانی کا رکنا، وزن میں اضافہ درد سر، یرقان شحمی اور ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: مردانہ جذبات پر اسیختہ ہونے کا دھیان رکھیں، پستانوں کے کینسر جگر گردوں کی خرابی سرگی جسم میں پانی رکھنے یرقان کی ہسٹری میں احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: خوردنی مانع حمل ادویہ سائیکلو سپورین دافع انجماد خون اور کاربامائیڈ پائٹن کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

DANOGEN

(CIPLA)

ڈانوجن

50mg: 30: Rs 237.60 100mg: 30: Rs.468.00, 200mg: 30: Rs 759 90

DANOL

(KANPHA)

ڈانول

50mg: 3x10: Rs.214.00; 100mg: 3x10: Rs.424.00, 200mg: 3x10: Rs.714.00

GONABLOK

(WIN MEDICARE)

گونابلاک

50mg: 30: Rs.202.00. 100mg: 30: Rs.378.00, 200mg: 30: Rs 670.00

DIENOESTROL

ڈائی نسترول

افعال و منافع: درم مہلی، مہلی کی اندرونی جملی کا سکڑنا، مہلی کی کھجلی سن یاس کے سبب ہونے والا مہلی تناؤ، کورم وغیرہ میں مفید دموثر ہے۔

مقدار و ترکیب: مخصوص آلے میں کریم بھر کر مہلی کے اندرون میں ۱-۲ پار لگائیں۔

احتیاط: مہلی کینسر اور حمل میں احتیاط رکھیں انفلکشن کی حالت میں مناسب علاج ساتھ میں جاری رکھیں۔

تجارتی مرکبات

ڈائی نسرول

(ETHNOR)

DIENOSTROL

Diennoestrol 0.01% cream 50g with applicator Rs.64.80

ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون جیلی

**DIHYDRO TESTO
STERONE GEL**

افعال و منافع: تناسلی اعضاء کا نامکمل اور چھوٹا ہونا، حسیوں کا تحصیل میں نہ اترنا، خضیوں کا خراب ہونا، نامردی، مردوں میں چھاتیوں کا ابھرنا، جلد کا سخت ہونے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: مردوں میں ۵ سے ۱۰ گرام پومیہ عورتوں میں ۲.۵ ملی گرام پومیہ ایک دن کا ناخ دے کر استعمال کرائیں۔

منفی افعال: غده قدامیہ کا کینسر حمل اور رضاعت میں اور بچوں کو قلب و جگر و گردوں کے امراض میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: ورم غده قدامیہ، آلات بول میں انفلکشن کا خطرہ خضیہ کی تحصیل پر گامٹھیں چھاتیوں ڈھیلی اور دراز ہونا۔

دواؤں کا رد عمل: تقویت باہ کی دوائیں، انسولین دافع ذیابیطیس اودیہ۔

تجارتی مرکبات

انڈراکٹم

(CHEMECH)

ANDRACTIM

Dihydrotestosterone 2.5g per 100g gel: 100g tube Rs.573.00

ڈائی ہائیڈرو جیسٹرون

DIHYDRO GESTRONE

افعال و منافع: قبل از حیض تناؤ، سر طبع، استقامت مندرہ، عادت استقامت مشیمہ کی عدم پیدائش، ہانچہ بن، جنسی بے رغبتی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: قبل از حیض تناؤ و درد میں ۵ سے ۱۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ہواوری کے ۱۲ ویں دن سے ۲۶ ویں دن تک، سر طبع میں آگولی ۵ ویں دن سے ۲۵ ویں دن تک استقامت مندرہ میں ۳۰ ملی گرام

پہلی خوراک پھر ۵ سے ۱۰ ملی گرام ہر ۸ گھنٹے بعد، عادتاً اسقاط میں حمل کا قرار پاتے ہی ۵ ملی گرام روزانہ حمل کے پانچویں ماہ تک۔

منفی افعال: سہل سے خون آنے و ریدوں میں خون جمنے، حمل کا ذب تنا سلی اعضاء چھاتیوں کا کینسر، جگر کی خرابی، حمل میں پھنسیاں انیسیا حمل اور لایم رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔
مضر اثرات: چکر آنا چھاتیوں میں درد ہونا۔

احتیاط: مرگی، ادھاسیسی دمہ، قلب و جگر کی خرابی نفسیاتی البھن اور ڈپریشن میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکب

DUPHASTON

(DUPHAR)

دوقاشن

Dydrogesterone 5 0mg tabs: 10 Rs.113.20

ESTRDIOL

ایسٹراڈیول

افعال و منافع: سن یاس کے سبب ایسٹروجن کی کمی، ہڈیوں کی کمزوری میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ سے ۱۰۰ ملی گرام یومیہ

منفی افعال: چھاتیوں اور رحم کی اندرونی جھلی میں کینسر رحم سے جریان خون جگر کے ٹیل ہونے اور ریدوں میں خون جمنے کی ہسٹری میں حمل اور لایم رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: مقامی خراش، چھاتیوں میں درد، ادھاسیسی کا درد کھلی جلد پر دانے پھنسیاں ری ایکشن ہو سکتا ہے۔

احتیاط: ضعف قلب، ہائی بلڈ پریشر جگر و گردوں کی خرابی، مرگی ادھاسیسی (حقیقہ) رحم اور چھاتیوں کے امراض رحمی رسولی، ذیابیطیس اور چھاتیوں کے کینسر میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکب

ESTRADERM TTS 25,50,100

(CIBA-GEIGY)

ایسٹراڈرم

0 1mg/day. TTS 25: 2 Rs.89 27. TTS 50: 2 Rs.114.28 TTS 100 2.

Rs 143 21



ایسٹریول سکسی نیٹ **ESTRIOL SUCCINATE**

افعال و منافع: سن یاس میں ایسٹروجن کی کمی میں، گرمی کے احساس، تاسلی اعضاء میں تھیلی پیشاب نہ رکنا، سن یاس کی ذیلی علامتوں میں مفید ہے۔ (سن یاس کی علامات کے لیے دیکھیے میڈیکل گائیڈ)
مقدار و ترکیب: ۸ سے ۱۰ ملی گرام یومیہ پہلے ہفتہ پھر آہستہ آہستہ کم کریں ۲-۳ ملی گرام یومیہ دیں۔
منفی افعال: حمل رگوں میں خون جمن، رحمی جریان خون اور لیام رضاعت میں ممنوع ہے۔
مضر اثرات: متلی، تے، چھاتیوں میں نرمی اور درد و پیٹرو میں رطوبت، مخاطیہ کی افزائش و درد سر۔
احتیاط: خون میں جھک Clot بننے کی ہشتری میں گردوں جگر اور قلب کے قیل ہونے جسم میں پانی کی زیادتی ہائی بلڈ پریشر مرگی او حاسیسی ورم رحم حمل کھلی ہرہیز اور کارٹی سون کے مرکبات کے ساتھ احتیاط لازم ہے۔

تجارتی مرکبات

EVALON (INFAR) ایوالون مبلیت
 1mg: 30 tabs : Rs 40 50, 2mg: 30 Rs 70 50
EVALON CREAM (INFAR) ایوالون کریم
 Estriol 1mg per gm cream: 15g tube with applicator. Rs. 75 00

ایٹھینیولسٹروڈیول **ETHINYLOESTRODIOL**

افعال و منافع: ایسٹروجن کی کمی سن یاس کی تکالیف ماہواری کی خرابیاں حیض کا درد سے اور بے ترتیب آنا، ابتدائی اور ثانوی بندش حیض چھاتیوں کا سکڑنا، دودھ کی کمی مردوں میں جنسی خواہشات کی زیادتی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ماہواری کی خرابیوں میں ۲۱ گولیوں کا پیکٹ والی / ۱ گولی ماہواری ختم ہونے کے پانچویں دن سے شروع کریں۔ دیگر امراض میں ابتدا میں ۵ ملی گرام اسے ۳ بار یومیہ بعد کو ۰۲۵ دینا چاہیے۔
احتیاط: حمل و دماغ قلب و جگر کی خرابی ہائی بلڈ پریشر، برقان قحی، مہل سے خون آنے کارٹی سون کے مرکبات کے ساتھ احتیاط لازم ہے۔

تجارتی مرکبات

DUOLUTON-L	(GERMAN REMEDIES)	ڈولون ایل
Ethinyl estradiol 0.05mg, Levo Norgestrel 0.25mg, tabs 21: Rs 25 39		
LYNDIAL	(INFAR)	لائنڈیال
Lynoeestrenol 1mg, ethinyl oestradiol 0.05mg: tabs 22: Rs 14 40		
LYNORAL	(INFAR)	لارنی نورال
Ethinyl oestrodial 0.01mg, 0.05mg & 1mg: tabs 0.01mg: 10 Rs 9.50, 0.05mg: 10. Rs.11.80, 1mg: 10: Rs.17.70		
MIXOGEN	(INFAR)	مکسو جن
Ethinyl estradiol 4.4mg, methyl testosterone 3.6mg. tabs: 10. Rs 13 80		
NOVELON	(INFAR)	نوویلان
Ethinyl estradiol 0.03mg, desogestrel 0.15mg: tabs: 21: Rs 40 00. 6x21: Rs.240 00		
ORGALUTIN	(INFAR)	ارگالوٹن
Ethinyl estradiol 0.05mg, lynoeestrenol 2.5mg: tabs: 10: Rs.22 00		
OVRAL-G	(WYETH)	اورال جی
Ethinyl estradiol 0.5mg, Norgestrel 0.5mg, tabs 20: Rs.22.00		
OVRAL-L	(WYETH)	اورال ایل
Norgestrel 0.3mg, (equiv to levonorgestrel 0.15mg) ethinyl estradiol 0.03mg tabs: 21: Rs.12 29		
OVRAL	(WYETH)	اورال
d-Norgestrel 0.5mg ethinyl estradiol 0.05mg tabs 21 Rs.16.56		
PRIMOVLAR-30	(GERMAN REMEDIES)	پرائی موڈلر
Norgestrel 0.5mg, ethinyl estradiol 0.03mg tabs: 21: Rs.15.50		

FOLICLE STIMULATING HORMONE

فالیکل اسٹی مولینگ ہارمون

افعال و منافع: یہ تین ہارمون کا مرکب ہے جن میں Ovary کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے جو بیضہ
آہنی کی بیضہ انکس میں اضافہ کر کے استقرار حمل میں مدد دیتا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۷۵ یونٹ سے ۲۲۵ یونٹ تک مریضہ کے حالات کے مطابق دیا جائے۔
 منفی افعال: مہینہ و خندہ نخامیہ میں رسولی کے مریض کو دینا خطرناک ہے۔
 مضر اثرات: حساسیت متعدد بیضہ انشی کی پیدائش سے توام بچوں کا اندیشہ، مہینہ کا بڑا ہونا، استقاء،
 مروق، استقاء، مروق میں خون جمنہ۔

تجارتی مرکبات

GONTROP-M (MODI-MUNDI PHARMA) گون ٹروپ ایم
 75 iu amp: Rs.445.65, 150 iu amp: Rs.892.00
 HUMEGON (INFAR) 1ml amp. with 1ml solvent: Rs.500.00 ہوئے گان
 PREGNORM 75 I.U (WIN MEDICARE) پریمیک نارم
 1 amp. Rs.300.00

ہائیڈرو آکسائی پروجسٹرون کیپ رویت

HYDROXY PROGESTRONE CAPROATE

افعال و منافع: عادی استقاط، استقاط مندرہ، جسم ابیض کی خرابی، ابتدائی و ثانوی بندش حیض ہانچہ پن
 میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: عادی استقاط میں ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی گرام عضلاتی ہفتہ وار استقاط مندرہ میں ۵۰۰ ملی
 گرام فوری طور پر عضلاتی پھر ہفتہ میں ۱ بار، جسم ابیض کے سبب ہونے والے عقر میں ۲۵۰ ملی گرام
 عضلاتی انجکشن لگائیں۔

احتیاط: حالت حمل میں سوائے خطرہ استقاط کے گردوں کی خرابی جگر میں دبلہ بننے حمل کی کھجلی اور
 پھنسی ہر ہیزا سٹر میں۔

تجارتی مرکبات

ANIN INJ (SWIFT) اے این انجکشن
 250mg amp Rs.38.00; 500mg amp Rs.58.00

HPC DEPOT (BPL) انجلی کیلکولٹ
250mg Box of 5x1ml amp Rs 125 20, 500mg Box of 5x2ml
Rs 229 40

MAINTANE INJ (JAGSONPAL) مین ٹین
250mg 1ml, Rs 37 50; 500mg 2ml, Rs 60 00

LIVON NORGESTRIL لون نار جسترل

افعال و منافع: فیض کی خرابی بار بار حیض آنے اور حمل کی حفاظت کے لئے مفید و مجرب ہے۔
مقدار و ترکیب: ماہواری ختم ہونے سے ۵ویں دن سے روزانہ ۱ گولی پیکٹ ختم ہونے کے
۷ دن کے اندر ماہواری شروع ہو جاتی ہے۔

منفی افعال: چھاتیوں اور رحم کے کینسر میں جگر کی خرابیوں، برقان، کھجلی حالت حمل، ذیابیطس
بارٹ ایکٹ نقص تغذیہ جریان مہلکی حمل کی کھجلی اور ہر میز کی ہسٹری میں دیتا مضرب ہے۔

مضرب اثرات: متلی، تھکے ادھاسی، مہل سے خون آنا پھر ضعف، ڈپریشن، بصارت میں فرق،
چھاتیوں میں نرمی، جنسی خواہش کم اور الرجی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: علاج سے قبل اعضاء نسوانی کی خرابیوں کی جانچ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

DUOLUTON-L (GERMAN REMEDIES) دولوٹن ایل

tabs 21 Rs 25 39

OVRAL-L (WYETH) 21 Rs. 12 29 اوورال

TRIQUILAR (GERMAN REMEDIES) Rs 18 60 ٹریکیلار

LYNOESTRENOL لائی نسٹری نال

افعال و منافع: استاضہ، حیض کا بخاری کرنا، مہاسہ، سرطنت، سرطان رحم میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: استاضہ میں ۱۰ ملی گرام ۷۰، ۲۰ دن تک پھر ۵ گرام ۵۰ ویں دن تک ۲۳ استعمال
کرائیں، انخواء حیض کے لئے حیض سے ۳ دن قبل ۵ ملی گرام ۷۰، ۲۰ دن تک پھر ۵ ملی گرام
۵۰ ویں دن کے ۵۰ ویں دن سے ۵۰ ویں دن تک۔

منفی افعال: غیر تشخص نزف الدم مہلکی، امراض جگر پر کان، کھجلی، ہر پیز میں اس کا استعمال مضر ہے۔
 مضر اثرات: سلی تے، پر کان سدی، جلد پر داغ دروغہ شقیہ بندش حیض ہو سکتا ہے۔
 احتیاط: ایام رضاعت جگر کی غیر طبعی حالت سورج کی تیز شعاعوں سے دوران علاج احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

LYNDIOL IMG	(INFAR)	tabs. 22:Rs. 14.40	لائنڈیال
ORGALUTIN	(INFAR)	tabs: 10:Rs.22.00	ارگالوٹین
ORGAMETRIL	(INFAR)	5mg tabs: 10: Rs 26.30	ارگامٹرل

MENOTROPHIN

مینوٹروفین

افعال و منافع: بیضہ اپنی عدم افزائش کے سبب عقر، جنسی تحریک کی کمی مہمین سے حوصلات کی تحریک اور خراج کے لئے مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: مریض کے حالات کے مطابق مقدار و خوراک کا تعین لٹرینجر کے مطابق خوراک دی جائے۔

مضر اثرات: ری ایکشن، مہینوں کا بڑا ہونا، شق ہونا، ایک ساتھ کئی بچوں کی پیدائش کا خطرہ۔
 احتیاط: غد غیر ناقہ کی خرابی، دماغ کی چوٹ یا صدمہ اور حمل میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

PREGONAL-75	(SERUMINSITUTE)	1amp: Rs.561	پریگنال ۷۵
PREGONAL-150	(SERUMINSITUTE)	1amp: Rs.876.59	پریگنال ۱۵۰
PREGNORM	(WIN MEDICARE)	1mp. Rs.800	پریگنارم

MESTE ROLONE

میسٹری لون

افعال و منافع: مردوں میں جنسی رغبت بلوغت کی کمی، مردانہ بانجھ پن ضعف باہ میں مفید ہے۔
 مقدار و خوراک: ضعف باہ اور جنسی کمزوری میں ابتداء میں ۲۵ ملی گرام دن میں ۳ بار پھر دن میں دو بار ۱ بار کئی ملائیک استعمال کرائیں۔

منفی افعال: غده قدامیہ کی رسولی اور کیسرس میں نہیں دینا چاہیے۔
 مضر اثرات: جگر اور شکم کی خرابی و جریان خون کی شکایت ہو سکتی ہے۔
 احتیاط: صرف مردوں کو استعمال کرائیں۔ غده قدامیہ اور جگر میں خرابی ہو تو علاج بند کر دیں۔

تجارتی مرکبات

PROVIRONUM (GERMAN REMEDIES) 30, Rs.279.00 پروویرونم

NORETHIESTERONE ACETATE نارائتھی اسٹرون

افعال و منافع: ابتدائی اور ثانوی بندش حیض، استخاضہ، سرٹمٹ، رحم کا سکڑنا، حیض کے بے ترتیب آنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہار ہار حیض آنے میں ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار ۱۰ دن تک۔

منفی اثرات: حمل پر قان، حمل کی کھلی میں، مرگی، شقیقہ میں مضر ہے۔
 مضر اثرات: متلی کی شکایت ہو سکتی ہے۔

تجارتی مرکبات

DUBOGEN (UNICHEM) ڈوبوگن ٹبلٹ

NORISTREAT (GERMAN REMEDIES) نارسٹریٹ

2ml. Rs.133.00

PRIMOLUT-N (GERMAN REMEDIES) پرائی مولٹ این

5mg tabs: 10. Rs.32.00

MEDROXY PROGESTERONE میڈروکسی پروجسٹرون

افعال و منافع: بندش حیض، سرٹمٹ، کارپس لیویم کی خرابی سے ہونے والی حیض کی خرابیوں میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲.۵ سے ۱۰ ملی گرام پرمیہ ۵ سے ۱۰ دن تک ۲-۳ بار استعمال کرائیں۔

منفی افعال: وریڈوں میں ورم و انجماد خون، جگر کی خرابی، مہلکی نرف الدم، استسلا، حمل کی جانچ میں

تجارتی مرکبات

DUOLUTON-L	(GERMAN REMEDIES) tabs 21: Rs 25 39	ڈیولوٹان
OVRAL-G	(WYETH) tabs 20 Rs 22 00	اورال
PRIMOVLAR-30	(GERMAN REMEDIES)	پرائمویلر ۳۰
tabs 21: Rs 14.50		

OESTRADIOL

ایسٹراڈائل

افعال و منافع: سن یاس کے سبب ہڈیوں کی خرابی میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: متاثرہ مقام پر جلد صاف کر کے پلاسٹر Patch لگایا جائے ۳-۴ دن بعد بدل دیا جائے بچوں کو اس کا استعمال ممنوع ہے۔
 منفی افعال: رحم اور چھاتیوں کے کینسر غشاء کاذب، مہلکی نزلہ الدم، جگر کے ناکارہ ہونے و ریدوں میں خون جمنے کی ہسٹری میں، رگوں میں ٹھکے Clot بننے حساسیت حمل اور رضاعت میں مضر ہے۔
 مضر اثرات: پلاسٹر کی جگہ خراش بے چینی، چھاتیوں میں تکلیف شقیقہ پیلا رنگ دکھائی دینا و ریدوں کا متورم ہونا ری ایکشن ہو سکتا ہے۔
 احتیاط: قلب کا ست ہونا، ہائی بلڈ پریشر، جگر گردوں کی خرابی مرگی، شقیقہ پستان میں نئی ساخت ڈیپھیس، چھاتیوں کے کینسر کی فیملی ہسٹری میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

ESTRADERMTTS	(CIBA GEIGY) Rs 143 21	ایسٹراڈرم
--------------	------------------------	-----------

OESTRADIOL

ایسٹراڈائل پروپیونیٹ

افعال و منافع: بندش حیض، قلت حیض دودھ کی زیادتی غدہ قدامیہ کا کینسر ورم کی مفید دوا ہے۔
 مقدار و ترکیب: بندش و قلت حیض میں ۲.۵ سے ۵ ملی گرام عضلاتی انجکشن لگائیں دودھ کی پیدائش روکنے کے لئے ۱۰ ملی گرام عضلاتی ۲-۳ دن لگائیں۔ غدہ قدامیہ کے ورم کینسر میں ۱۰ ملی گرام ایک دن پنج لگائیں۔

منفی افعال و احتیاط: حمل قلبی اور اور دماغی خرابیاں شدید ہائی بلڈ پریشر جگر کی خرابیاں برقان حمل کا برقان، غیر تشخیصی نرغ مہلی، کارٹی سون کے استعمال کے بعد، رضاعت میں استعمال نقصان دہ ہے اگر خون میں انجماد یا تھکے clot بننے کی شکایت ہو تو دوا بند کر دیں طویل عرصہ تک علاج سے، مرگی اور شقیقہ میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

MIXOGEN INJ

(INFAR) 1ml: Rs.31.50

کموجن

PROGESTRONE

پروجسٹرون

افعال و منافع: اسقاط مندرہ، عادی اسقاط، بندش حیض قلت حیض قبل حیض تاؤ درد پستانوں میں کا نہیں بننے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اسقاط مندرہ میں ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام شدید حالت میں ۱۰۰ ملی گرام عضلاتی پوسہ بار بار اسقاط میں، حمل کی ابتدا سے ۱۱.۵ ملی گرام ایک دن وقفہ سے ابتدائی ۳ تا ۵ تک لگائیں، بندش و قلت حیض میں ۵.۵ سے ۱۰ ملی گرام ایسٹراڈول ۵-۶ مرتبہ ۳ دن کے وقفہ سے بعد میں ۲۵ ملی گرام پروجسٹرون عضلاتی لگائیں ۵ دن تک۔

(منفی و منفی اثرات احتیاط دواؤں کے رد عمل کے لئے دوا کے ساتھ کا پرچہ ترکیب استعمال دیکھئے)

تجارتی مرکب

UTROGESTAN

(CHEMECH)

یوٹروگیسٹان

100mg: caps: 10x3 caps: Rs.532.00

TESTOSTERONE PROPIONATE

ٹیسٹوسٹرون پروپیونیٹ

افعال و منافع: مردوں میں جنسی خواہش کی نامردی، حویات منویہ کی کمی مردانہ ہارمون کی کمی کے سبب نامردی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ ملی گرام ہفتہ میں ۳ بار ۲ ہفتہ تک لگائیں۔

منفی افعال: غدہ قدامیہ اور پستانوں کے کینسر میں دینا سخت نقصان دہ ہے۔
 مضر اثرات: جنسی خواہش میں اضافہ، قبل از وقت بلوغت مادہ منویہ میں کرم منی کی کمی، انزال میں منی کا اخراج زیادہ ہو سکتا ہے۔
 احتیاط: قلب اور گردوں کی خرابی، ہائی بلڈ پریشر قبل از بلوغت استعمال میں احتیاط۔
 دواؤں کا رد عمل: فولاد وافع تیزابیت پنی سیلین مانع انجماد خون، دورہ روکنے والی کارہامازی پائین، فین ٹائن، لیجیم ڈیجاکسن کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

AQUAVIRON	(NICHOLAS) inj 1ml	Rs.20.85	ایکویرون
MIXOGEN INJ	(INFAR) 1ml	Rs.31 50	مکسوجن
SUSTANON "100"	(INFAR) 1ml	Rs 30 00	سٹانن ۱۰۰
SUSTANON "250" IML	(INFAR)	Rs.56 50	سٹانن ۲۵۰
SUSTANON 25	(INFAR)		سٹانن ۲۵
25mg per ml inj. 1ml		Rs 10.40	
SUSTANON 50	(INFAR)		سٹانن ۵۰
50mg per ml inj. 1ml		Rs. 18 70	
TESTOVIRON INJ	(GERMAN REMEDIES)		ٹسٹویرون
TESTANON 25/50	(INFAR)	Rs. 10 40/ 18 70	ٹسٹانن
TESTOVIRON DEPOT	(GERMAN REMEDIES)		ٹسٹویرون
per ml inj; 100mg 1ml		Rs 39 80; 250mg. 1ml: Rs 71.30	

SPERMICIDL DRUGS

قاتل کرم منی

NONOXYNOL

نونوآکسائی نول

افعال و منافع: منع حمل Contraception کے لئے موثر ہے۔
 مقدار و ترکیب: مباشرت سے قبل ۵ سے ۱۰ منٹ پہلے گولی مہبل میں اندر رکھوائیں۔
 مضر اثرات: مقامی خراش جلن۔

تجارتی مرکب

TODAY (BLISS) نوٹ
Nonoxynol (9) 5% vaginal pessaries 5: Rs.14.75: 3x5's Rs 41.30

نوناکل فینوکسی پالی ای تھروکسائی ای تھانول

NONYL PHENOXY POLY ETHROXYETHANOL

افعال و منافع: حیز مانع حمل دوا ہے جو کرم منی کو فوراً ختم کر دیتی ہے۔

مقدار و ترکیب: پچکاری بھر کر مباشرت سے قبل مہل میں داخل کریں ہر مباشرت سے قبل ایک پچکاری لینا ضروری ہے۔

DELFIN

(ETHNOR)

ڈیفن کریم

50g with applicator Rs.33.47

آنتوں کے کیڑوں کی ادویہ۔ مقدار، طریقہ استعمال ایک نظر میں

نام دوا	کپسورم	رائڈورم کچھوے	وہپورم	تھریڈورم	شیپورم کھدوانے
فل بنڈازول	۳۰۰ ملی گرام ابار	۳۰۰ ملی گرام ابار	۳۰۰ ملی گرام ابار	۳۰۰ ملی گرام ابار	۳۰۰ ملی گرام روزانہ ۳ دن
لیو ای سول	۱۵۰ ملی گرام ابار دو دن	۱۵۰ ملی گرام ابار	---	---	---
بی بنڈازول	۱۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۳ دن	۱۰۰ ملی گرام ۲ بار ۳ دن	۱۰۰ ملی گرام ۲ بار ۳ دن	۱۰۰ ملی گرام ابار	۲۰۰ ملی گرام ۲ بار ۳ دن
پائرن ٹیٹا پامیت	---	۱ گرام ابار	۱ گرام ابار	۱ گرام ابار	---
چرائین	---	۷۵ ملی گرام / کلو گرام ابار ۴ دن	---	۷۵ ملی گرام / کلو گرام ابار ۷ دن	---
لکوسائیز	---	---	---	---	۲ گرام (۳ گولی) ۱ بار ۲ گھنٹہ بعد دستوں کی دوا۔

UTRINE**محرک و مسکن رحم ادویہ****STIMULANT/ SEDATIVES****CARBOPROST TROMETHAMINE** کاربوپروست ٹرومی تھامین

افعال و منافع: یہ عضلاتی یا اندرون رحم استعمال کرائی جاتی ہے رحم میں شدید انقباض پیدا کر کے رحم کی اشیاء کو باہر نکال دیتی ہے۔ ۳ سے ۵.۵ تک کے حمل کو خارج کرنے، بعد از ولادت جریان خون کو روکنے میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: جریان بعد از ولادت ۲۵۰ ماٹروگرام گہرا عضلاتی لگائیں ضرورت ہو تو آدھ گھنٹہ بعد دوبارہ لگائیں حمل ساقط کرنے کے لئے ۲۵۰ ماٹروگرام گہرا عضلاتی انجکشن ضرورت ہو تو ۲-۳ گھنٹہ بعد دوبارہ لگائیں۔ اندرون رحم ۲.۵ ملی گرام ۱۰ ملی لٹر سوڈیم کلورائیڈ میں حل کر کے کیٹھیئر سے لگا میں ضرورت ہو تو دوسرا انجکشن ۳۸ گھنٹہ بعد دیا جاسکتا ہے۔

منفی افعال: حساس مریضوں کو بیڑو کے درم، قلب و جگر گردوں کے امراض میں دینا مضر ہے۔

احتیاط: ضرورت ہو تو دافع قے و اسہال دوائیں دیتے رہیں بیڑو میں زخم سوراخ یا ٹیو مر بننے کا خیال رکھیں برقان ذیابیطس مرگی میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکب**PROSTODIN (ASTRAIDL)**

پراس ٹوڈین

250mg per ml inj 1x1ml amp: Rs 80.13

DESAMINO OXYTOCIN**ڈس امینو آکسی ٹوسین**

افعال و منافع: درد زہ کو تیز کرنے رحم کے جامد ہونے دودھ میں اضافہ کرنے کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ یونٹ ہر ۳۰ منٹ بعد رحم کی صفائی کے لئے ۵۰ یونٹ دن میں ۵ بار دودھ میں

اضافہ کے لئے دودھ پلانے سے ۵ منٹ پہلے لگائیں۔

منفی افعال: رحم میں بچے کی غلط پوزیشن، رحم کے زیادہ پھیل جانے چار سے زیادہ ولادت ہونے رحم کا آپریشن پہلے ہو چکا ہو تو مشیمہ نیچے آگیا ہو تو اس کا استعمال خطرناک ہے۔
مضر اثرات: زیادہ مقدار میں دینے سے شدید انقباض کے نتیجے میں رحم شق ہو سکتا ہے۔

تجارتی مرکبات

BUCTOCIN

(WANDER)

بکوسین

Desamino-oxytocin 50 iu buccal tabs: 8: Rs.77.63

DINO PROSTONE

ڈائی نو پروسٹون

افعال و منافع: درد زہ میں اضافہ کے لئے مستعمل ہے جس سے بچے کی پیدائش میں آسانی ہوتی ہے۔
مقدار و ترکیب: ۰.۵ ملی گرام انجکشن عضلاتی یا زیر جلد لگائیں ضرورت ہو تو ہر آدھ گھنٹہ بعد لگائیں۔

منفی افعال: عائد کے متورم امراض، جنین کی غیر طبعی پوزیشن میں لگانا خطرناک ہے۔
مضر اثرات: کبھی متلی، تے، اسہال بچے کی حرکت قلب میں تبدیلی زائد مقدار دینے سے رحمی انقباض شدید۔

احتیاط: قلب و جگر گردوں کی خرابی میں مرگی گلو کو مائیں احتیاط برتیں۔
دواؤں کا رد عمل: پراسٹاگلائڈین انقباض الرحم کی دواؤں کے اثرات کو تیز کرتا ہے اس کے ساتھ اور دافع درد اور دلدویہ (NSAID) دینا خطرہ سے خالی نہیں۔

تجارتی مرکبات

CERVIPRIME

(ASTRA IDL)

سروی پرائم

Dinoprostone 0.5mg syringe 1: Rs. 105.54

PRIMPROST

(ASTRA IDL)

پرائم پروست

Dinoprostone (PGE-2) 0.5mg tabs: 4: Rs. 76.74

ETHACRIDINE LACTATE - جھاکرائی ڈین لکٹیٹ

افعال و منافع: ۳۰ سے زائد حمل کو طبی اور جائز نقطہ نظر سے ساقط کرنے کے لئے مستعمل ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی لیٹر رحم میں بذریعہ انجکشن دو اداخل کی جائے ۴ گھنٹہ بعد ۵۰ ملی لیٹر دوا اداخل کر سکتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

ABORTIL	(TROIKAA)	اہارٹل
inj 3x50 ml vial	Rs 77 00	
FOETABORT	(BIOGENICS)	فوٹ اہارٹ
1mg per ml inj 3x50ml	Rs 80 80	
VECREDIL	(JAGSONPAL)	ویس ریڈل
1mg per ml inj 3x50ml	Rs 80 80	

ISOXSUPRINE آئی سوکس سپرین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: مرفی رحم دوا ہے، رحمی ساختوں میں خون کی رسد میں اضافہ کرتی ہے قبل از وقت درد زہور اسقاط مندرجہ میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: وریڈی انجکشن ۳۰۰ ملی گرام / فی منٹ عضلاتی ۱۰۰ ملی گرام ہر ۲ گھنٹہ بعد دینا چاہیے ۶۰ سے ۸۰ ملی گرام پور میہ خوردنی یا عضلاتی دے سکتے ہیں۔
منفی افعال: رحم سے جریان خون کی حالت میں دینا سخت نقصان دہ ہے۔
مضر اثرات: سینہ میں درد متلی تے۔ جلد پر داغ، قبل از وقت استعمال سے زچہ کے سینہ میں درد ہو سکتا ہے۔

تجارتی مرکبات

DUVADILAN	(DUPHAR)	ڈواڈی لان ہلیٹ
10mg tabs 50	Rs 21 28	
DUVADILAN INJ	(DUPHAR)	ڈواڈی لان انجکشن
5ml per ml inj 6x2ml amps	Rs. 22.80	

DUVADILAN RETARD**(DUPHAR)**

ڈولڈیلان ریتارڈ

40mg caps 10: Rs 23.76

PERIVALAN**(TABLETS INDIA)**

پیری والان

10mg tabs 10: Rs. 12.84

SUPROX**(SWIFT)** tabs. 10 Rs. 5.86**SUPROX SR****(SWIFT)** 40mg S R. tabs: 10 Rs. 27.40**SUPROX INJ****(SWIFT)**سپرڈکس ایس آر
سپرڈکس انجکشن

5mg per ml inj 2ml amp 4.20

میٹھاگل ارگو میٹرین میلی ایٹ

METHYL ERGO METRINE MELEATE

افعال و منافع: رحم میں فوری انقباض پیدا کرنے درد زہ کے تیسرے درجے کو مختصر کرنے ولادت میں آسانی جریں خون روکنے، بعد از ولادت یا استقاط خون روکنے رحم اصلی حالت پر نہ آنے خون نڈس نہ زیادتی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: براہ دہن ۰.۲۵ ملی گرام دن میں ۳ یا ۴ بار انجکشن ۲ سے ۴ ملی گرام عضلاتی یا، ڈی گرام وریدی لگائیں ضرورت پر ۲ سے ۴ گھنٹہ بعد دوبارہ لگائیں۔

فقی افعال: حمل، درد زہ کا پہلا مرحلہ، شدید جگر اور گردوں کی خرابی عروق قلبیہ کے امراض میں استعمال سے گریز کریں۔

احتیاط: بالی ہلڈ پریش، خون میں زہریلے اثرات کی موجودگی میں پیدائش سے قبل نہ لگائیں تو وہ بچوں کی موجودگی میں جب تک ایک بچہ تولد نہ ہو جائے۔

تجارتی مرکبات**ERGACAP CAPS****(MERCURY)**

ارگاکپ

Ergot 214mg caps 20, Rs 40 00

HICON**(SYSTOPIC)**

ہائی کون

Methyl ergometrine maleate 0 125mg. tabs. 10. Rs. 30 00

HICON INJ**(SYSTOPIC)** 1ml amp Rs 6.25

ہائی کون انجکشن

IMERGEN INJ	(LIFE) 25x1 ml	Rs.108.24	ایم جی
INGAGEN-M	(INGA) 100x1ml	Rs.625.00	انگن ایم انجکشن
INGAGEN-M TABS	(INGA) 0.125mg 10:	Rs.25.00	انگن ایم ٹیبلٹ
LERIN	(TROIKAA) 0.125mg: 10:	Rs.18.10	لیرن ٹیبلٹ
LERIN INJ	(TROIKAA) 02mg per ml inj 5x1ml	Rs.29	لیرن انجکشن
MERGOX INJ	(BPL) 25x1 ml amp.	Rs.160	مرگوکس
METHERGIN TABS	(SANDOZ)		میٹھا جی ٹیبلٹ
	.125mg tabs 10:	Rs.37.00	
METHERGIN INJ	(SANDOZ) 1ml: 5amps:	Rs.58	میٹھا جی انجکشن
METHYLERGOMETRINE INJ	(P&B LABS)		میٹھائل ارگو میٹرین
	.2mg per 1ml, 1ml amp.	Rs.4.15	
SATERGIN	(TABLETS INDIA)		سیٹر جی
STYPTOMET	(DOLPHIN) 200mg tabs 10:	Rs.17.27	اسٹیپٹومیٹ
UTREGIN	(SIGMA LABS) 0.125mg: tabs:10:	Rs.20.00	اٹر جی ٹیبلٹ
UTREGIN INJ	(SIGMA LABS)		اٹر جی انجکشن
	0.2mg/ml inj. 50x1ml amp:	Rs.250.00	

METHYL ERGONOVINE میٹھائل ارگو نوون میلی ایٹ

افعال و منافع: بعد از ولادت جریان خون روکنے شکاف قیصری caesarean section طبی اسقاط حمل، بعد از اسقاط، جریان خون بعد از ولادت رحم کو منقبض کرنے کے لئے مفید و موثر ہے مقدار ترکیب: ۰.۲ ملی گرام زیر جلد عضلاتی وریدی لگا سکتے ہیں۔

مضر اثرات: درد سر، چکر آنا، کان بھنکنا درد شکم متلی قے، ہائی بلڈ پریشر، سینہ میں درد خفقان سانس میں تنگی اور قلب پر اثر پڑتا ہے۔

احتیاط: دو بچوں کی موجودگی میں جب تک ایک تولد نہ ہو جائے۔ رحم کے راستہ میں رکاوٹ نسیم الدم تسخ الدم جگر گردوں کی خرابی ہائی بلڈ پریشر میں احتیاط رکھیں۔

تجارتی مرکبات

CHROMERGEN TABS	(LIFE) tabs:10:	Rs.12.69	کرومر جین
METHERONE	(MEJDA) 0.2mg per ml : 50 ams	Rs.300	میٹھی روون

OXYTOCIN

آکسی ٹوسن

افعال و منافع: رحم کو سیکڑنے (منقبض) کرنے والی دوا ہے۔ دردزہ کو بڑھانے رحم کی سستی اور بے حرکتی دور کرنے ولادت کے تیسرے درجے میں لگانے سے بچہ کی ولادت میں آسانی ہوتی ہے بعد از ولادت زائد جریان خون روکنے مرد میانا مکمل حمل کو خارج کرنے میں مفید و معاون ہے۔

مقدار و ترکیب: دردزہ کو بڑھانے کے لئے ۵ یونٹ یا ۵ ملی لیٹر ۵۰۰ ملی لیٹر سوڈیم کلورائیڈ میں ملا کر چھ حامی ولادت کے تیسرے درجے سے ۲ یونٹ عضلاتی لگائیں بعد از ولادت جریان خون روکنے کے لئے ۵ سے ۱۰ یونٹ ۵۰۰ ملی لیٹر بوتل میں ملا کر چھائیں۔

منفی افعال: عانہ میں بچے کا سر پھنس جانے، بچہ کی غیر طبعی پوزیشن عانہ کا منہ پورا نہ کھلنے، آپریشن سے بچے کی پیدائش کی ہسٹری میں اس کا استعمال سخت نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: بچے کی قلبی حرکات پر اثر، ری ایکشن، زیادہ مقدار میں دینے سے رحم شق ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔

احتیاط: ماہر دایہ کی نگرانی میں استعمال کرائیں عانہ کا منہ بچے کی پوزیشن ولادت کا صحیح وقت کا تعین کرنے کے بعد لگائیں۔

تجارتی مرکبات

EVATOCIN INJ	(NEON) 10x1 amp; Rs.63.50	ایوا ٹوسن
GYNOTOCIN	(SIGMA LABS) 50x1ml Rs.215.00	گائوٹوسن
LABORON INJ	(WIN MEDICARE) 5x1ml Rs.11.50	لے بورن انجکشن
PITOCIN	(PARKE DAVIS)	پیٹوسین
Oxytocin 10 u. per ml inj; 1 amp, Rs.9.66		
SYNTOCINON	(SANDOZ)	سن ٹوسی نون
1 iu per ml inj. 2iu 5x1ml Rs.52.00		

PREPARED ERGOT پری پیروڈ ارگٹ

افعال و منافع: بعد از ولادت یا بعد از اسقاط جریان خون روکنے، استحاضہ، سن یا س میں جریان خون رحم کی سستی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۷۰ سے ۵۴۰ ملی گرام دن میں ۳ بار جب تک کہ مکمل افادہ نہ ہو جائے۔

منفی افعال: حالت حمل ولادت کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں شدید تقیح الدم Sepsis میں

جگر اور گردوں کے شدید امراض میں حساس مریضوں اور زیادہ مدت تک استعمال نقصان دہ ہے۔

دواؤں کا رد عمل: اڈرینالین کے ساتھ اس کا استعمال معتر ہے۔

تجارتی مرکبات

ERGACAP CAPS (MERCURY) ارگاکاپ

Prepared Ergot 214mg caps 20 Rs 40 00

ERGOTAB (JAGSONPAL) ارگوشپ

Ergot preparatata 150mg tabs. 10 Rs 7.00

ERGOTAB FORTE (JAGSONPAL) ارگوشپ فورٹ

Ergot preparatata 270mg caps 20 Rs 20.00

RITRODRINE HCL رائی ٹروڈرین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: یہ ایک مرنخی رحم دوا ہے۔ رحم کے عضلات کو ڈھیلا اور سست کرتی ہے قبل از وقت درد نہ، بچہ کی بے چینی درد کاذب کو روکنے کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۰.۰۵ ملی گرام / فی منٹ وریڈی انٹیوژن کی راہ سے یا ۲۵ سے ۳۵ ملی گرام فی منٹ عضلاتی۔ ۳ سے ۸ گھنٹہ تک یہاں تک رحمی انقباض رک جائے۔

منفی افعال: بغیر ولادت جريان خون، دورے پڑنا، رحم میں جنین کی موت ماں کی حرکات قلب بے ترتیب ہونا ہائی بلڈ پریشر، دمہ، بلفس، بویا بیٹس، غدود رقیہ کی خرابی اور کارٹی سون کے استعمال کے دوران نقصان دہ ہے معتر اثرات: زچہ بچہ کی حرکات قلب بے ترتیب، بلڈ پریشر میں تہدیلی، خفقان متلی تے در دوسرا بحسن سینہ میں درد و تنگی۔

دواؤں کا رد عمل: کارٹی سون کے مرکبات ڈیازی پاکسائیڈ، میگ سلف، پیٹھی ڈین بیہوشی، اور دافع
زپریشن ادویہ کا استعمال معطر ہے۔

تجارتی مرکبات

YUTOPAR (DUPHAR INTERFERON) یونوپار ٹبلٹ
Ritodrine 10mg tabs 10 Rs 95 00
YUTOPAR INJ (DUPHAR INTERFERON) یونوپار انجکشن
Ritodrine 10mg per ml inj 4 amps Rs.95.00




VALETHAMATE

ویلی تھامیٹ برومائیڈ

افعال و منافع: نرم عضلات کے تشنج کو روکنے بوقت ولادت عائد کامنہ کھولنے کے لئے مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: براہ دہن ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام ۳ بار روزانہ انجکشن ۸ سے ۱۶ ملی گرام عضلاتی انجکشن
اس وقت دیا جائے جب رحم کامنہ ۴ سے ۶ سینٹی میٹر کھلا ہو۔
منفی افعال: گلوکوما، ورم غدہ قدامیہ میں، اتساع امعاء میں نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

EPIDOSIN (TTK PHARMA) الپاڈوسن
8mg per ml inj 5x1ml Rs 26 35
OSDIL (TROIKAA) اوسڈیل
8mg per ml inj 5x1ml amp Rs 36 75
VALOSIN (SIGMA LABS) والوسن
8mg per ml inj 10x1ml amp Rs 46.40



خورونی مانع حمل ادویہ

ORAL CONTRACEPTIVES

CENTCHROMAN

سینٹ کرومان

افعال و منافع: براہدہن استعمال سے حمل کو روکتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ختم ماہواری سے پہلے دن ۱ گولی چوتھے دن دوسری گولی اس طرح ہفتہ میں دوبار ۳ ماہ تک پھر ہفتہ میں ۱ بار جب تک حمل روکنا چاہیں کھلاتے رہیں منفی افعال: پریشان جگر کی خرابی، مہیض کی خرابی، پیڑوں میں غیر طبعی ساخت بننا، شدید الرجی ٹی بی گردوں کے امراض لیام رضاعت میں ابتداء کی ۶ ماہ تک استعمال نہ کرائیں۔

احتیاط: وقت کی پابندی میں احتیاط رہے۔

تجارتی مرکب

CENTRON

(TORRENT)

سین ٹرون

Centchroman 30mg tabs 8- Rs 27 90

لائسنسری ٹول اتھھی ناکل ایسٹراڈیول

LYNOES TRENOL ETHINYL ESTRADIOL

افعال و منافع: براہدہن استعمال سے حمل قائم ہونے سے روکتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ماہواری ختم ہونے کے پہلے دن سے ۱ گولی روزانہ ۲۲ دن ۶ دن خالی یا دوسرے رنگ کی گولیاں استعمال کریں جو پیکٹ میں ہوتی ہیں۔

منفی اثرات: حمل میں، پستان و تناسل اعضاء کے کینسر رنگوں میں خون چھنے امراض جگر پریشان ویاہٹس ہارٹ ایٹک نقص تغذیہ و نامن کی کمی ابتداء کی ۶ ماہ تک دودھ پلانے والی کو مہلکی جریان خون مرگی شدید الرجی میں نہیں چاہیے۔

مضر اثرات: مثلی سے استخاضہ الرجی جلد کی رنگت میں تبدیلی، چکر ضعف ڈپریشن بصارت میں فرق
لختہ جسم میں درد چھین بوزن میں اضافہ چھاتیوں کا نرم ہونا۔

OTHER CONTRACEPTIVES دوسری مانع حمل ادویہ

1. NORGESTREL ETHINYLES TRADIOL

نارجرٹل ایتھی ٹریڈیول

2. LIVONORGESTREL ETHINYL ESTRADIOL

لوونارجرٹل ایتھی ٹریڈیول

(ان کے تجارتی مرکبات جنسی ہارمون کے تحت دیکھئے)

دافع مہیلبی انفکشن ادویہ

DRUGS VIGINAL INFECTION

CHLORAMPHENICOL SUPPOSITRY کلورم فینی کال سپازیٹری

افعال و منافع: ٹرائی کوموناس انفکشن ورم مہبل ورم عانہ میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ایک سپازیٹری دو روزانہ مہبل کے اندر سونے سے قبل رکھوائیں۔

تجارتی مرکب

KEMICETINE VAGINAL (MAC)
250mg 3 Rs 9 67; 500mg. 3. Rs 14.33

کیمی شین دیپاسٹل

CHLORDANTOIN

کلورڈن ٹائین

افعال و منافع: دافع فنگس مہبل کی جھلی میں کنڈیٹ اور ایسٹ کے اثرات کو دور کرتی ہے۔
مقدار و خوراک: ۱ فیصدی کریم مہبل میں مخصوص آلے سے دن میں ۲ بار لگائی جائے۔

تجارتی مرکب

SPOKOSTACIN

(ETHNOR)

اسپورسٹاسن

cream 50g Rs. 7.22

CHLOROQUINALDOL

کلوروکوئیٹال ڈول

افعال و منافع: ورم مہبل بیکٹیریل انفکشن ٹرائی کو موٹاس ورم مہبل کنڈیڈا انفکشن میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام ویچائنا کے اندر سوتے وقت رکھوائیں معمولی حالت میں ۵ سے ۸ دن
شدید حالت میں ۲ ہفتہ استعمال کرائیں۔

تجارتی مرکب

GYNOSAN

(S G PHARMA)

گائٹوسان

200mg vaginal tab 25x4 tabs Rs 32 08

CICLOPIROXOLAMINE

سائیکلوپائیروکسولامین

افعال و منافع: مہبل اور شرمگاہ کے فنگل انفکشن کی مفید ترین دوا ہے۔
مقدار و ترکیب: ۵۰ ملی گرام مہبل کے اندر سوتے وقت رکھوائیں ۶ دن ضرورت ہو تو ۱۲ دن۔

تجارتی مرکب

BATRAFEN

(HOECHST)

بٹرافین

Ciclopiroxolamine 10mg cream 15g Rs 18 70

CLOTRIMAZOLE

کلوٹریمازول

افعال و منافع: کنڈیڈا اور موٹی لہال انفکشن کے سبب ہونے والا لیکوریا، شرمگاہ اور مہبل کا ورم و
مہبل ورم شفہ کی کھجلی میں بطور حفظہ مقدم حمل کے آخری ۳ ماہ میں مفید و موثر ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام یا گولی مہبل کے اندر سوتے وقت رکھوائیں ۶ دن تک ضرورت ہو تو
۳ کورس یا اس کی کریم مخصوص آلے کے ذریعہ استعمال کرائیں۔
متیاط: ایام حیض میں دوائہ دیں، شوہر و بیوی دونوں ایک ساتھ دوا استعمال کریں۔

تجارتی مرکبات

CANDID V6/V3/V1	(GLENMARK)	کنڈیڈوی مہلیٹ
100mg: 6: Rs.17.97, 200mg: 3: Rs.16.58; 500mg: 1: Rs.14.19		
CANDID V GEL	(GLENMARK)	کنڈیڈ کریم
30g with applicator 25.52		
CANDINIL-100	(INGA)	کنڈی ٹل
100mg tabs; 6 tabs Rs.18.10		
CANESTIN VAGINAL	(BAYER)	کے نس ٹین ویجائٹل
0mg vaginal tabs; 6 tabs Rs.26.95		
CANESTIN-3 VAGINAL	(BAYER)	کے نس ٹین ۳ ویجائٹل
200mg vaginal tabs; 3 tabs Rs.24.95		
CANESTIN-1 VAGINAL	(BAYER)	کے نس ٹین ۱ ویجائٹل
500mg vaginal tabs; 1 tabs Rs.21.95		
GYNOSTATUM	(CROSLANDS)	گائوس ٹائٹم
30g with applicator: Rs.32.00		
IMIDIL VAGINAL	(LYKA)	ایڈل ویجائٹل
100mg: 6: Rs.21.80, 200mg: 3: Rs.9.46, 500mg: 1: Rs.6.38		
SINIUM VAGINAL	(DEE PHARMA)	سی نیم
100mg: tabs: 6: Rs.18.72		
STATUM VAGINAL TABS	(FRANCO INDIAN)	اسٹیم ویجائٹل
100mg vaginal tabs 6, Rs.18.00		
SURFAZ VAGINAL TABS	(FRANCO INDIAN)	سرفاز ویجائٹل
100mg vaginal tabs: 6, Rs.15.55		
TRIBEN VAGINAL TABS	(JENBURKT)	ٹرائبن ویجائٹل
100mg: 6: Rs.14.50; 200mg: 3: Rs.12.50; 500mg: 1: Rs.7.50		

FLUCONAZOLE

فلو کونازول

افعال و منافع: کنڈیڈا انفکشن مہلک گلٹیوں کے سبب ہونے والے مہلی انفکشن میں مفید ہے۔
 مقدار و اثرات: متلی سر درد، جلد پر داغ پڑنا، درد شکم، اسہال، نفخ شکم جلد متورم ری ایکشن،
 خون کے سرخ ذرات کی کمی۔

احتیاط: گردوں کی خرابی میں، جگر کے افعال پر دھیان رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: فین ٹائن، سائیکلو سپورین وارفارین ری فام پی سین مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

ALFLUCOZ	(ALEMBIC)	انفلوکوز
150mg: caps: 4: Rs.120.00		
FLUZIDE	(CONCEPT)	فلوزائیڈ
50mg: 4: Rs.72.00, 100mg: 4: Rs.124.00, 150mg: 1: Rs.45.00		
FORCAN	(CIPLA) 150mg: caps. 1: Rs.31.75	فورکان
MYCOREST	(RECON)	مائی کوریسٹ
50mg: Rs.194.25, 150mg: 1: Rs.28.40		
SYSCAN	(TORRENT)	سکان کپسول
50mg: 4: Rs.40.90, 100mg: 4: Rs.82.90; 150mg: 1: Rs.29.90; 200mg: 4: Rs.154.50		
SYSCAN INFUSION	(TORRENT)	سکان یو سی
2mg per ml inj. 100ml: Rs.70.90		
ZOCON	(FDC)	زوکون ٹبلیٹ
50mg: 4: Rs.47.95; 150mg: 1: Rs.34.25; 250mg: 4: Rs.174.50		
ZOCON INFUSION	(FDC)	زوکون یو سی
2mg per ml I.V. Infusion 100ml Rs.62.95		

HAMYCIN

ہے مائی سین

افعال و منافع: مہلی اور مونیلا انفکشن و درم، ٹرائی کو مونس مہلی انفکشن و درم و بچائے کے دیگر جراثیمی انفکشن میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۴ لاکھ سے ۸ لاکھ یونٹ لوشن یا گولی استعمال کرائی جاتی ہے۔

تجارتی مرکبات

HAMYCIN	(HAL)	ہے مائی سین لوشن
Hamycin 200 00 u per ml susp 10ml Rs.14.85		

HAMYCIN OVULES (HAL)
Hamycin 400,000 ovules 6 Rs. 15.76

ہیمل سین گولی

LIGNOCANE

لگنوکین

افعال و منافع: پیشاب کی نالی و دیگر متعلقات کو سن کرنے کی گھسڑ ڈالنے ورم درد کو تسکین دینے کے لئے
مستعمل ہے۔

(تجارتی مرکبات ٹیوب جیلی کریم انجکشن کے لئے دیکھئے عنوان سن کرنے والی ادویہ)

METRINIDAZOL

میٹری نائی ڈازول

افعال و منافع: ٹرائی کو موناس انفکشن کے لئے مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام شدید حالت میں ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۷ دن تک بچوں کو ۱۰۰ سے
۲۰۰ ملی گرام عمر کے مطابق انفکشن کی حالت میں شوہر بیوی دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔

منفی افعال: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں خون کی غیر طبعی حالت عصبی امراض و ایام رضاعت میں
استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: ہضم کی خرابی، زبان و دانتھ خراب لیو کو سائیٹ کی کمی، پیشاب سیاہ آنا طویل حلاج میں
دارے کا خطرہ۔

دواؤں کا رد عمل: شراب، خوردنی مانع انجماد خون ادویہ، فینوباربیٹون دوائی بلڈ پریشر کے ساتھ اس کا
استعمال مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

COMPEBA (IDPL) 200mg tabs 10 Rs 3 82
FLAGYL (RHONE POULENC)
200mg 10 Rs 3 94, 400mg 10: Rs 6 57
METROGYL (UNIQUE)
200mg. 10 Rs 3 93; 400mg: 10 Rs.6 65
UNIMEZOL (UNICHEM)
Metronidazol 200mg tabs: 10 Rs.3.65

کمپا
فلے جی

میٹرو جیل

یونی میزول

MICONAZOL NITRATE

مائی کونازول نائٹریٹ

افعال و منافع: شرمگاہ اور مہبل میں اور کنڈیڈا انفکشن کے لئے مفید ہے۔ گرام مثبت G+Positive بیکٹریا سے پیدا ہونے والے امراض میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام یا اگولی مہبل کے اندر رکھوائیں کریم اندر اور باہر ۱۴ دن استعمال کرائیں۔

احتیاط: صرف حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں استعمال کرائیں۔

تجارتی مرکبات

GYNODAKTARIN

(ETHNOR)

گائڈاکٹرین کریم

20g Rs.28.60; 50g Rs.37.95

GYNODAKTARINOVULE

(ETHNOR)

گائڈاکٹرین ٹکے

200mg ovule 3 Rs.17.04; 6 Rs.35.30

MICOLON

(ETHNOR)

مائی کولون کریم

0.1% w/w cream 15g: Rs.16.40

SIGMAZOL CREAM

(SIGMA LABS)

سگمازول کریم

cream 5g tube: Rs.7.22; 10g tube: Rs.12.51

ZOLE

(GUFIC)

زول لوشن

5g: Rs.4.18, Rs.12.60 Lotion 15ml: Rs.10.82

ZOLE OVULE

(GUFIC)

زول ٹکے

Miconazole 200mg ovule 6 Rs.19.95

N. BENZOYL SULPHANILAMID

این بنزو آئل سلفا نائلامائیڈ

SULPHACETAMIME

سلفا سیٹا مائیڈ

SULPHA THIAZOLE

سلفا تھیا زول

افعال و منافع: مہبل اور رحم کا غیر جراثیمی ورم، مہلی ٹرائی کو مونا س اور کنڈیڈا انفکشن، آپریشن اور ولادت کے بعد جراثیمی انفکشن سے حفاظت کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ایک پچکاری مہبل میں دن ۲ بار دن استعمال کرائیں بعد کو دوا لم کر دیں۔
احتیاط: سلفا گروپ سے حساس مریضوں کو اور گردوں کے امراض میں نہیں دینا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

NEBASULF (PFIZER)	15g : Rs. 9.61	نیم سلف
TRISULFA CREAM (STADMED)	Rs. 13 05	ٹرائل سلفا کریم
TRIPLE SULPHA (ETHNOR)	Cream 20 g Rs. 16.50	ٹریپل سلفا

NAYASTATIN

نیا سٹاٹن

افعال و منافع: ایک قابل بھروسہ دافع فنگل انٹی بائیوٹک دوا ہے جو مہبل کے مونی لیال اور کنڈیڈا
انفلس کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱ لاکھ سے ۲ لاکھ یونٹ یا اسے ۲ گولی مہبل کے اندر سوتے وقت ۲ ہفتہ استعمال کرائیں۔

تجارتی مرکبات

MYCOSTATIN VAGINAL (SARABHAI)

مالی کو سٹاٹن ویا جائل

10, Rs.24 41

POVIDINE IODINE

پاوی ڈین

افعال و منافع: کنڈیڈا، ٹرائل کو مونیال اور غیر جراثیمی ورم مہبل میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: سوتے وقت ۲ مہبل کے اندر ۲ ہفتہ تک رکھوائیں۔

احتیاط: دواسے آنکھوں کی حفاظت کریں۔

تجارتی مرکبات

ALPHADINE VAGINAL (NICHOLAS)

الفاڈین ویا جائل

14 pessaries with applicator Rs. 20 25

BETADINE VAGINAL (WIN MEDICARE) 10 Rs 22.29

POVIDONE VAGINAL (STAEMED) 14 Rs 20 00

WOKADINE VAGINAL (WOCKHARDT) 14 Rs. 23.48

SECNIDAZOL

سیکنی ڈازول

افعال و منافع: ٹرائی کو موناں و جراثیمی مہلکی انفکشن ورم میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۲ گرام اخوراک صرف استعمال کرائیں میاں بیوی دونوں استعمال کریں۔
 احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔
 مضر اثرات: درونم معدہ، زبان متورم، بے چینی، درد سر، بھوک کی کمی اسہال الرجی، جلد پر داغ،
 یو کوسائٹ کی کمی دورے پڑنا عصبی خلل ہو سکتا ہے۔
 دواؤں کا رد عمل: وارفارین، شراب، ڈائی سلفی ریم کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

AMID	(ELDER)	Secnidazole 500mg tabs: 4	Rs 48 00	ایسٹ
SAGENTYL	(SYSTOPIC)			سے گمن نائل
SECNIL	(RITONE-POULENC)			سیک نل
SECZOL DS	(INTAS)	Secnidazole 1gm tabs 2:	Rs 27 80	سیک نول
TAGERA	(UNICHEM)			ٹے گے را

TERCONAZOL

ٹرکونال زول

افعال و منافع: مہل اور شرمگاہ کے کنڈیڈا انفکشن کے لئے مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: پچکاری کے ذریعہ ۵ ملی لٹر سوتے وقت ۳ دن مہل کے اندر لگائیں۔
 مضر اثرات: درد سر، حیض کی تکلیف، مقامی سوزش و جلن بنز سردی۔
 احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں دودھ پلانے والی اور حساس مریضوں میں۔

تجارتی مرکبات

GYNO-TERAZOL VAGINAL CREAM (JHONSON & JHONSON) گائونویرازول کریم
 Rs 30 25

TINADAZOL

ٹناڈازول

افعال و منافع: ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۷ دن تک یا ۲ گرام واحد خوراک شوہر بیوی دونوں استعمال کریں۔

احتیاط: حمل کے پہلے ۳ ماہ میں، ایام رضاعت میں خون کی غیر طبعی حالت میں عصبی غمراہی اور شراب کے ساتھ احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

COSTINI	(CFL)	Rs. 45	کوشاکی نی
TINI-500	(KOPRAN)	10, Rs. 19.60	ہائی نی ۵۰۰
TINICIDE-V	(BLUE CROSS)	Viginal tabs: 4- Rs. 20 00	ہائی سائیڈ وی
TINIDAFYL	(JAGSONPAL)	10: Rs 16.50	ہائی نی ڈاقل
TRIDAZOLE	(FRANCO INDIAN)	500 mg: 4- Rs 6 19	ٹرائیڈازول
ZIL	(SARABIAI)	4 Rs. 21.33	زل
ZOACIDE-V	(TATA PHARMA)	Vagi tabs. 8 Rs 30 00	زو آسائیڈ

NATAMYCIN

نشامائی سین

افعال و منافع: کنڈیڈ اور ٹرائی کو موناس کے سبب ہونے والا مہلی اور مائیکسٹن میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام ویجائٹل مہلیٹ مہل کے اندر رکھوائیں۔

تجارتی مرکب

PIMAFUSIN VAGINAL (ELDER) پی مافوسن ویجائٹل مہلیٹ
Natamycin 100mg Vaginal tabs. 3 with applicator Rs 33.50

VAGINAL CANDIDIASIS
NOW COVERED UNDER ONE CAP

CANCAP-150

(Fluconazole 150mg Capsules)



Vaginal
Candidiasis
150mg
Single Dose

پھیپھڑوں کی عروق کو کشادہ کرنے والی ادویہ

BRONCHODILATOR

KETOTIFEN

کیٹوٹائی فین

افعال و منافع: بلغمی دمہ کا دورہ روکنے، بلغم نکالنے، الرجی، اور رمد چشم میں مفید ہے۔
 مقدار: ۱ سے ۲ ملی لیٹرون میں ۲ بار کھانے کے ساتھ بچوں کو ۱ ملی گرام، ۲ سال سے کم عمر کو نہ دیں۔
 مضر اثرات: خشکی درد سر، متلی، چکر، منہ خشک وزن میں اضافہ۔
 احتیاط: حمل لیام رضاعت اور حساس مریضوں کو احتیاط رکھیں۔
 دواؤں کا رد عمل: مسکنات، موتات، دافع حساسیت شراب اور دافع ذیابیطس۔

تجارتی مرکبات

AIRYFEN	(PANACEA)	ایری فن ٹیبلٹ سرپ
ASTHAFEN	(TORRENT) 10: Rs. 10.90	ایس تھا فین سرپ
KETASMA	(SUN PHARMA) 10: Rs. 13 20	کے ٹاسما
KETOTIF	(KOPRAN) 10: Rs. 11.45	کیٹوٹیف
KETOVENT	(INTAS)	کیٹوونٹ
STAFEN	(UNISEARCH)	اسٹافن ٹیبلٹ سرپ
TRITOFEN	(FDC)	ٹرائی ٹوفان ٹیبلٹ سرپ
ZEROSMA	(TATA PHARMA)	زیرو ساسما ٹیبلٹ سرپ

SODIUM CROMO GLYCATE سوڈیم کرومو گلائائی کیٹ

افعال و منافع: دمہ کا دورہ روکنے کے لئے مفید ہے۔
 مقدار: ۲ ملی گرام دن میں ۳ مرتبہ شدید حالتوں میں زیادہ بار بھی سونگھا سکتے ہیں۔
 مضر اثرات: حلق اور ناک کی تالی میں خراش، سینہ میں درد، چھینک آنا خون آنا۔
 احتیاط: حمل اور لیام رضاعت میں زیادہ مقدار میں اور جلدی جلدی استعمال سے احتیاط۔

تجارتی مرکبات

CROMAL-S INHALER (CIPLA) 1 Canister Rs. 156.83
FINTAL INHALER (RALLIS)
IFIRAL (UNIQUE)

کرومال ایس انسپلر
 فن ٹال
 ایفیرال

ADRENALIN

اڈرینالین

افعال و منافع: بلغمی دمہ، ہتی اچھلنا، الرجی، عروق کو کشادہ کر کے دورہ دورہ کرنا۔

مقدار: ۱ ملی لٹرز زیر جلد یا عضلاتی، وریڈی نہیں لگانا چاہیے۔

مضر اثرات: بے چینی درد سر ضعف، خفقان قلب ہائی بلڈ پریشر دماغی جریان خون۔

دواؤں کا رد عمل: ٹرائی سائی کلک، دافع ڈپریشن، فیورازولن ڈین انٹی ہشامین لود تھائی راکسین، بیٹا

بلاکر، گوئی حمیڈین، نائٹریٹ اور الفابلا کر کے ساتھ دینا مضر ہے۔

ALBUTEROL

آل بیوٹی رول

افعال و منافع: دمہ بلغمی سینہ میں درد پرانی کھانسی، امتناز میں مفید ہے۔

مقدار: ۴ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

مضر اثرات: عضلات کا پٹنا، خفقان، عروق پھیل جانا، لو بلڈ پریشر، متلی درد سر۔

احتیاط: ذیابیطس، جگر کی خرابی حرکات قلب بے ترتیب زخم معدہ غدہ درقیہ پھولنے اور حساس

مریضوں کو۔

دواؤں کا رد عمل: بکلو میحاسون، تھیوفائی لین جیٹا بلا کر کے ساتھ دینا مضر ہے۔

تجارتی مرکبات

ASMATIDE-BR (SYSTOPIC)
RESPIRA SYRUP (GENO)

10: Rs. 10.70

100ml. Rs. 16.40

ایس مائیڈ بی آر
 ریسپائی راسرپ

EPHIDRINE

ایفیدرین

افعال و منافع: دمہ بلغمی، سینہ کا درد۔ کھانسی بلغم خارج کرنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

مضر اثرات: وجع القلب، متلی، بد ہضمی، درد سر، نیند کی کمی حرکات قلب بے ترتیب۔

احتیاط: امراض قلب و جگر، غده درقہ کا پھولنا، زخم معدہ حمل ایام رضاعت، عظم غده قدامیہ میں۔

دواؤں کا رد عمل: سی سی ٹی ڈین، ارائی تھرو مائی سین، سائپر و فلاکسا سین، مانع حمل ادویہ کے ساتھ

رد عمل خراب۔

ISO PRENALINE

آئی سو پری نالین

افعال و منافع: بلغمی دمہ میں اور پرانی کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام (آگولی) زبان کے نیچے رکھ کر چوسیں دن میں ۴ بار یا ۴۰۰ سے ۸۰۰

ماخورد گرام ناک و منہ کے ذریعہ پھیپھڑوں میں کھینچیں۔

مضر اثرات: منہ خشک، خفقان، بے چینی۔

احتیاط: ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، قلبی امراض کھسکا اور دمہ قلبی میں استعمال نہ کریں۔

ORCI PRENALINE

آرسی پری نالین

افعال و منافع: بلغمی دمہ، پرانی کھانسی، گرد و غبار والا دمہ، ہوائی کیسوں کا پھولنا سینہ میں درد، ٹی بی،

پھیپھڑوں کے کینسر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بالٹوں کو ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام دن میں ۴ بار بچوں کو سرپ ۵ ملی لٹر دن میں ۳ بار

انجکشن، ۵ سے ۱ ملی لٹر عضلاتی یا زیر جلد۔

مضر اثرات: وجع القلب، بے چینی، کپکپانا، متلی، ہائی بلڈ پریشر خفقان سینہ میں درد۔

احتیاط: امراض قلب، امراض غده درقہ، قلبی دمہ، ہائی بلڈ پریشر ذیابیطس حمل اور رضاعت میں

احتیاط برتیں۔

SALBUTAMOL

سال بیو ٹامول

افعال و منافع: قلب کو تحریک کے بغیر پھیپھڑوں کی عروق کو کشادہ کرتی ہے۔ بلغمی دمہ ضیق النفس

کھانسی اور امفانی زما میں بطور معاون مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ سے ۶ سال تک اے ۲ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو ۲ سے ۴ ملی گرام دن میں ۳ بار دینا چاہیے۔ شدید دمہ میں ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملگرام یا اے ۲ کش سو گھنٹہ میں ہر ۴ گھنٹہ بعد۔
 مضر اثرات: عضلات میں کچکی، وجع القلب خفقان، لو بلڈ پریشر متلی درد سر۔
 احتیاط: امراض قلب، ہائی بلڈ پریشر، عظم درقیہ، ذیابیطس دوا سے حساس مریضوں میں۔
 دواؤں کا رد عمل: بکواسیماسون، تھیوفائی لین کے ساتھ دینا مضر ہے۔

سال میٹرول زینافوئیٹ SALMETROL XINAFOATE

افعال و منافع: دمہ، محنت کے وقت سانس پھولنا دورہ پڑنا، زیادہ دیر تک عروق کو کشادہ رکھنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ ملگرام دن میں ۲ بار شدید حالت میں ۱۰۰ ملگرام سو گھنٹہ میں ۴ سال سے کم عمر بچوں کو نہ دیں۔

مضر اثرات: ہاتھ چیر کا پھلنا، وجع القلب، خفقان درد سر، سینہ میں درد ری ایکشن، تشنج عضلات سینہ میں خراش جوڑوں میں درد۔

احتیاط: غدد درقیہ کے پھولنے، شدید دمہ میں حمل اور رضاعت اور بچوں کو نہ دیں۔

دواؤں کا رد عمل: بیٹابلاکراڈیہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

ٹربوٹالین سلفیٹ TERBUTALINE SULPHATE

افعال و منافع: تکلیف دہ کھانسی، پیپہروں کا دمہ سعال مزمن، ہوائی کیسوں کا پھیل جانا پیپہروں کی دیگر تکلیف میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲.۵ سے ۵ ملی گرام دن میں ۲ یا ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق سو گھنٹہ کے لئے ۲ سے ۴ کش دن میں ۳-۴ بار انجکشن ۰.۵ ملی گرام۔

مضر اثرات: عضلات کا کا پھلنا، وجع القلب خفقان۔

احتیاط: ذیابیطس ہائی بلڈ پریشر، امراض قلب اور دوا سے الرجک مریضوں میں۔

دواؤں کا رد عمل: بیٹاسیماسون، تھیوفائی لین، بیٹابلاک کے ساتھ دینا مناسب نہیں۔

AMINOPHYLINE

امینوفائی لین

افعال و منافع: بلغمی دمہ سینہ میں درد شش و رحم ہوائی کیسوں میں تسکین اور بلغم کی رکاوٹ میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۲۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے کے بعد۔

مضر اثرات: معدہ میں بے چینی حتیٰ تے بھوک نہ لگنا جمع القلب۔

احتیاط: قلب و جگر کے امراض میں ہائی بلڈ پریشر میں غدد و رتہ پھولنے، حمل زخم معدہ اور حساس مریضوں میں۔

دواؤں کا رد عمل: ابو پری نال، سی سی ٹی ڈین، پروپرانولول، اراپی تھرومائی سین فین تائن سگریٹ پیڑی و دیگر نشہ آور دواؤں کے ساتھ دینا مضر ہے۔

BUDE SONIDE

بڈی سونا ئیڈ

افعال و منافع: بلغمی دمہ میں دورہ روکنے کے لئے منہ کے ذریعہ ہیمپروڈوں میں بہہ پہنچائی جاتی ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملٹرو گرام ۱ سے ۲ کث دن میں ۲ بار استعمال کریں۔

مضر اثرات: آواز بیٹھ جانا، منہ اور حلق میں تکلیف ہو سکتی ہے۔

احتیاط: ہیمپروڈوں کی ٹی بی، فننگل اور وائرل انفیکشن میں ایام حمل اور حساس مریضوں میں احتیاط رکھیں۔

DIPRO PHYLINE

ڈی پرو فائی لین

افعال و منافع: ہیمپروڈوں کی تالیوں سے بلغم نکالنے، دمہ کا دورہ روکنے کھانسی سانس پھولنے اور نمونیا میں بطور معاون مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار

احتیاط: جگر و گردوں کی خرابی، سرگی ہو پریشن، مسل ایام رضاعت، گلہ کو ماہور شرابیوں میں احتیاط برتیں۔

ETO PHYLINE

ای ٹو فائی لین

افعال و منافع: بلغمی دمہ، شدید دمہ کا دورہ، سانس پھولنا۔ بلغمی کھانسی دمہ قلبی اور جمع القلب میں مفید ہے۔

مقدار: ۲۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے کے بعد پانی کے ساتھ۔
 مضر اثرات: معدہ میں خراش۔ متلی۔ تے، درد شکم معدہ آنتوں کے جریان خون، نیند کی کمی درد سر،
 بے چینی چکر، خفقان۔ لوہڈ پریش ہو سکتا ہے۔
 احتیاط: شدید قلب و جگر کے امراض، غدہ رقیہ کا پھولنا مرض گھٹیکھا و حمل میں
 دواؤں کا در عمل: الو پروتال، سی ی ٹی ڈین، پروپرانولول، ارائی تھروائی سین فین ٹائن کے ساتھ
 خراب رد عمل ہوتا ہے۔

تھیوفائی لین THIOPHYLINE

افعال و منافع: بلغمی دم، پرانی کھانسی، بلغم کارکنا، وائرل انفکشن کی کھانسی امفائی زیمیا۔ پھیپھڑوں کی
 رکاوٹ میں مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار بچوں کو ۱۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے
 حساب سے۔
 مضر اثرات: متلی۔ تے۔ فم معدہ پر درد، اسہال درد سر، بے چینی، نیند کی کمی خفقان سینہ میں درد چہرہ
 سرخ، لوہڈ پریش، سانس میں تنگی جلد پر داغ پڑ سکتے ہیں۔
 احتیاط: جگر کا دم۔ قلب میں تنگی اور درد پھیپھڑوں میں دم۔ قلب و جگر کے امراض حمل ایام
 رضعت معمر افراد۔ زخم معدہ اور حساس مریضوں میں احتیاط رکھیں۔

مندرجہ بالا دواؤں کے تجارتی مرکبات

AEROCORT INHALER	(CIPLA)	Rs. 115.01
ALUPENT TABS	(GERMAN REMEDIES)	
Oroprenaline sulph. 10mg: tabs: 10.		Rs. 12.50
ASMANIL	(INGA)	
ASMAPAX DEPOT	(NICHOLAS)	
ASMATIDE-BR	(SYSTOPIC)	
ASMOTONE	(EAST INDIA)	

ایروکارت ان ہلر
الوپینٹ ٹیبلٹ

اسمانل سرپ
اسمپاکس ڈیپاٹ
اسمائیڈ
ایسٹون

ASTHALIN	(CIPLA)	استحالی
Salbutamol 2mg & 4mg tabs 2mg 10 Rs. 3 47 4mg 10 Rs 5 18		
ASTHALIN INHALER	(CIPLA)	استحالی ان ہیلر
Salbutamol sulph 100mg per metered dose, inhaler 200 metered doses		
Rs 66 60		
ASTHALIN SYRUP	(CIPLA)	استحالی سیرپ
Salbutamol 2mg per 5ml syrup 112ml Rs. 10 98		
BECLATE INHALER	(CIPLA)	بیک لیٹ ان ہیلر
200mg 200 doses: Rs. 156 63		
BRICANYL	(ASTRA-IDL)	بری کائل
BRICANYL INHALER	(ASTRA-IDL)	بری کائل ان ہیلر
Terbutaline sulph 250mg, permetered dose; inhaler 200 metered doses		
Rs. 75 60		
BRICANYL SYRUP	(ASTRA-IDL)	بری کائل سیرپ
Terbutaline sulph 1 5 mg per 5ml, syrup 100ml: Rs. 10 25		
BRICAREX EXPECTORANT	(ASTRA-IDL)	بری کاریکس سیرپ
Terbutaline sulph 1 5mg, guaraphenesin 66 65mg per 5ml 120ml		
Rs 15 60		
BRICAREX TABLETS	(ASTRA-IDL)	بری کاریکس ٹبلٹ
Terbutaline sulf 2 5mg, guaraphenesin 100mg, tabs 10 Rs 5 07		
BRONCOPHYL PLUS	(CFL)	برا کوفل
Salbutamol 2mg, Theophylline 100mg tabs 10 Rs 3 95		
BRONCORDIL-PELIXIR	(NEOPHARMA)	برا کورڈیل الگور
BRONCORDIL-S TABS	(NEOPHARMA)	برا کورڈیل ٹبلٹ
BRONKOPLUS	(BIDDLESAWYER)	برا کوفلس
Salbutamol 2mg anhydrous therophylline 200mg, tabs. 10 Rs 10		
BRONKOPLUS SYRUP	(CROYDON)	برا کوفلس سیرپ
Salbutamol 2mg, Choline theophyline 100mg/5ml Syrup 100ml		
Rs 15 07		
BRONKOTAB-EX	(BIDDLESAWYER)	برا کوفلیپ
Salbutamol 2mg, bromhexine hcl 4mg tabs 10 Rs 2 24		
BRONTALINE	(SG PHARMA)	بران ٹالین

CADIPHYLATE	(CADILA)	کیدی فائی لیٹ
Theophylline ethanoate of piperazine 250mg; Tabs 100: Rs. 29 06		
CADIPHYLATE ELIXIR	(CADILA) 200ml Rs 26 42	کیدی فائی لیٹ سرب
COLDOFF	(STADMED) 10. Rs. 6.50	کولڈ آف
COSYP	(CFL)	کوسیف
COZY PLUS	(SWIFT)	کوزی پلس
CURAMOL	(MAC)	کیورامول
Theophylline 100mg, salbutamol 2mg tabs 10 Rs. 4.12		
DASLIN	(SEARLE) 100 ml Rs 10 86	ڈاس لین سرب
DELETUS-A	(NICHOIAS)	ڈی لی ٹس
Guaiaphenesin 100 mg, Salbutamol 2mg per 10ml liquid 100ml Rs 10 35		
DERIPHYLLIN	(GERMAN REMEDIES)	ڈیری فائی لین انجکشن
Etiohylline 169 4mg, Theophylline 50 6mg per 2ml ampoules 2ml Rs 2 28		
DERIPHYLLIN SYRUP	(GERMAN REMEDIES)	ڈیری فائی لین سرب
100ml Rs. 9 76		
DERIPHYLLIN TABS	(GERMAN REMEDIES)	ڈیری فائی لین ٹبلٹ
Etiohylline 77mg, Theophylline 23mg tabs 10 Rs 2 25, 250 Rs 49 65		
ETO-SALBETOL	(FDC)	ایٹو سالیٹال
Etiohylline 200mg, Salbutamol 2mg, Bromhexine hcl 8mg tabs 10 Rs 4 80		
GLAXO SALBUTAMOL INHALER	(GLAXO)	گلکسو سالیٹال ان ہیلر
Salbutamol 100mg per inhalation, inhaler (200 inhalations) Rs 49 36		
GRILINCTUS-BM SYRUP	(FRANCO-INDIAN)	گری لیکٹس سرب
Salbutamol (as sulph) 2mg, bromhexine hcl 8mg per 5ml syrup 100ml. Rs 16 10		
GRILINCTUS-BM TABS	(FRANCO-INDIAN)	گری لیکٹس ٹبلٹ
Salbutamol sulph 2mg, bromhexine hcl 8mg tabs 100 Rs. 31 80		
HYSTALIN	(MEJDA) 110 ML Rs 14 27	ہسٹالین سرب
MINAPHILIN	(MEJDA)	مین فائی لین
PHENSEDYL	(RHONE POULENC)	پینسیدیل سرب

PHYLOBID	(WOCKHARDT)	10 Tabs Rs. 9 50	فانی لوڈ
PROTUSSA PLUS	(BOOTS)	100ml Rs. 16 60	پروتوسا پلس
PULMICORT INHALER	(ASTRA-IDL)		پل می کورٹ ان ہیلر
Budesonide 100mg per metered dose; inhaler 100 metered dose Rs. 144.94			
PULMOREST PLUS SYRUP	(STADMED)		پل مورسٹ سیرپ
PULMOREST	(STADMED)		پل مورسٹ ٹبلٹ
Bromhexine hcl 8mg: tabs: 10:Rs.3.50			
RESPREN	(ETHNOR)		ریس پرین
SALBETOL	(FDC)	10, Rs 3.47	سالمی ٹال
TEDRAL LIQUID	(WARNER HINDUSTAN)	100ml Rs.7 43	ٹڈرال لکویڈ
TEDRAL SA	(WARNER HINDUSTAN)		ٹڈرال ایس اے ٹبلٹ
Theophylline 198mg, Ephedrine hcl 48mg, Phenobarbitone 25mg, Sustained action tabs 4 Rs. 4.04			
THEO-ASTHALIN	(CIPLA)		تھیو اسٹھالین ٹبلٹ
THEO-ASTHALIN SYRUP	(CIPLA)	100ml Rs. 13.86	تھیو اسٹھالین سیرپ
THEOMAC	(MAC)		تھیو میک
TUSSIVIL	(LEDERLE)		ٹس ویل
VENT	(KOPRAN)		وینٹ
Salbutamol 2mg, Theophylline anhydrous 100mg tabs, 10x3x10 Rs. 146 78			
VENT FORT	(KOPRAN)		وینٹ فورٹ
VENT LIQUID	(KOPRAN)	100ml Rs. 17 62	وینٹ لکویڈ
VENTKOF	(KOPRAN)	60ml. Rs 10 00	وینٹ کوف
VENTORLIN	(GLAXO)		وین ٹورلن ٹبلٹ
Salbutamol (as sulph) 4mg & 8mg controlled release caps 4mg, 10. Rs.6.27 8mg; 10, Rs.9.05			
VENTORLIN EXPEC	(GLAXO)		وین ٹورلن سیرپ
Salbutamol (as salbutamol sulph) 2mg, guaiaphenesin 100mg per 10ml syrup 120ml ; Rs. 11.45			
WINTREL	(PFIMEX)		وین ٹرل
XITMA	(NEON)	10x2ml amps Rs 29 00	زیتما انجکشن

دافع حساسیت کھانسی زکام کی ادویہ

ANTI HISTAMINES COUGH COLD REMEDIES

CHLORPHENIRAMINE

(۱) کلورم فینی رامن میلی ایٹ

MELEATE

افعال و منافع: دافع حساسیت دوا ہے الرجی، کھانسی سردی نزلہ زکام میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ء ۲ سے ۵ ملی گرام دن میں ۴ بار بچوں کو نصف خوراک۔

مضر اثرات: خشکی، چکر، لاتی ہے۔

احتیاط: دوران استعمال ڈرائیوری مشنری چلانے، اور شراب سے پرہیز کریں۔

DIPHEN HYDRAMINE

(۲) ڈائی فن ہائڈرامین

افعال و منافع: دافع حساسیت و مانع الرجی اثر رکھتی ہے سردی نزلہ زکام کھانسی ورم غار الانف اور

حساسی امراض میں بطور معاون مفید و موثر ہے۔

مقدار: ۱۵ سے ۳۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

مضر اثرات: خشکی، شکر آنا، دل دھڑکنا۔

احتیاط: دوا سے حساس مریضوں کو دودھ پلانے والی چھوٹے بچوں، گلو کو مارکی، مشنری چلانے و

ڈرائیوری سے پرہیز کریں۔

دواؤں کا رد عمل: شراب مسکن و منوم ادویہ دافع درد ادویہ کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

MEPRAMINE MALEATE

(۳) میپ رامن میلی ایٹ

افعال و منافع: سردی زکام خشک کھانسی، سگریٹ پیڑی کے سبب ہونے والی کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۶ سے ۳۲ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

مضر اثرات: خشکی پیدا کرتی ہے۔

احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں جگر کے امراض شراب، ڈوائیڈی اور مشنری چلانے سے احتیاط رکھیں۔

CODEINE (۴) کوڈین

افعال و منافع: مسکن درد اثر کرتی ہے خشک کھانسی آپریشن کے بعد ہونے والی کھانسی میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۱/۴ گولی سے ۱ گولی دن ۲-۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق اسال سے کم عمر بچوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: متلی، تے، قبض خشکی، گھبراہٹ پیدا کرتی ہے۔

احتیاط: سر کی چوٹ، دماغ میں دباؤ، کثرت شراب نوشی، شدید بلغمی دم، ضعف قلب، مرارہ کے آپریشن کے بعد استعمال نہ کرائیں۔

DEXTRO ME THORPHAN (۵) ڈیکسٹر و میتھارفین

افعال و منافع: خشک و تر کھانسی کو وقتی سکون پہونچاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۵ ملی گرام دن میں ۳ بار ۶ سال سے کم عمر بچوں کو ۲ سے ۴ ملی گرام۔

مضر اثرات: چکر ہضم کی خرابیاں الجھن، گھبراہٹ پیدا کرتی ہے۔

احتیاط: قلب جگر و گردوں کے امراض، ذیابیطس حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں خدہ در خدہ کے پھیل جانے میں احتیاط برتیں۔

ETHYLMORPHINE (۶) ایتھائل مورفین

افعال و منافع: خشک کھانسی، درمیانی درد، شقیقہ دانوں کے درد، عصبی اور عضلاتی درد میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۶ سے ۴۸ ملی گرام پومیہ۔

مضر اثرات: متلی، تے، قبض، الجھن، خفقان خشکی بے چینی پیدا کرتی ہے۔

احتیاط: طویل عرصہ تک استعمال سے عادت پڑ جاتی ہے، شدید قبض میں احتیاط برتیں۔

NOSCAPINE (۷) ناسکاپین

افعال و منافع: نزلہ زکام، کھانسی ناک بہنا، بھورم غار الانف میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۵۰ ملی گرام ۴ سے ۶ گھنٹہ بعد۔

مضر اثرات: متلی، چکر، درد سر، تھک، خفقان، پیشاب میں کی ضعف عضلات ہاتھ پیر کانپنا، الجھن خشکی نیند کی جلد پر داغ پڑنا۔

احتیاط: ہائی بلڈ پریشر، امراض قلب، وجع القلب اور دوا سے الرجک مریضوں میں۔

AMONIUM CHLORIDE

(۸) ایسونیئم کلورائیڈ

افعال و منافع: مخرج بلغم اثر کرتی ہے، دوسری دواؤں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے حاد و مزمن سعال میں بلغمی کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔

BROMO HEXINE HCL (۹) برومو ہگزین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: ہوائی نالیوں میں بلغم رکنا، سعال بلغمی دمہ، ورم غار الانف سینہ کے درد میں مفید ہے مقدار و ترکیب: ۸ سے ۱۶ ملی گرام دن میں ۳ بار ۵ سے ۱۰ سال کے بچوں کو ۴ ملی گرام دن میں ۳ بار ۵ سال سے کم عمر بچوں کو ۴ ملی گرام دن میں ۲ بار۔

منفی افعال: زخم معده، حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: متلی، اسہال، بد ہضمی معده میں گرانی۔

دواؤں کا رد عمل: انٹی بائیوٹک ادویہ کو پھیپھڑوں کی نالیوں تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔

CARBO CYSTEINE

(۱۰) کاربو سیسٹین

افعال و منافع: سگریٹ نوشوں کی کھانسی، حاد و مزمن سعال، پھیپھڑوں میں دمہ بلغمی کے سبب بلغم رکنا، ٹی بی کی کھانسی، ورم خجھر ورم شعبۂ الریہ ورم غار الانف نزلہ زکام پہنے انصہاب نزلہ میں مفید ہے۔ مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار سرپ ۵ سے ۱۰ ملی لٹر ۳ بار چھوٹے بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ہضم کی خرابیاں، متلی جلد پر داغ، درد سر۔

احتیاط: زخم معده اور حمل میں احتیاط رکھیں

(۱۱) ڈائی فینائل پائی رازین DIPHENYL PYRAZINE

افعال و منافع: زیر دست دافع حساسیت دوا ہے زکام ناک بہنا، چھینکیں آنے میں پتی اچھلنے، ایگزیریا، کیزے مکوزوں کا کٹنا دواؤں غذاؤں سے الرجی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ ملی گرام دن میں ۲-۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔

مضر اثرات: خشکی، چکر آنا، منہ خشک رہتا ہے۔

احتیاط: ہائی بلڈ پریشر، قلبی عروق کی تکالیف، حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں، مشنری چلانے ڈرائیوری کرنے سے احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: شراب مسکن و منوم ادویہ، منشیات دافع ڈپریشن دواؤں کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں۔

(۱۲) گلیسرائل گواکولیٹ GLYCERYL GUAICOLATE

افعال و منافع: مخرج بلغم ہے۔ بلغمی کھانسی، نفلوائڈز کے بعد نزلہ کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بالقوں کو ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام

(۱۳) گوائیفینے سین GUAIA PHENESIN

افعال و منافع: بلغمی مادے کو ڈھیلا کر کے اس کو خارج کرتی ہے مختلف اشیاء سے ہونے والی بلغمی کھانسی بلغمی دمہ، سعال مزمن ورم شعبۂ الریہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲-۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔

منفی افعال: غدہ درقہ کا پھولنا، امراض قلب، ذیابیطیس دوا سے حساس مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ہضم کی خرابیاں، خشکی متلی، تے، ہو سکتی ہے۔

(۱۴) فینائل پروپانولامین PHENYL PROPANOLAMINE

افعال و منافع: پھیپھڑوں اور آلات تنفس کی رگوں میں پھنسی ہوئی رطوبت کو ڈھیلا کرتی ہے ناک بند ہونے میں خاص طور سے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۲ سال سے زائد مرد والوں کو ۲۵ ملی گرام دن میں ۳ بار ۱۲ سال سے کم مرد والوں کو نہ دیں۔

مضر اثرات: منہ خشک، ہلکی خشکی محسوس ہوتی ہے۔

احتیاط: شدید ہائی بلڈ پریشر میں شرانین قلبی کی خرابی میں، ذیابیطیس غدہ درقہ کے امراض حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: ہالو حصین کوئی نی ڈین انٹی ڈپریشن کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

(۱۵) پوٹاسیم گوائے کول سلفیٹ POTASSIUM GUAICOL SULPHATE

افعال و منافع: کھانسی نزلہ زکام سردی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

مضر اثرات: خشکی متلی، پسینہ کی کثرت، قے، آنتوں میں سوزش۔

(۱۶) سیوڈو ایفیدرین PSEUDOEPHEDRINE HCL

افعال و منافع: بالائی آلات تنفس کے عضلات میں تشنج کو سکون دیتی ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۶۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔

مضر اثرات: نظام عصبی میں خلل، بکواس کرنا، جلد پر دماغ، ورم غدہ قدامیہ۔

احتیاط: شدید ہائی بلڈ پریشر، امراض قلب، اور ذیابیطیس میں احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: فیورازولی ڈین، بھوک کم کرنے والی ادویہ اور انٹی ڈپریشن کے ساتھ استعمال کرائیں۔

(۱۷) ٹرپن ہائیڈریٹ TREPENE HYDRATE

افعال و منافع: سردی نزلہ زکام کھانسی میں بطور معاون استعمال کی جاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۵ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

(۱۸) ٹرائی پرولی ڈین ہائیڈرو کلورائیڈ TRIPROLIDINE HCL

افعال و منافع: الرجی کی علامات، ناک بہنا، بالائی آلات تنفس کی تکلیف ورم غار الانف نزلہ وی بخار، ناک بند ہونا سردی نزلہ زکام دہائی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۲ سال سے زائد عمر میں ۲.۵ ملی گرام دن میں ۳ بار ۶ سے ۱۲ سال تک نصف مقدار دیں۔

مضر اثرات: غمار سستی کابلی، خشکی چکر، متلی درد غم معدہ، بصارت میں فرق پیشاب تکلیف سے اور کم آنا، مت خشک، لوبڈ پریش ضعف عضلات، درد سر ہو سکتا ہے
دواؤں کا رد عمل: شراب منوم اور مسکن نشیل دافع ڈپریشن ادویہ کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

مندرجہ بالا ۱۸ دواؤں کے تجارتی مرکبات

AVILEXPECTORANT (HOCHST) Rs. 15.00 ایول ایکس پکچورنٹ
AVON EXPECTORANT (CARMINOL) 100ml Rs 9 00 ایون سرپ
BENADRYL COUGH FORMULA (PARKEDAVIS) 114ml Rs 27.57 بنادرل کف فارمولا

BRICAREX EXPECTORANT (ASTRA-IDL) بری کاریکس سرپ
BRICAREX TABLETS (ASTRA-IDL) بری کاریکس ٹبلٹ

Terbutaline sulph 2 25mg, guaiphenesin 100mg tabs 10 Rs. 5 63

BRONKOSYRUP (BIDDLE SAWYER) 100ml Rs. 15 19 برانکوسرپ

BRONOLAX (ALKEM) 100ml. Rs. 18 00 برونولیکس

BROXYNOL (ETHNOR) 100ml. Rs. 25 35 بروکسائی نول

BRO-ZEDEX 8 (WOCKHARDT) 100ml. Rs 26 00 بروزی ڈیکس

CHESTON EXPECTORANT (PROTEC) 100ml. Rs 18 60 چسٹون

CHLORANTON PLUS TABS (REMEDIES) 10 Rs. 10 36 کلورنٹون

CHLORANTON-S (REMEDIES) 60ml. Rs 8 43 کلورنٹون ایس

CHLORANTON TABS (REMEDIES) 10 .Rs 4 95 کلورنٹون ٹبلیٹ

CLISTIN EXPECTORANT (ETHNOR) 100ml. Rs 24 74 کلیسٹن سرپ

CODINOL SYRUP (CARMINOL LABS) 100ml Rs 25 20 کوڈی نال

COREX	(PFIZER)		کوریکس
Chlopheniramine maleate 4mg, Codenine phos 10mg, ephedrine hcl 5mg sod citate 150mg, menthol 0.1mg per 5ml syrup 50ml. Rs. 18.45, 100ml. Rs. 24.06			
CORICIDINE-F	(FULFORD)	caps 10x10. Rs. 142.60	کوری سی ڈین
COSAVIL	(HOECHST)	10 Rs. 3.19	کوساویل ٹیبلٹ
COSCOPIN BR	(BIOLOGICAL)	120ml. Rs. 15.94	کاس کوپین سرپ
COSOME	(MERCK)	100ml Rs. 28.07	کوسوم سرپ
DELETUS-A	(NICHOLAS)	100ml. Rs. 10.35	ڈی لی ٹس ٹیبلٹ
DILOSYN EXPECTORANT	(GLAXO ALLENBURYS)		ڈلو سین سرپ
120ml. Rs. 19.90			
EPHEDREX	(ALEMBIC)	60ml. Rs. 17.75	ایٹلی ڈرکس سرپ
EPHEDREX-N	(ALEMBIC)	caps: 50. Rs. 45.00	ایٹلی ڈرکس این کپسول
ESKOLD	(SMITHKLINE)	10. Rs. 14.50	اسکاڈ کپسول
ESKOLD EXPECTORANT	(SMITHKLINE)	60ml. Rs. 15.40	اسکاڈ سرپ
LASTUSS-LA	(FDC)	syrup 60ml. Rs. 25.20	لاس ٹس سرپ
MEGATUSS P	(BIDDLE SAWYER)	100ml bottle. Rs. 26.85	میگا ٹس سرپ
MITS LINCTUS CODEINAE CO.	(ASTRA-IDL)		مٹس لکٹس
Codeine phosphate IP 15mg, Citric Acid IP 180mg, Syrup Tolu IP 2.0mg per 5ml Syrup 75ml. Rs. 26.00 300ml. Rs. 80.52			
MUCODYNE	(ELDER)		میو کوڈین کپسول
Carbocisteine 375mg, caps 10. Rs. 30.00			
MUCODYNE SYRUP	(ELDER)		میو کوڈین سرپ
Carbocisteine 250mg per 5ml syrup 100ml. Rs. 41.95			
PEDIA-3	(ETHNOR)	60ml Rs. 20.75	پیدی اے سرپ
PHENSEDYL EXP.	(RHONEPOULENC)	120ml Rs. 23.43	فینسی ڈل سرپ
PIRITON EXP.	(GLAXO)	115ml; Rs. 13.78	پیرٹان سرپ
PROTUSSA PLUS	(BOOTS)		پروٹوسا ٹس سرپ
RESPIRA SYRUP	(GENO)	100ml. Rs. 20.90	ریسپیریا سرپ
RESPOSYRUP	(BIDDLE SAWYER)		ریسپو سرپ
Bromhexine hcl 4mg per 5ml syrup: 100ml bottle. Rs. 13.00			
TIXYLIX	(RHONEPOULENC)	20ml. Rs. 14.83	ٹیکسی لکس سرپ

TOSSEX IMPROVED (SARABHAD)

لو عیسایمیر وڈ

Codeine Phos. 10mg, chlorpheniramine maleate 4mg, menthol 15mg,
ephedrine hcl 75mg, sod cit. 75mg per 5ml syrup: 100ml Rs. 19.67.

TREXYDIN (RANBAXY) 10: Rs 50.00

ٹریکیس ڈائن ٹیبلٹ

VISCODYNE (TATA PHARMA) 100ml Rs. 21.90

وہ کوڈین سر

ZEDEX	(WOCKHARDT)	100ml Rs. 24.50
--------------	--------------------	-----------------

زیڈیکس سرب

ZEET EXPECTORANT (ALEMBIC) 100ml- Rs 23.00

زیٹ سرپ

محرك اعضائے تنفس

RESPIRATORY STIMULANT

DOXAPRAM

ۋوكساپرام

افعال و منافع: بیہوشی کے بعد تھکن کو تحریک پہنچانے نظام عصبی کے ذہن کو دور کرنے پچھلے دوروں کے امراض مزمنہ اور سستی کو دور کرنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵.۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے۔

منفی افعال: سرگی و دیگر دورے پڑنا شدید ہائی بلڈ پریشر ہوئی نالیوں میں رکاوٹ غددہ ورقیہ پھولنے شدید و مہ کے دورہ میں دینا نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: نظام عصبي ميں خلل، ہلڈ پریش ميں اضافہ، رفتار تحفص ميں اضافہ۔

احتیاط: ہوائی تالیوں کی درستی پر ہی دوا دینا چاہیے جگر اور گردوں کی خرابی تیز رفتار سے بوجھل چڑھانے سے احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: مرثی عضلات، امینو فائی لین فروسی ہائیڈر کلورائیڈ ٹون سوڈیم اور دوسرے انکلائن کے ساتھ اس کا استعمال صحیح کی پیدا کر سکتا ہے۔

تجارتی مرکبات

DOXAPRAM

(KHANDELWAL)

ڈاکٹر ایم

DOXAPRAM (KHANDLERWAL)
Doxapram hcl 20mg, per ml inj 5ml vial: Rs. 32.87; 20ml, Rs. 66.43

ETHYL BUTAMIDE

ایٹھائل بیٹامائیڈ

PROPYL BUTAMIDE

پروپائل بیٹامائیڈ

افعال و منافع: ہاربی ٹون اور کاربن مونو آکسائیڈ کے زہریلے اثرات، نو مولود میں آکسیجن کی شدید کمی، سانس رکنا، ڈوبنا، اپریشن کے بعد تنفس میں رکاوٹ، امفانی زیمادوم گھٹنا وغیرہ میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۵۰ تا ۱۱۲ ملی گرام دونوں دوائیں ملا کر دیریدی عضلاتی یا زیر جلد انجکشن کپسول ۵۰ ملی گرام بوقت ضرورت

تجارتی مرکبات

RESTIMULEN

(S G PHARMA)

ریسٹی مولین انجکشن

Ethylbutamide 112.5mg, propylbutamide 112.5mg, per 1.5ml inj 5 amp: Rs 31 92

RESTIMULEN PEARLS

(S G PHARMA)

ریسٹی مولین ڈرائس

Ethylbutamide 7.5 propylbutamide 7.5g per 100ml · drops 15ml. Rs.14 77

NIKETHAMIDE

نکے تھامائیڈ

افعال و منافع: قلب اور پمپروں کو تحریک دینا چاہتا ہے قلب کے ٹیل ہونے وجہ القلب پمپروں میں خون کی رسد نہ ہو چلتا۔ ضعف قلب، صدمہ کی کیفیت میں مفید کام کرتا ہے۔
مقدار و ترکیب: ۲ سے ۳ ملی لٹر عضلاتی یا زیر جلد ضرورت پڑنے پر ۲ گھنٹہ بعد لگا سکتے ہیں

PRETHAEKAMIDE

پری تھی کامائیڈ

افعال و منافع: یہ نشہ کو دور کرنے نظام تنفس میں تحریک پیدا کرتی ہے، ہاربی ٹون کاربن مونو آکسائیڈ کے زہر کو دور کرنے نو مولود کے جسم میں آکسیجن کی کمی دم گھٹنا، ڈوبنا، تنفس میں سستی قلب کی کمزوری ضعف ٹکان میں مفید ہے

مقدار و ترکیب: ۲۲۵ سے ۳۵۰ ملی گرام دن میں کئی بار عضلاتی دیریدی یا زیر جلد، کپسول ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار شدید حالت میں ۵۰۰ ملی گرام نو مولود کے لئے ۲ بوندوں میں ۳-۴ بار۔

تجارتی مرکب

RESTIMULEN

(S. G. PHARMA)

ریسٹی مولن

Prethecamide 225mg per 1.5ml inj; 5 amps Rs 20 11

سرجری میں کام آنے والی ادویہ

SURGICAL MATERIALS

CHLOR HEXIDINE GLUCONATE کلور ہگزائیڈین گلوکونیٹ

افعال و منافع: ایک زبردست جراثیم کش اور انفکشن دور کرنے کے لیے سے محفوظ رکھنے کے لیے

استعمال کی جاتی ہے اپریشن کے اوزار ہاتھ اور مقامی صفائی کے لیے مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: الٹریانی میں ۱۰ ملی لیٹر یا فیصدی کالوشن بنا کر استعمال کریں۔

مضر اثرات: جلد پر خراش الرجی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: پانی میں حل کر کے استعمال کریں، آنکھ ناک کان کے اندرونی حصہ میں انفکشن اینٹیباکسی زخم

میں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔

تجارتی مرکب

MICROSHIELD

مائکرو شیلڈ

DICHLOROXY LENOL SOLUTION ڈائی کلوروکسائلینول سلوشن

افعال و منافع: ایک زبردست انٹی سپٹک دوا ہے، کاربائلک ایسڈ سے ۴ گنا زیادہ طاقتور ہے ہر قسم کے

جراثیم فنگس اور پروٹوزوا کو ختم کر دیتی ہے اسپتالوں مکانات مویشی فارم وغیرہ میں بطور دافع انفکشن و

جراثیم کش استعمال کی جاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: اس کو پانی میں ملا کر استعمال کرنا چاہیے آلات کو ۱۰ منٹ ۵ فیصد سلوشن میں ڈبو کر

رہنا چاہیے زچگی کے لیے ۲.۵ فیصد حلق کے انفکشن کے لیے ۱/۴ فیصد اور عام استعمال کے لیے ۱ فیصد

استعمال کرنا چاہیے۔

تجارتی مرکب

FAIRGENOLPLAIN (FDC) Rs. 21.67
TEOL-3 (ASTRA-IDL) 5 lit. Rs 234 99

فیرجینال
ایٹی اول

POVIDINE IODINE

پاوی ڈین آیوڈین

انفعال و منافع: اپریشن سے قبل متعلقہ مقام وزخم کی طہارت و جراثیم سے پاک کرنے کے لئے مفید ہے۔
 احتیاط: صرف بیرونی استعمال کریں آنکھوں میں نہیں لگنا چاہیے۔

ALPHADINE SCRUB (NICHOLAS-PIRAMAL) Rs 38.50

BETADINE-AD (WIN MEDICARE) 60ml Rs 38 50

BETADINE SCRUB (WIN MEDICARE) 500ml Rs. 191.10

BETADINE SOLN (WIN MEDICARE) 1000ml Rs. 142 78

MICRODINE SOLN (MICRO LABS) 1litre Rs. 175 00

MICROSHIELD PVP-S/PVP-P (JOHNSON AN JOHNSON)

500ml Rs 272.00

POVIDAX SOLN (UNIQUE) Povidone iodine 10% w/v, 100ml Rs 30.25, 500ml Rs 105 00

POVIDINE SOLUTION (STADMED)

Povidone iodine 5% w/v, 100ml Rs 30.25, 500ml Rs 105 00

WOKADINE SCRUB (WOCKHARDT)

Povidone iodine 7.5% w/v, 500ml Rs 197 00

دوکاڈین

ڈریسنگ میں کام آنے والی اشیاء

DRESSING & APLIANCES

ADHESIVE TAPE

چپکانے والا ٹیپ

زخم کی ڈریسنگ کو روکنے سہارا دینے کے کام آتا ہے

تجارتی نام

ADHESIA

(STNCARE) 10cm x 5m Rs. 78.20

ایڈھیا

DYNAPLAST	(JOHNSON AND JOHNSON)	ڈائی ناپلاست
10cm x 1m Rs 6890		
DERMILITE II	(JOHNSON AND JOHNSON)	ڈرمی لائٹ
2"x10yds Rs 516 00		
JOHNSON PLAST	(JOHNSON AND JOHNSON)	جان سن پلاست
10cm x 10m Rs. 330 10		

CREPE BANDAGE

کریپ بینڈیج

موج، چوٹ، کسر خلع کو سہارا دینے والی اور اعصاب و عضلات کو اپنی جگہ قائم رکھتا ہے۔

DYNACREPE	(JOHNSON AND JOHNSON)	ڈیانا کریپ
15cm x 4m Rs. 89 70		

BENZAL KONIUM CHLORIDE

بنزائل کونیئم کلورائیڈ ڈریسنگ

جو افرادیپ بینڈیج کو برداشت نہ کر سکیں ان کے لئے ابتدائی ڈریسنگ کے کام آتی ہے

SURGIDRES	(RANBAXY) 5m Rs 128 00	سرجی ڈریس
------------------	------------------------	-----------

CORN CAP

کارن کیپ

کارن، مکھ، ایڈی یا پیر کے تیلے میں سخت گانٹھ پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے

RIDCORN	Salicylic acid 50% corn caps. 4 Rs 10 00	ریڈ کارن
----------------	--	----------

INTERA VENOUS DRIP SET

بوٹل چڑھانے والا سیٹ

ADIV-1	(ALBERT DAVID)	ایڈو ۱-۲-۳-۴
Infusion set with vent tube for use with glass bottle with 21 g needle 1 set Rs. 11.50		

POLYVINYL POLYMER SPRAY

پالی وینائل پولیمر اسپرے

زخموں پر چھڑکنے والی واٹر پروف دوا ہے۔ ڈریسنگ کی جگہ استعمال ہوتی ہے

زخم چوٹ، ٹانگوں پر اسپرے کرنے سے زخم جلد مندمل ہو جاتا ہے

انفکشن کی حالت میں استعمال نہ کریں



HEALEX SPRAY	(RALLIS) 100%. Time of 90g, Rs. 83.34	ہیالیکس
---------------------	---------------------------------------	---------

دانتوں میں کام آنے والی ادویہ

DENTAL PREPARATION

یہ تمام ادویہ دانتوں کی تکالیف مثلاً دانتوں کے درد مسوڑھوں کا ورم خون آنے پانی لگنے دانتوں میں میل جمع ہونے اور دانتوں کی بیماریوں میں مفید ہیں۔

DARDANT	(DABUR)	درد دانت
DENTICIDE MOUTH WASH	(TEEM)	دہنٹی سائیز ماؤتھ واش
DENTICURE PAINT	(UNIVERSAL DRUG)	دہنٹی کیور پیٹنٹ
DENTAL	(BENGAL CHEMICALS)	دینٹل
DESENT	(INDOCO)	ڈی سینٹ
Strontium chloride 10% w/w cream: 50g: Rs. 12.45		
DETTOLIN	(RECKITT COLMAN) 500ml, Rs. 28.22	ڈی ٹولین
GELORA	(RECKITT & COLMAN) 10g, Rs. 19.75	گیلورا
TOSS TOOTHPASTE	(SWIFT)	ٹاس ٹوٹھ پیسٹ
Strontium chloride 10% w/w cream: 50g: Rs. 17.46		
STERADENT POWDER	(RECKITT & COLMAN)	سٹیراڈنٹ
Sodium perborate 10g bottle: Rs. 15 00		
TEEJAL TEETHING GEL	(RAPTAKOS) 0.1% v/w tube of 10g	ٹی جال
ZINGISOL	(ICPA) 20ml, Rs. 18.00	زینگیسول
ZYTEE TEETHING GEL	(ICPA) 10ml, Rs. 20.50	زائی ٹی جیل



ناک کے امراض کی دوائیں

NASAL PREPARATION

ناک کے امراض میں درج ذیل ادویہ یا ان کے مرکبات استعمال کئے جاتے ہیں یہ دافع حساسیت عروق کو کشادہ کر کے مقامی تناؤ بے چینی کو دور کرتی ہیں۔

نزہ زکام ناک بہنے ناک کی غشاء مخاطی کا غیر جراثیمی ورم چھینکیں آنا الرجی درد وغیرہ میں مفید ہیں۔

مقدار و ترکیب: ۲ سے ۳ بوند دونوں سوراخوں میں یا پیکنگ پر درج یہ ایات کے مطابق۔

مضر اثرات: خراش، متلی، تے درد سر حلق منہ میں خشکی بے چینی چکر کی شکایت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: طویل عرصہ نہ استعمال کریں۔ حمل۔ ۶ سال سے کم عمر بچوں کو ہائی بلڈ پریشر، غدہ درقہ کے پھولنے اور گلوکوما میں استعمال سے احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکبات

BECLATE NASAL SPRAY (CIPLA) بیک لیٹ نازل اسپرے

Beclate nasal spray 200 metered doses. Each metered dose supplies Beclomethasone 50mg, 200 metered dose: Rs. 99.32.

BECLATE AQUANASE (CIPLA) بیک لیٹ ایکوانس

Atomising pump 150 metered dose: Rs. 84 80

BETNESOL-N-SASAL DROPS (GLAXO) بیٹنی سال نازل ڈراپس

10ml. Rs. 7.46

DECON NASAL DROPS (CADILA) 10ml Rs. 12.10 ڈی کان نازل ڈراپس

DRISTAN SASAL DROPS (GEOFFREY) ڈرستان نازل ڈراپس

EFCORLIN NASAL DROPS (GLAXO) 15ml Rs. 6.38 ایف کورلن

ENDRINE NASAL DROPS (WYETH) 10ml Rs. 6.74 انڈرین نازل ڈراپس

FENOX NASAL DROPS (BOOTS) 15ml Rs. 15.10 فینوکس نازل ڈراپس

FINTAL NASAL SPRAY (RALLIS) 17.5ml Rs. 74 11 فینٹال نازل ڈراپس

IFIRAL NASAL DROPS (UNIQUE) ایفیرال نازل ڈراپس

KARVOL (DUPHAR) Caps 12 Rs. 9.82; 50 Rs. 35.35 کاروال

KARVOL PLUS INHALENT (DUPHAR) Caps 10	Rs. 13.50	کاروال پلس اینہالینٹ
KEMICETINE ANTIOZENA (MAC) 10ml	Rs. 22.00	کیمی سین اینٹوزینا
MUCORIS-E (FDC) drops: 10ml	Rs. 8	میکورس
NASIVION (MERCK) 10ml	Rs. 12.43	نایوین
NAZALIN (BELL) 10ML	Rs. 13.50	نازالین

حلق کے امراض کی دوائیں

OROPHARYNGEAL PREPARATION

حلق اور اس کے متعلقات کے انفیکشن (تعدیہ) حلق کی خراش و درم کھانسی و درم لٹ قلاع منہ کے زخم پھالے، کنڈیلہ اور جراثیمی انفیکشن و درم لوزین میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: لوزینز منہ میں رکھ کر چوسیں، تھروٹ پینٹ حلق میں لگائیں، غرغره والی دوا میں گرم پانی میں ڈال کر غرغره کرائیں

مضر اثرات: زبان اور دانٹوں کی رنگت میں تبدیلی منہ میں گرمی اور ذائقہ کی خرابی ہو سکتی ہے
احتیاط: آنکھوں سے محفوظ رکھیں، کولین سیلی سیلیٹ کے ساتھ اس پرین کا استعمال نہ کریں۔

تجارتی مرکبات

ALPHADINE MOUTHWASH (NICHOLAS)	Rs. 11.39	الفادین ماؤتھ واش
BENYLET LOZENGES (PARKE DAVIS) 20 tubes	Rs 1.60	بینیلت لٹ لوزینز
BENYLIN LOZENGES (PARKE DAVIS)		بینیلین لٹ لوزینز
BETADINE MOUTHWASH (WINMEDICARE)		بٹاڈین ماؤتھ واش
100ml.	Rs. 24.30	
CANDID MOUTH PAINT (GLENMARK) 15ml	Rs. 17.03	کنڈیڈ ماؤتھ واش
DESENT (INDOCO) 50ml	Rs 12.50	ڈیسنٹ
DETTOLIN (RECKITT & COLMAN) 50ml	Rs. 6.30	ڈیٹولین
DEQUADIN LOZENGES (GLAXO ALENBURYS)		ڈیکواڈین لوزینز
DEQUADIN PAINT (GLAXO ALENBURYS)		ڈیکواڈین پینٹ
FORCAN (CIPLA) 200mg 4	Rs. 164	فورکان
GELORA (RECKITT & COLMAN) gel 10g	Rs. 19.15	گیلورا

NIFUGAL B OINT (BIDDLE SAWYER)

نیفوگل بی آئٹ منٹ

Clotrimazole 1% w/v solution: 15ml bottle: Rs. 16.30

POVIDONE MOUTHWASH (STADMEID) 60ml Rs. 13.50

STERADENT (RECKITT & COLMAN) 100g Rs. 17

SYSCAN (TORRENT) Rs. 154.50

SYSFORM DENTAL DREAM (SYSTOPIC) 50g Rs. 13.97

TANTUM ORAL RINSE (SYSTOPIC) 50g Rs. 13.97

TOSS GEL (SWIFT) 50g Rs. 21.00

TOSS K TOOTH PASTE (SWIFT) 50g: Rs. 22.00

WOKADINE GARGLE (WOCKHARDT) 50ml Rs. 13.59

امراض کان کی دوائیں

OTIC PRAPARATION

درج ذیل دوائیں بیرونی اور اندرونی کان کا درم کان بہنا کان کے اندر انفلشن موکی بیماریاں کان کے اپریشن فنکشن انفلشن کان میں میل جتنا کان کے درد میں مفید ہیں
احتیاط: حمل میں اور بچوں کو زیادہ دن استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

ALFLOX EYE/EAR DROPS (ALKEM)

الفلوکس آئی / ایر ڈراپس

Norfloxacin 3%, benzalkonium drops 5ml Rs. 9.95

BACTIGEN E/E DROPS (FDC)

بیکٹی جن ڈراپس

Gentamycin (as sulphate) 0.3% w/v drops 5ml Rs. 5.67

BENICORT-N E/E DROPS (P&B LABS) 5ml vial Rs. 8.51

BETNESOL EYE/EAR (GLAXO) 5ml: Rs. 7.03

BETNOR EAR (INDOCD) 5ml Rs. 7.55

CANDIBIOTIC (GLENMARK) 5ml Rs. 15.51

CANDID EAR DROPS (GLENMARK)

Clotrimazole 1% w/v, lignocaine hcl 2% w/v drops 15ml Rs. 10.90

CHLOROMYCETIN EAR DROPS (PRKF DAVIS)	کلورومائی شین ایرڈراپس
5ml; Rs.6 69.	
CORGEN EYE/EAR DROPS (SWIFT)	کورگن ڈراپس
3ml Rs. 9 15	
DECDAN-N EYE/EAR DROPS (MERIND)	ڈیکڈان ڈراپس
3ml Rs 8 40	
DEXONA EYE/EAR (CADILA)	ڈیکسونا ڈراپس
2.5ml Rs.7.46	
ENTEROMYCETIN OTIC SOLN (DEYS)	انٹرومائی شین سلوشن
5ml Rs.8.00	
FLOXIGARD (GUARDIAN (CROSLANDS))	فلوگسی گارڈ
Rs. 12 50	
GARAMYCIN EYE/EAR DROPS (FULFORD)	جیرامائی سین
Gentamycin (as sulphate) 3mg per ml drops 3ml, Rs 7.08	
G-MYCIN E/E DROPS (BPL)	جی مائی سین
Rs. 7.00	
GENTICYN EYE/EAR (NICHOLAS)	جینی سین ڈراپس
5ml Rs 7 44	
GERFREE E/E DROPS (TATA PHARMA)	جیرفری ڈراپس
5ml Rs.5 17	
GEROCIN BM E/E DROPS (P&B LABS)	جیروسین ڈراپس
Rs. 9 41	
KEMICETINE OTIC SOLN (MAC)	کیمی شین اوٹک سلوشن
6ml Rs. 12 50	
LYRAMYCIN EYE/EAR (LYKA)	لائی رامائی سین
Rs. 4 90	
MERIGENTA EYE/EAR (MERCURY)	میری جینٹا ڈراپس
3ml Rs. 6.16	
METHAZIL (BELL)	میٹھازل
10ml Rs 8 00	
NEOSPORIN-H EAR DROPS (BURROUGHS WELLCOME)	نئی سپورین ڈراپس
OTINA EAR DROPS (GLAXO)	اوٹینا ایرڈراپس
Betamithasone valerate 0.1% w/v, chloramphenicol 5% w/v.	
lignocaine hcl 2% w/v drops 5ml Price N/A	
O'TOFLOUR TABS (BELL)	اوٹوفلور ٹبلٹ
Sodium flouride 20mg tabs tabs 10 Rs. 12.00	
OTOGESIC (ETHNOR)	اوٹو جی سک
Rs.20.77	
PARAXIN EAR DROPS (BOEHRINGER)	پاراکسن ڈراپس
5ml Rs. 8.80	
OCUPOL-D EYE/EAR DROPS (ALBERT DAVIID)	اوکیپول ڈراپس
Rs. 13.90	
OTEK (FDC)	اوٹیک ڈراپس
Rs. 9.34	

آنکھوں کے امراض میں کام آنے والے مرکبات

EYE PREPARATION ANTI BACTERIAL

درج ذیل دوائیں آنکھوں کے انفیکشن جراثیمی تعدیہ، گہا بخنی، پپٹوں کا درم رد چشم، آنکھوں میں دانے روپے لگرے پانی بہنا سرخی درد دورم متعدی پھنسیوں میں مفید ہیں۔
مقدار و ترکیب: دن ۳ بار دونوں آنکھوں میں ڈراپس ڈالیں مرہم سوتے وقت لگائیں
احتیاط: اگر ری ایکشن کا اثر ہو تو دوا فوراً بند کر دیں۔

تجارتی مرکبات

ALBUCID (NICHOLAS)	البوسڈ ڈراپس
Sulphacetamide sodium 10%, 20% 10ml Rs. 10.93	
ALFOX EYE/EAR DROPS (ALKEM) Rs. 9.95	الفاکس ڈراپس
CEBRAN EYE DROPS (BLUE CROSS)	سب ران آئی ڈراپس
Ciprofloxacin 0.3% per 5ml drops: 5ml: Rs 9.80	
C-FLOX EYE DROPS (PREM PHARMA)	سی فلاکس ڈراپس
Ciprofloxacin hcl 0.3% w/v solution: 5ml vial: Rs. 9.25	
CORTOLA-m (EAST INDIA) Rs. 6.88	کارٹولا ایم ڈراپس
DEXOSYN-C (BELL) Rs 8.05	ڈیکوسن سی
ENOX EYE/EAR DROPS (DEYS)	ای نوکس ڈراپس
Norfloxacin 0.3% w/v drops. 5ml vial Rs.9.50	
ENSAMYCIN (FULFORD)	ان سامائی سین
Sisomycin SO4 4mg per ml drops 3ml Rs 19.50	
ENTEROMYCETINE EYE DROPS (DEYS)	انٹرومای سی ٹین ڈراپس
Chloramphenicol 0.5% , phenyl mercuric nitrate 0.002% 5ml Rs 65.50	
FLOXIGARD (GUARDIAN) Rs. 12.50	فلاکسی گارڈ
GARAMYCIN EYE OINTMENT (FULFORD)	جیرمائی سین آئی آنٹ منٹ
Gentamycin (as sulph) 3mg/g oint 3g Rs.1.78	
GENTOMIN-D EYE/EAR DROPS (MEJDA)	جینٹومین ڈی ڈراپس
3ml vial Rs.7.42	

HERPEX OPHTHALMIC (TORRENT)

ہرپس انفصال مک

Acyclovir 3% ointment Tube Rs. 39.00

LOCULA (EAST INDIA)

لاکولا

10%, 10ml Rs 7.17, 20%, 10ml Rs. 10.22; 30%, 10ml Rs. 11.29

METAMYCIN EYE DROPS (BDH)

مٹامائی سین

Chloramphenicol 0.5% drops: 5ml Rs. 6.50

MICOPTIC (FDC)

مائیگوپٹک

Miconazole 1% w/v, opticops 30, Rs. 26.30

NEOSPORIN EYE DROPS (BURROUGHS WELLCOME) نیوسپورین ڈراپس

Polymixin B sulph 5000 units, Neomycin sulphate 1700u, Gramicidin

25 units per ml solution 10ml Rs 11.91

NORBACTIN EYE DROPS (RANBAXY)

نارہکٹین ڈراپس

Norfloxacin 3mk per ml drops 5ml, Rs 9.95

PIMAFUCINE EYE DROPS (ELDER)

پیمافیو سین ڈراپس

Natamycin 5% (50mg/ml) drops 3ml Rs 28.50

PRIMICIN EYE DROPS (HINDUSTAN ANTIBIOTICS) پرائیمی سین ڈراپس

Gentamycin (as sulph) 3mg per ml drops 3ml vial Rs 5.61

PROFLOX EYE DROPS (FROTEC)

پروفلاکس ڈراپس

Perfloxacin (as mesylate dihydrate) 0.3% w/v drops 5ml Rs. 9.95

PYRICORT (FDC)

پائی ری کورٹ ڈراپس

Gentamycin (as sulph) 0.3% w/v, dexamethazone 1% w/v eye drops 5ml Rs 9.26

Q-BID EYE/EAR DRIPS (KAMRON).

کیو بیڈ ڈراپس

Ciprofloxacin 0.3% w/v drips 5ml vial with dropper Rs 11.95

QUINTOR EYE DROPS (TORRENT) کیونٹور ڈراپس

Quinobact Eye Drops (Nicholas) Rs. 12.00

SETRIDE EYE DROPS (TATA PHARMA) سٹرائڈ ڈراپس

Silverex-1 (Guardian) Rs. 17.00

SOFRAMYCIN OPHTHALMIC OIT (ROUSSEL) سوفرامائی سین**& EYE DROPS**

Soframycin (framycetin slo) 0.5% ointment 5g. Rs. 6.01 ml Rs 6.43

SSZ APLICAPS (GUFIC) ایس ایس زیڈ ایپلی کیپ

Rs. 17.25

TOBACIN	(ARISTO)		ٹوباسین
Tobramycin 0.3% drops 3ml; Rs 2084			
TOBAZON	(BELL)	Rs. 16 40	ٹوبازون
WAXOLVE	(BELL)	10ml Rs. 15.00	وآکسالو

اس کے علاوہ کان کے امراض میں درج شدہ ذرا پس جن پر آئی / ایر لکھا ہو آنکھوں میں مفید ہیں۔

دافع گلوکوما اور پتلی کو سکیڑنے والی ادویہ

ANTI GLAUCOMA & MIOTIC

ACETAZOLAMIDE	ایسیٹازولامیڈ
PILO CARPINE NITRATE	پائلوکارپین نائٹریٹ
BITOXO LOL	بٹاکسولول
TIMOLOL MELEATE	ٹیمولول میلی ایٹ

افعال و منافع: حاد و مزمن گلوکوما، آنکھ میں تناؤ اور ثانوی گلوکوما میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: دن میں ۲-۳ بار آنکھ میں ڈالیں۔

منفی اثرات: آنکھ کے شدید ورم، انفکشن، سانس کی تکلیف، ناک بند ہونے میں اس کا استعمال مناسب نہیں

احتیاط: حساسیتی رد چشم، دوا سے حساس مریضوں میں طویل عرصہ اور چھوٹے بچوں میں احتیاط برتیں

تجارتی مرکبات

BI-MIOTIC	(BELL)	Rs 18.80	پائی مائی ادیک
CARPO-MIOTIC	(BELL)		کارپو مائیوٹک
Pilocarpine nitrate 0.5%, 1%, 2%, 4% 2% 5ml Rs 15 90; 4% 10ml Rs.23 85			

DIAMOX	(LEDERLE)	ڈیاموکس	
Acetazolamide 250mg tabs 10 tabs Rs 5.11			
GLAUCARE (MEJDA)	Timolol maleate 5ml	Rs 25.10	گلوکیئر
GLUCOMOL (TORRENT)	Timolol Maleate 5ml	Rs.22	گلوکومول
IOBET (FDC)	Betaxolol (as hcl) 0.5 5ml	Rs.29.45	آیوہٹ
IOTIM (FDC)	Timolol Maleate 5ml	Rs.25.95	آیوٹیم
OCUPRES (CADILA)	5ml	Rs. 22.29	اوکیوپریس
OPTEZE (GUARDIAN)	5ml vial:	Rs 29 00	آپٹیز
PILOCAR (FDC)			پائلوکار
Pilocarpine nitrate 1%, 2%, 4% drops 1% 5ml Rs. 12 10, 2% 5ml			
Rs.18 75, 4% 5ml Rs 30 95			
TIMOLO EYE DROPS (BELL)	Timolol Maleate	Rs. 22.54	ٹیمولو آئی ڈراپس
TIMOPTAL EYE DROPS (P&B LABS)			ٹی سوپ ٹال آئی ڈراپس
Timolol maleate USP Rs. 28 99			

پتلی کو پھیلائے اور حرکت روکنے والی دوائیں

MYDRATICS & CYCLOPLEGICS

اس میں درج ذیل ادویہ شامل ہیں

ATROPIN SULPHATE

اتروپین سلفیٹ

CYCLOPENTOLATE

سائیکلوپین ٹولیٹ

HOMATROPINE

ہوماٹروپین

TROPICAMIDE

ٹروپی کامائیڈ

PHENYL EPHRINE

فینائل افرین

افعال و منافع: تشخیص کی غرض سے اور موتیابند کے آپریشن کے وقت آنکھ کے گولے کو روکنے اور آپریشن کرنے پتلی کو وقتی طور پر من کرنے کے لئے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔

مقدار و ترکیب: بوقت ضرورت اسے ۲ بند ڈالیں

احتیاط: زیادہ بوڑھے افراد میں، دور کی نگاہ کی کمزوریوں میں، گلوکوما، سافٹ لینس کی حالت میں اس کا استعمال معطر ہے۔

تجارتی مرکبات

ATROPINE EYE OINT (DEYS)	ایٹروپین آئی اےنٹ منٹ
Atropine sulphate 1% w/w 3 5g tube Rs 1 72	
BELL HOMATROPINE (BELL) 10ml Rs.5.62	بیل ہوماتروپین
BELL PINO-ATRIN (BELL)	بیل پینو آٹرین
CYCLOGIC EYE DROPS 1% (MEJDA) Rs. 18 45	سائیکلو جیک آئی ڈراپس
DROSYN EYE DROPS (FDC) Rs 21 90	ڈروسائن آئی ڈراپس
OCCUREST EYE DROPS (GENTAUR) Rs 10 50	اکورسٹ آئی ڈراپس
PUPILETTO FORTE (BELL) Rs 5 10	پیوپیلتو فورٹ
TROPICO EYE DROPS (BELL) Rs 29 10	ٹروپیکو
TROPISYN EYE DROPS 1% (MEJDA) Rs 33 16	ٹروپسین سائن
FLUBI PROFEN	فلوبی پروفین

افعال و منافع: آنکھ کے ورم، تھوڑا اور درد کو دور کرتی ہے۔ آپریشن کے وقت اور بعد کی تکلیف میں مددگار ہے۔

مستمر اثرات: اندام زخم میں تاخیر جلن، آنکھ میں جریان خون کا خطرہ
احتیاط: انفیشن کی حالت میں بچوں کو، ورم قرینہ میں احتیاط رکھیں۔

تجارتی مرکبات

OCUFLURE EYE (FDC) Rs 15 30	اوکیو فلور آئی
HYDROXY PROPYL METHYL CELLULOSE	ہائیڈروکسائی پریپائل میتھائل سیلولوز

افعال و منافع: آنکھوں میں خشکی، دھماکے کی کمی، مزمن رمد چشم، مصنوعی لینس کو روکنے میں

مفید ہے انجکشن، موتیابند گلوکوما کے آپریشن مصنوعی لینس، طبقہ قرنیہ لگانے میں مستعمل ہے۔

تجارتی مرکبات

HYPROSOL	(BELL)	10ml Rs. 11.10	ہائپر سول ڈراپس
MOISOL EYE DROPS	(FDC)	5ml. Rs. 9.50	موسول آبی ڈراپس
OCULOSE	(MEJDA)	2ml vial Rs. 56.65	آئیو لوز انجکشن
VIZOL	(BELL)	5ml vial Ra. 18.40	وائی زول انجکشن

IODOXYURIDINE

ایوڈوکسائی یورائیڈین

افعال و منافع: آنکھ میں ہرپیز (Herpez) کے سبب ہونے والے درم قرینہ میں مفید ہے
 مقدار و ترکیب: ۱ بوند ہر گھنٹہ بعد دن میں ہر ۲ گھنٹہ بعد رات میں زیادہ سے زیادہ ۲۱ دن۔
 احتیاط: مقدار خوراک سے تجاوز نہ کریں، کارنی سون اور پورک کے ہر لونہ دیں

تجارتی مرکبات

RIDINOX DROPS	(BELL)	10ml, Rs. 10.00	رڈی نوکس ڈراپس
RIDINOX OINT	(BELL)	3g tubes Rs. 5.32	رڈی نوکس اینٹ منٹ

NAPHAZOLINE NITRATE

نافازولین نائٹریٹ

افعال و منافع: سرد چشم، سرخی، درد و درم اور مصنوعی لینس لگانے کے بعد اس کا استعمال مفید ہے
 مقدار: ۲-۳ بوند دن میں ۳-۴ بار، گلوکوما میں استعمال نہ کریں

تجارتی مرکب

PROTO-BORIC	(BELL)	10ml Rs. 8.50	پروٹو بورک
-------------	--------	---------------	------------

PHENYL EPHRINE

فینائل الفیرین

افعال و منافع: آنکھ کے گولے کو سن اور مفلوج کرنے مصنوعی لینس لگانے میں مستعمل ہے
 محو دہ: بائی بند پریشر قلبی امراض میں احتیاط برتیں

تجارتی مرکبات

DROSYN EYE DROPS (FDC) 10% 5ml Rs. 21.90 ڈروسائن آئی ڈراپس

OCCUREST EYE DROPS (CENTAUR) اکیورسٹ آئی ڈراپس

10ml vial: Rs.10.50

SODIUM CHROMOGLYCATE سوڈیم کروموگلاکسٹ

افعال و منافع: رد حساسی، ورم طبقہ قرینہ آنکھ میں درد ورم جلن بے چینی کھلبلی میں مفید ہے
احتیاط: شیشی کھولنے کے ۴ ہفتہ بعد استعمال نہ کریں۔

تجارتی مرکب

FINTAL EYE DROPS (RALLIS) Rs. 63.52 فنٹال آئی ڈراپس

SODIUM HYALURONATE سوڈیم ہائی لورونائٹ

افعال و منافع: موتیابند، طبقہ قرینہ کا بدلنا، گلوکوما، چوٹ لگنے، آنکھ کے آپریشن میں مستعمل ہے

تجارتی مرکب

HEALON (PHARMACIA) ہیلون

Sodium hyaluronate 10mg per vial injection vial Rs. 1550.00 0.4 ml loaded syringe with gauge cannula.

SODIUM IODINE سوڈیم آیوڈائیڈ موٹو بیسک میاشیم فاسفیٹ

MONO BASIC CALCIUM PHOSPHATE

افعال و منافع: آنکھ کی پتلی (لینس) کے آگے جمل پیدا ہونا پتلی بند ہو جانے میں مفید ہے
مقدار و ترکیب: اسے ۳ یو نمون میں ۳-۴ بار ۳ سے ۶ ماہ تک بلاناغہ استعمال کریں

تجارتی مرکب

CARACSOL EYE DROPS (DEYS)

کریک سول آئی ڈراپس

10ml vial: Rs.15.00

امراض جلد کی بیرونی ادویہ

SKIN PREPARATION

ACNE

دافع مہاسے

درج ذیل دوائیں اس میں مفید ہیں

ALUMNIUM CHLORHYDROXIDE

الومینیم کلور و ہائیڈروکسائیڈ

CLINDAMYCIN, ERYTHROMYCIN

کلائنڈامائی سین، اریٹھرومائی سین

HYDROUS BENZOYL PEROXIDE

ہائیڈروس بنزائل پر آکسائیڈ

METRONIDAZOLE

میٹری نائی ڈازول

SULPHUR

سلفر

TRETINOIN

ٹرائی ٹی نوائین

TRANS-RETINOIC ACID

ٹرانس ری ٹی نوائک ایسڈ

افعال و منافع: چہرے کے مہاسے، جلد پر مہاسے نکلنا جلد کا ورم اور پھنسی میں مفید ہیں۔
مقدار ترکیب: سوتے وقت مہاسوں پر لگائیں صبح کو بغیر کاسٹک والے صابن سے دھو ڈالیں۔
احتیاط: دوا کو آنکھ سے بچائیں، زخم، ہرہیز اور دوسرے انفکشن میں استعمال نہ کریں۔

تجارتی مرکبات

ACNESOL

(SYSTOPIC)

ایٹنی سول

Erythromycin in hydroalcoholic base 2% soln. 30ml Rs. 35.60

ACNEX

(UNISEARCH) 20ml bottle Rs. 49.96

ایک ٹیکس

CLINDAC-A	(CROSLANDS)	طین ذیک اے
Clindamycin (as phos.) 1% w/w topical gel 10g. Rs. 35.00		
EUDYNA	(GERMAN REMEDIES)	یوڈائیٹا
Tretinoin (trans-retinoic acid-vitA acid) 0.05% cream 20g Rs. 37.60		
MERTOGLYL GEL	(UNIQUE)	مینروجل جیل
Metronidazole 1% w/w gel. 30g Rs. 20.72		
PERNOX GEL	(GFL)	پرناس جیل
PERSOL FORTE	(WALLACE)	پرسول فورٹ
Precipitated sulphur 5% w/w, benzoyl peroxide 10% w/w cream 20g Rs. 24.50		
RETINO-A	(ETHNOR)	رے ٹی نو
20g Rs. 44.72		

ANTIBACTERIAL ASTRINGENT مانع جراثیم مرہم اور لوشن

درج ذیل پینٹ دوائیں جلد کے انفکشن، زخم جلنے کٹنے چھالے پڑنے بیرونی کان کے انفکشن دوا، کٹہرے، انفکشن جراثیمی انفکشن زخم بستری کاربنکل وغیرہ میں مفید ہیں

تجارتی مرکبات

ALPHADINE OINT (NICHOLAS-PIRAMAL)	الفاڈین مرہم
Povidone iodine 5% v/v oint 15g Rs. 11.10, 125g Rs. 47.10	
ALPHADINE POWDER (NICHOLAS-PIRAMAL)	الفاڈین پوڈر
10g Rs. 9.32	
ALPHADINE SOLUTION (NICHOLAS-PIRAMAL)	الفاڈین لوشن
100ml Rs. 25.90	
ANAEBELL CREAM (BELL)	انائیل کریم
20gm tube Rs. 4.00	
ARGENEX CREAM (NEO PHARMA)	آر جی نیکس کریم
25g tube Rs. 22	
BELLE CREAM (BELL)	بیلے کریم
20gm tubes Rs. 7.50	
BETADINE OINT (WIN-MEDICRE)	بٹاڈین مرہم
Povidone iodine 5% oint 15g Rs. 16.50, 125g Rs. 58.50, 250g Rs. 94.84	
BETADINE POWDER (WIN-MEDICARE)	بٹاڈین پوڈر
Povidone iodine 5% powder 10g Rs. 11.10	
DIBACT CREAM (SIGMA LABS)	ڈی بی کٹ کریم
250G jar, Rs. 115	

ENSAMYCIN CREAM (FULFORD)	ان سامائی سین کریم
Sisomy sulph 0.1% cream 7.5g Rs. 4.80; 15g Rs. 31.63	
ERYACNE (CROSLANDS)	ارائی سین
Erythromycin 4% w/w gel. 20g tube. Rs. 33.50	
FAIRGENOL (FDC)	فیرجی نال
Dichloroxylenol 1.88%, Terpineol 2%; fluid 5 lit. Rs. 196.13	
FRAMYCETIN TULLE (TOUSSEL)	فرامائی سین
Framycetin sulphate 1%, 10 pcs Rs. 76.62	
FUCIBET CREAM (CROSLANDS)	فیوسی بٹ کریم
Fusidic acid 2%, betamethasone (as valerate) 0.1% w/w cream 10g Rs. 45.90	
FUCIDIN CREAM (CROSLANDS)	فیوسی ڈین مرہم
Fusidic acid 2% w/w cream 10g Rs. 44.80	
FUCIDIN OINT (CROSLANDS)	فیوسی ڈین انجٹ منٹ
Sod. fusidate, 2% oint 5g. Rs. 27.18 10g Rs. 44.80	
HEALAN (J & J DECHANE) 110g Rs. 16.00	ہی لین
ITEOL-3 (ASTRA-IDL) 5 litres Rs. 173.91	ایٹائی اول
LEDERMYCIN OINT (LEDERLE)	لیدر مائی سین مرہم
Demeclocyclin hcl 0.5% oint 15g Rs. 3.29	
MERIGENTA CREAM (MERCURY)	میری جنتا کریم
Gentamicin (as Sulphate) 0.1% w/w 15g Rs. 7.90, 75g Rs. 36.00	
MICRODINE OINT (MICRO LABS)	مائی کروڈین
Povidone iodine 5% w/w ointment 20g Rs. 15.80	
NEBASULF OINT (PFIAER) oint 15g Rs. 15.07	نیباسلف مرہم
NEBASULF SPRINKLING POWDER (PFIAER) 10g Rs. 12.71	نیباسلف پوڈر
NEOSPORIN OINT (SURROUGHS WELLCOME)	نیوسپورین مرہم
20g. Rs. 18.41	
PIODIN (BIDDLE SAWYER) 120ml. Rs. 23.80	پیوڈین
SILVEREX CREAM (CROSLANDS) 250g Rs. 125	سلور ایکس کریم پوڈر
SOFRADEX CREAM (ROUSSEL) 25g. Rs. 26	سوفراڈیکس
SOFRAMYCIN SKIN CREAM (ROUSSEL)	سوفرامائی سین سکن
20g Rs. 12.09 120g. Rs. 48.83	

TERRAMYCIN SKIN OINT (PFIZER) 15g Rs 8 07 ٹیرامائی سین اسکن
WOKADINE (WOCKHARDT) ووکاڈین
WOKADINE POWDER (WOCHARDRT) ووکاڈین پوڈر

MUPIROCIN

موپیرو سین

افعال و منافع: یہ ایک زبردست دافع انفکشن دوا ہے، مچھالے پڑنا ایگزیم، چوٹ کا زخم کیڑے
 مکوڑوں کا کاٹنا اور جلنے کٹنے کے زخموں میں مفید ہے۔

احتیاط: آنکھوں سے بچائیں اگر ری ایکشن ہو تو دوا بند کر دیں، طویل عرصہ تک استعمال نہ کریں۔

تجارتی مرکب

BACTROBAN (SMITHKLINE) 5g tube, Rs. 58 30 بیکٹروبان

ANTI FUNGAL

دافع فنگس بیرونی دوائیں

افعال و منافع: فنگس سے پیدا ہونے والے امراض، کھجلی سر میں جو نہیں پڑنا پھنسی دانے نکلتا،
 واد ایگزیم کنڈیڈ انفکشن مہل کی پھنسیاں و کھجلی مقعد اور شرمگاہ کی کھجلی، الرجی کیڑوں مکوڑوں کے
 کاٹنے سے ہونے والی سوزش میں مفید ہیں۔

مقدار و ترکیب: متاثرہ مقام کو صاف کر کے دن میں ۲ بار لگائیں۔

متقی افعال: متورم اور کھلے زخم پر، مرہم نہ لگائیں بلکہ خشک پوڈر استعمال کریں۔

احتیاط: ان مرکبات سے آنکھوں کو بچائیں کیما کیما زول کے مرکبات کو زیادہ عرصہ استعمال نہ کریں
 ورم جگر کا خطرہ رہتا ہے۔

تجارتی مرکبات

ABZORB DUSTING POWDER (CROSLANDS)

ایزابرپ پوڈر

Clotrimazole 1% w/w powder 75g Rs.24 30

BATRAFEN CREAM (HOECHST)

بٹرافین کریم

Ciclopiroxolamine 10mg/ gram 15g tube Rs 25.50

BATRAFEN SOLN	(HOECHST)	برافین لوشن
Ciclopiroxolamine 10mg per ml soln. 20ml bottle		
BENZOCENOL EMULSION	(CARMINOL)	بزدی تال
BETAMIL	(MERCK) 10g. Rs. 17.89	پائل مرہم
CANDID	(GLENMARK)	کنڈیڈ مرہم
Clotrimazole 1% w/w cream. 15g. Rs. 14.64		
CANDID LOTION	(GLENMARK)	کنڈیڈ لوشن
Clotrimazole 1% v/v: lotion 15ml. Rs. 15.95		
CANDID POWDER	(GLENMARK)	کنڈیڈ پوڈر
Clotrimazole 1% w/w: powder 30g: Rs. 13.96 100g. Rs. 29.09		
CANDIDERMA	(GLENMARK) 15g: Rs. 22.90	کنڈیڈرما
CANDISTAT	(MERCK)	کنڈیڈ سٹیٹ
Miconazole nitrate 2% w/w cream. 15g: Rs. 12.60		
CANESTEN	(BAYER)	کے نس ٹین مرہم
Clonazole 10mg, per gm cream. 15g: Rs. 21.95		
CLOBEN	(INDOCO) 15g: Rs. 19	کلو بین
CLOBEQUAD	(SWIFT) Tube: Rs. 29.95	کلو بی کواڈ
CLOBETAMIL-H	(MERCK) 10g. Rs. 21.47	کلو بیتائل
CLOMYCIN CREAM	(NEO PHARMA) 10g. Rs. 12.50	کلو میکسین
CORTILATE	(MICRO LABS)	کورٹیلےٹ
CROTORAX	(S G PMCLS) 60g. Rs. 14.43	کروٹوریکس
CTM CREAM	(BDH)	سی ٹی ایم کریم
Clotrimazole 1% cream. 15g. Rs. 12.08		
CTM LOTION	(BDH)	سی ٹی ایم لوشن
Clotrimazole 1% lotion: 15ml: Rs. 13.23		
DAKTACORT GEL	(ETHNOR) 5mg, Rs. 19.60	ڈاکٹاکارٹ جیل
DAKTARIN	(ETHNOR)	ڈاکٹارین
Miconazole nitrate 2% w/w gel 20g: Rs. 26.30		
ELDERM CREAM	(ELDER) 10g: Rs. 13.50	ایلم ڈرم
FLUCREME-NM	(CONCEPT) 10g: Rs. 23.90	فلو کریم
FUMIN	(RECON)	فومین

FUNGITOP GEL	(MICRO LABS)	فنگی ٹاپ جیل
Miconazole nitrate 2% w/w topical gel 15g	Rs 18 10	
GENTALENE-CREAM	(CROSLANDS) 10g	جنٹالین سی کریم
LOTRIDERM	(ZYG PHARMA) 10g,	لوٹریڈرم
MICOGEL	(CIPLA)	مائی کو جیل
Miconazole nitrate 2% cream 15g	Rs 12 54	
MICOLON	(ETHNOR) 15g,	مائی کولون
MILLICORTEN-VIOFORM	(H CIBAGEIGY)	ٹی کارٹن وائیو فارم
15g	Rs 6 22	
MIZOLE CREAM	(EUPHORIC)	مائی زول کریم
Miconazole 2% cream	Price N/A	
MULTIFUNGIN	(BOEHRINGER) 30g	ملٹی فن گن کریم
MYCOCID	(CHEMOPHARMA)	مائی کو سڈ
Clotrimazole 1% cream 15g	Rs 7 95	
MYCODERM	(FDC) 100g,	مائی کوڈرم پوڈر
MYCOSTATIN OINT	(SARABHAI)	مائی کو سٹائن سرہم
Nystatin 100,000u, per g oint 10g,	Rs 16 60	
NIFUGAL OINT	(BIDDLE SAWYER)	نی فزگل
Clotrimazole 1% oint 15g tube	Rs 15 60	
NIZRAL	(ETHNOR)	نیزرال ٹیلیٹ
Ketoconazole 200mg tabs 10,	Rs 139 50	
OLAMIN	(MICRO LABS)	ولا مین
PENTADERM CREAM	(MERCURY) 5mg	پنٹاڈرم
PRAGMATAR	(SMITHKLINE) 15g	پریگمٹار
SIGMADERM	(SIGMA LABS) 5g tube	سگماڈرم
SIGMAZOL CREAM	(SIGMA LABS) 10g tube	سگما زول کریم
SILODERM C CREAM	(NEO PHARMA)	سیلوڈرم
Clotrimazole 1% w/w cream, 15g tube	Rs. 14.90	
SINUM V	(DEE PHARMA)	سی نیم وی
Clotrimazole 100mg vaginal tabs 6	Rs 18 72	
SINUM CREAM	(DEE PHARMA)	سی نیم کریم
Clotrimazole 1% w/w cream 15g tube:	Rs 12 80	

SKINMENT (J & J DECHANE)	80g Rs. 42.00	اسکن منٹ
SOFRADEX-F (ROUSSEL)	15g tube; Rs. 16 68	سوفرا ڈیکس
STATUM (CROSLANDS)		اسٹیم کریم
Clotrimazole 1% w/w; oint 20g; Rs. 26.50		
STATUM DUSTING POWDER (CROSLANDS)		اسٹیم پوڈر
Clotrimazole 1% w/w; powder 30g; Rs. 12 00 100g; Rs. 17 00		
SURFAZ (FRANCO-INDIAN)		سرفاز لوشن
Clotrimazole 1% w/v, soln 15ml. Rs 13.77		
SURFAZ DUSTING POWDER (FRANCO-INDIAN)		سرفاز ڈسٹنگ پوڈر
Powder 30g Rs. 12 22		
SURFAZ-SN-CREAM (FRANCO-INDIAN)	7 5g. Rs 13 76	سرفاز کریم
TINADERM (FULFORD)		ٹیناڈرم لوشن
Tolnaftate 10mg, per ml soln 10ml Rs 17 00		
TINADERM CRÉAM (FULFORD)		ٹیناڈرم کریم
Tolnaftate 10mg per g cream 5g Rs 10 00		
TRIBEN CREAM (JENBURKT)		ٹریبن بن کریم
Clotrimazole 1% w/w cream 20g Rs 15 95		
TRIBEN DUSTING POWDER (JENBURKT)		ٹریبن بن پوڈر
Clotrimazole 1% w/w dusting powder 60g Rs 24 95		
TRIBEN LOTION (JENBURKT)		ٹریبن بن لوشن
Clotrimazole 1% w/v lotion 30ml Rs 32 00		
ZOACIDE-V (TATA PHARMA)	20mg 8 Rs 26 50	زوہا سائیڈ وی
ZOLE (GUFIC)	15ml Rs. 15 80	زول لوشن
ZOLE DUSTING POWDER (GUFIC)	15g Rs 14 10	زول پوڈر
ZOLE-F (GUFIC)	15ml. Rs. 19 00	زول کریم

In fungal
infection of
skin & nail

FUNGIZOLE
(Fluconazole)



BENZYL BENZOATE

بنزائل بنزوئیٹ

افعال و منافع: ہر طرح کی کھجلی اور جوئیں کے لئے مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: گرم پانی سے نہا کر جسم کو خشک کر کے پورے جسم پر اس کی مالش کریں ۴ دن بعد دوبارہ اسی طرح لگائیں بالوں کی جوؤں کے لئے بالوں میں اچھی طرح شام کو لگا کر سر پر کپڑا باندھ لیں صبح کو دھو ڈالیں۔

احتیاط: دو آگردن سے نیچے لگائیں آنکھوں کو دوا سے بچائیں۔

تجارتی مرکبات

ASCABIOL (RHONE-POULENC) 125ml Rs 19 32 اسکے پیال لوشن

BENZO SCAB (UNILODS) 25g Rs 2 75 بنزو اسکیب مرہم

GAMMA BENZENE HEXA CHLORIDE گاما بنزین ہکسا کلورائیڈ

افعال و منافع: یہ ایک زبردست سریع الاثر دافع پیراسائیٹ دوا ہے جو بیرونی طفیلی کیڑوں، کھجلی کے کیڑوں بالوں میں پیدا ہونے والے طفیلی کیڑوں جوؤں کو ختم کر دیتی ہے۔

مقدار و ترکیب: کھجلی میں نہانے کے بعد پورے جسم پر مالش کی جائے ۲۴ گھنٹہ بعد نہایا جائے جوؤں اور طفیلی کیڑوں کے لئے بالوں میں اچھی طرح دوا لگا کر ۲۴ گھنٹہ بعد نہائیں احتیاط: آنکھوں کو دوا سے محفوظ رکھیں

تجارتی مرکبات

GAB (FUFIC) 40g: Rs. 5.80

SCABEX (INDOCO) 100ml: Rs. 18 00

SCABEX-SCREAM (INDOCO) 20g: Rs.9.00

SCABINE LOTION/CREAM (STADMED) 15g Rs 8 50

SCABOMA (GLENMARK) 450ml: Rs.27.78

SCABOMA CREAM (GLENMARK) 25g, Rs. 6.40

کسیب اسکے پیس اسکے ٹکس ایس کریم اسکے بن لوشن کریم اسکے بوم اسکے بوم کریم

PERMETHRIN

پر می تھرین

افعال و منافع: کھجلی اور سر کی جوڑن کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: سر سے پیر تک اچھی طرح دوا کی مالش کی جائے ۱۲ گھنٹہ بعد نہانا چاہیے عموماً ایک بار دوا کا استعمال کافی ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

PERLICE CREAM RINSE (CROSLANDS) 60g Rs 56 60 پرالٹس کریم
PERMITE CREAM (CROSLANDS) 30g Rs 40 00 پرمانٹ کریم
SCALTIX (CROSLANDS) 60g bottle Rs. 56 00 اسکاٹکس

ANTI SEBORRHOIC

انگیزیا اور بفا کی دوائیں

افعال و منافع: درج ذیل ادویہ، انگیزیا، چھاجن، خشک و تراگیزیا مقعد اور مہیل کی کھجلی جلد پر سرخ دھبے، الرجی، مہاسے سر میں بھوس جلد کی مرطوب پھنسیاں دوا ہالوں کے امراض وغیرہ میں مفید ہیں۔

احتیاط: طویل علاج سے پرہیز، آکھ کنج ران اور متورم مقام پر نہ لگائیں دوران علاج غذا کم کاربوہائیڈریٹ والی استعمال کریں۔

تجارتی مرکبات

DERMOQUINOL (EAST INDIA) 170g Rs 25 96 ڈرمو کینول
ELOCON OINT (FULFORD) ایلو کون مرہم
Mometasone furoate 0.1% w/w oint Price N/A
ESKAMEL OINT (SMITHKLINE) 25g Rs. 18 70 اسکامل
KARPIN LOTION (DEYS) Rs. 16 00 کارپن
PRAGMATAR OINT (SMITHKLINE) 25g Rs. 12 00 پراگما تار مرہم
SELSUN SUSP (ABBOT) سلسن سوشن
Selenium sulphide 2.5% w/v; susp. 60ml Rs. 27 50; 120ml, Rs 46 22

ACYCLOVIR

اسانکلوویر

افعال و منافع: یہ دوا جلد کے اچھ ایس وی انفکشن تاسلی اعضاء پوٹوں کے کنارے چہرے اور سینہ پر ہونے والے ہر پیز انفکشن میں بہت مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: دن میں ۵ بار ۴ گھنٹہ کے وقفہ سے ۵ دن تک لگائیں۔

مضر اثرات: وقتی طور سے چہن کا احساس جلد پر داغ و خشکی ہونا۔

احتیاط: آنکھوں میں یہ دوا نہیں لگنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

CYCLOVIR CREAM (CADILA)

سانکلوویر کریم

Acyclovir 5% w/w cream 5g, Rs 35 00

HERPEX CREAM (TORRENT)

ہر پکس کریم

Acyclovir 5% w/w cream 5g, Rs 53 55

HERPERAX OINT (MICRO LABS)

ہر پراکس مرہم

Acyclovir 3% w/w oint 5g Rs. 50 70

LACTIC ACID

لیکٹک ایسڈ

PODOPHYLLINE

پوڈوفائی لین

SALICYLIC ACID

سلیسیلک ایسڈ

افعال و منافع: یہ دوائیں چہرے کے تلوؤں اور دوسرے مقامات پر ہونے والے گنے (کارن) جلد کی سخت گانٹھ، مزمن دوا میں مفید ہیں۔

احتیاط: کھلے زخموں میں استعمال نہ کریں۔

COTARYL (FDC) cream 50g Rs 24 90

کونارل

DEBORIN SKIN (GLAXO ALLENBURYS) 25g Rs 16 07

ڈی بورن

KERALIN (EAST INDIA) 10g Rs. 8 46

کیرالین

ALLANTOIN

الن ٹائسن

افعال و منافع: انفکھن کو دور کرنے زخموں کو جلد مندمل کرنے پھتانوں کے پھٹنے میں مفید و موثر ہے۔

تجارتی مرکب

MASSE CREAM (ETHNOR) tube of 20g Rs. 37 75 مے کریم

BENZYL NICO TINATE

بنزائل نیکوٹینیٹ

افعال و منافع: تنج سطح، بالوں کا گرنا، بالوں کے تمام امراض میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: متاثرہ مقام پر دن میں اہار پھر ہفتہ میں ۲-۳ بار

احتیاط: دوا لگانے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کریں ابتدا میں کمزور بال زیادہ گر سکتے ہیں علاج جاری رکھنے پر پورا فائدہ ہوتا ہے۔

تجارتی مرکب

K-5 HAIR TINCTURE (GERMAN REMEDIES) کے ۵-ہیزلوشن
Benzyl nicotinate 100ml: Rs.67 29

HEPARIN

ہپارین

افعال و منافع: رگوں میں ر کے خون کو تحلیل کرنے جلد کی خلی اور تناؤ کو دور کرنے خون کا تھکے یا گانٹھ بننے حادثات کھیلوں میں بند چوٹ لگنے سردی کے سبب پیروں اور انگلیوں کے ورم و درد میں مفید ہے۔

احتیاط: دوا لگا کر زیادہ زور سے مالش نہ کریں کھلے زخموں پر نہ لگائیں۔

BEPARIN (BIOLOGICAL E) 15g Rs. 6 25

THROMBOPHOB (GERMAN REMEDIES) 20g: Rs 19 20 ہپارین
تھرومبوفوب



MALATHION

میلا تھیان

افعال و منافع: سر کے بالوں زیر ناف بغل اور جسم کے دوسرے اعضاء کی کی جوڑوں وغیرہ کو ختم کرنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: متاثرہ مقام پر اچھی طرح لگا کر کم از کم ۲ گھنٹہ بعد صابن یا شیمپو سے دھو ڈالیں عموماً ایک بار لگانا کافی ہوتا ہے ضرورت ہو تو ہفتہ بعد لگائیں

تجارتی مرکب

CYBAN

سائی بان

MINOXIDIL

مناکسی ڈل

افعال و منافع: یہ دو بالوں کی جڑوں میں خون کی رسد بڑھا کر بالوں کے غدود میں تحریک پیدا کر کے بالوں کی افزائش میں مدد دیتا ہے مردانہ ہارمون کی خرابی سے ہونے والے تنج میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: متاثرہ مقام کو اچھی طرح صاف کر کے تنج کے مقام پر اسپرے کریں ۱۲ گھنٹہ بعد ۱۱ بار لگائیں۔

مضر اثرات: سوزش سرخی اور ری ایکشن ہو سکتا ہے

احتیاط: ۱۸ سال سے کم عمر والوں کو، حساس افراد کو استعمال نہ کرائیں

تجارتی مرکبات

GROMANE	(ALIDAC)	50ml: Rs. 150.00
HAIREX	(KOPRAN)	60ml. Rs. 201.25
HEBALD	(INTAS)	10ml. Rs 42 10
MINTOP	(STANGEN)	60ml. Rs. 138.15
MULTIGAIN	(TORRENT)	60ml: Rs 163.25

گرومین
ہیریکس
ہے بالڈ
مینٹاٹپ
ملٹی گین

MUCOPOLY سکارائیڈ پالی سلفیٹ SACCHARIDE POLY SULFATE

افعال و منافع: موج چوٹ کے سبب خون رگوں میں رک جانا خون کا تھک بن جانا اور یروں میں خون
جنے رگیں پھولنے کا نٹھوں کو نرم کرنے اور پھلانے میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: متاثرہ مقام پر دو الگا کر زوردار مالش کریں یا ڈرینگ کر دیں۔
احتیاط: آنکھوں اور کھلے زخموں جریان خون کی جگہ پر نہ لگائیں۔

تجارتی مرکب:

HIRUDOID (CFL) 5g Rs. 15 50, 14g Rs. 32 00

ہیروڈائیڈ

AMMOIDINE

امو آئی ڈین

افعال و منافع: برص سرخ و سفید داغ کے لئے مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۳۰ کلو گرام وزن کے مریض کو ۱ گولی ۳۰ سے ۵۰ کلو تک ۲ گولی ۵۰ سے ۶۵ کلو
۳ گولی ۶۰ سے ۸۰ کلو ۴ گولی یومیہ مرہم یا لوشن داغوں پر لگائیں۔
متقی افعال: یرقان حمل اور چھوٹے بچوں کو نہ دی جائے
مضر اثرات: متلی، نیند کی کمی، ڈپریشن کھلی چکر در در معمولی جج ہو سکتا ہے۔
احتیاط: آنکھوں، ہونٹوں اور تناسلی اعضا پر نہ لگائیں۔

تجارتی مرکبات

MELANOCYL (FRANCO-INDIAN) 200: Rs. 179 20

میلانوکائل مبلٹ

MELANOCYL OINTMENT (FRANCO-INDIAN)

میلانوکائل مرہم

25g Rs. 20.80

MELANOCYL SOLUTION (FRANCO-INDIAN)

میلانوکائل لوشن

25ml: Rs. 23.85

CALCI POTRIOL

کیلسی پوٹریول

افعال و منافع: سرخ و سفید دماغ پڑنا، برص کے مرض میں مفید ہے۔
 منفی افعال: حساس مریضوں، حمل رضاعت کے دوران اور بچوں کو استعمال نہ کرائیں۔
 احتیاط: استعمال کے بعد ہاتھوں کو صاف کریں چہرے پر نہ لگائیں

تجارتی مرکب

ڈیوونیکس (CROSLANDS) Calcipotriol 50mg/g. oint 30g

METHOXALEN

میٹھا کسالیین

افعال و منافع: برص اور سفید داغوں میں مفید ہے۔
 مقدار و خوراک: 0.7 ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے۔
 منفی افعال: یہ تان میں صل میں اور چھوٹے بچوں کو نہ دی جائے۔
 مضر اثرات: متلی، نیند کی کمی، بڑپریش، کھلی، چھالے پڑنا، تھج چکر در دسر۔
 احتیاط: آنکھوں، ہونٹوں پلوں اور تاسل اعضاء پر نہ لگائیں۔

تجارتی مرکبات

MACSORALEN

(MAC)

میک سورالین ٹبلٹ

Methoxsalen 10mg tabs. 10 Rs 8.71

MACSORALEN LOTION

(MAC)

میک سورالین لوشن

پیرا امینو بنزوئک ایسڈ

افعال و منافع: برص سفید داغوں کے علاج سورج کی تیز شعاعوں اور گرمی سے حفاظت کے لئے اس کا استعمال مفید ہے۔

تجارتی مرکبات

MELALITE

(NICHOLAS)

50g: Rs 40.82

میلا لائٹ کریم

PARAMINOL CREAM (FRANCO-INDIAN) 25g: Rs. 12.80

پیرامینول

PSORALEN

سورالین

افعال و منافع: برص سفید داغوں اور سرخ داغوں کے لئے مفید ہے۔
 مقدار و ترکیب: ۷۰۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے روزانہ۔
 منفی افعال: روشنی سے حساس مریضوں کو جلد پر چھالے اور غدو جگر کی خرابی میں استعمال نہ کرائیں۔
 مضر اثرات: سر بھاری، متلی بے چینی، ڈپریشن کی علامات ہو سکتی ہے۔

تجارتی مرکبات

MANADERM (GEOFFREY) 40 tabs Rs. 28.50 میناڈرم ٹبلٹ
 MANADERM OINT (GEOFFREY) میناڈرم مرہم
 Psoralen 10mg per gram 30g Rs. 29.50

TRIMETHYL PSORALEN

ٹرائی میتھائل سورالین

TRIOX SALEN

ٹرائی اوکسالیٹ

افعال و منافع: برص، جلد کی رنگت تبدیل ہونے اور سفید داغ میں مفید ہے۔
 منفی افعال: خون کی خرابی آتھک، وجہ نام دالے سفید داغ اور حمل کی حالت میں استعمال نہ کرائیں۔
 مضر اثرات: زیادہ مقدار اور تیز دھوپ میں رہنے سے چھالے پڑ سکتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

NEOSORALEN (MAC) نیوسورالین
 Trimethyl psoralen 5mg tabs 10 tablets Rs. 12.01
 NEOSORALEN FORTE (MAC) نیوسورالین فورٹ
 Trimethyl psoralen 25mg dragees 8, Rs. 40.60
 NEOSORALEN LOTION (MAC) نیوسورالین لوشن
 Trioxalen 0.2% w/v Rs. 17.60

BENZYDAMINE HCL

بنزائی ڈامین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: چوٹ، سوج کسر و خلیج کا درد عضلات اعصاب اور رباطات میں درد و روم میں مفید ہے

تجارتی مرکب

TANTUM CREAM

(ELDER)

ٹن ٹم کریم

Benzydamine hcl 5% w/w cream 20g: Rs. 26.95

MENTHOL

منتھال

MEPHENSEN

می فن سین

METHYL NICOTINATE

میٹھائل نیکوٹی نیٹ

METHYL SALICYLATE

میٹھائل سیلی سیلیٹ

یہ ادویہ مسکن درد، مرئی عضلات اور محرک تاثیر رکھتی ہیں عضلات و مفاصل کے درد موج
چوٹ، اعصاب کی خلی تشنج میں مفید ہیں۔

احتیاط: زیادہ دوز سے مالش یا مرگڑنا نہیں چاہیے۔

تجارتی مرکبات

ARJET SPRAY

(CADILA) 50ml Rs. 27.79

ارجٹ سپری

CAPSIDOL

(CROSLANDS) gel 30g. Rs. 30.00

کیپ سیڈول

ETHNORUB

(ETHNOR) 20g: Rs. 19.50

ای ٹھنی ٹورب

FLAMAR CREAM

(INDOCO) 20g: Rs. 11.90

فلے مار کریم

KILPANE CREAM

(BIDDLES AWYER) 30g Rs. 26.85

کل پن کریم

MEDICREME

(RALLIS) 30g: Rs. 17.45

میڈی کریم

MUSLAX CREAM

(BIOLOGICAL E.) 15g. Rs. 12.75

مس لیکس کریم

MYOLAXIN OINT

(GENO) 30g. Rs. 26.48

مایو لاکسن مرہم

NEUROPHEN CREAM

(SWIFT) 30g. Rs. 23.42

نیورو فین کریم

RELAXYL

(FRANCO-INDIAN)

ری لکسائل

Mephenesin 10% Methyl nicotinate 1% capsicum oleoresin 0.05%
oint 30g: Rs. 16.25

جلد کو ملائم رکھنے اور تسکین دینے والے مرکبات

SOOTHING AGENT

درج ذیل مرکبات، گرمی والوں کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے پتی اچھلنے کھجلی جلد کا متورم ہونا، ایگزیمیا کی سوزش و بے چینی میں تسکین پہنچاتے اور جلد کو ملائم رکھتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

CALAMINE LOTION

کیلا من لوشن

CALADRY LOTION (PARKE DAVIS) 171ml Rs. 29.40

کیلا ڈرل لوشن

CALADRY CREAM (PARKE DAVIS) 14g Rs. 2.92

کیلا ڈرل کریم

GESICAIN OINT (S G PMCLS) 35g Rs. 11.82

گیسی کین مرہم

RASH-FREE (ABBOTT)

ریش فری

Benzalkonium chlor 0.1% zincozide 8 5% cream 15g Rs. 14.37

SILODERM

(NEO PHARMA) 100g Rs 67.14

سلوڈرم

STEROIDS

اسٹیرائیڈ والے بیرونی مرکبات

BECLOMETHASONE

بیکلو میتھاسون ڈی پروپی نیٹ

DIPROPIONATE

افعال و منافع: ایگزیمیا، مچا جن جلد پر سرخ داغ جلد کا متورم ہونا جلد پر پھنسیاں فرج و مقعد کی کھجلی میں مفید ہے۔

منفی افعال: آنکھوں میں لورٹی بی کی وجہ سے ہونے والی جلد کی تکلیف میں استعمال نہ کرائیں۔

تجارتی مرکبات

BAYCORT

(BAYER)

10g: Rs 18.00

بے کورٹ

BEC-FORTE CREAM (REMEDIES INDIA) 10g: Rs. 14.55

بیک فورٹ کریم

BECLATE

(CIPLA)

15g: Rs. 13.26

بیک لیٹ

BECLOTRIM	(BDH)	15g: Rs. 21.90	بیک لوٹریم
BECMET	(SWIFT)	15g: 12.56	بیک میٹ
BECMET-N	(SWIFT)	15g: 14.92	بیک میٹ این
BEC-NM CREAM	(REMEDIES)	10g Rs. 17.50	بیک این ایم کریم
BESTOPIC	(SYSTOPIC)	10g: Rs. 19.80	بس ٹوپک
DERMICORT	(RECON)	15g: tube; Price N/A	ڈرمی کورٹ
ECLOSPAN	(TATA PHARMA)	15g. Rs. 27.50	ایک لو اسپان
ECODAX-G	(UNIQUE)	10g Rs. 15.91	ایکوڈیکس
ZIDERM-S	(GLENMARK)	15g Rs 19 20	زی ڈرم ایس
ZOVATE	(GLAXO ALENBURYS)		زوویٹ

Beciomethasone dipropionate 0.025% w/w oint 15g Rs.15 45

BETAMETHASON DIPRO PIONATE

بٹامیتھاسون ڈیپرو پوائیٹ

افعال و منافع: جلد کا ورم چھاجن ایگزیم میں مفید ہے
مستفی افعال: ٹی بی سے متاثرہ افراد میں وائرل، جراثیمی انفکشن میں اس کا استعمال مناسب نہیں

تجارتی مرکبات

BETAGEL	(MICROLABS)	15g: Rs 18 00	بٹا جیل
BETAMIL	(MERCK)	10g. Rs. 17.89	بٹا مل
BETAMIL GM	(MERCK)	10g Rs. 24 25	بٹا مل جی ایم
BETATOPIC	(SYSTOPIC)	10g Rs 23.00	بٹا ٹوپک
BETATOPIC CREAM	(SYSTOPIC)	10g. Rs.24 60	بٹا ٹوپک کریم
DIPFORM	(ZYG PHARMA)	10g Rs. 36.90	ڈپ فارم
DIPGENTA	(ZYG PHARMA)	10g Rs. 29.62	ڈپ جنتا
DIPLNE	(ZYG PHARMA)	10g Rs. 28 87	ڈپ لین
DIPROVATE	(CROSLANDS)	10g: Rs.19.50	ڈپ پروویٹ
DIPROVATE-MF	(CROSLANDS)	10g Rs 34.00	ڈپ پروویٹ ایم ایف
DIPSALIC LOTION	(ZYG PHARMA)	10ml: Rs.32.65	ڈپ سالک لوشن
GENTALENE-C CREAM	(CROSLANDS)	10g: Rs.30	جنتا لین کریم
GENTOPIC	(SYSTOPIC)	10g:Rs.23.90	جن ٹوپک

BETAMETHASONE VALERATE پٹامیتھاسون ولیریٹ

افعال و منافع: ایگزیمیا جلد پر سرخ متورم دانے، ہیرونی کان کی سوزش و دانے مقعد و فرج کی کھجلی میں مفید ہے

منفی اثرات: وائرل، فنگل، ٹی بی، اسٹک کے اثرات میں ۱ سال سے کم عمر بچوں کی متورم جلد میں نہ لگائیں۔

احتیاط: کارٹی سون کے مرکبات جراثیمی انفکشن میں تنہا استعمال نہ کریں جب تک اس مرض کی اصولی دوا ساتھ میں نہ دی جائے۔

تجارتی مرکبات

BETNOVATE-N (GLAXO) 15g Rs. 12.05 بنوویٹ این

BETNO VATE SCALP APPLICATION (GLAXO) بنوویٹ اسکالپ لوشن

20ml Rs. 15 44

QUADRIDERM (ZYG PHARMA) 25g, Rs 34 .15 کوڈرے ڈرم

TOLBET CREAM (CFL) 5g Rs. 14.90 ٹال بٹ کریم

VALVET CREAM (LUPIN) 25g Rs 28 00 ویل بٹ کریم

VALBET SCALP APPLICATION (LUPIN) ویل بٹ اسکالپ لوشن

20ml, Rs 14 29

CLOBETASOL PROPIONATE کلوبٹاسول پروپیونیت

افعال و منافع: جلد کے خیلے اور مزمن امراض مثلاً چنبل بار بار ہونے والا ایگزیمیا پھنسیاں جلد پر چھالے سفید داغ پڑنا تکلیف دہ کھجلی میں مفید ہے۔

احتیاط: ۱۲ سال سے کم عمر بچوں حاملہ اور وائرل، انفکشن میں استعمال نہ کرائیں انفکشن کی حالت میں خصوصی دوا ساتھ میں چلائیں۔

تجارتی مرکبات

ADIVATE (CROSLANDS) 10g tube: Rs.21 60

CLOBENATE (SWIFT) 15g Rs.24.90

ڈی ویت
کلو بی ویت

CLOBETAMIL (MERC)	10g. Rs 19 61	کلونی ٹیل
CLOBETAVATE (LUPIN)	10g. Rs 24.66	کلونی ٹاویٹ
CLOBITOL (CROSLANS)	10g. Rs 21.05	کلونی ٹال
CLOSTAGEN CREAM (ELDER)	10g. Rs 25 95	کلوس ٹاجن کریم
CUTISTATE-G (MEJDA)	10g Rs 18 33	کیو ٹس میٹ جی
EXEL (GUFIC)	10 mg Rs. 18 90	ایک سل
LOBATE-CM (NICHOLAS)	15g. Rs 13.69	لو بیٹ سی ایم
TENOVATE-G (GLAXO)	10g, Rs 17.14	ٹنو ویٹ جی
TENOVATE-M (GLAXO)		ٹنو ویٹ ایم
Clobetasol propionate 0.05% w/w miconazole nitrate 2% cream 10g.		
Rs 23 86		

TOPIFORT CREAM (FRANCO-INDIAN) ٹاپ فورٹ کریم
10g Rs 111 65

TOPINATE CREAM (SYSTOPIC) 30g Rs 41.00 ٹاپی میٹ کریم

CLOBETASONE BUTYRATE کلو بیٹاسون بیوٹائی ریٹ

افعال و منافع: ایگزیم، جلد کا درم جلد کی پرانی پٹلی تکالیف میں مفید ہے

منفی افعال: جراثیمی انفکس اور وائرس سے پیدا ہونے والی جلدی بیماریوں اور دوا سے الرجک مریضوں میں نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: حمل میں زیادہ عرصہ استعمال سے انفکشن کی حالت میں خصوصی انفکشن کی دوا کے بغیر استعمال نہ کریں۔

تجارتی مرکبات

CLOBEQUAD (SWIFT)	5g. Rs 17.00, 10g. Rs 29.95	کلونی کاڈ
EUMOSONE (GLAXO)	10g Rs. 17 80	یو موسون
EUMOSONE-G (GLAXO)	10g Rs 14.87	یو موسون جی
EUMOSONE-M (GLAXO)	10g Rs 19 77	یو موسون ایم

۱۔ ڈیکسامیٹھاسون سوڈیم فاسفیٹ DEXAMETHASONE
SODIUM PHOSPAHTE

۲۔ ٹرائی میٹھائل ایسی ٹیٹ TRIMETHYL ACETATE

افعال و منافع: چھاجن، ایگزیم اور چنبل میں مفید ہیں
مقدار و ترکیب: دن میں ۲-۳ بار لگائیں دوا لگا کر ڈرینگ کر دیں

تجارتی مرکبات

MILLICORTENOL (H.CIBAGEIGY) 15g: Rs. 10.40 ملی کارٹی نال

MILLICORTEN-VIOFORM (H.CIBAGEIGY) 15g: Rs. 6.22 ملی کاشن والیو فارم

فلوسی ٹولون ایس ٹوٹائیڈ FLUCINOLONE ACETONIDE

افعال و منافع: ایگزیم، مرطوب متورم جلد سینہ اور پشت پر تکلیف دہ دوانے (بجی) میں مفید ہے۔
احتیاط: کارٹی سون کے مرکبات جراثیمی اور فنگس انفکشن کی حالت میں اس مرض کی خصوصی دوا کے
بمراہ استعمال کرنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

CUTI/CUTI-N (EUPHORIC)

EFCINOL PLUS CREAM (JENBURKT)

10g tube. Rs. 21.95

FLUCORT (LYKA) 15g: Rs. 9.47

FLUCORT LOTION (LYKA) 15ml. Rs. 7.95

SUPRICORT (GLENMARK) 15g: Rs. 8.40

FLUOCORTOLONE

کیوٹی۔ کیوٹی این
ایف سی ٹول کریم

فلوکارٹ کریم

فلوکارٹ لوشن

پری کارٹ

فلوکارٹولون

افعال و منافع: تمام جلدی امراض کیڑے مکوڑوں کا کائن، سورج کی گرمی سے ہونے والی تکلیف جلد
کا درم بے چینی میں مفید ہے

منفی اثرات: ٹی بی آتھک اور وائرس سے پیدا ہونے والے امراض چھک خسرہ چکن پاکس میں اس کا استعمال معر ہے

احتیاط: ۴ سال سے کم عمر بچوں حمل کے ابتدائی ۳ ماہ اور انفکشن کی حالت میں انفکشن کی خصوصی دوا کے بغیر اس کا استعمال مناسب نہیں

تجارتی مرکبات

COLSIPAN (GERMAN REMEDIES) 5g: Rs. 19.42 کول سی پان
COLSIPAN-N (GERMAN REMEDIES) 15g: Rs.27.61 کول سی پان این
ULTRAPROCT (GERMAN REMEDIES) 5g:Rs.30.50 الٹرا پروکٹ
ULTRAPROCT SUPPOSITOTIES(GERMAN REMS.) الٹرا پروکٹ سپازٹری
5g:Rs.30.76

FLUCORTOLONE HEXANOATE فلو کورٹولون ہکسانئیٹ

افعال و منافع: ایگزیماء، جلد کے امراض وہ تمام امراض جس میں کارٹی سون کے مرکبات مفید رہتے ہیں موثر و مفید ہے۔

مقدار ترکیب: ابتدا میں دن میں ۳ بار آرام آنے پر دن میں ابار۔
احتیاط: جراثیمی انفکشن میں اس کی خصوصی دوا کے ساتھ دیں، آنکھوں سے بچائیں۔

تجارتی مرکب

ULTRALAN (GERMAN REMEDIES) 5g: Rs.42.46 ال ٹرالان

HYDROCORTISONE ACETATE ہائیڈرو کارٹی سون ایسی ٹیٹ

افعال و منافع: ہر طرح کے ایگزیماء تو خشک جلد کا اور مقلد و فرج کی کھجلی میں مفید و مجرب ہے
احتیاط: وائرل آتھک اور ٹی بی کے انفکشن میں احتیاط برتیں

تجارتی مرکبات

CORTO QUINOL (EAST INDIA) 5g: Rs. 5.94

DAKTACORT GEL (ETHNOR) 5g:Rs. 19.60

کانو کوئال
ڈاکٹاکورٹ جیل

DEROBIN HC
WYCORT

(GLAXO) 3g: Rs 2 11
(WYETH) 5g: Rs. 11.57

ڈیروبین ایچ سی
وائی کورٹ

ٹرائم سی نولون ایسی ٹوٹائیڈ TRIMCINOLONE ACETONIDE

افعال و منافع: جلد کی مختلف تکالیف میں سکون پہنچاتی ہے بطور معائنہ استعمال کی جاتی ہے۔

تجارتی مرکبات

KENACOMB

(SARABHAI) 10g Rs 20.00

کیناکومب مرہم

KENACORT

(SARABHAI) 10g Rs 15 00

کیناکورٹ ٹیبلٹ

KINALOG-S SKIN

(SARABHAI) 10g Rs 18 00

کینالوگ مرہم

LEDERCORT

(LEDERLE) 15g Rs 11 30

لیڈر کورٹ مرہم

جرثومہ H. Pylori زخم معدہ کاشافی علاج

علاقہ ۱	لوی پرائیڈول ۲۰۰ ملی گرام ۲ بار	کلار تھرومامی سین ۵۰۰ ملی گرام ۲ بار	ایسوسی سلین آکریم ۲ بار	مدت علاج ۷ دن	فائدہ ۹۶-۹۷ فیصد
علاقہ ۲	لوی پرائیڈول ۲۰۰ ملی گرام ۲ بار	کلار تھرومامی سین ۵۰۰ ملی گرام ۲ بار	میٹری ٹائیڈ پرائیڈول ۳۰۰ ملی گرام ۲ بار	مدت علاج ۷ دن	فائدہ ۹۱-۹۵ فیصد
علاقہ ۳	لوی پرائیڈول ۲۰۰ ملی گرام ۲ بار	کلار تھرومامی سین ۲۵۰ ملی گرام ۲ بار	فناڈول ۵۰۰ ملی گرام ۲ بار	مدت ۷ دن	فائدہ ۸۸-۹۳ فیصد
علاقہ ۴	ریٹینی ڈین ۳۰۰ ملی گرام سوتے وقت	ایسوسی سلین ۵۰۰ ملی گرام ۳ بار	میٹری ٹائیڈ پرائیڈول ۳۰۰ ملی گرام ۳ بار	مدت ۳ دن پھر صرف ۳ دن ریٹینی ڈین ۳۰۰ ملی گرام سوتے وقت	فائدہ ۸۹-۹۴ فیصد

ایورویدک کی مرکب دوائیں

نظام ہضم کی ادویہ

ALIMENTRY SYSTEM

ICIDINOL Banlab Co.

آئی سی ڈی نال

افعال و منافع: معدہ کی جلن، تیزابیت، بد ہضمی، ورم معدہ میں مفید ہے۔
مقدار و ترکیب: ۲ گولی دن میں ۳-۴ بار کھانے کے ساتھ۔
قیمت: 1000 گولی 243.00 روپے۔

ALSAREX Charak Co

السا ریکس

افعال و منافع: زخم معدہ اور تیزابیت کے لئے مفید ہے۔
مقدار: ۲ گولی دن میں ۳-۴ بار کھانے کے ساتھ ۴ سے ۶ ماہ استعمال کرائیں۔
قیمت: 100 گولی 42.00 روپے

AMAL JEER SYRUP Dee Pharma

امل جیر سرپ

افعال: مستثنی ہاضم طعام اور بھوک میں اضافہ کرنے والا شربت ہے۔
مقدار: ۱ چمچ دن میں ۳ بار۔
قیمت: 200 ملی لیٹر 28.00 روپے

ANAZYME Neo Pharma

انازائم

افعال: بد ہضمی، نفخ شکم، بھوک کی کمی، جگر اور پانکراس کی کمزوری درد شکم میں مفید ہے۔
مقدار: ۵ سے ۱۰ ملی لیٹر کھانے سے اگشتہ پہلے قیمت: 100 ملی لیٹر 16.00 روپے

ARSHONIT Charak

ارشونٹ

افعال: بواسیر خونی ہو یا ہادی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار ۱۰ دن تک پھر ۱ گولی دن میں ۳ بار ۶ ہفتہ تک۔

قیمت: 100 گولی 25.25 روپے فورٹ والی 100 گولی 28.00 روپے۔

ARSOL Ban lab

ارسول

افعال: متورم اور تکلیف دہ بواسیر کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳-۴ بار بچوں کو نصف خوراک۔

قیمت: 200 گولی 34.20 روپے۔

BIO SAL J.&J Dechane

بایوسال

افعال: بچوں کے درد شکم، پیٹ پھولنا، نیند نہ آنا معدہ میں۔ تیزابیت اور دستوں میں مفید ہے۔

مقدار: نومولود کو ۱ چمچ ۶ ماہ تک ۱ چمچ ۲ سال کے بچوں کو ۱ سے ۲ چمچ دن میں ۳ بار

قیمت: 100 ملی لیٹر 7.50 روپے

COLI CARMIN Ban lab

کولی کارمین

افعال: دست، اسہال، پیٹ پھولنا گیس بننے میں مفید ہے۔

مقدار: ۳ سے ۶ ماہ تک ۲ سے ۳ سال تک ۴ سے ۶ بو ند ۵ سال تک ۱۰ بو ند دی جائے۔

قیمت: 30 ملی لیٹر ڈراپس 17.50 روپے

CONSTILAX Gamber

کانسٹی لیکس

افعال: آنٹوں کے افعال کی سستی، بھوک کی کمی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۳ گولی سوتے وقت کھلائیں۔ قیمت: 50 گولی 10.00 روپے۔

578

DIAREX Himaiya drug ڈایا ریکس

افعال: دستوں (اسہال) میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳ بار کھلائیں۔ قیمت: 100 گولی 22.00 روپے

DIASYN J&J.Dechane ڈایا سین

افعال: امیائی اور ڈیسلری پیچش، دستوں خصوصاً بچوں میں بہت مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی ہر ۴ گھنٹہ بعد بچوں کو آدمی سے ۱ گولی۔ قیمت: 100 گولی 17.50 روپے۔

DIGEST Synthochem ڈائی جیسٹ

افعال: بھوک کی کمی، بد ہضمی، نفخ شکم، ہضم کی کمی میں مفید ہے۔

مقدار: باغیے کے لئے ۲ چمچے دن میں ۳ بار کھانے کے بعد بھوک کے لئے ۲ چمچے کھانے سے پہلے۔

قیمت: 110 لٹر 18.75 روپے۔

DYGEAID Themis Pharma ceuticals ڈائی گید

افعال: بد ہضمی، بھوک کی کمی کو دور کرتی ہے ہضم میں مدد دیتی ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار شربت ۱ سے ۲ چمچے دن میں ۳ بار

ENTRODARIN Ban lab انٹرو ڈارن

افعال: دست پیچش، پرانی یا وقت (حادیاض من) میں مفید ہے۔

مقدار: ۳ سے ۴ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو ۲ سے ۲ گولی آرام آنے تک استعمال کرائیں۔

قیمت: 1000 گولی 243.50 روپے۔

F.T.X. BDH ایف۔ ٹی۔ ایکس

افعال: سوہا پا (فریبی) جسم میں چھیلے اجزاء کی زیادتی میں مفید ہے۔

ترکیب: پرچے کی ہدایت کے مطابق۔ قیمت: 10 گولی 24.60 روپے۔

گارل

GARLILL Charak

افعال: نفع، شکم، پیٹ کے درد، اینٹھ مروڑ میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۳ گولی، دن میں ۲ یا ۳ بار کھانے کے بعد بچوں کو نصف مقدار۔

قیمت: 100 گولی 17.00 روپے۔

گیس، ایکس

GASEX Himalya Drug

افعال: پیٹ پھولنا، گیس کی تکالیف کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۳ گولی کھانے کے بعد چبا کر کھائیں شدید ضرورت پر ہر آدھ گھنٹہ بعد۔

قیمت: 100 گولی 27 00 روپے۔

گیسو فکس

GASOFIX Gamber

افعال: بد ہضمی، ذکریں، ابکائی آنا پیٹ پھولنا اور ریاحی تکالیف میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی پانی سے کھانے کے بعد۔ قیمت: 100 گولی 34 00 روپے۔

گیس ٹریکس

GASTREX Ban lab

افعال: نفخ شکم تیزابیت دور کرنے اور گیس کی تکالیف میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو نصف خوراک۔ قیمت: 1000 گولی 243 05 روپے۔

گیس ٹرومون

GASTROMONE J.&J. Dechane

افعال: نفخ شکم، بد ہضمی ریاحی تکالیف کے لئے بہترین کام کرتی ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی کھانے سے ۱۵ منٹ قبل یا کھانے کے فوراً بعد بچوں کو عمر کے مطابق۔

قیمت: 80 گولی 11.00 روپے۔

گیس کٹ

GASCUT Durveshi Dawakhana P. O. DANG
DISTT. PILIBHIT

افعال: قبض، ریاحی درد شکم، پیٹ پھولنا، بد ہضمی اور گیس کی تھیف میں لاجواب ہے۔

مقدار: ۵ گرام یا اچھ پانی کے ساتھ کھانے کے بعد قبض کی حالت میں ایک چمچ سوتے وقت گرم پانی سے کھائیں۔ قیمت: 65 گرام 12.00 روپے

HEPATOGARD Themis Pharmaceuticals **ہپاٹوگارڈ**

افعال: جگر کے درمیان نکلشن، تیز اور زہریلی لود یہ داغیہ کے استعمال سے جگر کی تکالیف میں مفید ہے۔
مقدار: ۲ سے ۳ گولی دن میں ۳ بار سرپ ۱ سے ۲ چمچ ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔
قیمت: 10 گولی 5.50 روپے، سرپ 100 ملی لٹر 28.00 روپے، ڈراپس 16.50 روپے۔

HEPANORM Themis Pharmaceuticals **ہپانارم**

افعال: جگر میں چربی اور روغنی مادوں کی زیادتی شرابی اور ذیابیطس کے مریضوں کے امراض جگر میں بے حد مفید ہے۔

مقدار: ۱ گولی دن میں ۲-۳ بار۔ قیمت: 10 گولی 9.00 روپے ہپانارم ٹبس 10: 9 50 روپے۔

HERBI TAR J.&J. Dechane **ہربی ٹار**

افعال: جگر کی خرابی، جگر کا سکڑنا، انٹی بائیوٹک دواؤں کے سبب جگر کی خرابی میں مفید ہے۔
مقدار: پہلے ہفتہ ۲-۳ گولی کھانے سے پہلے دن میں ۲ بار دوسرے ہفتہ ۱ گولی بچوں کو نصف مقدار۔
قیمت: 10 گولی 16.00 روپے، سرپ 100 ملی لٹر 10.00 روپے۔

HERBOLAX Himalya Drugs **ہربو لیکس**

افعال: قبض، اور آنتوں کے فعل کی سستی و خرابی میں مفید ہے۔
مقدار: ۱ سے ۲ کپسول سوتے وقت۔ گولی ۱ سے ۳ شام کے کھانے سے قبل۔

INFEE Zandu **ان فی**

افعال: ہر ہضمی اور قبض دور کرنے کے لئے مستعمل ہے۔
مقدار: بچوں کو ۵ سے ۱۰ ابوند دن میں ۲ بار پانی کے ساتھ، بڑوں کو ۱۰ سے ایک چمچ پانی کے

ہر گھ ۳ بار۔ قیمت: 100 ملی لیٹر 19.50 روپے۔

KYNO TOMINE J.&J.Dechane

کائی ٹومین

افعال: یرقان بلغمی Catarrhal Jaundice کی کارگر دوا ہے۔

مقدار: ۱ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو نصف خوراک سرپ ۱ سے ۲ چمچے ۲-۳ بار۔

قیمت: 100 گولی 17.00 سرپ 100 ملی لیٹر 10.00 روپے۔

LAXATE

Synthochem

لکزیٹ

افعال: قبض دور کرنے کے لئے مفید ہیں۔

مقدار: ۱ سے ۲ کپسول پانی کے ساتھ سوتے وقت لکزیٹ فورٹ اکپسول اگر دست روکنا

چاہیں تو گرم پانی پلائیں۔ قیمت: 100 کپسول 90.00 روپے۔

LIVMEGH SYRUP Dee Pharma

لومیکھ سرپ

افعال: درم جگر، بھوک کی کمی، اور جگر کی سستی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار قیمت: 100 گولی 19.00 روپے۔

LIVEX

Ban lab

لویکس

افعال: جگر کی مزمن خرابیاں، ضعف جگر، شراب کے سبب ہونے والی جگر کی خرابیوں میں مفید ہے۔

مقدار: اکپسول دن میں ۳ بار، چھوٹے بچوں کو ذرا پس ۵ سے ۱۰ ابوند۔

سرپ: ۱ سے دو چمچے دن میں ۳ بار

قیمت: 100 کپسول 15.90 روپے ذرا پس 14.45 سرپ 21.00 روپے۔

LIVOMYN

Charak

لوومائن

افعال: بھوک کی کمی، نقص تغذیہ نشوونما میں کمی، جگر کی خرابی میں مفید ہے۔

مقدار: سرپ ۲ سے ۳ چمچے یا ۳ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو سرپ ۱ چمچے یا ۱ گولی یا ۵ سے ۱۰

بوند ڈرائپس پائیں۔ قیمت: 100 گولی 18.75 روپے۔ 100 ملی لیٹر 12.75 روپے۔

LIVO SYN Syntho chem لوو سائن

افعال: جگر کا بڑا ہوتا، جگر کا سکر جانا، عادی قبض کی مفید دوا ہے۔

مقدار: دو کپسول دن میں ۳ بار، سرپ ۱۰ ملی لیٹر دن میں ۳ بار بچوں کو نصف مقدار دیں۔

قیمت: 100 کپسول 90 00 سرپ 110 ملی لیٹر 18.75 روپے۔

LIVOTRIT Zandu لوو ٹرٹ

افعال: متعدی ورم جگر عظم جگر، جگر کی خرابی، بھوک کی کمی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار سرپ اچھہ دن میں ۳ بار۔

قیمت: 100 گولی 20 60 روپے 100 ملی لیٹر 19.60 روپے۔

LIV 52 Himalya Drugs اوفنٹی ٹو

افعال: مختلف اسباب سے ہونے والے ورم جگر میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار، بچوں کو ۵ سے ۲۰ بوند دن میں ۳ بار سرپ بچوں کو ۵ ملی لیٹر بڑوں کو

۵، ۷ ملی لیٹر دن میں ۲ بار بچوں کو عمر کے مطابق قیمت: 100 گولی 25 45 روپے سرپ 37 85

PIPTARD Vital care پیپٹارڈ

افعال: حیرانیت، زخم معدہ، زخم امعاء، ڈکاریں آنا، ابکائی وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۳ کپسول روزانہ دودھ کے ہمراہ یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔

PILEX Himalya Drugs Co پائی لیکس

افعال: بواسیر خونی اور ہادی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۳ بار کھانے کے بعد ایک ہفتہ پھر ۲ گولی دن میں ۲ بار ۱ ماہ تک۔

قیمت: 100 گولی 25 60 روپے مرہم 19.05 روپے۔

PILZANO Gamber **پل زانو**

افعال: نئی یا پرانی دونوں طرح کی بودا سیر میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار کھانے کے بعد۔ قیمت: 100 گولی 31.00 روپے

POLYMIX Synthochem **پولی مکس**

افعال: ہچکچ اور دست (اسہال) کی مفید دوا ہے۔

مقدار: شدید حالتوں میں ۲ کپسول دن میں ۳ بار معمولی حالت میں ۱ کپسول دن میں ۳ بار

قیمت: 100 کپسول 90.00

REGULAX Charak **ریگولیکس**

افعال: وقتی یا عادی قبض میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ گولی سوتے وقت پانی کے ساتھ کھلائیں۔

قیمت: 100 گولی 22.00 روپے۔

SAL PHAS J.&J. Dechane **سال فاس**

افعال: بھوک نہی کمی، نفع شکم (پیٹ پھولنا) اور بد ہضمی کی علامتوں میں مفید ہے۔

مقدار: بھوک کی کمی میں ۱ سے ۲ گولی کھانے سے قبل ہضم کی خرابیوں میں ۱ سے ۲ گولی کھانے

کے بعد بچوں کو نصف مقدار۔ قیمت: 100 گولی 17.50 روپے

SAVOURYN Ban lab **ساوورائن**

افعال: بچوں کو قوی لچ آنتوں کے درمیان بد ہضمی، تھکاوٹ اور کمزوری میں مفید ہے۔

مقدار: نمر کے مطابق ۰.۲۵ چمچ سے ۱ چمچ اچھے دودھ میں ڈال کر پکائیں پھر چھان کر بوتل سے

پائیں ہر بار تازہ بنائیں۔ قیمت: 100 گرام 39.50 روپے

SILIMIT**Alarsan****سلی مٹ**

افعال: موٹاپا، جسم میں زیادہ چربی جمع ہونے کو روکتی ہے۔
 مقدار: اکپسول ۳ بار ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔

SOOKTYN**Alarsan****سو کٹائن**

افعال: پیٹ پھولنا، بد ہضمی سے بھوک کی کمی، اور قبض میں مفید ہے۔
 مقدار: بچوں کو آدھ گولی دودھ، پانی یا پھلوں کے رس کے ساتھ دن میں ۳ بار۔
 قیمت: ۱۰۰ گولی 36.90

SPOLAX**J.&J. Dechane****اسپولیکس**

افعال: عادی قبض کے لئے مفید دوا ہے۔
 مقدار: ۱ سے ۳ چمچہ تازہ پانی سے سوتے وقت بغیر چبائے کھانا چاہیے۔ ۷۵ گرام 15.50

ULTRA LIV SYRUP**Jenburkt****الٹرا لوسرپ**

افعال: بھوک کی کمی، کمزوری، جگر کی خرابی، دواؤں اور شراب سے ہونے والی جگر کی خرابی پر قان
 میں مفید ہے۔

مقدار: بچوں کو آدھ سے اچھے دن میں ۲ بار بڑوں کو ۲ چمچے۔ قیمت: ۱۰۰ ملی لٹر 19.95

ZANDUZYME**Zandu****زاندوزائم**

افعال: بد ہضمی، نفخہ، ہضم کی خرابیاں، بھوک کی کمی میں مفید ہے۔
 مقدار: ۲ گولی کھانے کے بعد قیمت ۳۰ گولی 15.00

BLOOD**امراض دموہ کی دوائیں****ANCARE Vital Care**

ان کیر

افعال: بواسیر خونی، جس میں خون کثرت سے نکلتا ہو مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۳ کپسول پانی کے ساتھ دن بھر میں۔

AYAPON Alarsan

ایاپان

افعال: استخاضہ، رحم سے بار بار خون آنے ہر طرح کے جریان خون میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار جب تک خون بند نہ ہو پھر ۲ گولی دن میں ۲ بار ۳ ماہ تک۔

قیمت: ۱۰۰ گولی 30.00

CHINIUMCO

J.&J. Dechane

چنی مکو

افعال: رحمی جریان خون بواسیر، نکسیر، منہ حلق اور آنتوں سے جریان خون کی مفید دوا ہے۔

مقدار: بچوں کو ۱ سے ۲ گولی بڑوں کو ۲ سے ۴ گولی دن میں ۳ بار۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 17.50

STYPLON

Himalya Drug

اسٹیلان

افعال: ہر طرح کے جریان خون کو روکنے کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۳ گولی دن میں ۳ بار جب تک خون نہ رکے۔ خون رکنے پر ۱ سے ۲ گولی دو بار

۱ ماہ تک۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 35.85

VITALIP

Vital Care

وٹالپ

افعال: خون میں چربی کے اجزاء کی زیادتی، لحمی اجزاء کی خون میں کثرت شریان کی خلی، خون کے سرخ

ذرات کی غرابی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۳ کپسول ایک دن میں کھلائیں۔

SAPERA Charak **سپیرا**

افعال: ہائی بلڈ پریشر کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار پھر ۱۰۰ گولی ۳۱.۰۰ فورٹ گولی ۱۰۰: 45 00

SERPINA Hemalya Drug **سرپائی تا**

افعال: گردوں اور قلب کے خرابی سے ہونے والا ہائی بلڈ پریشر بچوں کا پیشاب نکل جتا، بے چینی، الجھن گھبراہٹ، ہسٹریا، نیند نہ آنے میں مفید ہے۔

مقدار: معمولی بلڈ پریشر میں آدھی گولی شدید ہائی بلڈ پریشر میں ۲ گولی دن میں ۳ بار دورے پڑنے
ہسٹریا میں آدھی سے ۲ گولی دن میں ۳ بار سکون کے لئے آدھی سے ۱ گولی سوتے وقت۔

عصبی امراض

CENTRAL NERVOUS SYSTEM

ALLERIN Ban lab **ے لیرین**

افعال: دافع الرجی دوا ہے جی اچھلنا، کھجلی، دودھ (چکے) پڑنے میں مفید ہے۔

مقدار: بڑوں کو ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو ۱ گولی، قیمت: ۱۰۰ گولی 29.05

BILOVAS German Remedies **بلووا اس ٹیلیٹ**

افعال: دماغی افعال میں کمی کی علامات مثلاً چکر آنا، کان بجنا، درد سر، حافظہ کی کمی، الجھن گھبراہٹ ہوتا۔

مقدار: اسے ۳ گولی روزانہ چبا کر پانی کے ساتھ کھائیں قیمت: ۱۰ گولی 65 00

BRAVOBOL Ban lab **براووبول**

افعال: دماغ کو سکون دینا، الجھن گھبراہٹ، جذباتی غیر طبعی حرکات میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ کپسول سوتے وقت دودھ کے ساتھ بچوں کو ایک کپسول قیمت: ۳۰ کپسول 34.00

BRENTO

Zandu

برین ٹو

افعال: حافظے کی کمزوری، دماغی نشوونما کی کمی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو ۱ گولی دن میں ۳ بار سرپ ۱ سے ۳ نیچے بچوں کو
اچھ ۳ بار دیر قیمت: ۵۰ گولی 16.00 سرپ ۱۰۰ ملی لٹر 19.60 - ۲۰ ملی لٹر 32.60

CEPHA GRANE

Charak

سیفا گرین

افعال: ناک کے گڑھے کاورم، آدھاسر کاورد، تناؤ کے سبب درد سر میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار کھلائیں اور ۲ بوندوں تختوں میں ہر ۲ گھنٹہ بعد ۷ دن تک ڈالیں ادھا
سیس میں سورج نکلنے سے آدھ گھنٹہ پہلے ۲ گولی کھلائیں ۱۰۰ گولی 42.00 ڈراپس 11.25

DERMAFEX

Ban lab

ڈرما فیکس

افعال: الرجی، جلد پر پھنسیاں مہاسے داغ پڑنا کھجلی دودرے (چکلتے) پڑنے میں مفید ہے۔

مقدار: آپسول دن میں ۳ بار دودھ کے ساتھ کھلائیں۔

مضر اثرات: جگر اور گردوں کے امراض و انفکشن میں اس کا استعمال مضر ہے۔

قیمت: ۱۰۰ آپسول 151.00

FEUVRIL

Ban lab

فیوورل

افعال: بخار، نزلہ زکام سردی کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو ۱ گولی دن میں ۳ بار۔

مضر اثرات: گردوں اور جگر کی خرابی یا انفکشن کے سبب ہونے والے بخاروں میں دینا مضر ہے۔

قیمت: ۱۰۰۰ گولی 288.65

HIBRIL

Vital Care

ہائبرل

افعال: دماغی تناؤ، بے چینی بولغم ماؤف ہوتا۔ حافظہ کی کمزوری میں مفید ہے۔

مقدار: ایک کپھول دن میں ۲ بار

H.P 200

Zandu

ایچ پی ۲۰۰

افعال: ہر طرح کے پارکن سنز (Parkinsonism) کی علامات میں جو دواؤں کے سبب نہ ہوں مفید ہے۔

مقدار: ۵۰ گرام ۱۰۰ ملی لیٹر پانی میں حل کر کے فوراً پلا دیں۔ دودھ میں نہیں دینا چاہیے۔

قیمت: ۳۵۰ گرام 60.00

MENTAT

Himalaya Drug

مین ٹیٹ

افعال: دماغی کمزوری، حافظہ کی کمی، رات میں بستر پر پیشاب نکل جانا۔

مقدار: ۲ گولی یا ۲ چمچ سرپ دن میں ۲ بار بچوں کو ایک چمچ سرپ یا گولی دن میں ۲ بار

قیمت: ۵۰ گولی 24.00 سرپ 29 00

NEO

Charak

نیو

افعال: مرگی، ہلکی اور شدید جھٹکے دار مرگی دورہ پڑنے اور ارادی حرکات میں خلل کی حالت میں اور جریان منی، سرعت انزال غدہ قدامیہ کا ورم، بچوں کے بستر پر پیشاب کرنے میں مفید ہے۔

مقدار: بچوں کو گولی دن میں ۳ بار، بڑوں کو ۲ گولی دن میں ۳ بار، قیمت: ۱۰۰ گولی 28.00

NE VOSS

J.&J. Dechane

نیو واس

افعال: بے چینی تھکاو، گھبراہٹ اور پریشانی دور کرنے دماغ کو تسکین دینے کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی ہر ۳-۴ گھنٹہ بعد دودھ کے ساتھ بچوں کو نصف مقدار۔ ۱۰۰ گولی 17.50

REMORIN

J.&J. Dechane

ری مورن انجکشن

افعال: درد کمر، جوڑوں کا پتھر اجاتا، عرق النساء، مہمی دردوں میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ ملی لیٹر عضلاتی ۲۴ گھنٹہ میں ایک بار لگائیں ۱۰ انجکشن 20.00

SILEDIN

Alarsin

سائی لی ڈین

افعال: نیند میں خلل، نیند نہ آنا، بے چینی تناؤ، عصبی کمزوری، ڈپریشن گھبراہٹ میں مفید ہے۔
 مقدار: اسے ۲ گولی دن میں ۲-۳ بار قیمت: ۵۰ گولی 19.95

VITAFIX

Gamber

وٹا فکس

افعال: قوت باہ کی کمی، جلق، حساسیت غیر ارادی انتشار عضو خاص میں مفید ہے۔
 مقدار: ۲ گولی صبح خالی پیٹ ۲ گولی سوتے وقت۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 39 00

VITESSON

J.&J. Dechan

وائی ٹے شن

افعال: نفسیاتی بیماریاں، عصبی تناؤ، بے چینی و گھبراہٹ میں مفید ہے۔
 مقدار: اسے ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق ۱۰۰ گولی 17 50

VOMITAB

Charak

وائی ٹیب

افعال: متلی، تے ابکائی، حاملہ کی تے، صبح اٹھکر ہونے والی متلی تے میں مفید ہے۔
 مقدار: دو چمچے سرپ یا ۲ گولی بچوں کو نصف مقدار۔ ۵۰۰ ملی لٹر 11 25

جراثیم کش انٹی بائیوٹک ادویہ

CHEMOTHERAPEUTIC

ALARSKIN

Alarsin

الارس کن

افعال: چہرے کے مہاسے، جلد کا تورم ہونا، ایگزیماتی اچھلنے، پسینہ کی زیادتی میں مفید ہے۔
 مقدار: خوراک بلور قیمت پرچے کے مطابق۔

CHIRAKIN**Zandu****چراکین**

افعال: طیریا اور دوسرے موٹھی بخاروں میں مفید ہے۔

مقدار: علاج کے لئے ۲ گولی دن میں تین بار گرم پانی سے ۳ سے ۷ دن بچوں کو نصف خوراک حفظہ
قدم کے لئے ۲ گولی دن میں ۲ بار ۷ دن تک

منفی اثرات: حالت حمل میں دنیامنع ہے۔ قیمت: ۲۰۰ گولی 159.00

HEMO PLEX**J.&J. Dechane****ہیموپلکس**

افعال: جسنے پھوڑے پھنسی، زخم وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار: ہانگوں کو اسے ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو نصف مقدار قیمت: ۵۰ گولی 7 50

HERBO SULPH**J&J Dechane****ہربوسلف**

افعال: پرانے انگیزیاء اور جلد کے زخموں کے لئے بہت مفید ہے۔

مقدار: بڑوں کو اسے ۲ گولی دن میں ۳ بار، گولی باریک چیر کر ۵ گنے ویسلین میں ملا کر زخموں پر
لگائیں۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 7.50

SULPHONAX**Gamber****سلفونکس**

افعال: مہاسے جلد پر داغ چھالے پڑنا، جلنا اور الرجی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ گولی پانی کے ساتھ دن میں ۳ بار کھانے کے بعد ۲۰ سے ۳۰ دن تک
قیمت: ۱۰۰ گولی 34.00

UREXYNOL**Ban lab****یورکسائی نول**

افعال: مزمن ورم گردہ، پیشاب میں رسوب crystal-تا۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو ۲ گولی پیشاب کی نالی کے انفلکشن میں ۲ گولی دن میں ۳ بار
قیمت: ۱۰۰۰ گولی 319.00

غدد کی خرابی میں کام آنے والی ادویہ

ENDOCRINE SYSTEM

DIA BECON

Himalya Drug

ڈایابی کون

افعال: خون کی شوگر کو ختم کرتی ہے اور ذیابیطیس کی خرابیوں کو دور کرتی ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۲ بار قیمت: ۲۰ گولی 40.50

GLUSET

Vital care

گلو سیٹ

افعال: ذیابیطیس شکاری میں مفید ہے۔

J. K. 22

Charak

جے۔ کے ۲۲

افعال: ہانپوں اور بوڑھے افراد کی ذیابیطیس میں ذیابیطیس کے آغاز میں بہت مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار قیمت: ۵۰ گولی 22 00

MERSINA

J&J. Dechane

مر سینا

افعال: ذیابیطیس کی ہر حالت میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۳ گولی دن میں ۳ بار کھانے سے آدھ گھنٹہ پہلے۔ ابتدا میں زیادہ مقدار دیں۔

قیمت: ۱۰۰ گولی 13.00

TRIBANG SHILA

Zandu

تری بنگ شیلہ

افعال: ذیابیطیس شکاری اور اس کے عوارضات میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۳ گولی دن میں ۲ بار کھانے سے پہلے۔ ۸۰ گولی 63.50

امراض گردہ و مثانہ

EXCRETORY SYSTEM

ALURETIC Allarsan **الورے ٹک**
 افعال: معمولی اور درمیانی درجے کا ورم، گردوں کی کمزوری، ورم گردہ قلب و پھیپھڑوں کے اعتلاء میں مفید ہے۔

مقدار: اسے ۲ گولی دن میں ۳ بار۔ شام کے وقت نہ دیں۔ قیمت: ۵۰ گولی 5.70

BANGSHEEL Alarsan **بنگ شیل**

افعال: آلات بول گردے مثانے کے دیرینہ مزمین انفکشن کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار، ۲ سے ۳ ہفتہ کھلائیں۔ قیمت: ۵۰ گولی 27.00

CALCUROSIN Ban lab **کیل کیوروسن**

افعال: پیشاب کی نالی میں پتھری، سنگ گردہ و مثانہ کو خارج کرنے میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۳ کپسول دن میں ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔

قیمت: ۱۰ کپسول 15.95 سرپ ۱۱۰ ملی لٹر 19.75

CALCURY Charak **کیل کیوری**

افعال: گردے و مثانے کی پتھری خارج کرنے میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار ۷۵ گولی 28.00

CYSTONE Himalya Drug **سسٹون**

افعال: پیشاب میں رسوب (کرسٹل) خارج ہونے پر پیشاب کی جلیں انفکشن گردہ و مثانہ میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار جب تک پتھری خارج نہ ہو یا پیشاب صاف نہ ہو جائے۔ ۶۰ گولی 26.25

KAYBEE

Gamber

کے بی

افعال: گردے و مثانے کی پتھری، گردوں میں رکاوٹ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ گولی پانی کے ساتھ کھانے کے بعد دن میں ۳ بار۔ قیمت ۱۰۰ گولی 34.00

K-4

Tablet

کے فور

افعال: غدہ قدامیہ کے ورم، ورم نائزہ گردے کے پتھری نکالنے کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار پانی یا دودھ سے۔ ۷۵ گولی 30 20

ORUCLYN

Charak

اور وکلائن

افعال: پیشاب میں جلن پیشاب میں خون آنا، غیر جراثیمی ورم نائزہ میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو اگولی۔ ۷۵ گولی 28 00

TURAI Co

J&J Dechane

ٹورائی کو

افعال: پیشاب کا تکلیف سے اور کم آنے میں فائدہ پہنچاتی ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳ بار پانی زیادہ مقدار میں دیں۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 17 50

عضلات و عظام کے امراض

MUSCULOSKELETAL SYSTEM**ARTHROM**

Vital Care

آر تھروم

افعال: جوڑوں کے درد، وجع المفاصل، جوڑوں کا پتھرا جانا، ہڈیوں کا ورم اور جڑ جانے میں مفید ہے۔

مقدار: ایکسپول دن میں ۲ بار۔

CHESOL OIL J&J Dechane چسول آئل

افعال: جوڑوں کے درد پھل کے درد، نمونہ اور کھانسی میں اس تیل کی مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ قیمت: ۳۰ ملی لیٹر 10.00

R. COMPOUND Alarsin ارکمپونڈ

افعال: جوڑوں کے درد، گھٹیا، موج، چوٹ ورم خون جھنے کے لئے مفید ہے۔
مقدار: ۲ گولی، دن میں ۳ بار سے ۳ ہفتہ قیمت: ۵۰ گولی 27.45

REMITONE Gamber ریکی ٹون

افعال: گھٹیا، جوڑوں کا پتھر اچانا، ہڈیوں کا جڑ جانا اور نئی ساخت کے بننے میں مفید ہے۔
مقدار: ۱ گولی دن میں ۳ بار پانی سے کھانے کے بعد۔ ۱۰۰ گولی 55.00

RHUMASYL Zandu ریوماسائل

افعال: جوڑوں کے درد، جوڑوں کا اکٹھا ہونا، کندھوں کا درد گردن اکڑ جانا، مہروں کا ورم موج چوٹ میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۳ ملی لیٹر روغن یا آدھ انچ ٹیوب کا مرہم لے کر متاثرہ مقام پر مالش کی جائے۔
قیمت: روغن ۳۰ ملی لیٹر 26.80 مرہم ۲۵ گرام 17.00

RHUMAYOG/RHUMAYOG ریومایوگ/ریومایوگ گولڈ with Gold Zandu

افعال: گھٹیا، جوڑوں کا پتھر اچانا، ریڑھ کے مہروں کا ورم، کندھوں کا درد، عرق انشاء، عضلات کی پٹھن درد موج میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ گولی دن میں ۲ بار ۱۵ دن تک۔

قیمت: ریومایوگ ۷۵ گولی 39.50 گولڈ والی ۴ گولی 17.50

R.PYRINE

Ban lab

ارپائی رین

افعال: مٹھیا، جوڑوں کا پتھر اجاتا، ہڈیوں کا درم درد کندھوں کا درد، عرق النساء، سوچ میں مفید ہے۔
 مقدار: پرانے دردوں میں ۲ گولی دن میں ۳ بار گرم دودھ کے ساتھ ۲ سے ۶ ماہ۔ شدید حالت
 میں ۲ سے ۴ گولی دن میں ۳ بار۔

قیمت: ۱۰۰ گولی 41.80

RUMALAYA

Himalaya Drug

رومالیہ

افعال: مختلف اسباب سے ہونے والے ہڈیوں کے درد میں مفید ہے۔
 مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار، کریم دن میں ۲ بار لگائیں۔ ۱۰۰ گولی 22.00 کریم 19 60

RYMANYL

Charak

رائی مائل

افعال: مٹھیا، جوڑوں کا پتھر اجاتا، نرم ہڈیوں کا درم، نقرس کمر درد عرق النساء میں مفید ہے۔
 مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو ۱ گولی۔ قیمت: ۵۰ گولی 33.75

SUPER GESIC CREAM

Themis

سپر جے سک کریم

افعال: نئے اور پرانے درد، کے لئے بہترین کام کرتی ہے ۳۰ گرام 26.00

VEDNIL

Synthochem

ویدنیل

افعال: مٹھیا، جوڑوں کا پتھر اجاتا اور نقرس کے لئے مفید چیز ہے۔
 مقدار: اکھسول دن میں ۳ بار۔ ۱۰۰ اکھسول 90.00

غذائیت و طاقت والے مرکبات

NUTRITION

ALPITONE

Zandu

ال پی ٹون

افعال: بھوک کی کمی، الجھن، عام جسمانی کمزوری میں مفید ہے۔
مقدار: ایک بڑا چھ دن میں ۲ بار کھانے سے پہلے بچوں کو ایک چھ چائے والا دن میں ۲ بار۔
قیمت: ۳۵۰ ملی لٹر 37.00

B. & M. PILLS

Gamber

بی اینڈ ایم پلز

افعال: حافظہ کی کمی، بھول جانا، عام جسمانی کمزوری کے لئے مفید ہے۔
مقدار: ۱ صبح ایک شام گرم دودھ میں شہد یا مکھن ڈال کر اس سے استعمال کریں۔ ۱۰۰ گولی 59.00

BONNISAN

Himalya Drug

بوننی سان

افعال: بچوں کی بھوک کی کمی، اور ہضم کی خرابی کے لئے مستعمل ہے۔
مقدار: ۳ ماہ تک کے بچوں کو آدھ چھ، اسان تک اچھ زیادہ عمر والوں کو دو چھ ۳ بار۔
قیمت: ۱۲۰ ملی لٹر 18.80

CEVIT

Synthochem

سی وٹ

افعال: وٹامن سی کی کمی، اسکروٹی، مسوڑھوں کا پھولنا، ضعف میں بطور معاون مستعمل ہے۔
مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 50.00

ELPHA

Gamber

الفا

افعال: عام جسمانی کمزوری اور ضعف ہا کے لئے مفید ہے۔
مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار کھانے کے بعد۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 27.00

FATOF Malladi فاٹوف

افعال: جسم میں چربی کے اجزاء کی زیادتی، موٹاپا اور پیٹ کا بڑا ہونا، جسم کو متوازن بنانے میں مستعمل ہے۔
مقدار: ۲ کپسول دن میں ۳ بار کھانے سے آدھ گھنٹہ پہلے ۳ ماہ تک قیمت: ۱۰۰ کپسول 239.21

FEROLIV Ban lab فیرولو

افعال: خون کی کمی، نقص تغذیہ عام جسمانی کمزوری جگر کی بستی کے لئے بہترین ہے۔
مقدار: ۲ کپسول روزانہ، ۱۰ دن تک دودھ کے ساتھ بعد کو کپسول روزانہ۔ ۱۰۰ کپسول 151 90

FORTEG Alarsan فورٹیک

افعال: نقاہت کمزوری الجھن، نفسیاتی یا عضوی نامردی کے لئے مفید ہے۔
مقدار: ۲ گولی صبح و شام ۶ ماہ تک کھائیں۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 46.95

GERI FORT Himalya Drug جیری فورٹ

افعال: عام جسمانی صحت کو بحال کرنے میں مدد اور معاون ہے۔
مقدار: ۱ گولی یا اچھے سرپ دن میں ۲ بار قیمت: ۱۰۰ گولی 34.00 سرپ ۲۰۰ ملی لیٹر 30.90

LIPAN Ban lab لیپان

افعال: ذریبی (موٹاپے) کو کم کرنے میں متوازن جسم بنانے کے لئے مفید ہے۔
مقدار: ۲ کپسول روزانہ یا جیسا ڈاکٹر مشورہ دے۔ قیمت: ۱۰۰ کپسول 151 90

MANOLL MALT Charak مے نول مالٹ

افعال: عام جسمانی کمزوری، خون کی کمی نقص تغذیہ و نقاہت کو دور کرتا ہے۔
مقدار: ۲ چمچے یا دو گولی دودھ کے ساتھ دن میں ۲ بار قیمت: ۱۰۰ گولی 31.00 مالٹ 45 00

OBENYL

Charak

ادبی ٹائل

افعال: موٹاپا (فرہی) کسی بھی طرح کی ہو مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار ۳ ماہ تک غذائی پرہیز اور ورزش کے ساتھ دوا خالی پیٹ نہ کھائیں۔

قیمت: ۵۰ گولی 22.50

OJUS

Charak

اوجس

افعال: بھوک کی کمی، ہضم کی خرابی کو دور کر کے جسم میں طاقت پہونچاتی ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ چمچے (بڑے) ۱۵-۳۰ ملی لیٹر یا ۲ گولی دن میں ۲ بار۔

قیمت: ۱۰۰ گولی 28.00 ۱۰۰ ملی لیٹر 26.75

PO TENZA

Gamber

پوٹینزا

افعال: سرعت انزال، نفسیاتی نامردی، ضعف باہ میں مفید ہے۔

مقدار: وقتی فائدے کے لئے ۳ گولی دودھ کے ہمراہ مباشرت سے قبل، مستقل طور سے ۲ گولی دودھ

کے ہمراہ کھانے کے بعد۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 34.00

POWER PILLS

Gamber

پاور پیلز

افعال: ضعف باہ، نفسیاتی نامردی کے لئے مستقل ہے۔

مقدار: ۲ گولی ۱ سے ۲ گھنٹہ قبل مباشرت، دودھ کے ہمراہ قیمت: ۱۰ گولی 30.00

ROYAL ALFA

Gamber

راکل الفا

افعال: ضعف باہ، خواہش نفسانی کمی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دودھ کے ہمراہ کھانے کے بعد دن میں ۲ بار قیمت: ۱۰ گولی 39.00

SUPER TINE

Synthochem

سپر ٹین سرپ

افعال: عام جسمانی کمزوری، نامردی، بڑھاپے کی کمزوری میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ بڑے چمچے، دن میں ۳ بار قیمت: ۲۰۰ ملی لٹر 28.75

VIGORIT CAP

Dee Pharma

وگورٹ کپسول

افعال: طاقت اور چستی کے لئے جسم میں نیا خون نیا جوش والو پیدا کرتی ہے۔

قیمت: ۵۰ کپسول 325.00

VIGOROLL

Charak

وگورول

افعال: عام جسمانی کمزوری نقاہت ضعف کو دور کرتی ہے۔

مقدار: اچھ یا ۲ گولی دن میں ۲ بار۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 49.00 جیلی ۵۰۰ گرام 75.00

HONY MOON GOLD PILL

ہنی مون گولڈ پیلو

Dr. Abdul Jabbar Durveshi Dawakhana 282 001

مقدار: ۲ گولی مباشرت سے قبل دودھ کے ساتھ قیمت: ۱۲ گولی 60.00

VITON - 99

Ban lab

وائی ٹون

افعال: غذائیت کی کمی، خون کی کمی، قوت باہ کی کمی کو دور کرتی ہے۔

مقدار: ۲ چمچے دن میں ۳ بار بچوں کو اچھ دودھ کے ساتھ شربت ۲۲۰ ملی لٹر 80 41

تولید و تناسل میں کام آنے والی ادویہ

REPRODUCTIVE MEDICIN

ADDY ZOA

Charak

ایڈائی زوا

افعال: کرم منی کا کم ہونا، ہانجھ پن، نامردی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار جب تک فائدہ حاصل نہ ہو جائے ۱۰۰ گولی 42.00

ALOES COMPOUND

Alarsan

الوز کمپوئنڈ

افعال: حیض کی خرابیاں، زنانہ بانجھ پن، بندش حیض، حیض تکلیف سے آنے میں مفید ہے۔
 مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار حیض آنے سے ۵ دن قبل شروع کریں جب تک حیض نہ آئے گولی
 کلائیں۔ ۵۰ گولی 16.40

BANOVIT

Ban lab

بے نووٹ

افعال: سرعت انزال، قوت باہ کی کمی، جریان، خواہش کی کمی اور بستر پر پیشاب کرنے میں مفید ہے۔
 مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار دودھ کے ساتھ ۱۰۰۰ گولی 258.65

B.H.PILLS/SHILAJEET PILL

Gamber

بی ایچ پیلز / شلا جیت پیلز

افعال: عام جسمانی کمزوری، نامردی، خواہش نفسانی کی کمی میں فائدہ پہنچاتی ہے۔
 مقدار: ۲ گولی دودھ کے ہر اودن میں ۳ بار کھانے کے بعد ۱۰۰ گولی 27.00

BRAHAMDINE

J&I Dechane

برہمڈین

افعال: کثرت حیض، سیلان الرحم (لیکوریا)، حیض کی خرابی میں مفید ہے۔
 افعال: ۲ گولی صبح ۲ گولی شام۔ ۱۰۰ گولی 17.00

CEA TANGLE TENTS

Synthohem

سی ٹینگل ٹینٹ

افعال: بغیر درد کے عائدہ (جیزو) کے منہ کو کھولنے والی عقی ہے۔
 ترکیب: استعمال، ایک جی فلم رحم کے اندر رکھوائیں۔ ۱۰ جی 95.20

FEMIFORTE

Charak

فیمی فورٹ

افعال: سیلان الرحم (لیکوریا) کے لئے مفید ہے۔
 مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار پانی کے ساتھ۔ ۷۵ گولی 47.75

FETEX PASTE

Gamber

فی ٹیکس

افعال: بندش حیض، درد حیض اور اسقاط حمل کے لئے مستعمل ہے۔

مقدار: ۵ ملی لیٹر فی ہفتہ کے حملے کے حساب سے پیسٹ کو مخصوص پچکاری سے رحم میں داخل کریں۔

GESTONE

Zandu

گیسٹون

افعال: حالت حمل میں خون کی کمی غذائیت کی کمی مٹھ نہ بننا عاداتی اسقاط میں ہے۔

مقدار: ۲ چمچے دن میں ۳ بار دودھ کے ساتھ۔ ۲۰۰ گرام 84.00

GYNEC-20

Synthocam

گائی نیک

افعال: حیض کا بے ترتیب اور بار بار آنا کثرت حیض وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ چمچے دن میں ۳ بار ۱۰ ملی لیٹر 18.75

HIMCOLIN

Himalya Drug

ہم کولین

افعال: قوت باہ میں کمی سرعت انزال اور جنسی کمزوری میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: عضو مخصوص پر تھوڑا سا مرہم لے کر مالش کریں۔ ۱۰ گرام 19.70

JERIAT

Vital Care

جی ری آٹ

افعال: عام جسمانی کمزوری، نشوونما کی کمی، سستی کاہلی کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ کپسول دن میں ۲ بار دودھ کے ساتھ۔

LA VIRIL CAP

Jenuburkt

لاورل کپسول

افعال: نامردی، مردوں اور عورتوں میں جنسی بے رغبتی، جنسی الجھن گھبراہٹ، اور سرعت انزال میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۴ کپسول روزانہ صبح و شام پھر ۲ کپسول صرف سوتے وقت ۱۰ کپسول 51.95

LA-FORT CAP Jenuburkt **لا فورٹ کپسول**

افعال: روزمرہ کی طاقت باہر تندرستی کی بحالی کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ ۱۰ کپسول 51.50

LEPTADEN Alarsan **لپٹاڈین**

افعال: دودھ کی کمی دور کرنے میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد شروع کر دیں ۱۰۰ گولی 26.85

LICOGEN Gamber **لیکو جن**

افعال: لیکوریا، کثرت حیض اور حیض کی دیگر خرابیوں میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دودھ کے ساتھ دن میں ۲ بار کھانے کے بعد۔ ۱۰۰ گولی 39.00

LUCUGYL Ban lab **لیو کو جل**

افعال: کثرت حیض، حیض کا بے ترتیب اور بار بار آنا۔

مقدار: ۱ کپسول دن میں ۳ بار دودھ کے ساتھ ۳ سے ۶ ہفتے۔ ۱۰۰ گولی 167.10

LUCOSYNTH-O- syntho chem **لیو کو سنتھ**

افعال: سیان الرحم (لیکوریا) ورم العانہ، ورم مہبل میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ کپسول دن میں ۳ بار دودھ کے ہمراہ۔ ۶۰ کپسول 100.00

LUCO SYNTH-V Synthochem **لیو کو سنتھ وی**

افعال: ہیڈ کے ورم، ورم مہبل، اور لیکوریا میں اندرونی استعمال کی نکلیاں ہیں۔

مقدار: ایک نکیہ روزانہ صبح اور سوتے وقت مہبل کے خوب اندر رکھوائیں۔ ۱۳ دن۔

قیمت: ۵۰ نکلیاں 85.00

LUKOL

Himalya Drug

لیوکول

افعال: لیوکوریا (سیان الرحم) کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۳ گولی دن میں ۲ بار ۱۰۰ گولی 25.00

LUNAREX

Charak

لیوناریکس

افعال: حیض بند ہونے حیض کے کمی سے آنے میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار حیض آنے سے ایک ہفتہ قبل شروع کریں حیض آنے پر بند کر دیں۔

قیمت: ۱۰۰ گولی 33.75

MAMTONE

Charak

مام ٹون

افعال: دودھ بڑھانے والا، جزل ٹاک ہے۔ مرضہ (دودھ پلانے والی) کے لئے بہت مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ کپسول دن میں ۳ بار ۱۰۰ کپسول 159.47

MENORIL

Ban lab

مینورل

افعال: حیض کا بے ترتیب آنا، ابتدائی بندش حیض میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ کپسول دن میں ۳ بار۔ ۱۰۰ کپسول 30.40

M-2 TONE

Charak

ایم ٹو ٹون

افعال: جنسی بلوغت کی کمی، حیض کی خرابیاں، بار بار حیض آنا، حیض کی زیادتی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ بڑے ٹچے ۱۵ سے ۲۰ ملی لیٹر دن میں ۳ بار ۳ ملوٹک ۲۰۰ ملی لیٹر 32.00

MYRKAP

Zandu

مائزکیپ

افعال: ولادت کے بعد جریان خون من یا س سے قبل جریان خون، آلات منع حمل کے سبب ہونے

والے جریان خون میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ کپسول دن میں ۳ بار ۳۰ کپسول 36.00

OAKAY PILLS

Gambers

او کے پل

افعال: بندش حیض، حیض کے درد سے آنے (عسر الطمث) میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار پانی کے ساتھ کھانے کے بعد ۵ سے ۱۰ دن تک ۱۰۰ گولی 27.00

OVARIN

Ban lab

اووارین

افعال: حیض کا تکلیف سے آنا، حیض کم آنے میں مفید ہے۔

مقدار: ایکسول دن میں ۳ بار دودھ یا پانی کے ساتھ ۴ ہفتہ ۱۰۰ گولی 174.70

OVOUTOLINE

Zandu

اووٹولین

افعال: کثرت حیض، حیض کا تکلیف سے اور بار بار آنا، ورم رحم وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳ بار روزانہ سرپا سے ۲ گچے،

قیمت: ۵۰ گولی 32.50 سرپ ۱۰۰ ملی لٹر 20 60

PEP CAP

Prem Pharma

پیپ کیپ

افعال: مردانہ بانجھ پن جنسی رغبت میں کمی، نامردی، سرعت انزال میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ ایکسول روزانہ، ۱۰ ایکسول 4.50

POSEX

Charak

پوسیکس

افعال: مختلف اسباب سے ہونے والے جریان خون کے لئے فائدہ مند ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار یا مرض کے مطابق۔ ۱۰۰ گولی 31.00

RE PEL

Vita Care

رے پل

افعال: سیلان الرحم (لیکوریا) حیض کا تکلیف سے آنا پشت کے درد میں مفید ہے۔

مقدار: ایکسول دن میں ۳ بار

SATAVAREX

Zandu

ستاوریکس

افعال: دودھ کی پیدائش میں اضافہ کرتی ہے حالت حمل میں بچے کو طاقت دیتی ہے۔

مقدار: ۲ سے ۴ چمچے دن میں ۲ بار دودھ کے ساتھ۔ ۲۰۰ گرام 30.80

SENSA HERB

Vicico lab

سین ساہرب

افعال: جنسی خواہش کی سرعت انزال، عضو کے انتشار میں کمی الجھن پریشانی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار ۱۰ دن پھر آگولی دن میں ۲ بار ۱۵ دن تک ۲۰ گولی 35.30

SENSA SPUR

Vilco lab

سنسا اسپر

افعال: حویات منویہ کی مقدار میں کمی اور جنسی خواہش کی کمی کو دور کرتی ہے۔

مقدار: آپسول دن میں ۲ بار ۳۰ دن تک ۳۰ کپسول 121.80

SEnzINE

J&J Dechane

سین زائن

افعال: ضعف کے سبب ہونے والی نامردی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۴ گولی دن میں ۳ بار ۱۰۰ گولی 17 50

SEXTON

Synthochem

سیکس ٹون

افعال: ضعف، باہر، عضوی نامردی، جوش و انتشار کی کمی میں فائدہ مند ہے۔

مقدار: آپسول دن میں ۳ بار دودھ کے ساتھ فوری فائدہ کے لئے ۲ کپسول صحت سے قبل۔

قیمت: ۶۰ کپسول 90.00

SPEMEN

Himalya Drug

اسپے من

افعال: کرم منی کم ہونا، اور م غده قدامیہ میں غده قدامیہ کے بڑا ہونا جانے میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار ۳ سے ۶ ماہ تک

SPEMEN FORTHimalya Drug **اپے من فورٹ**

افعال: سرعت انزال، جریان اور جلق کی خرابیوں کو دور کرتی ہیں۔
 مقدار: ۱ سے ۲ گولی روزانہ ۴ ہفتہ کھلائیں۔ ۱۰۰ گولی 34.00

SOVERGEN

Gamber

ساورن

افعال: لیکوریا (سیلان الرحم) کمزوری اور اعصابی الجھن میں مفید ہے۔
 مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار کھانے سے پہلے ۱۰۰ گولی 39.00

TEN TEX FORT

Himalya Drugs

ٹن ٹیکس فورٹ

افعال: مردانہ کمزوری ضعف باہ کے لئے مفید ہے۔
 مقدار: دو گولی دن میں ۲ بار دودھ کے ساتھ چبا کر کھائیں ۳ سے ۴ ہفتہ تک۔ ۱۰۰ گولی 13.00

VIGOREX

Zandu

وگوریکس

افعال: نامردی، ضعف باہ، ٹکان، عام جسمانی کمزوری میں مفید ہے۔
 مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۲ بار دودھ سے۔ ۱۵ کپسول 43.00

VIROGEN-G

Gambers

وروجن۔ جی

افعال: جنسی قوت کی کمی پرانی نامردی کے کیسوں میں اچھا کام کرتی ہے۔
 مقدار: ۱ سے ۲ گولی شہد یا مکھن کے ساتھ کھانے کے بعد۔ ۲۰ گولی 70.00

VIBRANT

Vital Care

وائی برنٹ

افعال: جنسی خواہش کی کمی، سرعت انزال نامردی، بے رغبتی میں مفید ہے۔
 مقدار: اکپسول دن میں ۲ بار دودھ کے ساتھ کھلائیں۔

VYSEX

Ban labs

وائی سیکس

افعال: ضعف ہاوا، جریان منی کے لئے مفید ہے۔

مقدار: آگولی صبح ایک گولی سوتے وقت دودھ کے ساتھ ۳ بار تک ۱۰۰ آگولی 250.65

آلات تنفس کے امراض

RESPIRATORY DISEASES

ALLERKHAND

Sitaram

الرکھنڈ

افعال: دودھ سے بچاؤ اور علاج کے لئے، کھانسی نزلہ آلات تنفس کے انفلشن میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ چمچے شہد یا دودھ کے ہمراہ۔

ASMAGARD

Malladi

اسماگارڈ

افعال: بلغمی دودھ، پرانی کھانسی، سینہ میں درد، الرجی، اسٹونیلیا، میں مفید ہے۔

مقدار: آکپسول دن میں ۳ بار روزانہ کھانے سے پہلے ۶ دن تک بچوں کو ۲ بار ۱۰۰ آکپسول 239.21

BRIFRIL

Vital Care

بریف ریل

افعال: بلغمی دودھ، حاد و مزمن سعال، کھانسی ورم حلق میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۳ آکپسول گرم پانی سے۔

CORAZAN

Zandu

کورازان

افعال: نزلہ زکام ناک اور ہوائی نالیوں میں رکاوٹ، بخار، درد چھکیں آنے میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ آکپسول دن میں ۲ بار ۱۶۰ آکپسول 164.00

CURX SYP

Ban lab

کیوریکس

افعال: کھانسی، الرجک کف، تکلیف دہ کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ چمچے دن میں ۳ بار سرپ ۱۰ ملی لٹر، 22.80

GLYSAN SYP

Dee Pharma

گلائی سان سرپ

افعال: یونانی دواؤں سے تیار کردہ کھانسی کا شربت نزلہ زکام کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار: اچھے دن میں ۳ بار ۱۰۰ ملی لٹر 25.00

DANGINE

J&J Dechane

ڈین جین

افعال: کالی کھانسی اور دوسری تکلیف دہ کھانسی میں فائدہ کرتی ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو آدھی گولی ہر ۴ گھنٹہ بعد شہد کے ساتھ ۱۰۰ گولی 17.50

DEKOF CYN

Allarsan

ڈی کوف سائن

افعال: کھانسی، دمہ، اسٹونقیلیا، نزلہ زکام میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی یا ۲ چمچے پانی یا شہد کے ساتھ دن میں ۳ بار۔ ۱۰۰ گولی 32.75 ۱۰۰ ملی لٹر 15 65

DESMA

J&J Dechane

ڈے سما

افعال: پرانی کھانسی اور دے کے لئے بہترین کام کرتی ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳۔ ۴ بار بچوں کو آدھی گولی۔ ۱۰۰ گولی 17.50

DETONSY

Charak

ڈی ٹون سی

افعال: نئے، پرانے ورم لوز تین لوز تالو کے ورم میں مفید ہے۔

مقدار ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں تک۔ ۱۰۰ گولی 42.00

DRILL EXPEC

Banlab

ڈرل سرپ

افعال: حادو مزمن سعال (بلغنی کھانسی) اور بلغنی کے لئے مفید ہے۔

مقدار: اچھہ دن میں ۳ بار بچوں کو آدھا چمچہ ۱۰۰ ملی لٹر 20 50

IOBIN

J&J Dechane

آیو بین

افعال: نزلہ زکام کھانسی الرجی میں فائدہ پہونچاتی ہے۔

مقدار: آٹھ دن میں ۳ بار بچوں کو آدھی گولی۔ ۱۰۰ آگولی 17 70

KASKOL

Concept

کاس کول

افعال: بالائی آلات تنفس کے انفلشن، نئی دہرائی کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار: بڑوں کو ۵ سے ۱۰ ملی لٹر دن میں ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق ۱۰۰ ملی لٹر 18 00

KOFLET

Himalya Drug

کف لیٹ

افعال: کھانسی، نزلہ زکام میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ چمچہ دن میں ۲ بار ۱۰۰ ملی لٹر 19 30

KOFLIN

J&J Dechane

کوف لین

افعال: درد اور بلغنی کھانسی میں بہترین کام کرتی ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق ۱۰۰ آگولی 17 50

KOFOL

Charak

کوفول

افعال: درم حلق، درم قصہ الریہ، درم لوز تین میں فائدہ مند ہے۔

مقدار: ۱۔ ۲ گولی منہ میں رکھ کر چوسیں دن میں ۵ سے ۶ بار ۱۰۰ آگولی 22.50

MEDI TAB

J&J Dechane

میڈی ٹیب

افعال: پرانی کھانسی (سعال مزمن) دودھ بلغمی میں مفید ہے۔

۲۰ گولی 4.00

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دودھ یا شہد کے ساتھ دن میں ۲-۳ بار

SEPTILIN

Himalya Drug

سپٹی لین

افعال: ورم حلق، ناک کے گڑھے کا ورم، ورم لوز تین، آلات تنفس کے انفیکشن میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ چمچ یا گولی دن میں ۲ بار بچوں کو نصف مقدار۔ ۱۰۰ گولی 33.85 ۱۰۰ ملی لیٹر 25 03

SPASMA

Charak

اسپازما

افعال: دمہ بلغمی، پھیپھڑوں میں ورم اور پرانی کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۳ چمچ دن میں ۳ بار بچوں کو اچھچھ ۲۰۰ ملی لیٹر 28.00

WHOOPEX

Synthochem

وہوپیکس

افعال: سعال مزمن، کالی کھانسی، اور خشک کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ کپسول دن میں ۲ بار ۴ کپسول 8.00

ZEFS

Zandu

زیف

افعال: سردی، زکام، حلق کے ورم، کھانسی، سعال، کالی کھانسی وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ چمچ دن میں ۳ بار بچوں کو آدمی خوراک ۱۰۰ ملی لیٹر 19 50

ZENIF SYP

Neo Pharma

زے نف سرپ

افعال: کھانسی، اربک کف، سگریٹ پیڑی والوں کی کھانسی اور بلغمی دمہ میں بہت مفید ہے۔

مقدار: ۵ سے ۱۰ ملی لیٹر بچوں کو نصف مقدار دیں۔ ۱۰۰ ملی لیٹر 18.00

مراہم لوشن جلدی بیماریاں

TOPICAL PREPARATION

ALARSKIN

Alarsan

الارسکن

افعال: مہاسے چہرے پر داغ پڑتا، قنکس انفکشن میں مفید ہے۔

BACTIMO

Vital Care

بکٹی مو

افعال: جلد کا درم، ایگزیرما، کھجلی جراثیمی اور قنکس، انفکشن میں مفید ہے۔
مقدار: ایک کپسول دن میں ۲ بار کھلائیں۔

CLAREX

Concept

کلاریکس

افعال: چہرے کے مہاسے پھنسیاں دور کرنے جلد کو تقویت پہنچانے کے لئے مفید ہے۔
مقدار: دن میں ۲-۳ بار صاف کر کے لگائیں۔ ۲۵۰ گرام ٹیوب 38.00

CUTFAR OINT

Ban lab

کٹ فار مرہم

افعال: زخم، کٹ جانے چھالے پڑنے کے لئے بہترین کام کرتا ہے۔
ترکیب: گرم پانی سے دھو کر زخم پر لگائیں۔ دن میں ۲ بار ۱۵ گرام ٹیوب 15.60

DENTOSOL

Synthochem

ڈین ٹوسول

افعال: منہ آنا (فلاغ) سوڑھوں کا درم تالو کے درم میں مفید ہے۔
ترکیب: متاثرہ مقام پر روئی کی پھیری سے لگائیں۔ ۶۰ یو پیانی میں ڈال کر غرغره کریں۔
قیمت: ۵ لیٹر 7.10

DERMAFEX

Ban lab

ڈرما فیکس

افعال: ایتزیما، چھاجن، جھوت دار پھنسیوں کے لئے اکسیر ہے
 ترکیب: دن میں ابار متاثرہ مقام پر اچھی طرح لگائیں۔ ٹیوب 22.00

GUMTONE

Charak

گم ٹون

افعال: مسوڑھوں میں ورم خون پیپ آنا اور پائیوریا میں مفید ہے۔
 ترکیب: انگلی یا ملائم برش سے مسوڑھوں پر صبح و شام ملیں۔ ۵۰ گرام پوڈر 21.00

G 32

Alarsan

جی ۳۲

افعال: مسوڑھوں کے ورم پیپ آنے دانتوں میں درد، منہ آنے ورم لوز تن وغیرہ میں مفید ہے۔
 ترکیب: استعمال اسے ۲ گولی چبا کر مسوڑھوں اور دانتوں پر اور متاثرہ مقام پر انگلی سے خوب ملیں۔
 قیمت: ۱۰۰ گولی 25.00

KAMILLOSAN

German Remedies

کاملوسان

افعال: ورم لٹ مسوڑھوں منہ کی غشاء مخاطی اور متعلقات کے ورم میں مفید ہے۔
 ترکیب استعمال: منہ کے اندر دن میں ۳ بار دو اکا سپرے کریں۔ ۳۰ ملی لیٹر 49.00

PIGMENTO

Charak

پگ منٹو

افعال: برس، چھپ، بھلہری کے لئے مفید دوا ہے۔
 مقدار: ۲ سے ۴ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو نصف مقدار ۵۰ گولی 56.00

RASGENT

J&J Dechane

رس جینٹ

افعال: رمد چشم، آنکھ میں سرخی درد جلن پانی بہنے میں مفید ہے۔
 ترکیب: ۱۵ سے ۳۰ ملی گرام ایک بڑے حقے میں حل کر کے دونوں آنکھوں میں ڈالیں۔ ۱۰ گرام 5.00

RIN GO

Synthochem

رن گو

افعال: داد کھلی، متعدی زخم، جلنے اور ایگزیم میں مفید ہے۔

مقدار: رن گو پودر کسی تیل اور لیموں کے عرق میں ملا کر متاثرہ مقام پر لگائیں۔ ۵۰ گرام ۹.50

RIPANTO

J&J Dechane

ری پن ٹو

افعال: عرق النساء، ٹانگ اور کمر میں درد، ریڑھ کے مہروں میں درد و درد کے لئے مفید ہے۔

ترکیب: متاثرہ مقام پر دن میں ۲-۳ بار مالش کریں۔ ۵۰ ملی لیٹر 21.00

SIX-C

Ban lab

سکس سی

افعال: ترائیزیم، کھلی الرجک ایگزیم اور چھالے پڑنے میں مفید ہے۔

ترکیب: متاثرہ مقام پر مرہم کی اچھی طرح مالش کریں۔ مرہم ۵۰ گرام 16.75

Near Total**Ulcer Healing**

Symptomatic improvement (daytime/ night-time epigastric pain, heartburn, nausea) was better with omeprazole 20mg once daily compared with Ranitidine 300 mg per day after 2 weeks in patients treated for Duodenal Ulcer

Gise et. al. Scandinavian J. of Gastroenterology 26:137-145,1991

in Duodenal Ulcer

**Dabur (ULZOL)**

At daily doses of 20 to 40 mg Omeprazole consistently achieved complete healing of duodenal ulcers in about 80% of the patients after 2 weeks and in about 100% of the patients after 4 weeks

ابن

ڈاير

عرق مرت سنجیونی ڈاير

یہ حیات بخش دواؤں کا کشیدہ کیا ہوا عرق ہے، اس سے جسم میں نئی طاقت توانائی اور تازگی پیدا ہوتی ہے، پرانا بخار، ٹائی فائیڈ، پرانے دست خوں کی کمی، بے خوابی، نزلہ زکام کھانسی و ریاحی تکالیف میں مفید ہے، یہ عرق ہاضم اور معدہ جگر دل و دماغ کو قوت بخشتا ہے۔

مقدار: ۱۰-۲۰ ملی لٹر کھانے کے بعد دن میں ۲ بار۔

درودانت ڈاير

فینول، روغن لونگ کافور، کلوروفارم، آئل مینٹھاپ، روغن اجوائن سے تیار کیا جاتا ہے۔ دانت میں کیڑا لگنا، مسوڑھوں کا پھولنا، دانتوں کے درد دورم کے لئے مفید ہے۔ ۵ ملی لٹر کے چٹنگ میں آتا ہے۔

درکان ڈاير

یہ عجم ادبیم عجم اکوٹامید اور گلیسرین سے تیار کردہ لوشن ہے۔ کان کے درد کے لئے مفید ہے۔

آئی نولا ڈاير

زنگ سلف، بورک ایسڈ، برے رن وغیرہ سے تیار کردہ آکھ کالوشن ہے۔ آکھ دکھ، سرخی پانی

یہ بلاڈونا، افیم، ست مازو وغیرہ سے تیار کردہ مرہم ہے۔ مقعد کی کھلی، جلن، خونی اور بادی بواسیر، منوں کی تکالیف کے لئے مفید ہے، ۲۲ گرام کا بیوب ملتا ہے۔

ڈاير

وب دمہ

یہ ایلو پین، پوٹاشیم، ایوڈائیڈ سکوتا وغیرہ سے تیار کردہ سرپ ہے۔ سانس کی سختی، بلغم کارکنا، دمہ کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۱۰ سے ۱۵ یونڈ پانی میں ملا کر دن میں ۳ بار۔

ایوڈائیڈ سارسا ڈاير

یہ مرکب اسٹمپ مول، منڈی، پوٹاس ایوڈائیڈ وغیرہ سے تیار ہوتا ہے۔ خون کی صفائی کرنے، پھوڑے پھنسی کھلی دور کرنے کے لئے مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲ چمچے پانی میں ملا کر صبح و شام۔

پائیریا ریمیڈی ڈاير

یہ نینک ایسڈ، روغن لونگ، فینول، عجم مرہ، عجم ایوڈین، گلیسرین، ست پودینہ سے تیار کی جاتی ہے، مسوڑھوں کے درد دورم خون آنا، پائیریا منہ کی بدبودار کرنے کے لئے مفید ہے۔

بدبودار مواد کے آنے میں مفید ہے۔ کان صاف کر کے ۵-۵ قطرے صبح شام ڈالیں۔

کھجلینا ڈابر

یہ کیلشیم سلفائیڈ سے تیار کردہ گولیاں ہیں۔ کھجلی، خارش، خون کی خرابی کے لئے کھانے والی گولیاں ہیں، ایک گولی دن میں ۳ بار۔

کھجلینا ڈابر

روح مندل، نیم، چال موگرہ، اجوائن سے تیار کیا جاتا ہے۔ کھجلی، پھوڑے پھنسی، زخم وغیرہ کے لئے اکیر صفت ہے۔

کولاریا ڈابر

یہ ایک مقوی دوا ہے۔ افریقہ کی کولانامی دوا کے عرق سے تیار کی جاتی ہے۔ سانس پھولنے، دل کی دھڑکن اور کمزوری کو دور کرنے کے لئے مفید ہے۔

لال شر ڈابر

یہ کیلشیم، سوڈیم فاسفیٹ، پوٹاشیم ہائیڈرو فاسفیٹ، سوڈیم بنزوئیم سے تیار کردہ خوش ذائقہ شربت ہے۔ یہ بچوں کی کمزوری، سوکھا، کیلشیم کی کمی میں مفید ہے، یہ خون کو بڑھاتا، ہڈیوں کو طاقت بخشتا،

آنے درود غیرہ کے لئے مفید ہے۔

کیسٹرینا ڈابر

لومب، جی کھار، پبلی، پیگ، چرک، کشتہ، شکم، نوشادر، عرق لیموں سے تیار کردہ چٹنی ہے۔ ہاضم طعام، کاسر ریاچ، بھوک بڑھانے گیس کی تکالیف کو دور کرنے والی ہے۔

مقدار خوراک: ۱-۲ چمچے کھانے کے بعد۔

گھارن ڈابر

پہ ایوڈ فارم، یو کپنس آئیل سے تیار کردہ لوشن ہے، یہ خراب، متعفن، بدبودار زخموں کے لئے مفید ہے اس کی ڈریسنگ سے زخم صاف ہو کر بہت جلد مندمل ہو جاتا ہے۔

کافو ڈابر

کافو اور الکحل سے تیار کردہ عرق ہے ہیضہ کی ابتدائی حالت تے، دست، بد ہضمی درد شکم میں فائدہ کرتا ہے، ہیضہ کے ایام میں اس کا استعمال مفید ہے۔

مقدار: ۱-۲ قطرے پانی میں ملا کر دن میں ۲-۳ بار۔

کان پپ ڈابر

یہ فارمل ڈی اینڈ کلوٹن ہے، کان بہنا، کان سے

مقدار خوراک: ۲ چمچے دن میں ۳ بار پانی میں ملا کر
پلائیں۔

الی انکھ ویدنا تھ

آنکھ دکھنے، سرخی، روہے وغیرہ میں مفید ہے۔

است سالہ ویدنا تھ

خون کی خرابی، جلدی امراض پھوڑے پھنسی،
کھجلی میں فائدہ مند ہے۔

عرق کافور

کارا، دست قے وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

عرق پودینہ

پیٹ پھولنا، بد ہضمی کھٹی ذکاریں۔ قے، متلی،
بھوک کی کمی میں فائدہ کرتا ہے۔

بال امرت ویدنا تھ

سوکھا، سردی، زکام، کمزوری میں مفید ہے۔

یواسیر مرہم ویدنا تھ

یواسیر، منوں کی جلن، درد خون آنے میں مفید ہے۔

پچھو کی دوا ویدنا تھ

دو فیشیوں میں پودر آتا ہے دونوں کو ملا کر کاٹی
ہوئی جگہ پر ملیں۔

بچوں کو سردی، زکام، کھانسی، بد ہضمی سے محفوظ
رکھتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲ چمچے دن میں ۳ بار۔

پودینہ ہرا ڈاوبر

یہ عرق پودینہ، پیپر مٹ، آئل، کلورو فارم سے
تیار کیا جاتا ہے، بد ہضمی، درد شکم، نفخ شکم، جی
تھکنا، کھٹی ذکاریں، دست پیٹ کی جلن وغیرہ
میں مفید ہے۔

۵۔۱۰ بونڈ پانی ملا کر دن میں ۳ بار،

سکئی لائن ڈاوبر

یہ سائینڈون، آلیپان، میٹاشیم لکلیٹ اور گلیسرین
سے تیار کردہ کیمچر ہے، ہر قسم کے جریان خون، مثلاً
فیض، بواسیر، حلق، پیچھروں، آنسوؤں وغیرہ سے
خون کے اخراج کو روکنے میں مفید ہے۔

مرکیورک اولیٹ ڈاوبر

گلے پھولنے، مرض گھبیکا کے لئے مفید ہے، گلے
پر مرہم لگائیں جب چھالے پڑ جائیں تو بدن
کریں۔

لسمینا

ڈاوبر

جگر کی خرابی، بھوک کی کمی، قبض، بد ہضمی، چکر
آنا، نیند کی کمی، بواسیر، برقان وغیرہ میں مفید ہے،

چرم روگی مرہم

کھجی، پھوڑے، پھنسی، زخم جلدی امراض میں
منفید ہے۔

دنتا ششتری

ویدنا تھ

دانت کے درد، سوزھوں کے درد پانیو ریا وغیرہ
میں منفید ہے۔

دھارا

ویدنا تھ

کاسر ریا جہ دست، تھلی وغیرہ میں منفید ہے۔

گلارین

ویدنا تھ

منہ کی تھلی کے درد، گلے کی سوجن، دورم لوز تھیں
میں غولہ کے لئے۔

ہیلر مرہم

ویدنا تھ

زخم، سوج، کٹنے درد کے لئے منفید ہے۔

کاس امرتا

ویدنا تھ

نزلہ زکام کھانسی، سردی، کال کھانسی، درد میں
منفید ہے۔

لیریا تھلیف

ویدنا تھ

لیریا، تھلی، سوکی تھلوں میں منفید ہیں۔ مگولی
دن میں مہار۔

پران دا

ویدنا تھ

تھلی کی دوا

عرق نیرم

جوڑی تاپ

ڈایر

لیریا، سوکی جلد، تھلی بڑھتا، خون کی کمزوری
میں منفید ہے۔

سپت گن تیل

ویدنا تھ

کھیا، پٹوں کے درد دورم، زخم وغیرہ میں منفید
ہے۔

زکامو

ویدنا تھ

نزلہ زکام، کھانسی، ماضوا کٹزا میں منفید ہے۔

برمین شیب

سکن دماغ و عضلات، دماغ درد ہے جینی کو دور
کرتی ہے۔

دماغ دو شاہاری

ویدنا تھ

ہالی بلڈ پریشر، دماغی کمزوری، تھلی میں منفید
ہے۔

فلور وگری

ویدنا تھ

اضطراب کٹزا، نزلہ زکام، سردی، کھانسی طق کے
درد میں منفید ہے۔

پاچک وٹی ویدنا تھ

بد ہنسی تو لچ، ریاحی تکالیف میں مفید ہے

رکت شودھک ویدنا تھ

خون کی خرابی، کھجنی، پھوڑے پھنسی میں مفید ہے

سرپ گندھا ویدنا تھ

ہائی بلڈ پریشر اور دامائی تسکین کے لئے مفید ہے۔

سندری کلب ویدنا تھ

حیض کی خرابی، رحم کی کمزوری، لیکوریا میں مفید ہے۔

سرکٹ ویدنا تھ

مصفی خون ہے، جلدی امراض میں مفید ہے

سواس کلب ویدنا تھ

دافع درد، دافع الرجی، کھانسی و ضیق النفس میں مفید ہے۔

سوپن دوش ہری ویدنا تھ

جریان احتلام، سرعہ، انزال میں مفید ہے۔

میس ایک وٹی ویدنا تھ

دافع تیزابیت، کاسر ریاح، بھوک کی کمی ریاحی درد میں مفید ہے۔

گیسول پاچک ویدنا تھ

کاسر ریاح، بھوک کی کمی، بد ہنسی میں مفید ہے۔

جیون کلب

عام جسمانی کمزوری، بھوک کی کمی، سردی

کاس وٹی ویدنا تھ

کھانسی نزلہ، گلے کے درد میں مفید ہے۔

سداھا کروٹی ویدنا تھ

کڑھ، ٹی بی، گلٹیوں کے بڑھنے میں مفید ہیں

لورال ویدنا تھ

خون کی کمی، جگر کی خرابی، یرقان میں مفید ہیں

مہوماری یوگ ویدنا تھ

ہر قسم کی ذیابیطس میں مفید ہیں۔

منداکسی سنہار ویدنا تھ

بھوک کی کمی، عام کمزوری میں مفید ہے۔

مرت سنجیونی ویدنا تھ

مقوی بدن، مقوی باہ، جزل ناک ہے۔

سفوف

نام دوا بمعہ مختصر فوائد

اشوگندھ چورن: احتلام، جریان کئی باہ
 آوی پتی کر چورن: ترشی معدہ، قبض
 پشپانگ چورن: جریان الرحم، سیلان الرحم،
 استخاضہ۔

پنج سم چورن: درد شکم، نفخ، قبض
 تالیس آوی چورن: کھانسی، نزلہ
 تر پھلا چورن: کمی بھوک، قبض،
 سار سوت چورن: امراض دماغ
 ستوپلا دی چورن: کھانسی بدق
 سدرشن چورن: پرانا بخار، طیریا
 شٹ شکار چورن: قبض، بد ہضمی، نفخ
 شواکھار پانچن چورن: قبض، نفخ، درد شکم،
 ہیضہ

کرشنا آوی چورن: امراض اطفال۔

گنگا دھر چورن (برہمت): اسہال
 لون بھاسکر چورن: بد ہضمی، درد شکم، نفخ
 لونگ آوی چورن: بخار، کھانسی، بد ہضمی
 مدھر ورتکین چورن: قبض و بد اسیر۔

موصلی آوی چورن: احتلام، جریان برقت منی

ہنگو آوی چورن: بد ہضمی، درد شکم، اچھارہ
 ہنگو اشک چورن: بد ہضمی، قوی نفخ

گوگل

تریو دشانگ گوگل: عرق النساء
 سنگھ ناد گوگل: پرانا مثیاء، درد کمر، ہیکمن باؤ۔
 کانچنار گوگل: خنازیر
 کیشور گوگل: مصفی خون، معلیمی
 گوکھشر آوی گوگل: درد گردہ، پرانا سوزاک،
 سوزاکی مثیاء
 مہاپوگرانج گوگل: تمام اقسام امراض دات
 امراض حیض، ہانجھ پن
 یوگرانج گوگل: تمام امراض دات

پیشی (صلایہ)

پابال پیشی: جریان خون، کھانسی، لاغری، دماغی
 کمزوری

زہر مہرہ خطائی پیشی: بچوں کے ہرے پیلے،
 دست، سوکھا، جھٹ

عقیق پیشی: مقوی اعضائے رئیسہ، حابس دم
 مسکن و مفرح

کھریا پیشی: حابس دم، ضعف قلب، خفقان
 موتی سیپ: بخار، کھانسی دم، کمزوری

اولیہہ و پاک (مجنون)

انڈیا پاک: گھٹیا، نقرس
چیون پر اش اولیہہ: دق، کھانسی، دل دھڑکن،
کمزوری

سپاری پاک: سیلان الرحم، جریان الرحم، درد کمر
سو بھاگیہ شخصی: امراض زچہ
نخ اولیہہ: اسہال، پچش، خونی بادیر
کٹشکاری اولیہہ: کھانسی
مدانند مودک: سرعت انزال
ہر در اکھنڈ: پرانی چھپاکی

گھی و تیل

براہمی گھرت: نسیان، کند ذہن، مانجھ لیا وغیرہ
پھل گھرت: سیلان الرحم، استقاط حمل، انخرا،
بانجھ پن
مہاتر پھلا آدی گھرت: جملہ امراض چشم
راری مید آدی تیل: درد دانت، ماعورہ
جوش دہن
مہانارائن تیل: درد ورم، فالج لقوہ موج
چوٹ کے لئے
برہمت (مہا) لا کھش اوئی تیل: پرانا بخار دق،
کمزوری

حبوب یعنی گولیاں

آموات آری وٹکا: گنٹھیا
اگنی تندڑی وٹی: کئی ہاضمہ، درد کمر وغیرہ
اندروٹی: سوتے ہوئے بستر پر پیشاب کر دینا،
کثرت پیشاب
ایلا دی وٹی: کھانسی، نفث الدم
پلیہہ آری وٹی: تلی کا بڑھ جانا۔
چندر پر بھاوٹی: احتلام، جریان، امراض پیشاب
چندر کا وٹی: احتلام، جریان، کئی باہ
ڈگدھ وٹی: برائے شکر ہنی
ڈگدھ وٹی ختم دھتور اوالی: سوجن
راج وٹی: بد ہضمی، تے
کھدرا آدی گٹکا: جوش دہن، خشک کھانسی
گندھک وٹی: بد ہضمی
لشن آدی وٹی: بد ہضمی، ہیضہ
لوٹک آدی گٹکا: کھانسی
مرچ آدی گٹکا: کھانسی
منڈور وٹک: برکان، کئی خون، سوجن
وردھی بادھی کا وٹکا: فتن، کھانی فوطہ
ویوش آدی گٹکا: زلہ، زکام، کھانسی

نیز نوا آدی آرشت: ہر قسم کی سوجن
 دراکش آرشت: دق، کھانسی، کمزوری، قبض
 و شمول آرشت: تلی کا بڑھ جانا
 کچ آرشت: اسہال
 کھدر آرشت: فساد خون، جذام
 وژنگ آرشت: خنازیر، غدودوں کا بڑھ جانا

رس

آرگیہ وردھنی رس: برقان، جلندھر
 آنند بھیرورس رمبیدر سارنگرہ والا: بخار و
 اسہال
 آنند بھیرورس شارنگدھر والا: بخار و اسہال
 آپد نش کشار: آتک، پھوڑے پھنسیاں،
 اجیرن کٹک رس (سرخ): بد ہضمی، پادی، دودھ
 ہضم نہ ہونا۔
 اچھا بھیدی رس (سیاہ): تیز جلاب آورد و
 ارش کشار رس: پادی، بواسیر
 اشوچولی رس: بے ضرر جلاب آورد و
 اگنی تنڈی رس: کئی ہاضمہ کرو غیرہ کا درد
 اگنی کمار رس: صفحہ ہاضمہ، اسہال، بد ہضمی
 امیر رس: آتک، آتکی مٹھیا، فساد خون
 آنماد ہر رس: جنون، مرگی

کاسیس ادی تیل: بواسیر
 کاسیس ادی تیل: بواسیر
 کھشار تیل: جلد امراض کان
 کھربند و تیل: پرانند و سر، ہال جھڑنا، مٹھاپن
 مہا بھرنگ راج تیل: امراض بال

آسو و آرشت

اشیر آسو: سیلان الدم، گرمی کا بڑھ جانا
 دراکش آسو: دق، کمزوری، کھانسی، قبض
 چندن آسو: سوزاک، دشواری پیشاب
 سار و آدی آسو: فساد خون
 کماری آسو: پرانا بخار، تلی و جگر کا بڑھ جانا
 کتک آسو: دمہ
 لوہ آسو: کمی خون، تلی کا بڑھ جانا، کمزوری
 ابھیا آرشت: قبض، بواسیر
 ارجن آرشت: امراض دل
 اشوک آرشت: سیلان الرحم، جریان الرحم
 اشوگندھ آرشت: اسٹریا، جنون دماغی و
 جسمانی کمزوری۔
 امرت آرشت: پرانا بخار
 برہمی آرشت: لیان، کند ذہنی، مانجھلیا، جنون
 وغیرہ

رس آدی وئی (جھید): بخار، تے، متلی،

زیادتی پیاس

رس پیپری (عام): جملہ امراض، بچکان

سدھ پرائٹر ایسٹور رس: بخار و اسہال کا
مرکب ہونا، شکر ہنی،

سروانگ سندرس: دق، کھانسی

سمرتی ساگر رس: مرگی

سوت شیکھر رس: بخار، ترشی معدہ، ہنگی

سومنا تھ رس: کثرت پیشاب

شرنگار ابھر رس: کھانسی، دق

شرودجر رس: سر درد

شری جے منگل رس: پرانا بخار

شری من متھ رس: کمکی باہ، سرعت انزال

شواس چنٹا منتری رس: دمہ

شواس کٹھار رس: دمہ

شول گج کیسری رس: درد پیٹ

کال آری رس: پہنات، بخار

کامنی ودر اوٹرس: سرعت انزال

کرپور رس: دست آنا، پیشاب، ہیضہ

کرشن چترکھ رس: جنون، مرگی، ہڈیان، نمونیہ۔

کرمی مدگر رس: کرم ہائے شکم

کستوری بھیرو رس: نمونیہ، میعادی بخار، غیض

کی کمزوری

کف کرتی رس: کھانسی، دمہ

کف کیتور رس: نزلہ و زکام

کنک سندرس: بخار و اسہال کا مرکب ہونا
شکر ہنی

گر بھ پال رس: استقامت، انخراہ

گر بھ چنٹا منتری رس: امراض حاملہ مستورات

گر ہنٹری کپاٹ رس: شکر ہنی

گندھک رسائن: مصلی خون

گنڈمالا کنڈن رس: خنازیر

گنگادھر رس: اسہال و پیشاب

گھوڑا چوٹی رس: بے ضرر جلاب آور دوا

لکشمی نارائنتر رس: میعادی بخار، پر سوت بخار

لکشمی وللاس نارویہ: احتکام، جریان، ضعف

باہ، نزلہ و زکام۔

لوکنا تھ رس: جگر و تلی کا بڑھ جانا

لیلا وللاس رس: ترشی معدہ

مرتیورنجہ رس: بخار اتارنے کے لئے

مہاجورا غلش: طیریا بخار

مہا گندھک رس: بچوں کے تے اور دست

مہا لکشمی وللاس رس: میعادی بخار، نمونیہ،

زکام، کمزوری

ویتال رس: سنپات، بخار، ہڈیان
ہر دیہ آرٹھرورس: دل کا دھڑکنا و پھر کنا
ہنگلیشور رس: بخار، گھٹیا۔

لوه و منڈرور

اٹل پت آنتک لوه: ترقی معده
برہت سر و جور ہر لوه: پرانا بخار، کمی خون
پٹ پکو و شم جور آنتک لوه: پرانا بخار کمی خون
پرور آری لوه: جریان الرحم، سیلان الرحم
پرور آنتک لوه: جریان الرحم، سیلان الرحم
پنر نوا آدی منڈور: برقان، بھس، کمی خون
تریہ او شتر آدی لوه: درم گردہ (نفرائیس)
دھاتری لوه: ترقی معده، درد پیٹ
دیگر دھاتری لوه: ترقی معده، درد پیٹ
سپت امرت لوه: امراض چشم
سر جور ہرہ: پرانا بخار، کمی خون
نوائس لوه: کمی خون، کمزوری،
و شم جور آنتک لوه: پرانا بخار، کمی خون
یکرت پلہاری لوه: امراض جگر و تلی

کوی پکورس

تال سندور: فساد خون
سدھ مکردھو ج: رسائن، نامردی، کمزوری،

مہاناراج رس: تیز جلاب آوردہ
نرپتی ویلہ رس: شکر ہنی، ہیضہ
نئیہ اودت رس: بواسیر
وات کلاتک رس: مرگی
بال کلیانثر رس: بچوں کے دست
برہت ہنگلیشور رس: زیادتی ذکات حس،
جریان، کمزوری

برہت پورنثر چند رس: نامردی، ترقی معده
برہت کستوری بھیرو: نبض کی کمزوری، ہڈیان،
نئی پاد سنپات
برہت وات چٹا منثری رس: جنون، مرگی،
ہسنہ، ہڈیان، کمزوری پاد۔
بسنٹ کسما کر رس: زیابطیس، احتلام، جریان،
نئی پاد
بسنٹ مالتی رس: وق، پرانا بخار، میعاد بخار،
سیلان الرحم۔

بول بدھ رس: سیلان الدم
پرانثر ولہ رس: برقان
پر تاب لنگلیشور رس: پر سوت، بخار، سنپات،
ہسنہ

پرور آنتک رس: سیلان الرحم
پرور پورس: سکرت طبع

پرپٹیاں

بول پرپٹی: جریان الرحم، جریان خون، خونی بواسیر
 پنج آمرت پرپٹی: شکر ہنی، رس پرپٹی، شکر ہنی،
 اسہال

سورنٹر پرپٹی: شکر ہنی، دق
 لوہ پرپٹی: شکر ہنی، کمی خون

بش کی کمزوری

مکرو صوج سادہ: سذہ مکرو صوج کی مانند لیکن
 کمزور اثر

رس سندور: لقوہ، فالج، فساد خون، مقوی باہ
 مل سندور: یوگ دایہی

سمیر پنگ رس (مل لکن): فالج لقوہ

سمیر پنگ رس (اوردہ لکن): فالج لقوہ

سورنٹر پنگ: احتلام، جریان، سیلان الرحم،

سوزاک

دماغ اور اعصاب کی بیماریاں

دوسرے اور آدھا سیسی کا درد

اطریقہ نقل زمانی نزولہ و زکام، درد سر، دوران سر (سر پھرانا) آدھا سیسی کا درد، قریح اور بلک لیا میں منید ہے۔ تبض کو دور کر کے آلوں کو فضلات سے پاک کرنا ہے۔
مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک عمر کے مطابق۔
طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ یا پانی سے کھائیں۔

اطریقہ نقل سنائی پرانے درد سر، آدھا سیسی کا درد اور دوران سر (سر پھرانا) میں استعمال کیا جاتا ہے اور تبض کو بھی دور کرنا ہے۔
مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک عمر کے مطابق۔
طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ یا پانی سے کھائیں۔

اطریقہ نقل کشینری دماغ اور معدے کو قوت دیتا ہے۔ تبض کو دور کرنا ہے۔ اس کے ۱۵ گرام کھانے سے دائمی نزولہ پیشہ کے لیے فتم ہو جاتا ہے۔ نزولہ سے پیدا ہونے والی تمام بیماریاں جٹا درد سر، سر پھرانا، آنکھوں کی سرخی بھی اس کے

استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔ پاک، کان کا درد اور منیر رک جاتی ہے۔
مقدار خوراک: ۱۰ گرام
طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت یہ طریقہ پانی سے کھائیں۔

اطریقہ نقل ملین پرانے درد سر، دوران سر اور آدھا سیسی کو دور کرنے کے لئے بہت اچھی دوا ہے، تبض کو دور کرتا ہے، نزولہ و زکام اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے لئے خاص طور پر منید ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام
طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ یا پانی سے کھائیں۔

ایار ج فیقر پرانے درد سر میں منید ہے۔ معدہ اور آلوں کو قلیقہ موند سے پاک صاف کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام
طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت پانی سے گل لیں۔
حب ایار ج یہ گولیاں دماغ کو باقی فضلات سے پاک صاف کرنے کے لئے مخصوص

بار بار سر پر رکھیں دوسرے سر اور پٹائی پر لٹائیں۔
قرص مثلث : قرص سر کے درد اور
 آدھا کھسی کے درد کو تسکین
 دیتے ہیں۔
 طریقہ استعمال : ایک گلیہ پانی میں گھس کر پٹائی پر
 کپٹیوں پر لٹائیں۔

ضعف دماغ

اطریاقل مقوی دماغ : اطریاقل دماغ کو
 طاقت بخشتا ہے ،
 آنکھوں کی روشنی کو قائم رکھتا ہے۔ دائمی نزلہ اور دوسرے
 میں مفید ہے۔
 مقدار خوراک : ۱۰ گرام
 طریقہ استعمال : رات کو سوتے وقت یا صبح کو صبح سے
 کھائیں۔
 خمیرہ گاؤز پاں سادہ : دماغ کو طاقت دیتا
 ہے ، دل کی تھقیہ
 کے لیے بھی مفید ہے۔ صحت مند سوس اور ملا لیا کو دور
 کرتا ہے۔
 مقدار خوراک : ۱۰ گرام
 طریقہ استعمال : چاندی کے ورق میں لپیٹ کر صبح کو
 کھائیں۔

خمیرہ گاؤز پاں جنبری : دل و دماغ کو طاقت
 دیتا ہے ، دل کی
 تھکاوٹ اور خیالات کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ آنکھوں
 کو طاقت دیتا اور ذہن و حافظہ کو بڑھاتا ہے۔ اس کا روزانہ

ہیں۔ پالے دوسرے، چنگی اور دوسرے دائمی امراض میں
 استعمال کی جاتی ہیں۔

مقدار خوراک : ۳ گرام

طریقہ استعمال : یہ گولیاں صبح عام کے بعد صبح
 خاص (صبح و دماغ) کے لئے معالج کے طور سے سے
 اس طرح استعمال کی جاتی ہیں کہ جب چار گھنٹہ رات
 باقی رہتی ہے تو یہ گولیاں عرق گاؤز پاں ۱۲۵ ملی لیٹر یا کسی
 دوسرے درق سے کھا کر سوجاتے ہیں۔ صبح کو جاگنے
 کے بعد سسل پیتے ہیں۔

دماغ کی خشکی کو دور کرتا، نیند لاتا ہے
روغن بنفشہ : اور دوسرے کو دور کرتا ہے۔

طریقہ استعمال : سر پر مالش کریں اور پیشانی پر بھی
 لٹائیں۔

گرمی سے پیدا شدہ دوسرے کو دور کرتا
روغن کاہو : دماغ کی خشکی کو دور کر کے
 لٹک چڑھ کر تازہ نیند لاتا ہے۔

طریقہ استعمال : سر اور پیشانی پر لٹائیں اور ناک کان
 میں بھی قطرے ڈالیں۔

گرمی سے پیدا ہونے والے دوسرے
روغن کدو : کو دور کرتا ہے ، دماغ کی خشکی کو دور
 کر کے لٹک چڑھ کر تازہ نیند لاتا ہے۔

طریقہ استعمال : سر اور پیشانی پر لٹائیں اور ناک کان
 میں بھی ایک دو قطرے ڈالیں۔

سر سام میں مفید ہے۔ گرمی سے
روغن گل : پیدا ہونے والے دوسرے کو دور
 کرتا ہے۔

طریقہ استعمال : سر سام کے شروع میں روغن گل ،
 عرق کلاب اور سرکہ خالص ملا کر کپڑے یا روئی کی مدد سے

معجون برہمی ضعف دماغ میں نہایت مفید ہے ، دماغ کو طاقت دیتی اور

ذہن و حافظہ کو بڑھاتی ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام

طریقہ استعمال : صبح کو نہار منہ دودھ سے کھائیں۔

معجون نقرہ یہ معجون دل و دماغ کو طاقت دیتی ہے ، تفریح بخشنی ہے ، ضعف

اعصاب اور ضعف ہاؤ کو بھی دور کرتی ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام

طریقہ استعمال : صبح سویرے نہار منہ کھا کر لوپ سے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پی لیں۔

مفرح مشکیں دماغ کو طاقت دینے اور ذہن و حافظہ کو قوت بخشنے کے لیے

بہترین دوا ہے۔ تمام دن کا تھکا ہوا دماغ اس کی ایک خوراک کے استعمال سے تازہ ہو جاتا ہے۔ دماغی کام

کرنے والوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔

مقدار خوراک : ایک گرام

طریقہ استعمال : صبح سویرے نہار منہ یا بوقت ضرورت ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔

سر چکرا نا

سر چکرا نا میں اطریشل ایسٹر خودوس ، اطریشل

زناں ، اطریشل سنائی ، اطریشل کشیزی ، اطریشل ملین ،

غیرہ گاڈزباں غبری ، غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا ، کشت

مرجان سادہ ، کشتہ مرجان جواہر والا مفید ہیں۔ ان سب کا

ہوان "دوروسر" کو "ضعف دماغ" میں ہو چکا ہے۔

حب جواہر ، دواہ آسک معتدل ، نوشدارو لولوی اور

استعمال دماغی کام کرنے والوں کے لیے مفید ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک۔

طریقہ استعمال : صبح کو نہار منہ یا بوقت ضرورت کھائیں۔

لوپ رکھے ہوئے

غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خیروں کے

مقابلے میں زیادہ طاقت ور اور جلد اثر کرنے والا ہے ، دل

و دماغ کو قوت دینے اور راحت بخشنے کے لیے نہایت مفید

ہے۔ دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے اور ذہن و حافظہ کو

بڑھاتا ہے ، عام جسمانی کمزوری کے لیے بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام

طریقہ استعمال : صبح سویرے نہار منہ یا بوقت ضرورت

کھائیں۔

غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے

غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

لوپ رکھے ہوئے غیرہ گاڈزباں غبری جواہر والا خاص

روغن خشخاش سر پہ لگانے سے نیند لاتا ہے اور
گری سے پیدا ہونے والے درد
کو دور کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: سر پہ لگائیں، ناک اور کان میں چکانیں۔
روغن لبوب سبب ۴ خوابی میں منہ
۴ سر پہ لگانے سے
دماغ میں تڑلوٹ پیدا کرنا اور نیند لاتا ہے۔
طریقہ استعمال: سر پہ آہستہ آہستہ مالش کریں اور
ناک کان میں چکانیں۔

لو لگنا

شربت روح افزا شربت روح افزا گریوں کی
شدت میں جب کہ بعض
آدی لو لگنے سے بیمار ہو جاتے ہیں، شربت روح افزا بہت
منفید ثابت ہوا ہے۔ گرمی کی شدت سے جبکہ پیاس
بے حد لگ رہی ہو، بدن میں آگ سی لگی محسوس ہو
اور دل و دماغ پر اندر کی چھائی ہو، شربت روح افزا
کے پیتے ہی سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔
مقدار خوراک: ۵۰ ملی لیٹر
طریقہ استعمال: پانی میں ملا کر اور حسب خواہش ہر
ذیل کریں۔

مرگی

خمیرہ گاؤز ہاں خبری جد و لد ر حود صلیب والا
یہ خمیرہ مرگی کے مریضوں کے لیے خاص طور پر منہ
ہے۔ بچوں کی مرگی (ام ایسٹن) اور مستور لک کے
مرض اختلاف ارحم (سیریا) میں بھی فائدہ دیتا ہے۔

خمیرہ مردانہ بھی سر پکڑانے میں فائدہ دیتے ہیں۔
ان کا بیان "ضعف قلب" میں آئے آئے گا۔

نسیان - بھول

شربت اسطوخودوس نسیان اور اختلاج میں
منہ ہے۔ بھلی اور
سوداوی نادوں کو آسانی سے نکالتا ہے۔
مقدار خوراک: ۳۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: سحارج کے مشورے سے یہ شربت
مرقی گاؤز ہاں ۱۲۰ ملی لیٹر میں ملا کر پیئیں۔

معجون نسیان نسیان (بھول) کی خاص دوا ہے۔
یہ قوت حافظہ اور ذہن کو بوجھاتی
ہے۔ کند ذہن اور بھلی بچوں کے لیے یہ معجون بہت مؤثر
ہے۔ اس سے ذہن کی ذہنی قوتیں کھلتی ہیں۔ بوجھوں کے
مرض نسیان میں بھی منہ ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام
طریقہ استعمال: یہ معجون صبح یا رات کو سوتے وقت یا
دونوں وقت کھائیں۔ ہر قسم کی کھٹی چیزوں سے
پرہیز کریں۔

بے خوابی - نیند نہ آنا

اکسیر شفا نیند لانے کے لئے نہایت منہ
دوا ہے۔ اس کا بیان "جنون" میں ہے۔
روغن بادام، روغن کاہو اور روغن کدوسر پر لگانے سے
نیند لاتے ہیں۔ ان کا بیان "درد سر" میں ہو چکا ہے۔

کھائیں۔

روغن دھتورہ : قانچ و لقوقہ میں منید ہے پلوں پر
دردوں کو تسکین بخاتا ہے۔

طریقہ استعمال : بالمش کر کے لوپر سے روئی گرم کر کے
ہاند میں۔

روغن سرخ : قانچ و لقوقہ، گھٹیا، عرق النساء،
نقرس اور کمر کے درد کے لیے
منید ہے۔ چوٹ کا درد بھی اس کے استعمال سے دور
ہو جاتا ہے۔

طریقہ استعمال : نیم گرم کی بالمش کر کے لوپر سے روئی
گرم کر کے ہاند میں۔

روغن سیر : قانچ و لقوقہ، عرق النساء اور درد
کمر میں منید ہے۔

طریقہ استعمال : نیم گرم بالمش کر کے لوپر سے روئی گرم
کر کے ہاند میں۔

روغن قسط : قانچ و لقوقہ، ریشہ اور گھٹیا میں
منید ہے۔

طریقہ استعمال : نیم گرم بالمش کر کے لوپر سے روئی
گرم کر کے ہاند میں۔

روغن لوہان : قانچ و لقوقہ، گھٹیا اور درد کمر کو دور
کرتا ہے۔

طریقہ استعمال : نیم گرم بالمش کریں لوپر سے روئی
گرم کر کے ہاند میں۔

قرص آسیر قانچ و لقوقہ : قانچ و لقوقہ میں منید ہیں۔

مقدار خوراک : ایک ٹمپ۔

طریقہ استعمال : صبح و شام دونوں وقت ۱۰ اگرام شدہ میں
ٹما کر کھائیں۔

مقدار خوراک : ۵ گرام
طریقہ استعمال : یہ طیرہ صبح کو عمایا معالج کے
مغورے سے کسی چیز کے ساتھ کھائیں۔

قرص حود صلیب : قرص مری میں
منید ہیں۔

مقدار خوراک : ایک قرص

طریقہ استعمال : صبح و شام پانی سے کھائیں

قانچ و لقوقہ اور ریشہ

حب لذاراتی (پکڑی کرلیاں) : اصاب کو طالت
دیتی ہیں، قانچ و

لقوقہ اور گھٹیا وغیرہ ہلکی امراض میں منید ہیں۔

مقدار خوراک : ایک گول

طریقہ استعمال : کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت
کھائیں۔

دواء المسک حار جو اہر والی : اصاب کو طالت
(دل، دماغ، جگر) کو

طالت دیتی ہے۔ وحشت اور لٹولیا میں منید ہے۔ قانچ و
لقوقہ، ریشہ وغیرہ صمبی و ہلکی امراض میں منید ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام

طریقہ استعمال : یہ دوا صبح کو ۱۲۵ ملی لٹر عرق گاؤں یا
معالج کے مغورے سے کسی چیز کے ساتھ کھائیں۔

دواء المسک حار سادہ : قانچ و لقوقہ، ریشہ
وغیرہ صمبی و ہلکی

امراض میں منید ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام

طریقہ استعمال : یہ دوا صبح کو عرق گاؤں یا ۱۲۵
ملی لٹر معالج کے مغورے سے کسی چیز کے ساتھ

خدر۔ کن بہری

معجون خدر خدر (کن بہری) کے لیے مفید ہے۔
 مقدار خوراک: ۵ گرام
 طریقہ استعمال: یہ مہون صبح یا شام دونوں وقت
 کھا کر نوپ سے پانی پی لیں۔

مانگو لیا۔ جنون (پاگل پن)

آکسیر شفا یہ جنون اور پاگل پن کی بہترین دوا
 ہے۔ اس کے استعمال سے اس مرض
 کے عوارض بہت جلد دور ہو جاتے ہیں۔ جنون جو انجمن
 ابرہہ (مسیرنی) کی وجہ سے ہو وہ بھی اس کے استعمال سے
 اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ دماغ اور اعصاب کو تسکین دیتی اور نیند
 لاتی ہے۔ خون کا دباؤ بندھ جائے (ہائی بلڈ پریشر) میں بھی
 مفید ہے۔

مقدار خوراک: ایک کپ

طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت کھا کر نوپ سے
 ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پی لیں۔

شر بہت احمد شاہ مانگو لیا میں مفید ہے، دل، دماغ
 کو طاقت دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵۰ ملی لیٹر سے ۳۵۰ ملی لیٹر تک

طریقہ استعمال: عرق کا ذرا ہاں ۱۲۵ ملی لیٹر پانی میں
 ملا کر پیئیں۔

معجون شجاح مانگو لیا اور دوسرے سوداوی
 امراض میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک

طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت دودھ سے
 کھائیں۔

کشتہ ہڑتال ورقتی قلع و قعد، رشتہ و جع محاسن (مضیا) ہلکی کھانسی

اور دھ کے لیے مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۳۰ ملی گرام یا ایک قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ شدہ خالص ۱۰ گرام میں یا بکھن یا
 ملائی میں ملا کر کھائیں۔

معجون اذراقی یہ مہون قلع و قعد، رشتہ، مضیا اور

دوسرے مسمی و ہلکی امراض میں مفید ہے۔ ہٹوں کو
 طاقت دینے کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ سردیوں کے
 موسم میں بڑے آدمیوں کو اس کا استعمال سردی کے
 نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام

طریقہ استعمال: یہ مہون کھانا کھانے کے بعد
 دونوں وقت کھائیں۔

معجون جو گراج گوگل قلع و قعد، رشتہ مضیا و غیرہ مسمی و

ہلکی امراض میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت یہ مہون
 کھا کر نوپ سے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پی لیں۔

معجون سیر جلوی خانی قلع و قعد، مضیا، نفوس، عرق النساء

و غیرہ مسمی و ہلکی امراض میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: صبح یا رات کو سوتے وقت پانی سے
 کھائیں۔

آنکھوں کی بیماریاں

تیار کیا جاتا ہے، وہائی کو بڑھاتا اور اسے آخر عمر تک قائم رکھتا ہے۔ روزانہ لگا کر لگاتے رہنے سے آنکھوں کو تمام بیماریوں سے بچاتا ہے۔
 طریقہ استعمال: صبح اور رات کو سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔

نزول الماء۔ مویا بند

کحل الجواہر جو لوہے کا کیا ہے، نزول الماء (سونا بند) میں بھی مفید ہے۔

ضعف بصارت۔ پینائی کی کمزوری

سرمد زرنگی یہ ایک بہترین سرمہ ہے، وہائی کو طاقت پہنچاتا ہے، آنکھوں کو روشن اور چمک دلوں دیتا ہے، روہے، چالے، پھولے اور داغہ کو دور کرتا ہے۔
 طریقہ استعمال: صبح اور رات کو سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔

کحل الجواہر یہ آنکھوں کو تقویت دینے والا لاجواب سرمہ ہے جتنی اجزاء سے

کان کی بیماریاں

دردوں کو تسکین دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
 طریقہ استعمال: ہرگز نہ لے کر کان کے چاروں طرف نیم گرم لگائیں۔

قلم قطرے روغن گل آٹھ قطرے میں ملا کر نیم گرم کان میں چکانیں۔ کان کے درد کو تسکین دیتا ہے۔ مشترک فائدہ رکھنے والی دونوں میں نہ کرے۔

کان کا درد

روغن ترب کان کے درد کو دور کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: روئی کی پھیری بھگو کر ۳ قطرے نیم گرم کان میں چکانیں۔

ضیاء راحت کان کے درد کو تسکین دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اعضاء کے

بہرہ پن۔ اونچا سننا

روغن سماعت کشا کم سنہ اونچا سننا اور کان بھنا
کی فکھوں میں مفید ہے۔
طریقہ استعمال: ۲-۳ قطرے نیم گرم صبح و شام کان
میں پکائیں۔

کان کا بہنا

کان بہنے کی حالت میں اطریٹل شاترہ اور صافی کا استعمال
بھی مفید ہے۔ بچوں میں "ٹوٹل ہے بی فک" بھی
فائدہ دیتا ہے۔ چائے کا ایک ایک چمچہ دن میں دو بار دیں۔

طنین و دوی (کان کی جھنجھاٹ اور جھنجھاٹ)

اطریٹل زبانی، اطریٹل کشیزی اور اطریٹل طین کا استعمال
طنین و دوی میں مفید ہے۔ کان کا بیان گذشتہ صفحات میں
ہو چکا ہے۔

کان کی پھنسیاں

مرہم کافور کان کی پھنسیوں کے لیے فائدہ
مفید ہے۔

طریقہ استعمال: نیم کے چوں کے جو شامہ ہے کان کو
دھو کر پھنسیوں پر لگائیں۔

اطریٹل شاترہ اور صافی جو فساد خون کی بیماریوں میں لکھی
گئی ہے، کان کی پھنسیوں میں بھی مفید ہے۔

کان کی کھجلی

کان کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے اندرونی طور پر
اطریٹل شاترہ اور صافی استعمال کرائیں یا قلوبم ۲
قطرے روغن گل ۵ قطرے میں ملا کر نیم گرم
پکائیں۔

ناک کی بیماریاں

طریقہ استعمال: اس تیل کے ۲-۳ قطرے نیم گرم
ناک میں پکائیں۔

قلم دوسرے فائدے رکھنے کے علاوہ ناک کی بدبو میں بھی
مفید ہے، قلم دو قطرے روغن گل ۵ قطرے میں ملا کر
صبح و شام ناک میں پکائیں، اس کا مصلح بیان مشترک
فائدہ رکھنے والی دواؤں میں درج ہے۔

ناک کی بدبو

اطریٹل زبانی، اطریٹل اسطو خوردس، اطریٹل شاترہ،
اطریٹل طین ناک کی بدبو میں مفید ہے۔ درد سر میں
لکھے چائے ہیں۔

روغن انف ناک کی تھلی کے درم اور ناک کی
بدبو کو دور کرتا ہے۔

کے لیے ایک کامیاب دوا ہے۔ نزلہ دہائی میں ہلور
ماکھڑا استعمال کیا جاتا ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ہر دہے

نزلہ وزکام کی خاص دوا ہے۔ ماکھڑا
بہن میں فائدہ دیتی ہے۔ قلعہ

تھوڑے عرصہ، لہسن، سر پکڑا، خیرہ، آناکان، تونگی
اور مہدو جگر کے درد کو دور کرتا ہے۔ نئی اور پرانی کھانسی
میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ایک گرم

طریقہ استعمال: نزلہ وزکام میں یہ دوا رات کو سوتے
وقت خیرہ، گاڑیاں، جگری جوہر والا، گرم میں ملا کر
کھائیں۔ مہدو جگر کے درد میں یہ دوا جوارش پالٹوس
گرم میں ملا کر کھائیں۔

نزلہ کو روکتا ہے، نزلہ کی کھانسی کو
ترباقی نزلہ دور کرتا ہے۔ اس کے گاجر

استعمال کرنے سے دائمی نزلہ جاہر ہوتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرم

طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت کھائیں۔

سرد دواؤں کا ایک قدیم نسخہ ہے جو

جو شامکہ ہزار سال سے کامیابی کے ساتھ

استعمال ہوتے آ رہے ہیں، یہ کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی

غرائض اور نزلہ بخار میں مفید ہے۔ ہر وقت اور ہر موسم میں

سب کے لیے یکساں مفید ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

جو شامکہ طب ہندی میں جو شامکہ کا جو نسخہ نزلہ وزکام

کے لیے مشہور ہے، جو شامکہ کا خلاصہ

(ایکٹرکٹ) ہے اس کے استعمال سے نزلہ وزکام،

کھانسی، گلے کی غرائض اور نزلہ سے پیدا ہونے والا بخار

دور ہو جاتا ہے۔

ناک کے کیڑے

اطریٹل شجرہ اور سانی کا استعمال ناک میں کیڑے پیدا
ہونے کی حالت میں مفید ہے۔

نفسیر

قرص بدش خون، قرص سابس، قرص گھبر اور کٹو غولاد
کٹو سنگ جراثیم کے استعمال سے کھیر کا طون بد ہو جاتا
ہے۔ ان کا چھان "کھٹ لدم" (خون قہو کا) میں ہو چکا ہے،
جو لوش آلو کھانے سے کھیر بد ہو جاتی ہے۔ سفوف
کب میں نہ کرے۔

نزلہ وزکام۔ انفلو انزا

اطریٹل اسطو خودوس دائمی نزلہ میں
فوسمیت سے منہ
ہے، لگا کر استعمال سے بالوں کی سیاہی کو قائم رکھتا ہے، اگر
نزلہ یا کسی بیماری کی وجہ سے ہل رات سے پہلے منہ
ہو جائی تو ان کو کچھ حالت پر واپس لاتا ہے۔ دماغ کو
فلٹات سے صاف کرتا ہے، مہدو اور آکلاں کو قوت دیتا
ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرم سے ۲۰ گرم تک۔

طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت پانی سے کھائیں۔

سلید بالوں کی حالت میں اس کے ساتھ قرص نورود ایک

دوا استعمال کریں۔

انفلو انزا عام نزلہ وزکام، نزلہ دہائی (انفلو انزا) اور

ان سے پیدا ہونے والے کھانسی، بخار

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

حب سرفہ: یہ گولیاں نزلہ کو روکتی ہیں، مطلق
عوامل اور خشک طبعہ دار کھانسی کو
دور کرتی ہیں۔

مقدار خوراک: ۲-۴ گولیاں

طریقہ استعمال: وقت ضرورت معہ میں رکھ کر ہن کا
دس پھسکیں۔

حب شفا: دائمی نزلہ و زکام کھانسی اور دھڑکن میں
منفید ہے۔

مقدار خوراک: ایک ایک گولی

طریقہ استعمال: صبح و شام پانی سے کھائیں۔

حب نزلہ: نزلہ و زکام میں منفید ہیں، نزلہ بہتا
ہو، چھینکیں آتی ہوں، اور دوسرے
سب علامات ہن کے استعمال سے دور ہو جاتی ہیں۔ صف
دماغ اور صف اصاب میں بھی ہن کے استعمال سے
فائدہ ہوتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲-۴ گولیاں

طریقہ استعمال: صبح و شام پانی سے کھائیں۔

خمیرہ خشکاش: نزلہ و زکام کو روکتا ہے، نزلہ کی
کھانسی کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ اگریم

طریقہ استعمال: صبح و رات کو سوے وقت کھائیں۔

خمیرہ نزلہ جو ابرو والا: دائمی نزلہ و زکام میں
خاص طور پر منفید

ہے، مصلحہ اصاب کو مالت و حور عام جسمانی کمزوری کو
دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ اگریم

طریقہ استعمال: صبح و رات کو کھائیں۔

ویا قوزہ: نزلہ دار (گرم نزلہ) کو بچنے کی طرف
گرسے دے دیتا ہے اور اس کی دھڑکن
کھانسی سہی ہو جس کو دور کرتا ہے، پچھروں سے ملیم
کو آسانی دے دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰-۱۵ اگریم

طریقہ استعمال: صبح و رات کو کھائیں۔

شربت بنفشہ: نزلہ و زکام اور کھانسی بخاروں
میں منفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت کسی مناسب دوا کے
جوشانہ سے یا کسی مناسب عرق یا نیم گرم پانی میں
ڈال کر پھسکیں۔

شربت صدر: نزلہ و زکام اور کھانسی میں منفید
ہے، سہل و دق اور دھڑکن میں

بھی فائدہ بخشتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: عرق گاؤں یا ۱۲۵ ملی لیٹر پانی میں
ڈال کر پھسکیں۔

شربت خشکاش: نزلہ اور نزلہ سے پیدا ہونے
والی کھانسی میں منفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: پانی میں ڈال کر پھسکیں۔

شربت فریادرس: نزلہ و زکام اور کھانسی میں
منفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: عرق گاؤں یا ۱۲۵ ملی لیٹر پانی میں
ڈال کر پھسکیں۔

کشتہ بسند: دائمی نزلہ اور کھانسی دھڑکن میں منفید ہے۔

پیدا ہونے والی شدید کھانسی میں منید ہے۔ ظلم کو خارج کرنا اور قبض کو رفع کرتا ہے، مطلق اور جزو کے درم کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک : ۱۰ گرام

طریقہ استعمال : صبح و شام نیم گرم پانی میں ملا کر پھینکے۔

لحوق معتدل نزله و زکام اور کھانسی میں فائدہ دیتا ہے۔ گرم نزله میں رقیق

رطوبت کو غلیظ کر کے خارج کرتا ہے۔

مقدار خوراک : ۱۰ گرام

طریقہ استعمال : دن میں تین بار صبح، دوپہر اور شام کھائیں۔

لحوق نزلی نزله و زکام اور ان سے پیدا ہونے والی کھانسی کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک : ۱۰ گرام

طریقہ استعمال : یہ لحوق دن میں تین بار صبح، دوپہر اور شام کھائیں۔

نزلی یہ نزله و زکام کی خاص دوا ہے۔ اس مرض میں خاص قسم کا زہر یا مادہ ناک اور مطلق کی جھلی میں

ورم پیدا کرتا ہے، پھر جھینگیں آلے لگتی ہیں اور ان مصلیوں

سے رقیق رطوبت بننے لگتی ہے، اگر اس وقت اس کا

مناسب علاج نہ کیا جائے تو اس سے طرح طرح کے

خطرناک امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں نزلی

کے استعمال سے مصلیوں کی دوری کیفیت دور ہو جاتی ہے

اور اس سے پیدا ہونے والے مضر خف زائل ہو جاتے ہیں۔

طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے۔

مقدار خوراک : ۶۰ ملی گرام یا ۲ قرص
طریقہ استعمال : یہ کشتہ خیرہ گاؤں ۱۰ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

کشتہ مرجان ساوہ نزله و زکام اور کھانسی میں منید ہے۔ دماغ اور دل کو طاقت دیتا ہے۔

مقدار خوراک : ۶۰ ملی گرام یا ۲ قرص
طریقہ استعمال : یہ کشتہ خیرہ گاؤں ۱۰ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

کشتہ مرجان جواہر والا نزله و زکام، کھانسی اور دوسرے منید ہے، ضعف دماغ اور ضعف قلب کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک : ۶۰ ملی گرام یا ۲ قرص
طریقہ استعمال : یہ کشتہ صبح سویرے نہاد معہ خیرہ گاؤں ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

لحوق سپستان نزله و زکام اور کھانسی میں منید ہے۔ کھانسی کی شدت کو کم کرتا اور ظلم کو نکالتا ہے۔

مقدار خوراک : ۱۰ گرام سے ۲۰ گرام تک
طریقہ استعمال : صبح سویرے نہاد معہ اور رات کو سوتے وقت عرق گاؤں ۱۲۵ ملی لٹریں جو شہ دے کر پھینکے۔

لحوق سپستان خیار شہری نزله و زکام اور اس کی وجہ سے

حلق کی بیماریاں

حلق کی پھنسیاں

شربت قوت سیاہ اور لہوق سیاہیں خیار صہری یہ سب دوائیں حلق کی پھنسیوں میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔

ورم لوز تھین (ٹانسلائٹس)

لہوق سیاہیں خیار صہری، مٹھا دلت، صدوری اور سعالین یہ سب دوائیں "ورم لوز تھین" میں بھی ملتی ہیں۔

خناق وبائی

جو دوائیں لوہے "ورم لوز تھین" کے لیے لکھی گئی ہیں وہ حلق وبائی میں بھی ملتی ہیں۔

درد و ورم حلق

شربت قوت سیاہ حلق کے ورم اور درد کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: صبح و شام نیم گرم پانی میں ملا کر پئیں۔

ضماد و راحت حلق کے ورم کو تحلیل کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: گے پر لگائیں اور اس پر پان گرم کر کے رکھیں اور اوپر سے ردی نیم گرم کر کے باغداد دیں۔

لہوق سیاہیں خیار صہری بھی ورم حلق میں فائدہ دیتا ہے، "تولڈو زکام" میں درج ہے۔

منہ اور زبان کی بیماریاں

ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ دو خاص طور پر مفید ہے۔ بچوں کی نقل اتارنے سے یہ عادت رائج ہو جاتی ہے، ان کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ لیکن پیدائشی لکنت میں اس کے استعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
طریقہ استعمال: ایک گرام یہ دوا صبح کو اور ایک گرام رات کو سوتے وقت زبان پر لیں۔

منہ کی بدبو

جو لڑکے جالندس، سکون لاسٹر، سکون خاص صحت کی بدبو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔

قلاع۔ منہ آنا

ذراور چھالوں والا صحت اور زبان کے زخم اور چھالوں کے لیے مفید ہے۔
طریقہ استعمال: ایک چمک دوا منہ میں چمکیں۔
قلاع صحت اور زبان کے دانوں اور چھالوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔
طریقہ استعمال: صحت اور زبان پر دہلی کی مگریری سے کھل ہلے۔

لکنت

زبان کے کسی حصے میں
دوائے لکنت جو لکنت (لکنت) پیدا

دانتوں اور مسوڑھوں کی بیماریاں

طریقہ استعمال: صبح و شام دانتوں پر لمبی اور چدرہ میں منٹ کے بعد کلی کریں۔

دانتوں کا ہلنا

سنون پوسٹ مغیلاں ہلتے ہوئے دانتوں کو ہلاتا ہے۔ ہر ایک دانت اپنی جگہ نہ چھوڑ چکے ہوں۔ مسوڑھوں کو مضبوط بناتا ہے۔

طریقہ استعمال: یہ نمک انگلی سے دانتوں پر لمبی اور چدرہ میں منٹ کے بعد کلی کریں۔

سنون مقوی دندان ہلتے ہوئے دانتوں کو مضبوط بناتا ہے۔

مسوڑھوں کو سخت کرتا ہے، ان سے خون بہنے کو روکتا ہے، اگر مسوڑھے گل گئے ہوں تو ان کو درست کرتا ہے۔ طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت دانتوں پر مل کر سور ہیں یا صبح کو دانتوں پر لمبی اور آدھ گھنٹے کے بعد کلی کریں۔

پائریا

اکسیر پائریا اکسیر پائریا ۱۵ چیزوں پر مشتمل ہے، (۱) نمک (۲) کلی کی روں نمک ایسے اجزاء سے بنایا گیا ہے جو پائریا کے زہر لیے مادے کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور مسوڑھوں کو پیپ سے پاک صاف کرنے اور مزید پیپ پڑنے سے محفوظ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو محفوظ کرتے اور ہلتے دانتوں کو جاتے ہیں۔ کلی کی دوا سے منہ پیپ اور گندگی سے صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نمک اپنے اثرات ابھی طرح دکھاتا ہے اور یہ خطرناک مرض بالکل دور ہو جاتا ہے۔ طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

دانتوں کا درد

سنون خاص دانتوں کے درد کو دور کرتا ہے، مسوڑھوں کی سوجن کو خفیل کرتا ہے، مسوڑھوں سے غریب طبیعت نکالتا ہے، منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے۔

اکسیر یا زیا بھی دانوں کے لئے مفید ہے۔

دانوں کا میل

سنون بجلی دانوں کو صاف کرتا اور ان کو چمکا تا ہے۔

طریقہ استعمال : صبح و شام دانوں پر ملیں۔

ہمدرد منجن دانوں کو میل کھیل سے صاف کرتا اور ان کو موتیوں جیسا چمک

دار بناتا ہے۔ نگار استعمال کرتے رہنے سے دانوں کو

غلط بیماریوں سے بچاتا اور صحیح حالت میں رکھتا ہے۔

طریقہ استعمال : روزانہ صبح و شام دانوں پر ملیں۔

ہمدرد لال منجن دانوں کو موتی جیسا چمکا تا ہے، اس کا ایسی نر حینف ایکشن

مسوڑھوں کو صحت مند رکھتا ہے اور ان سے خون بہنے کو

بند کرتا ہے، اس کے مسلسل استعمال سے دانت صحت

مند اور مضبوط رہتے ہیں۔ اور منہ کی بدبودار ہو جاتی ہے۔

طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے۔

سینے کی بیماریاں

یہ ”کھانسی“ کے زیر عنوان درج ہیں۔

آواز بیٹھ جانا

شربت توت سیاہ، لہوق آب ترب و زوالا اور سعالین کو لڑ بیٹھ جانے کے لیے مفید ہیں۔ ان کا ذکر گزشتہ صفحات میں آچکا ہے، سعالین آئندہ صفحہ پر درج ہے۔

نمونیا۔ پسلی کا درد

نمونیا، پسلی کے درد (دانت الجھب) اور سینے

کشتہ قرن الاصل

دورم جگرہ، قروح جگرہ نر خرے کی سو جن اور زخم

شربت توت سیاہ ملق کے دورم اور زخم میں مفید ہے

مقدار خوراک : ۲۰ ملی لٹر

طریقہ استعمال : یہ شربت چائے یا نیم گرم پانی میں ملا کر پیئیں۔

لہوق سہاں خیار صہری بھی دورم جگرہ میں مفید ہے جگرے کے زخموں میں سعالین بھی مفید ہیں۔

قرص گلزار ان قرصوں کے استعمال سے ہر ایک عضو کا جریان خون رک جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۳ قرص
طریقہ استعمال: صبح اور شام شربت انجبار ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر پانی سے کھائیں۔

کھانسی

اکسیر سعال چنے، جے ہوئے، ہلیم کو نکالتی اور کھانسی میں آرام دیتی ہے۔

طریقہ استعمال: ایک ٹیکے کو دو کر چار کر کے ۱۰ گرام شدہ میں ملا کر چائیں۔

دوائے سرفہ سیاہ ہلیم کھانسی میں مفید ہے، ہلیم کو خارج کرتی ہے۔

مقدار خوراک: آدھا گرام
طریقہ استعمال: یہ دوا دن میں تین بار شدہ ۱۰ گرام میں ملا کر کھائیں۔

دوائے سیاہ کیو تر والی ہلیم کھانسی اور دوسرے تمامیت مفید دوا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام
طریقہ استعمال: یہ دوا شدہ ۱۰ گرام میں ملا کر کھائیں۔

سعالین ہر قسم کی کھانسی میں مفید ہے۔
بچہروں سے ہلیم کو نکالتی ہے گلے کی نواش کو دور کرتی اور ٹیلی ہوئی آواز کو نکھلتی ہے۔
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

صدوری کھانسی کے لیے ایک زود اثر شربت ہے۔ ہر مرکب میں برگ ہانسہ اور

اپنے ذریعہ، تلی، پھول اور کوڈین فاسفیٹ بھی دوائیں شامل ہیں، جو کھانسی اور بچہروں میں ہلیم کو

کے درد میں مفید ہے۔ ہلیم کھانسی میں قائمہ دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام یا ۲ قرص
طریقہ استعمال: یہ کشتہ صبح کے وقت لعوق سینہ میں خیار شہری ۱۰ گرام میں ملا کر کھائیں اور اسی مقدار میں شام کو استعمال کریں۔

خون تھو کنا۔ قنٹ الدم

شربت انجبار ہر عضو کے جریان کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر
طریقہ استعمال: یہ شربت پانی میں ملا کر تھیں یا دوسری دواؤں کے ساتھ بطور دوائے معاون استعمال کریں۔

قرص بندش خون قنٹ الدم (خون تھو کنا) نکسیر، میٹاب میں خون، خون بواہر، خون حیض، غرضیکہ کسی بھی عضو سے خون نکلتا ہو۔ ان قرصوں کے استعمال سے بند ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۴ قرص
طریقہ استعمال: صبح و شام دونوں وقت دودھ سے کھائیں۔

قرص جابس بار بار نکسیر پھونتی ہو، کھانسی کے ذریعہ خون نکلتا ہو، میٹاب پانختہ کے ساتھ خون خارج ہو، کثرت حیض کی شکایت ہو، ان سب حالات میں ان قرصوں کے استعمال سے خون رک جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ایک قرص
طریقہ استعمال: صبح، دوپہر اور شام دن میں تین بار دودھ سے کھائیں۔

ضیق النفس - دومہ

بخور دومہ مرض دومہ میں جب کہ مریض سانس کی گلی سے بے چین ہو، بخور دومہ کے استعمال سے اس کا سانس درست ہو جاتا ہے۔

طریقہ استعمال: دو تین دیکتے ہوئے کوٹوں پر بخور دومہ ایک ہنگی ایل کر مریض کو اس دھوئیں میں سانس لینے کی ہدایت کریں، جو نمی یا دھواں سانس کے ساتھ پیچیدوں میں پہنچے گا سانس کی گلی دور ہو جائے گی۔

حب ضیق النفس یہ گولیوں دومہ کو دیا دیا جاتا ہے۔

طریقہ استعمال: ایک گولی چورا کر کے شد میں ملا کر کھائیں۔

شربت ربوی اس شربت کے استعمال سے دومہ کا درد بہت جلد رک جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت تین تین گھنٹے کے بعد لیں۔

شربت زوقا سادہ ضیق النفس (دومہ) اور کالی میں منہ ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ سے ۵۰ ملی لیٹر تک

طریقہ استعمال: یہ شربت نیم گرم پانی میں ملا کر لیں۔

شربت زوقا مرکب ضیق النفس (دومہ) اور کالی میں منہ ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ سے ۵۰ ملی لیٹر تک

طریقہ استعمال: یہ شربت نیم گرم پانی میں ملا کر لیں۔

لحوق ربوی دومہ کے علاوہ کالی کی شدہ کو کم کرتا ہے۔

دوہانے کی تکلیف، پرانے اور شدید براکٹس، زکام، بچوں کی کھال کالی اور دومہ غیرہ میں منہ ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

کشتہ ایرک سفید کالی اور دومہ کو دور کرتا ہے۔ عام جسمانی کمزوری کو دور کر بخور قوت ہوا کو جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام سے ۱۲۵ ملی گرام یا ایک سے ۲ قریب تک۔

طریقہ استعمال: یہ کشتہ شدہ اگر ام میں ملا کر کھائیں۔

کشتہ ایرک سیاہ یہ کشتہ ایرک سفید سے فائدہ رکھتا ہے لیکن اس سے

نہایت قوی لاثر ہے۔

مقدار خوراک: ۳۰ ملی گرام سے ۶۰ ملی گرام تک یا ایک سے ۲ قریب تک۔

طریقہ استعمال: یہ کشتہ شدہ اگر ام میں ملا کر۔

کشتہ ایرک کلاں یہ کشتہ کالی اور دومہ میں منہ ہے۔ عام جسمانی

کمزوری اور ضعف ہوا کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ۲ قریب

طریقہ استعمال: یہ کشتہ شدہ خالص اگر ام میں ملا کر کھائیں۔ عام جسمانی کمزوری اور ضعف ہوا کے لیے ملائی ۵۰ گرام میں ملا کر کھائیں۔

لحوق آب تربوز والہ یہ لحوق خشک کالی اور بل میں منہ ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ لحوق دن میں دو بار صبح و شام کھائیں۔

مقدار خوراک : ۵۰ گرام
 طریقہ استعمال : یہ لعوق دن میں تین بار کھائیں۔
 معجون راح المومنین خیق النفس (دوسرا) اور
 نفعان کے لیے مفید
 ہے۔ ضعف یاہ کو دور کرتی ہے۔
 مقدار خوراک : ۵ گرام
 طریقہ استعمال : دن میں دو بار صبح و شام کھائیں۔

مقدار خوراک : ۵ گرام
 طریقہ استعمال : قہوے گرم پانی میں ملا کر پلائیں۔
 لعوق خیق النفس دوسرے میں مفید ہے، ظلم
 کا ہے۔
 مقدار خوراک : ۵۰ گرام
 طریقہ استعمال : یہ لعوق دن میں تین بار کھائیں۔
 دوسرے میں فائدہ دیتا ہے، ظلم کو
 لعوق کتال خارج کرتا ہے۔

دل کی بیماریاں

جوارش آملہ عنبری بہ نسخہ کلاں یہ جوارش دل
 کی کمزوری اور
 دل کی دھڑکن کو بہت جلد دور کرتی ہے۔ دوسرے
 فائدے جوارش آملہ جیسے ہی رکھتی ہے لیکن یہ اس کے
 مقابلے میں زیادہ مفید ہے اور بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔
 مقدار خوراک : ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک
 طریقہ استعمال : صبح سویرے نادر صبح کھائیں۔
 جوارش شاہی دل و دماغ کو طاقت دیتی ہے۔
 مقدار خوراک : ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک
 طریقہ استعمال : یہ جوارش صبح سویرے نادر صبح
 کھائیں۔

ضعف قلب۔ اختلاج قلب
 (دل کی کمزوری، دل کی دھڑکن)

جوارش آملہ سادہ یہ جوارش ضعف قلب
 اور اختلاج قلب میں
 مفید ہے، دل، دماغ اور معدے کو طاقت دیتی ہے، اور دل
 دھڑکی بڑھی ہوئی گرمی کو دور کرتی ہے، تھیر کو روکتی اور
 دستوں کو بند کرتی ہے۔
 مقدار خوراک : ۵۰ گرام
 طریقہ استعمال : یہ صبح صبح سویرے نادر صبح کھائیں۔

طریقہ استعمال: یہ خیرہ کھا کر لوچ سے دودھ ۲۵۰ مل لڑائیں۔

خیرہ ابریشم شیره عتاب والا دل کی کمزوری اور
گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ قوت حافظہ اور بیانی کو
بڑھاتا ہے۔ سل دوتی کی تنگ کھانسی کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ خیرہ صبح سویرے ندرتہ کھائیں۔
خیرہ ابریشم عود مصطفیٰ والا دل و دماغ اور
دیتا ہے۔ خیالات کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ خیرہ صبح سویرے ندرتہ کھائیں۔
خیرہ صندل دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ کو
دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ خیرہ صبح سویرے ندرتہ کھائیں۔

خیرہ مروارید یہ خیرہ دل کو طاقت دیتے اور
فرحت پیدا کرنے کے لیے
مخصوص ہے۔ دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ اس کے
استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔ موتی جھرو، خسرہ اور چمک
جیسی بیماریوں میں دل اور حرارت فریخی کی حفاظت کرتا
ہے۔ ان بیماریوں کے بعد کی کمزوری اس کے استعمال سے
بست جلد دور ہو جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ خیرہ صبح و شام دن میں دو وقت
کھائیں۔

یہ دل کو طاقت دیتے اور حرارت
جواہر مرہ غریزی کو بڑھانے کے لیے طب ہوئی
کی چوٹی کی دواؤں میں سے ہے۔ عالم نزع میں جب کہ
مریض کی حرارت فریخی گھٹ جائے اور کمزوری بڑھ
جائے، اس کا استعمال حرارت انگیز اثر دکھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام ایک قرص

طریقہ استعمال: یہ جواہر مرہ دوا ملک معتدل جواہر
دلایا شدہ خالص ۵ گرام میں ملا کر کھائیں۔

یہ گولیاں دل و دماغ اور جگر کو
حسب جواہر طاقت دیتی ہیں، حرارت فریخی
کی حفاظت کرتی ہیں، بیماری سے اچھا ہونے کے بعد
کی عام جسمانی کمزوری کو بہت جلد دور کر دیتی ہیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: صبح ندرتہ یہ گولی دوا ملک
۵ گرام میں رکھ کر کھائیں اور اوپر سے دودھ ۲۵۰
مل لڑائیں۔

خیرہ ابریشم سادہ دل و دماغ کو طاقت دیتا
ہے، دھڑکن اور گھبراہٹ
کو دور کرتا ہے، آنکھوں کی بیانی کو بڑھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ خیرہ صبح سویرے ندرتہ کھائیں۔
خیرہ ابریشم حکیم ارشد والا یہ خیرہ دل کی
کمزوری کو دور

کرنے کے لیے خاص طور پر منبہ ہے۔ دل کی دھڑکن،
گھبراہٹ اور خیالات کی پریشانی کو بہت جلد دور کر دیتا
ہے۔ دماغ اور جگر کو بھی طاقت دیتا ہے اور بیماریوں
کے بعد کی عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے کی خصوص

مقوی دوا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

خمیرہ مروارید خاص اس خمیرہ کے وہی
قائدے ہیں جو خمیرہ

مروارید کے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن یہ خمیرہ اس سے زیادہ
قوی اثر ہے اور اپنے اثرات جلد دکھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام سے ۵ گرام تک

طریقہ استعمال: یہ خمیرہ دن میں دو بار صبح و شام یا بوقت
ضرورت استعمال کریں۔

خمیرہ مروارید بہ نسخہ کلاں یہ خمیرہ بھی
پہلے خمیرے

سے زیادہ قائدے رکھتا اور قوی اثر دکھاتا ہے۔ دل کی
کنزوری سے دل دھڑکتا ہو یا گھبراہٹ رہتی ہو، اس
خمیرے کے استعمال سے بہت جلد دور ہو جاتی ہے، عام
جسمانی کنزوری کو دور کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام سے ۵ گرام تک

طریقہ استعمال: یہ خمیرہ صبح و شام یا بوقت ضرورت
کھائیں۔

خمیرہ مرکب دل و دماغ کی کنزوری اور عام
جسمانی کنزوری کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: صبح کو دودھ کے ساتھ یا پھر دودھ کے
کھائیں۔

دواء المسک بار و جواہر والی گرم مزاجوں میں
دل کو طاقت

دینے کے لیے نہایت مفید ہے، دل کی دھڑکن اور
گھبراہٹ کو دور کرتی ہے، دماغ اور جگر کو بھی طاقت
دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ دواء مسک صبح سویرے خدار مح

کھا کر لو پھر سے عرق گاڑنا ۱۲۵ ملی لیٹر لیں۔

دواء المسک بار و سادہ گرم مزاجوں کے

دل کو قوت دیتی
اور فرحت بخشتی ہے۔ دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ کو دور
کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ دواء مسک صبح سویرے خدار مح
کھا کر لو پھر سے عرق گاڑنا ۱۲۵ ملی لیٹر لیں۔

دواء المسک معتدل جواہر والی یہ عام معوی

کی تقویت کے لیے مخصوص ہے، دل کو طاقت دے کر
بدن میں دور امن خون کو چیر کرتی ہے، دل کی دھڑکن اور
گھبراہٹ کو دور کرتی ہے، خون کی پیدائش کو بڑھاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ دواء مسک صبح کو یا صبح و شام دونوں
وقت کھائیں اور لو پھر سے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ لیں۔

دواء المسک معتدل جواہر والی خاص لوہے کی

دواء مسک جیسے صفات رکھتی ہے لیکن اس سے زیادہ قوی
اثر ہے اور اپنا اثر بہت جلد دکھاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ دواء مسک صبح کو یا صبح و شام دونوں
وقت کھائیں اور لو پھر سے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ لیں۔

دواء المسک معتدل سادہ عام معوی قلب

و جسم ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ دواء مسک صبح کو یا صبح و شام
دونوں وقت کھائیں اور لو پھر سے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ لیں۔

اور بھوک لگتا ہے۔ صرلوی دستوں، حتیٰ اور تے کو روکتا ہے۔ صرلوی بخاروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ سے ۵۰ ملی لیٹر تک

طریقہ استعمال: یہ شربت کسی عرق یا پانی میں ملا کر پئیں۔

شربت انگور شیریں دل کو قوت و فرحت دیتا ہے، کسی قدر لین تاخیر رکھتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی لیٹر تک

طریقہ استعمال: یہ شربت کسی عرق یا پانی میں ملا کر پئیں۔

شربت بھی دل کو قوت و فرحت بخشتا ہے، صرلوی اور آنکھوں کو طاقت دیتا ہے، رتے اور دستوں کو روکتا ہے، صرلوی کی زیادتی کو گھٹاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت عرق گاؤں یاں ۱۲۵ ملی لیٹر پانی میں ملا کر پئیں۔

شربت صندل گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، بکر اور صرلوی کی گرمی کو تسکین دیتا ہے، گرمی کے دور کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت نصفے پانی میں ملا کر پئیں۔

شربت کیوڑہ دل کو قوت و فرحت بخشتا ہے، دل کی گھبراہٹ اور دھڑکن کو دور کرتا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت نصفے پانی میں ملا کر پئیں۔

سٹوف قضہ دل کو قوت و فرحت بخشتا ہے، دل کی گھبراہٹ اور دھڑکن کو دور کرنے کے لیے نہایت مفید دوا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام

طریقہ استعمال: یہ سٹوف صرلوی یا قوتی مسئل یا دوام ایک مسئل جو ہر دلی ۵ گرام میں ملا کر صبح سویرے کھائیں۔

شربت آملہ آملہ کے دوائی خواص اور ملائی افادیت دینی طبوں میں

صدیوں سے مسلم ہے۔ ہر روز آملہ پر طویل مدت میں مسلسل سائیکلک ریسرچ کے بعد تازہ آملوں کا املا سوار کا شربت تیار کیا ہے۔ یہ شربت دل، صرلوی اور حافظہ کو طاقت دیتا ہے۔ صرلوی بکر کی گرمی ہوئی گرمی اور صرلوی کو احوال پر لاتا ہے۔ گھبراہٹ اور پیاس کو دور کرتا ہے اور گرمی کے دستوں کو روکتے ہیں۔

مقدار خوراک: ۳۰۰ ملی لیٹر (دو بڑے چمچے)

طریقہ استعمال: صبح و شام دونوں وقت استعمال کریں۔ آٹھ سال کی عمر کے بچوں کو چھائی خوراک اور اس سے بڑے بچوں کو آدھی خوراک دی جائے۔ گھبراہٹ اور پیاس وغیرہ بھی شکایت میں اس شربت کی ایک خوراک بروقت دی جائے۔

شربت انار شیریں دل اور بکر کو طاقت دیتا ہے، فرحت بخشتا ہے اور پیاس کو بجھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی لیٹر تک

طریقہ استعمال: یہ شربت پانی میں ملا کر پئیں۔

شربت انار ترش دل کو قوت و فرحت بخشتا ہے، صرلوی کو قوت دیتا ہے۔

شربت گلاب دل کو قوت و طرح بخشنے اور
دھڑکن و گھبراہٹ کو دور
کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت غصے پانی میں ملا کر
پئے۔

عرق الالچھی معوی قلب اور مطرح ہے،
معدے کو طاقت دیتا ہے، قندہ اور
ہیڈ میں استعمال کیا جاتا ہے، حلی اور تے کو روکتا ہے۔
مقدار خوراک: ۵۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت دونوں وقت صبح و شام
شربت ہارنچ یا شربت لیوں ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر پئے یا
بلیہ شربت کے پئے۔

عرق عنبر دل کو طاقت دیتا اور طرح بخشتا ہے،
اس کے طعم بکر اور معدے کو بھی
طاقت دیتا ہے، حلی کو دور کرتا ہے۔ عام جسمانی کمزوری
کو رفع کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق شربت نار ۱۵ ملی لیٹر میں
ملا کر پئے۔

شربت کیوڑہ دل کو تقویت اور طرح کے
لے بہترین دوا ہے۔ گھبراہٹ کو
دور کرتا ہے اور پیاس کو بجھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: عرق کیوڑہ میں شربت صندل ۱۵
ملی لیٹر ملا کر پئے۔

عرق گاؤڑیاں دل کو قوت و طرح بخشتا ہے،
دماغی بیماریوں میں مفید ہے،

پیاس کو بجھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق شربت کیوڑہ ۲۵ ملی لیٹر میں
ملا کر پئے۔

عرق گزر سادہ دل کو قوت و طرح بخشتا
ہے، دل کی دھڑکن اور

گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق شربت صندل ۲۵ ملی لیٹر میں
ملا کر پئے۔

عرق گلاب دل کو قوت دینے اور طرح بخشنے
کے لیے خوب ہے، دل کی دھڑکن
اور گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ دماغ، معدہ اور بکر کی

بیماریوں میں بھی مفید ہے، مری کو تسکین دیتا اور پیاس کو
بجھاتا ہے۔ حلی کی حالت میں نہایت مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق شربت صندل ۱۵ ملی لیٹر میں
ملا کر پئے۔

قرص فضا ضعف قلب اور اختلاج قلب
(دھڑکن) کو دور کرتے ہیں،

ضعف دماغ میں بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک: ایک ٹیبلٹ

طریقہ استعمال: خیرہ گاؤڑیاں تھری جو لہر والا ۵ گرام
میں رکھ کر وقت ضرورت کھائیں۔

کشتہ زہر عمرہ دل کو قوت و طرح بخشتا ہے،
دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ کو

دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام یا ٹیبلٹیں

طریق استعمال: غیر مرادہ گرم میں رک کر کھائیں۔

کشتہ حقیق دل کو حالت دہا ہے، انقباض قلب (دل کی دھڑکن) اور وحشت (گھبراہٹ) کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰۰ ملی گرام یا انکسیر
طریق استعمال: پیکٹنگ سے پہلے دہا سے غیر مرادہ گرم میں رک کر کھائیں۔

کشتہ نقرہ دل و دماغ اور جگر کو حالت دہا ہے۔
دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰۰ ملی گرام یا انکسیر
طریق استعمال: پیکٹنگ سے پہلے دہا سے غیر مرادہ گرم میں رک کر کھائیں۔
قوت دہا کے لیے خوب کھو۔
گرم میں رک کر کھائیں، دہا سے دہا نکلیں۔

کشتہ یا قوت دل و دماغ کو حالت دہا اور فرحت بخشتا ہے۔
مقدار خوراک: ۱۰۰ ملی گرام یا انکسیر

کشتہ یشب دل کو قوت و فرحت بخشتا ہے۔
دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰۰ ملی گرام یا انکسیر
طریق استعمال: پیکٹنگ سے پہلے دہا سے غیر مرادہ گرم میں رک کر کھائیں۔

مفرح اعظم دل کو قوت دہا اور فرحت بخشتا ہے۔ دماغ، جگر اور سب کو حالت دہا ہے۔
مقدار خوراک: ۵ گرم

طریق استعمال: یہ طریق کجاہدہ دہا کھائیں۔
مفرح ہار و جواہر والی دل و جگر کی دہا دہا کریں کہ دور کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرم
طریق استعمال: یہ طریق کجاہدہ دہا کھائیں۔
مفرح ہار و سادہ دل کو فرحت دہا دہا کرتی ہے۔
مقدار خوراک: ۵ گرم

طریق استعمال: یہ طریق کجاہدہ دہا کھائیں۔
مفرح شیخ الرئیس یہ طریق عام ہستی کردہ دہا و صفت قلب کو دور کرنے کی جیب دہا دہا ہے۔
دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ کو دور کرتی ہے۔
دل و دماغ کو دہا دہا کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرم
طریق استعمال: یہ طریق عجاذ کی عرق دہا دہا کرتی ہے۔

مفرح شاہی فرحت بخشتی اور تجلہ کو دور کرتی ہے۔
کری کے دستوں کو دور کرتی ہے۔
مقدار خوراک: ۵ گرم

طریق استعمال: یہ طریق کجاہدہ دہا کھائیں۔
مفرح حیا قوتی معتدل یہ طریق دہا دہا کی طریق ہے۔

کروڑی کو دور کرتی اور دل کو خاص طور پر قوت بخشتی ہے۔
دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ کو دور کرتی ہے۔ دماغ اور جگر کو حالت دہا دہا کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرم
طریق استعمال: یہ طریق کجاہدہ دہا کھائیں۔

دوسرے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پئیں۔

غشی

غشی میں دواء المک معتدل جوہر والی، دواء المک معتدل سادہ، عرق حمر، عرق کلاب کا استعمال مفید ہے، ان کا بیان گذشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔ دواء المک کو عرق حمر یا عرق کلاب میں گھول کر چمچ سے مریض کے منہ میں ڈالیں اور عرق کلاب چمچ سے پینے کیس۔

خون کا دباؤ۔ ہائی بلڈ پریشر

اسرو فین اسرو فین خون کا دباؤ بڑھ جانے (ہائی بلڈ پریشر) کی تکلیف کے لیے ایک معجزین دوا سمجھا جاتی ہے، اس کے علاوہ یہ صمبھا تھلاؤس ٹینش کو مافاتی پیمانہ، جنون (پاگل پن) اختلال ارحم (مسمیہ) مریگی اور تھینہ آنے کی شکایت کو بھی دور کر دیتی ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

آج کل خون کا دباؤ بڑھ جانے (ہائی بلڈ پریشر) کا ایک خاص سبب یہ ہے کہ بدن کے بعض غدود (کھاد، گردہ، اور غدود نظامیہ) کے انجیل میں عیڑی آ جانے سے ان کی خاص رطوبت زیادہ مقدار میں رسنے لگتی ہے جو طون میں شامل ہو کر اس کے دباؤ کو بڑھا دیتی ہے، اس کے استعمال سے ان غدود کا فضل

حالت اعتدال پر آ جاتا ہے اور خون کا دباؤ بڑھ جانے والی رطوبت کی پیدائش کم ہو جاتی ہے، نیز طون کی رگوں میں ٹپک پیدا ہو جاتی ہے۔ فرنیٹک تریاق نظر اس مرض کی خاص دوا ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

خون کے دباؤ کا کم ہو جانا۔ لو بلڈ پریشر

جب خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے تو عام جسمانی کمزوری بڑھ جاتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، اگر کام کیا جاتا ہے تو جلد ہی تھکن پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر سستی اور خنودگی چھائی رہتی ہے۔ ایسی حالت میں کشتہ فولاد، کشتہ طلا، دواء المک معتدل جوہر والی، مجنون اور وائی، حب حمر موسمیائی اور مادہ اللعہود آکسہ کا استعمال مفید ہے۔

خون کے سفید دانے

حب مسین بعض اوقات خون کی کمیادی ترکیب میں خلل پڑ جاتا ہے، خون کے سفید دانوں (اسٹونیل) کی تعداد حالت اعتدال سے بڑھ جاتی ہے اور اس صورت میں سانس بھی سے آنے لگتا ہے اور کھانسی ستانے لگتی ہے۔ ان حالات میں ان گولیوں کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: صبح کو بکاشا کھانے کے بعد کھائیں۔

معدے کی بیماریاں

ضعف معدہ

چھول بد ہضمی، کھٹی ذکاریں، پیٹ میں اچھاڑ،
بچے میں چلن، حلی، بھوک کی کمی، پیٹ
کا درد اور کھانا کھانے کے بعد طبیعت کی سستی آپ سے
چھول کے استعمال کا تقاضہ کرتی ہے۔ چھول معدہ کی تمام
فکالتوں کو جیزی سے دور کرتی ہے اور اس کا اثر دیر تک
کاظم رہتا ہے۔
طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے۔

جوارش انارین گرم مزاجوں کے معدے اور جگر
کو طاقت دیتی ہے۔ بھوک لگاتی
ہے، مضرہ کی زیادتی کو کم کرتی اور حلی، تے کو روکتی ہے۔
مقدار خوراک : ۱۰ گرام

طریقہ استعمال : یہ جوارش صبح کو یا شام کے وقت کھائیں۔
جوارش پودینہ ولایتی معدے اور جگر کو
طاقت دیتی ہے، حلی،
تے اور پی کی روکتی ہے۔

مقدار خوراک : ۱۰ گرام
طریقہ استعمال : صبح اور شام دونوں میں دو بار کھائیں۔

جوارش جالینوس معدہ، جگر، آنکھوں اور مثانہ
کو طاقت دیتی ہے، غذا کو
ہضم کرتی اور بھوک بڑھاتی ہے، ریح کو تحلیل کرتی اور
بھوک خوب لگاتی ہے، منہ کی بد بو کو دور کرتی ہے،
بچہ کی زیادتی کو روکتی ہے، ہلکی کھانسی اور بواہر میں
مفید ہے۔ گردہ و مثانہ میں بار بار پتھری پید ا ہونے کی
صورت میں اس کے استعمال سے پتھری کی پیدائش رک
جاتی ہے۔ اگر بال وقت سے پہلے مفید ہو جائیں تو اس سے
لگاتار استعمال سے وہ کچھ حالت میں آجاتے ہیں۔

مقدار خوراک : ۱۰ گرام سے ۲۰ گرام تک
طریقہ استعمال : کھانا کھانے کے بعد دو گھنٹے یا
کے ساتھ کھائیں۔

جوارش زرغونی سادہ معدہ، جگر، آنکھوں
اور مثانہ کو قوت دیتی
ہے۔ تھکے اور بد ہضمی میں مفید ہے۔

مقدار خوراک : ۱۰ گرام سے ۲۰ گرام تک
طریقہ استعمال : یہ جوارش صبح یا رات کو کھائیں۔

جوارش نذرغونی عنبری بہ نسخہ کلاں دماغ، معدہ،
آنکھوں اور گردہ

جوارش عود ملین محصے کو قوت دیتی ہے
اور قبض دور کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام
طریقہ استعمال: یہ سبوں صبح کو نیم گرم پانی سے
کھائیں۔

جوارش قرطم محصے کو تقویت بخشتی ہے،
قبض کو دور کرتی ہے، عیاشاب
لائی اور جیش جاری کرنے میں مدد دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام
طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح سویرے صاف صبح
کھائیں۔

جوارش مصطلی محصہ، بجر اور آنکوں کو
طاقت دیتی ہے، محصہ اور
آنکوں کی کمزوری سے دست آورے ہوں تو ان کو روکتی
ہے، صبح سے رات پہنے کو بند کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک
طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح اور شام کھائیں۔

جوارش مصطلی بہ نسخہ کلاں محصے، آنکوں اور
بجر کو قوت دیتی ہے،

محصے اور آنکوں کی کمزوری سے آنے والے
دستوں اور صبح سے پہنے والی رات کو روکنے کے لیے نہایت
منفد ہے، تھیر کو روکتی اور عیاشاب کی زیادتی کو دور کرتی ہے
۔ جوارش مصطلی سادہ سے زیادہ قوی الاثر ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام
طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح و شام کھائیں۔

حبوب مقوی محصہ یہ گاہیں محصہ، بجر
اور آنکوں کو طاقت
دینے کے لیے نہایت منفد ہیں، غذا کو ہضم کرتی، بھوک

دینے کو طاقت دیتی ہے، دور و کمر کو دور کرتی اور پشت کو
منہبہ کرتی ہے۔ مادہ تولید پیدا کرتی اور قوت باہ کو بڑھاتی
ہے۔ عیاشاب کی زیادتی، بلیغی کھانسی اور نقرس میں فائدہ
پہناتی ہے۔ رباع کو خارج کرتی اور بالوں کی سیاہی کو قائم
رکھتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام
طریقہ استعمال: محصہ، بجر اور گردہ و مثانہ کی تقویت
کے لیے یہ جوارش قرص فولاد ایک عدد کے ساتھ
کھائیں اور گردہ و مثانہ کی تقویت اور بلیغی کھانسی کیلئے یہ
جوارش قرص مذکور ایک عدد کے ساتھ استعمال کریں۔

جوارش زنجبیل محصے کو طاقت دیتی ہے، غذا
لگاتی ہے، رباع کو خارج کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام
طریقہ استعمال: یہ جوارش دونوں وقت کھانا کھانے
کے بعد کھائیں۔

جوارش عود ترش محصے کو قوت دیتی ہے،
بھوک لگاتی ہے۔ غذا کو
ہضم کرتی ہے، مغز کی زیادتی میں خاص کر مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام
طریقہ استعمال: دونوں وقت کھانا کھانے کے بعد
کھائیں۔

جوارش عود شیریں محصے کو تقویت
بخشتی ہے، غذا کو ہضم
کرتی اور بھوک لگاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام
طریقہ استعمال: یہ جوارش کھانا کھانے کے بعد
کھائیں۔

کافی اور ریح کو خارج کرتی ہیں اور آغوش سے فضلات کو نکالتی ہیں۔

مقدار خوراک : معمولی

طریقہ استعمال : کھانا کھانے کے بعد دو دنوں وقت کھائیں۔

زخمیلا
سودہ کو ٹھیک رکھتی ہے اور قوت ہضم کو بڑھاتی ہے۔ ورزش یا جسمانی محنت کے کام

کرنے سے اور زیادہ عمر میں سودہ اور آغوش کا فصل سے ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں بھوک کم گئی ہے۔ کھانا

وقت پر ہضم نہیں ہو سکتا اور دوسری کئی تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وغیرہ میں کام کرنے والے اور زیادہ عمر کے لوگ

عام طور پر غریبی ہضم اور سودہ کی دوسری تکلیفوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ زخمیلا ایسے لوگوں کے لیے مفید سمیت سے

منفید ہے۔ زخمیلا خواہش کے لیے صلی کے دنوں کی مٹی اور تے کی فکایت کو بھی دور کرتی ہے۔

طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے
سفوف نعناع
سودے کو طاقیت دیتا ہے ،

بھوک لگاتا ہے۔
مقدار خوراک : ۳ کرم

طریقہ استعمال : یہ سفوف کھانا کھانے کے بعد کھائیں۔
سفوف نمک شیخ الرئیس

کرم حبوب کے سودے کو قوت دیتا ہے ، بھوک لگاتا اور غذا کو ہضم کرتا ہے۔ مٹی اور تے

کو روکتا ہے۔
مقدار خوراک : ۳ کرم

طریقہ استعمال : یہ سفوف بعد غذا دو دنوں وقت کھائیں۔
شربت زخمیلا

سودے کو قوت دیتا اور غذا کو ہضم کرتا ہے۔

مقدار خوراک : ۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال : یہ شربت کھانے کے بعد دو دنوں وقت

کھائیں۔
شربت مانخواہ
سودے کو طاقیت دیتا ہے اور

بھوک لگاتا ہے۔
مقدار خوراک : ۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال : یہ شربت پانی ۱۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر

کھائیں۔
عرق اجوائن
سودے کو طاقیت دیتا ہے ، بھوک

لگاتا اور ریح کو خارج کرتا ہے۔
ٹہنی بخاروں میں فائدہ دیتا ہے۔

مقدار خوراک : ۵۰ ملی لیٹر
طریقہ استعمال : یہ عرق صبح اور شام دونوں وقت

کھائیں۔ اگر اس میں ۱۵ ملی لیٹر شربت مانخواہ ملا کر کھائیں تو

زیادہ قوی اثر ہو جاتا ہے۔
عرق بادیان
بکر ، سودہ اور آغوش کی بیماریوں

میں استعمال کیا جاتا ہے ،
سودے کو طاقیت دیتا اور ریح کو خارج کرتا ہے۔

مقدار خوراک : ۱۲۵ ملی لیٹر
طریقہ استعمال : صبح اور شام دن میں دو بار کھائیں۔

عرق پودینہ
سودے کو طاقیت دیتا ہے ، غذا

کو ہضم کرتا ہے ، بھوک لگاتا ہے۔
عرق پودینہ
سودے کو قوت دیتا ہے

بھوک لگاتا ہے اور غذا کو

ہضم کرتے ہیں۔ ریاح کو خارج کرتے ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ ٹکیاں

طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت کھائیں۔

معجون مقوی معدہ یہ معدے کے طبقات

کو قوت دیتی ہے، ہضم اور جذب غذا کے نظام کو درست کر کے بھوک خوب لگاتی ہے، قبض کو دور کرتی ہے، جگر کو بھی تقویت بخشتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵-۵ گرام

طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے میں منہ بعد دونوں وقت پانی سے کھائیں۔

معجون ناشخوہ یہ معجون معدے کو قوت دیتی ہے، غذا کو ہضم کرتی اور بھوک لگاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت کھائیں۔

نمک جالینوس معدہ اور آنتوں کو طاقت دیتا ہے اور معدے کی اس

رطوبت کی پیدائش کو بڑھاتا ہے جو ہضم غذا میں مدد دیتی اور بھوک لگاتی ہے، اس کے علاوہ اس نمک کے استعمال سے دائمی قبض دور ہو جاتا ہے اور ریاح خارج ہونے لگتے ہیں۔ بدن میں صاف خون کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۲ ٹکیاں

طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت کھائیں۔

نمک سلیمانی معدے کو قوت دیتا ہے، غذا کو

ہضم کرتا اور بھوک خوب لگاتا ہے۔ یہ معدے کے ریخی درد کو دور کرتا اور ریاح کو خارج کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ایک گرام سے تین گرام تک۔

طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت کھائیں

نمک مرگائنگ معدے کو طاقت بخشتا اور بھوک لگاتا ہے، پیٹ کی گرانی اور ریاح کو دور کرتا ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ایک قرص طریقہ استعمال: یہ نمک پاس کا ایک قرص جوارش

سہا ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

نوشدار و سادہ معدے اور آنتوں کو طاقت دیتی ہے اور ان کی کمزوری سے جو دست آہاتے ہیں ان کو روکتی ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام طریقہ استعمال: یہ نوشدار و صبح کو نہار منہ کھائیں۔

نوشدار و لولوی معدہ، جگر اور آنتوں کو طاقت دیتی ہے، دل کو

قوت و فرحت بخشتی ہے، دھڑکن اور گھبراہٹ کو دور کرتی ہے، دستوں کو روکتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام طریقہ استعمال: صبح سویرے نہار منہ کھائیں۔

درد معدہ

معدہ اور آنتوں کے ریخی درد کو جوارش کمونی روکتی ہے، ریاح کو خارج کرتی

اور قوت ہضم کو بڑھاتی ہے، ٹھنڈیوں کو روکتی ہے، قبض کو دور کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک۔

طریقہ استعمال: دونوں وقت کھانے کے بعد کھائیں۔

جوارش کمونی اکبر

معدے کی غلاب و طوچوں
اور دیاج کو خارج کرتی اور
معدے کے درد کو تسکین دیتی ہے، ہاضمہ کو درست رکھتی
اور قبض کو رفع کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک

طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح کو یا کھانے کے بعد
دونوں وقت کھائیں۔

جوارش کمونی کبیر

معدے کے درد اور توج
رنگی کو دور کرتی ہے،
دیاج کو خارج کرتی اور غذا کے ہضم میں مدد دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک

طریقہ استعمال: صبح کو یا بوقت ضرورت کھانے
کے بعد پانی سے کھائیں۔

جوارش کمونی مسہل

معدے اور آنتوں کو
فضلات سے پاک
صاف کرتی اور ان کو طاقت پہنچاتی ہے اور ان کے دردوں
کو دور کرتی ہے، معدے میں تھوک زیادہ پیدا ہوتا ہو یا رمل
ہو یا جوارش کے استعمال سے یہ شکایت دور
ہو جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح سویرے ہمارے معدے میں
ہادیان پہنچاتی ہے کھائیں۔ قبض کو دور کرنے کے لیے
۱۰ گرام استعمال کریں۔

یہ گولیاں معدے اور آنتوں کے درد

حسب طبیعت کو دور کرتی ہیں، ہیضہ کے نفاذ میں

ان کا استعمال ہیضہ کے اثرات سے بچاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: صبح اور شام کھانے کے بعد
کھائیں۔

حب خلطیت

معدے اور آنتوں کے درد کو
دور کرتی ہیں، دیاج کو خارج
کرتی ہیں اور بھوک لگاتی ہیں۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: کھانے کے بعد یا ضرورت کے
وقت کھائیں۔

سفوف الالملاح

ہیضہ کے رنگی درد کو دور
کرنے کے لیے حمایت مفید
ہے، درد توج کو دور کرتا ہے، غذا کو ہضم کرتا اور بھوک
خوب لگاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵۰ ملی گرام سے ۵۰۰ ملی گرام تک

طریقہ استعمال: یہ سفوف بوقت ضرورت یا کھانے
کے بعد جوارش کمونی ۱۰ گرام میں ملا کر کھائیں۔

سفوف برق

ہیضہ کے رنگی درد کو دور کرتا اور
دیاج کو خارج کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ایک گرام

طریقہ استعمال: یہ سفوف بوقت ضرورت کھائیں یا
کھانے کے بعد دونوں وقت استعمال کریں۔

قرص خلطیت

ہیضہ کے رنگی درد کو دور کرتے
ہیں، دیاج کو خارج کرتے اور
بھوک لگاتے ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ گرام

طریقہ استعمال: بوقت ضرورت یا کھانے کے بعد
دونوں وقت کھائیں۔

کھنی نکار میں آتی ہوں اور سجدے، طلق اور پہنے میں ملن
معلوم ہوتی ہو تو ان حالات میں ان قرصوں کے استعمال
سے فائدہ ہوتا ہے۔
مقدار خوراک: ۲ ٹکیاں
طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت
کھائیں۔

مستکی اور قے

جولش تمر ہندی صغروی دستوں اور حلی کو روکتی ہے، صغروی مزاج اشخاص کے معده اور جگر کو حالت دہی اور بھوک لگاتی ہے، گرمیوں اور ہیشہ کے زمانے میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔
مقدار خوراک : ۱۰ اگر ام
طریقہ استعمال : کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت کھائیے۔
روغن الاچھی یہ روغن تھکے، صغریٰ اور دستوں کو روکتا ہے۔
مقدار خوراک : ۳ یا ۵ قطرے
طریقہ استعمال : یہ روغن عرق گلاب ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر لیں۔
سنگبین ساوہ حلی اور تھکے کو روکتی ہے، صغروی بخاروں میں مفید ہے۔
پیس میں تسکین دیتی ہے۔
مقدار خوراک : ۲۵ ملی لیٹر
طریقہ استعمال : عرق گاؤں ۱۲۵ ملی لیٹر یا سادہ پانی میں ملا کر لیں۔

چھوٹا، سلف تک سلیٹی، سلف تک فلج
ہر نہیں، سلف خلع، قرص پودہ، مہون مہوی
مہود، مہون مہول، تک جالندس، تک
مرگاف وچ سب مہودے کے درویش مہود ہیں۔
مہود مہود کے زیر عنوان بیان ہو چکے ہیں۔

بدین معنی

حب ترش مٹھی کرتی ہیں، غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتیں اور بھوک خوب لگاتی ہیں، دماغ کو خارج کرتی ہیں۔

مقدار خوراک : ۲ گولیاں
طریقہ استعمال : دونوں وقت کھانا کھانے کے بعد
کھائیں۔

عرق نعناع
 پر ہنسی کو دور کرتا ہے ، غذا کو
 ہضم کرتا اور بھوک لگاتا ہے ۔
 اور علی کو روکتا ہے ۔

مقدار خوراک: ۸۰ فی لیٹر
طریقہ استعمال: یہ مرق سبجین ۲۵ فی لیٹر میں ملا کر
کھلا

عرق ہاضم
 ہر پانی، دودھ، گوشت اور بیج
 میں مفید ہے۔
 مقدار خوراک : ۵۰ ملی لیٹر
 طریقہ استعمال : یہ عرق کھانا کھانے کے بعد دونوں
 وقت لیں۔

قرص الکی جب معدے میں غذا کے انجی طرح ہضم نہ ہونے کی وجہ سے

میں بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: رات کو سوئے وقت پانی سے پھلک لیں۔

جوارش کموگی: معدہ اور آنتوں کی کمزوری سے

آنے والے دستوں اور پیچش

کے لیے مفید ہے۔ ریاضی و رد کو دور کرتی اور پیچشوں کو روکتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ سے ۱۰ گرام تک

طریقہ استعمال: دونوں وقت کھانا کھانے کے بعد پانی

سے کھائیں۔

تخمہ کے تے دستوں کو روکنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ

دست لانے میں مدد دیں۔ مثلاً جوارش سر جلی مسلسل

۵ گرام کھلا کر سوڈا واٹر یا عرق پادیند اور عرق الہیچ

پلائیں۔ قلم اور عرق کافور استعمال کریں جب تے دست

آکر معدہ اور آنتیں صاف ہو جائیں تو تقویع معدہ کے

لیے جوارش کونی، جوارش زنجبیل جیسی دوائیں دیں۔

ہیضہ

قلزم دوائی بیماریوں کے دلوں میں، خاص کر برسات

میں ہیضہ بد ہضمی کی شکایت سے بچنے کے

لیے اس کا استعمال بے حد ضروری ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

مقوی معدہ، مہونہ انخول، تنک سلیمانی، تنک مرگامک، یہ

سب دوائیں بھوک لگاتی ہیں۔ ان کا بیان ”ضعف معدہ“

وغیرہ کے ذریعہ عنوان ہو چکا ہے۔

پھکی

جوارش کونی، مہونہ انخول، حب طلیع، جعول، قرص

طلیع، یہ سب دوائیں پیچش میں مفید ہیں اور گزشتہ

مکات میں درج ہو چکی ہیں۔

تبخیر

قرص افق، جوارش آلم، جوارش جالینوس، جوارش عود

شیریں، جوارش طہشیر، جوارش معطلی بہ لسنہ کلاں، مہونہ

مقوی معدہ، نوشدارو سادہ اور نوشدارو لولوی معدہ کی

تبخیر کو روکتی ہیں، ان کا بیان ”ضعف معدہ“ کے ذریعہ

عنوان ہو چکا ہے۔

تخمہ۔ بد ہضمی کے دست و تے

پرانے دستوں اور پیچش میں مفید ہے۔

اس کے استعمال سے معدہ اور آنتوں کا

ورم دور ہو جاتا ہے۔ رنگی درد اور مردگی شکایت

اندمانی

جگر، پتہ اور تلی کی بیماریاں

ورم و عظم جگر

جو ہر نوشادور عظم جگر (جگر کا بڑھ جانا) میں مفید ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ ملی گرام

طریقہ استعمال: میون دیدالور ۹۰ گرام میں رکھ کر عرق نکوہ ۵۰ ملی لٹر کے ساتھ کھائیں۔

حب بکند نوشادری یہ گولیاں جگر کی بیماریوں میں خاص طور پر مفید ہیں۔

خصوصاً ورم جگر اور عظم جگر (جگر کا بڑھ جانا) میں بہت مفید ثابت ہوئی ہیں۔ غذا کو ہضم کرتی ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ گولیاں

طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت کھائیں۔

روغن افسنتین جگر اور معدے کے درمیان کو تحلیل کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: یہ تیل نیم گرم لگائیں، لوہے سے ایک ارنڈ کا پتہ اسی تیل سے چڑھ کر گرم کر کے باہر صحت۔

روغن مصطکی جگر بڑھ گیا ہو، خف ہو گیا ہو، اس روغن کے استعمال

حرارت جگر۔ جگر کی گرمی

شریت بزوری بارو جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے، پیشاب لاتا ہے۔

اور پیشاب کی جگہ کو دور کرتا ہے، جگر، گردہ اور مثانہ کی گرم بیماریوں میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ شریت معدے پانی میں ملا کر صبح کو پئیں۔

شریت بزوری جگر، گردوں اور مثانہ کی گرمی کو دور کرتا ہے اور

پیشاب لاکر ان کو صاف کرتا ہے، جگر کی گرمی سے بخار رہتا ہو تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لٹر

طریقہ استعمال: پانی میں ملا کر پئیں۔

برودت جگر۔ جگر کی سردی

جودش جالندوس، جودش مہار، جودش

شریادس، جودش مصطکی، شریت بزوری بارو جگر

کی سردی کو دور کرنے کے لیے نہایت مفید ہیں۔

ہے صبح صاف میں آجاتا ہے۔

طریقہ استعمال: پیچہ پر نیم گرم مالش کریں، لوہے سے
رڈ کا پتہ گرم کر کے ہاتھ میں۔

شریت بزوری حار جگر، گردوں اور مثانہ کی
پاریوں میں استعمال کیا

ہوتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: عرق ہادیان ۱۲۵ ملی لیٹر یا پانی میں ملا کر
کھنکھن۔

شریت دینار درم جگر، درد جگر اور استقاء میں
منفید ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت عرق ہادیان ۱۲۵ ملی لیٹر یا پانی
میں ملا کر کھنکھن۔

شریت کاسنی جگر، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے
درم، برقان، صفراء کی زیادتی
اور جگر کی بڑھتی ہوئی گرمی وغیرہ میں منفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر سے ۵۰ ملی لیٹر تک

طریقہ استعمال: پانی یا کسی مناسب عرق (۱۲۵ ملی لیٹر)
میں ملا کر کھنکھن۔

ضاد جالینوس یہ ضاد معدہ، جگر آنتوں اور
رحم وغیرہ اندرونی اعضاء کے

درم کو تحلیل کرنے کے لیے نہایت منفید ہے۔

طریقہ استعمال: ضرورت کے مطابق یہ ضاد چوبیس
سے گرم کر کے درم پر لگائیں اور لوہے سے لڑکا پتہ گرم کیا
ہو ہاتھ میں۔

عرق المستقین جگر کی سختی اور درم کو دور کرتا
ہے۔ درم جگر کے سبب بخار ہو

تو اس کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔

مقدار خوراک: ۷۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق صبح و شام دونوں وقت کھنکھن۔

عرق برنجاسف یہ عرق جگر، معدہ، آنتوں
اور رحم وغیرہ اندرونی

اعضاء کے درم کو تحلیل کرتا ہے اور ان اعضاء کی
خرابی سے آنے والے بخار کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق شربت کشوت ۲۵ ملی لیٹر میں
ملا کر کھنکھن۔

عرق کاسنی درم جگر میں منفید ہے، جگر کی
گرمی کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق شربت کاسنی ۲۵ ملی لیٹر میں
کھنکھن۔

عرق مکوہ تمام اندرونی اعضاء مثلاً جگر، معدہ
آنتوں اور رحم کے درم کو تحلیل

کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی گرمی کو تسکین
دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق، شربت کاسنی ۲۵ ملی لیٹر میں
ملا کر کھنکھن۔

معجون دبید الورود درم جگر، درم، معدہ درم
رحم وغیرہ اندرونی اعضاء

کے درم کو تحلیل کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون عرق ہادیان اور عرق مکوہ
۶۰-۶۵ ملی لیٹر کے ساتھ کھائیں۔

کشتہ زعفران ضعف جگر میں مفید ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے، دل کو قوت بخشتا ہے،

بیضاب کی زیادتی کو روکتا ہے، کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۳۰ ملی گرام یا ایک قرص

طریقہ استعمال: جوارش زرعی مہری ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

کشتہ فولاد ضعف جگر میں مفید ہے، جگر کو قوت دے کر خون کی پیدائش کو بڑھاتا ہے،

لور بیماریوں سے اچھا ہونے کے بعد کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ۲ قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ جوارش جالندوس ۵ گرام یا دوام الحک معتدل جو ابرو والی ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

کشتہ فولاد سونے چاندی والا جگر کے لیے خاص چیز ہے، خون صالح بکثرت پیدا کرتا ہے، ہرے کو سرخ بنا دیتا ہے، ضعف معدہ اور ضعف جگر کو دور کرتا ہے، مقوی غذاؤں کو جزو بدن بنانا اور بدن میں فرسکی لاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۳۰ ملی گرام یا ایک قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ دوام الحک معتدل جو ابرو والی ۵ گرام یا جوارش جالندوس ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

کشتہ مرگائگ ضعف جگر میں مفید ہے، معدہ اور جگر کو طاقت دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ۲ قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ جوارش جالندوس ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

غیرہ ۱۰ بریشم حکیم ارشد دہلا، دوام الحک معتدل جو ابرو والی، دوام الحک معتدل جو ابرو والی خاص، دوام

عرق ماء اللحم مکوہ کاسنی والا معدے اور جگر کو طاقت دیتا اور ان کے درمیان کو تحلیل کرتا ہے، عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق، شربت کاسنی ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر پئیں۔

ضعف جگر

دواء الکرم کبیر ضعف جگر میں مفید ہے، جگر اور کلی کی دوسری بیماریوں میں بھی مفید ہے، جب کہ ان کا سبب سردی ہو،

گردہ و مثانہ کو بھی طاقت دیتی ہے، دیاج کو خارج کرتی ہے، استفادہ میں مفید ثابت ہوتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ دوا صبح کو لہرے کھا کر لوپ سے ۱۲۵ ملی لیٹر عرق بادیان یا لیں۔

شربت سٹوٹ ضعف جگر کے سردوں کو کم کرتا ہے، بخاروں میں مفید ہے جو جگر کی خرابی سے آتے ہیں۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت، عرق بادیان ۱۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر پئیں۔

کشتہ حبث الحدید ضعف جگر میں مفید ہے، معدے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، خون کی پیدائش کو بڑھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام یا ۲ ٹیکیں

طریقہ استعمال: یہ کشتہ صبح نہارے جوارش جالندوس ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

مجمون حجر الیسود کدو دھند کی پتھری پتھری کو
خلع کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام
طریقہ استعمال: یہ مجمون کھا کر لوہے سے پانی میں
شریت بخوری ۵۰ ملی لیٹر ملا کر پئے۔

قرص کشتہ حجر الیسود گردو دھند کی پتھری اور
ریگ کو خلع کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ایک قرص
طریقہ استعمال: یہ کشتہ، مجمون مغرب ۳ گرام یا مجمون
حجر الیسود ۵ گرام میں رکھ کر یا سبجین بخوری ۵۰ ملی لیٹر میں
ملا کر استعمال کریں۔

سنگ مرارہ کے مریض کو اگر ضعف صمدہ کی وجہ
سے اچھا دارنگی درد کی شکایت ہو تو حب طبعیت
۲-۳ گولیاں کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت دیں۔

عظم طحال۔ تلی کا بڑھ جانا

ذوبانی
بڑھی ہوئی تلی کو صحیح حالت میں
لانے کے لیے ذوبانی ایک اسیر دوا
ہے۔ یہ صمدے اور جگر کی بھی اصلاح کرتی ہے۔
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

شریت مسکین اور حادہ جالوس بھی درم و عظم
طحال میں مفید ہیں "تھم جگر" کے لیے صولن درج ہیں۔

اسک معتدل سادہ، کشتہ ملاکلاں، مفرح اعظم، یہ
سب دوائیں "ضعف جگر" میں مفید ہیں، اور یہ
"ضعف قلب" کے لیے عنوان لکھی جاتگی ہیں۔ ان
کے علاوہ جوارش انارین، نوشادر و سادہ اور نوشادر
لوہی بھی ضعف جگر میں فائدہ دیتی ہیں اور یہ
"ضعف صمدہ" میں لکھی گئی ہیں۔

استقاء۔ جلندھر

مجمون کلکلاںج استقاء میں مفید ہے، عوشاب
لاتی ہے اور درد قویج کو تسکین
دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک
طریقہ استعمال: یہ مجمون عرق بادیان ۱۲۵ ملی لیٹر سے
کھائیں۔

دواہ اکثر کم کبیر، شربت دیمہ، شربت کوٹ، استقاء میں
مفید ہیں۔ اور یہ ضعف جگر اور دم جگر میں لکھے گئے ہیں۔

سنگ مرارہ۔ پتہ کی پتھری

دوائے سنگ گردو دھند کی پتھری کو کھوے
کھوے کر کے نکال دیتا ہے اور
گردو کے درد کو تسکین بخشتی ہے۔ مرارے کی پتھری کو
نکالنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ سے ۲۵۰ ملی گرام تک۔
طریقہ استعمال: یہ دوا سبجین بخوری ۲۵ ملی لیٹر میں
ملا کر کھائیں۔

آنتوں کی بیماریاں

اسہال (دست) - پیچش

یہ اسہال و پیچش کی نہایت مفید دوا ہے۔
اسہال (دست) خولہ کیسی ہی شدت سے جاری
ہوں اور پیچش خولہ کیسی ہی شدید ہو اس کے استعمال سے
دور ہو جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ایک قرص

طریقہ استعمال: پانی یا دودھ کے ساتھ کھائیں۔ دن
میں تین مرتبہ سے زیادہ ہر گز استعمال نہ کریں۔

جوارش طباشیر گرمی سے آلے والے دستوں کو
بند کرتی ہے۔ معدے سے
مدغ کی طرف بخارات کے چڑھنے (تغیر) کو روکتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح اور شام دونوں وقت
کھائیں۔

حب پیچش یہ گولیاں دستوں کو روکتی ہیں،
پیچش کو دور کرتی ہیں۔ درد اور

مر دھ کی شکایت بھی ان کے استعمال سے جاتی رہتی ہے۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: رات کو پانی سے کھا کر سو رہیں، پیچش
کی صورت میں (اگر گرانی محسوس ہو تو) ان گولیوں کے
استعمال سے ایک دن پہلے روغن لہڑی ۴۰ ملی لیٹر دودھ
میں ملا کر صبح کو بچیں اور رات کو حسب پیچش کھائیں۔

حب ساق
معدے اور آنتوں کی کمزوری سے
آلے والے دست ان گولیوں کے
استعمال سے رک جاتے ہیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: صبح اور رات کو پانی سے کھائیں۔

دوائے سیاہ پیچش
سدی ۱۰ یا غیر سدی، ہر
حال میں اس کے استعمال
سے فائدہ ہوتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: بہ دوا صبح کو پانی سے کھائیں۔

سٹوف مقبلیا
پراسے دستوں اور پیچش میں
مفید ہے، درد اور مر دھ کو دور

کرتا ہے۔ بڑھاپہ رنگی میں بھی فائدہ دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ سٹوف صبح و شام پانی سے کھائیں۔

قبض

جوارش سفر جلی مسلسل یہ جوارش دست لاتی ہے، درد تو بخ کدور کرتی ہے، جگر کی حرارت کو کم کرتی ہے، بھوک نکاتی ہے، معدے کو طاقت دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام
طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح کو یارات کو پانی سے کھائیں۔

جوارش شہر یاراں قبض کو دور کرتی ہے، معدے اور جگر کی سردی کو دور کرتی اور ان کو طاقت دیتی ہے، تو بخ میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام
طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح یارات کو پانی سے کھائیں۔

خمیرہ بنفشہ یہ ایک بلی قبض کشا دوا ہے۔ ہر قسم کے بخدوں، نزلہ زکام، کھانسی، درد اور پیٹے کے دوسرے امراض میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ گرام سے ۵۰ گرام تک
طریقہ استعمال: یہ خمیرہ عرق بادین ۱۲۵ ملی لیٹر پانی میں ملا کر لیں۔

شربت ارزانی آٹوں سے ٹک لعلہ کو پھلا کر قبض کو دور کرتا ہے، نزلہ زکام اور کھانسی کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر سے ۵۰ ملی لیٹر تک۔
طریقہ استعمال: یہ شربت صبح کو نیم گرم پانی میں ملا کر لیں۔

قرص شکار دوائی قبض کو دفع کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر صبح کی

چش میں سون چمک کر پوپ سے ریوہ صلی ۵ گرام کا مابہانی ۱۲۵ ملی لیٹر میں لال کر شربت بنفشہ ۲۵ ملی لیٹر ملا کر لیں۔

شربت بیلگری دستوں اور چش میں مفید ہے، گرمی کو تسکین دیتا اور پیاس کو بجاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر سے ۵۰ ملی لیٹر تک
طریقہ استعمال: یہ شربت پانی میں ملا کر لیں۔

شربت حب الاس ہر قسم کے دستوں کو بند کرتا ہے، دستوں میں خون آتا، بواس کو روکتا ہے، معدے اور آٹوں کو طاقت دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر سے ۵۰ ملی لیٹر تک
طریقہ استعمال: یہ شربت پانی میں ملا کر لیں۔

معبون سنگدانہ مرغ معدے اور آٹوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے اور ان کی کمزوری سے آنے والے دستوں کو روکتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام
طریقہ استعمال: یہ معجون صبح و شام دونوں وقت پانی سے کھائیں۔

جوارش آملہ، جوارش آملہ حنری، جوارش نارین، جوارش سفر جلی قابض، جوارش مصطفیٰ، جوارش مصطفیٰ پہ لعلہ کلاں، شربت لار زرش، شربت بلی، نوشدارو سادہ اور نوشدارو لولوی جو "ضعف قلب" کے زیر عنوان لکھے جا چکے ہیں، معدے اور آٹوں کی کمزوری سے آنے والے دستوں کے لیے بھی مفید ہیں۔

جوارش عود میں نور جوارش کوئی مسلسل قبض کھائیں،
امراض معدہ میں درج ہو چکے ہیں۔

حب سورنہان، سمون سورنہان، قبض کھائیں، ان کو دوج
مغاسل کے ذریعہ عنوان لکھا گیا ہے۔

شریعت دینار اور شریعت ورد بھی ملین ہیں، امراض جگر
میں درج ہیں۔

کرم شکم۔ پیٹ کے کیرے

اطریفل ویدان یہ دوا پیٹ کے ہر قسم کے
کیروں خصوصاً کینچوں کو مار
کر خارج کر دیتی ہے اور آئندہ کے لیے ان کی پیدائش کو
رک دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت پانی سے کھائیں،
تین روز گنا تار کھانے کے بعد چھ دن رات کو قمر
ملین ۲۰ گنا پانی سے کھائیں۔

قرص دیدان ان کے استعمال سے پیٹ کے
کیرے مر کر نکل جاتے ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ قرص

طریقہ استعمال: یہ قرص صبح کو پانی سے کھائیں۔

بواسیر

اطریفل مقل غولی اور بادی بواسیر میں فائدہ
دیتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک

طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت پانی سے کھائیں۔

جوارش ہمسباس غولی اور بادی کے لیے مفید ہے،
معدے اور جگر کی سردی کو دور

کرانی کو دور کرتے اور بھوک لگاتے ہیں۔

مقدار خوراک: ایک ہادو قمر

طریقہ استعمال: رات کو دودھ یا پانی سے گل کر سو
رائیں۔

قرص ملین معدہ اور آنتوں کو غلظت سے پاک
صاف کرنے کے لیے نہایت مفید

ہیں۔ نزلہ زکام، آشوب چشم اور ناک کان کی پیدائش میں
رفع قبض کے لیے عموماً استعمال کیے جاتے ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ قرص

طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت دودھ یا پانی سے
کھائیں۔

معجون انجیر دائمی قبض کو دور کرنے کے لیے
نہایت مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون رات کو دودھ یا پانی سے
کھائیں۔

معجون قرطم دائمی قبض کے لیے نہایت
مناسب دوا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو پانی سے کھائیں۔

ہنز و لیکنس قبض کھاتا ہے

مقدار خوراک: بچوں کو ۲ قرص، بچوں کو نصف قرص
سے ایک قرص تک

طریقہ استعمال: سوتے وقت گرم پانی یا گرم دودھ کے
ساتھ کھائیں۔

اطریفل نانی، اتریفل علی، اتریفل شہری،
اطریفل ملین، لیارج لیارج، قبض کو رفع کرتے ہیں۔ یہ
دوائی امراض میں دوسرے کے ذریعہ عنوان لکھی جا چکی ہیں۔

مرہم سائیدہ چوب نیم والا
بو اسیری مسوں کے درد اور جلنی کو تسکین دیتا ہے۔

طریقہ استعمال: آدھ ست کے بعد مسوں پر یہ مرہم لگائیں۔

مرہم مازو
بو اسیری مسوں کے درد اور جلنی کو تسکین دیتا ہے۔

طریقہ استعمال: آدھ ست سے فارغ ہونے کے بعد پانی کو خشک کر کے یہ مرہم لگائیں۔

معجون حبث الحدید
اس معجون کے
بو اسیر رک جاتا ہے، مدد اور جگر کو تقویت پہنچتی ہے اور
بھوک خوب لگتی ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام سے ۵ گرام تک۔
طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو چھاپے سے کھائیں۔
معجون مقل
خونی و ہادی بو اسیر میں منہ ہے،
مددے کو طاقت دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام
طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو پانی سے کھائیں۔

تمک بو اسیر
اس کی چھ خوراک میں خون
بو اسیر بند ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک: آدھ گرام سے ایک گرام تک۔
طریقہ استعمال: یہ تمک دس ۳۰ گرام میں ملا کر
کھائیں۔

ہمدور انڈ (مرہم لور کچھول)
بو اسیر کا کاسیب
لور دوبر علاج ہے مدد و قدیم تحقیقات کو سامنے

کرتی ہے اور اس کی وجہ سے بد ہضمی کی شکایت رہتی ہو تو
دور رخ ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے بڑھنے کو روکتی ہے، کھانا
کھانے کے بعد کھانے سے غذا کو ہضم کرتی اور پیٹ کے
رنگ دور دور کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام
طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح کو یا کھانا کھانے کے بعد
دو دنوں وقت کھائیں۔

حب بو اسیر ہادی بو اسیر ہادی میں منہ ہیں۔
مقدار خوراک: ۲ گرام

طریقہ استعمال: صبح کو پانی سے کھائیں۔
حب بو اسیر خونی
بو اسیر خونی کے لیے
منہ ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ گرام
طریقہ استعمال: صبح و شام دو دھ پیانی سے کھائیں۔
حب رسوت
بو اسیر خونی اور بو اسیری
دستوں میں منہ ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ گرام
طریقہ استعمال: صبح و شام تازہ پانی سے کھائیں۔
حب مقل
بو اسیر ہادی میں منہ ہیں، قبض کو
دور کرتی ہیں۔

مقدار خوراک: ۳ گرام
طریقہ استعمال: رات کو پانی سے کھائیں۔
مرکبی
بو اسیر ہادی میں منہ ہیں۔

مقدار خوراک: ایک قرص
طریقہ استعمال: رات کو جوارش جالینوس ۵ گرام میں
دک کر کھائیں یا صبح و شام پانی سے کھائیں۔

ہمدور انڈیکسول یہ کمپول بست جلد
دورن خون میں جذب
ہو کر خون کو روکتے ہیں اور دم کو تحلیل کرتے ہیں۔
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

اطریل ٹیگز-ی جو "دوسر" میں بیان ہو چکا
ہے، اور جوارش جالینوس جو "ضعف معدہ"
میں درج ہے، قرص گلنار "غٹہ الدم"
میں تحریر ہے، یہ سب دوائیں بواسیر میں
بھی مفید ہیں۔

رکتے ہوئے ہمدور کے جراثیم کا ماحصل ہے، یہ ہر دنی اور
داخلی دونوں طرح اپنا اثر دکھاتی ہے۔ درد میں سکون
اور جلن میں کمی لاتی ہے، جراثیم کو مار ڈالتی ہے، خطرناک
خون آنے کو روکتی ہے، مسوں کے درد کو دور کرتی ہے اور
دخم کو جیزی سے بھرتی ہے۔

اسے مقامی طور پر استعمال کیجیے
ہمدور انڈیکسول یہ جیزی سے درد اور جلن کو
دور کرنے اور مسوں کے دخم کو بھرنے اور جراثیم سے
پاک ہونے میں تیز دوا ہے۔

گردہ و مثانہ کی بیماریاں

ٹکالے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔
مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام سے ۲۵۰ ملی گرام تک
طریقہ استعمال: یہ دوا سببجین یا دوری ۲۵ ملی لٹر میں
حاکر کھائیں۔

شربت آلو بالو گردہ و مثانہ کی پتھری اور
رچک کو خارج کرتا ہے اور
پیشاب لاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لٹر سے ۵۰ ملی لٹر تک
طریقہ استعمال: یہ شربت عرق اتاس ۱۲۵ ملی لٹر میں
حاکر کھائیں۔

ضعف گردہ و مثانہ

جوروش زرعونی پتھری، چھدر پر بھلائی، جھون پرائش، سٹوف
کلاں، لوب کبر، لوب معتدل، مجون لاسند، مجون
کندر ضعف گردہ و مثانہ میں مفید ہیں۔

سنگ گردہ و مثانہ

دوائے سنگ گردہ و مثانہ کی پتھری کو ٹکڑے
ٹکڑے کر کے نکال دیتی ہے اور
گردہ کے درد کو تسکین بخشتی ہے۔ مرارے کی پتھری کو

قرص کاسنج یہ قرص گردہ و مثانہ کی پتھری اور ریک کو خارج کرتے ہیں اور پیٹاب لاتے ہیں۔ درد گردہ میں مفید ہیں۔

مقدار خوراک: ۳ قرص

طریقہ استعمال: یہ قرص صبح و شام دونوں وقت مرق ہونہاں ۱۲۵ ملی لیٹر شربت ہذوری ۲۵ ملی لیٹر کے ساتھ کھائیں۔

کشتہ حجر الیہود گردہ و مثانہ کی پتھری اور ریک کو خارج کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام ایک قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ، مہجون مقرب ۳ گرام یا مہجون حجر الیہود ۵ گرام میں رکھ کر یا سبجین ہذوری ۱۰ ملی لیٹر میں ملا کر استعمال کریں۔

کشتہ سنگ سرمائی گردہ و مثانہ کی پتھری کو نکلنے کے لیے مستعمل ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام

طریقہ استعمال: یہ کشتہ، جوارش زور عونی منبری بہ نسخہ کلاں ۵ گرام میں رکھ کر یا سبجین ہذوری ۱۰ ملی لیٹر میں ملا کر استعمال کریں۔

مہجون حجر الیہود گردہ و مثانہ کی پتھری اور ریک کو خارج کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ مہجون صبح کو کھا کر لوہے سے شربت ہذوری ۲۵ ملی لیٹر یا تازہ پانی میں ملا کر لیں۔

مہجون سنگ سرمائی گردہ و مثانہ کی پتھری اور ریک کو خارج کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ مہجون کھا کر لوہے سے مرق اناس ۱۲۵ ملی لیٹر شربت ہذوری ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر لیں۔

مہجون مقرب یہ مہجون گردہ و مثانہ کی پتھری کو نکلنے کے لیے مستعمل ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام

طریقہ استعمال: یہ مہجون کھا کر لوہے سے مرق کرفس اور بادیان ہر ایک ۵ گرام کو پانی میں جوش دے کر پھان کر لیں۔

گردہ اور مثانہ کی گرمی

شربت درد مکرر جگر، معدہ، آغلاں اور گردہ و مثانہ کی گرم بیماریوں میں مفید ہے۔ قبض کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: کسی مناسب مرق میں ملا کر لیں۔

گردوں اور مثانہ کی گرمی کو دور کرنے کے لیے

شربت ہذوری بارہ، شربت ہذوری - مثدل،

شربت اناس اور مرق اناس مفید ہیں۔

درد گردہ

درد گردہ کو دور کرنے کے لیے دوائے سنگ، قرص کاسنج، کشتہ حجر الیہود مفید ہیں اور یہ سب "سنگ گردہ و مثانہ" کے ذریعہ حوائج نکھے گئے ہیں۔

گردوں اور مثانہ کو طاقت دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح و شام کھائیں، اگر اس کے ساتھ کشت حبیب اللہ پیا کشت پینے مرغ ۱۲۵ ملی گرام کھائیں تو نمایاں فائدہ جلد ظاہر ہوتا ہے۔

بلوٹی، معجون فلاسفہ، جو لرش معطل اور

کشت پینے مرغ بھی عیشاب کی زیادتی میں

منہد ہیں۔

عیشاب کی بندش

شربت بزوری معتدل جگر، گردوں اور
مثانہ کی گرمی کو دور

کرتا ہے اور عیشاب لاکر ان کو صاف کرتا ہے جگر کی گرمی

سے بخار رہتا ہو تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لٹر

طریقہ استعمال: پانی میں ملا کر پئیں۔

شربت ناشخواہ معدے کو طاقت دیتا ہے اور
بھوک لگاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: ۱۲۵ ملی لٹر پانی میں ملا کر پئیں۔

اس کے علاوہ شربت بزوری، شربت

کاسنی، شربت اناس، اور عرق کاسنی

بھی عیشاب کو ہادی کرتے ہیں۔

ذیابیطس۔ عیشاب میں شکر آنا

ذیابیطس کی کامیاب دوا ہے۔ اس کے

دولابی استعمال سے عیشاب کا بار بار آنا اور اس میں

شکر کا خارج ہونا رک جاتا ہے۔ اس کے ساتھ عیاب

گردوں اور مثانہ کو طاقت بھی دیتی ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

کشت پینے مرغ لیا بیٹس میں منہد ہے، عیشاب

کی زیادتی کو روکتا ہے، گردوں

کے مرض جبین و رقت منی اور عورتوں کے مرض

سیان الرحم کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام ۲ قرص

طریقہ استعمال: یہ کشت، جو لرش معطل، اگر ایسا معجون

سہاری پاک، اگر گرام میں رکھ کر کھائیں، لوہے سے ۲۵۰ ملی

لٹر دودھ پئیں۔

عیشاب کی زیادتی

معجون ماسک البول مثانہ کو طاقت دیتی اور

عیشاب کی زیادتی کو

روکتی ہے۔ رات کو نیمہ کی حالت میں عیشاب گل جانے

کے لیے بھی منہد ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون رات کو سوتے وقت پانی سے

کامیج۔

معجون کندر عیشاب کی زیادتی، طس البول

(عیشاب کا بلا لرونہ کلا) اور

رات کو ہستہ عیشاب گل جانے کی عادت کو دور کرتی ہے

ہیں، قرص سلاجیت اور بلوٹی اس مرض میں مفید ہیں۔ "جمن" کے قصود میں ہیں۔

پیشاب میں خون آنا

قرص بلوٹی خون، قرص جابس، قرص گلار اور کشتہ سنگ جراحیہ یہ سب پیشاب میں خون آنے کو روکتے ہیں۔ "کشف الدم" کے زیر عنوان درج ہیں۔

پیشاب کی جلن

شریت بزدوری، شریت کاسنی، پیشاب کی جلن کو دور کرتے ہیں۔ اس مرض جگر میں لکھے گئے ہیں۔

بستر پر پیشاب نکل جانا

مومن ماسک ابول، مومن کندر، کشتہ وند مرغ، قرص سلاجیت اور بلوٹی یہ سب دوائیں بستر پر پیشاب نکل جانے کی عادت کو دور کرتی ہیں۔ پچھلے صفحات میں پیشاب کی زیادتی مثلاً بیس اور جریان کے تحت درج ہیں۔

سلس البول (پیشاب کا بلا لروہ قطرہ قطرہ نکلنا)

چدر، بلوٹی، مومن ماسک ابول، یہ سب دوائیں سلس البول (پیشاب کا بلا لروہ قطرہ قطرہ نکلنا) میں مفید ہیں۔ زیادتی اور پیشاب کی زیادتی کے زیر عنوان لکھی گئی

مردوں کی مخصوص بیماریاں

جوہر سین کو بڑھاتا ہے، بھوک خوب لگا ہے، اعصاب کو قوی کرتا اور قوت ہاد کو بڑھاتا ہے۔ ہاڑوں کے موسم میں بڑھوں اور ہلکی حرج الخس کے لیے خصوصیت سے مفید ہے۔
مقدار خوراک: ۳۰ ملی گرام
طریقہ استعمال: یہ جرہ، مکھن یا ملائی ۲۵ گرام میں ۵ کر کھائیں، دوا سے ۲۵۰ ملی لٹروں تک۔

ضعف باہ

الاحمر یہ دوا ملا درجہ کی متوی ہاد ہے، لیکن اس کا استعمال ہاڑوں کے موسم میں بڑھوں اور ہلکی حرج مریموں کے لیے مناسب ہے۔
مقدار خوراک: ۱۵ ملی گرام
طریقہ استعمال: یہ دوا مکھن یا ملائی ۱۰ گرام میں ملا کر کھائیں، دوا سے ۲۵۰ ملی لٹروں تک۔

حب خاص یہ گولیاں اعصاب کو قوت دیتی ہیں اور قوت ہاہ کو بڑھانے کے لیے

مخصوص ہیں۔ اس کے علاوہ دل، دماغ اور جگر کو تقویت بخشتی ہیں، بدن میں قوت و حرارت پیدا کرتی ہیں اور دوران خون کو تیز کرتی ہیں، معدے کو قوت دیتی ہیں اور ہموک بڑھاتی ہیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: صبح بارات کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔

حب عنبر مومیاٹی یہ گولیاں دل، دماغ اور اعصاب کو قوت دیتی ہیں، قوت ہاہ کو بڑھاتی ہیں، مادہ تولید (منی) کی اصلاح کرتی ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ گولیاں

طریقہ استعمال: رات کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔

مبہمی خاص یہ کچھ سال قوت ہاہ کو بڑھانے کے لیے عجیب الاثر ہیں، مبہمی کمزوری کو بہت جلد دور کر دیتی ہیں، نقصان نقدیہ اور ضعف اعصاب سے جو مردانہ کمزوری لاحق ہوتی ہے اسے بھی دور کر دیتی ہیں۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

حلوائے ثعلب یہ حلوائے درجہ کا مقوی ہاہ ہے۔ مادہ تولید (منی) کی پیداوار کو بڑھاتا اور عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے، دماغی کمزوری کے لیے بھی مفید ہے، بدن میں خون کی پیداوار کو بڑھاتا ہے اور اس کو تیز بناتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵۰ گرام

حب احمر یہ گولیاں اعصاب کو قوت دیتے ہیں اور قوت ہاہ کو بڑھانے کے لیے مفید ہیں۔

ہاڑوں کے موسم میں ان کا استعمال مناسب ہے۔

مقدار خوراک: کوئی بھی گولی سے ایک گولی تک

طریقہ استعمال: جو ان کوئی پہلے دن کوئی گولی کھیں یا ملائی میں رکھ کر کھائیں پورے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے۔

ایک ہفتے تک استعمال کرنے کے بعد پوری ایک گولی روزانہ اسی طرح استعمال کریں۔ پورے کوئی پہلے دن سے ہی

پوری ایک گولی اسی طرح کھائیں۔

حب المسک یہ دل و دماغ اور اعصاب میں تحریک پیدا کر کے قوت ہاہ میں

بہاں پیدا کر دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: صبح بارات کو دودھ سے کھائیں۔

حب جالینوس یہ گولیاں اعصاب کو قوت دیتی ہیں اور قوت ہاہ کو بڑھاتی

ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ گولیاں

طریقہ استعمال: صبح بارات کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔

حب جدوار یہ گولیاں قوت ہاہ کو بڑھاتی ہیں اور قوت اساک پیدا کرتی ہیں،

جریان، رقت اور سرعت میں بھی مفید ہیں۔ نزلہ و زکام اور کھانسی میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔

مقدار خوراک: ایک یا دو گولی

طریقہ استعمال: صبح بارات کو کھا کر ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے۔

طریقہ استعمال : یہ طوامیج کو کھاکر ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ
پکائیے۔

یہ دوا اعصاب کی عام کمزوری اور ضعف باہ
ضعفین میں بکریوں کرتی ہے، کثرت جماع اور جلق کی
وجہ سے عام جسمانی کمزوری لاحق ہو جائے اور قوت باہ
کمزور ہو جائے، خون کی پیدائش گھٹ جائے اور حرارت
غریبی کم ہو جائے تو ضعفین کے استعمال سے حیرت انگیز
فاکہ ہوتا ہے البتہ نکات حس کی صورت میں اس کا
استعمال مناسب نہیں ہے۔

طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے۔

اصول کلام صمبی کی کمزوری کو دور کرتا ہے،
کثرت احتلام سے ضعف باہ پیدا ہو جائے
اس کے استعمال سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ مردانہ عضو میں
دوران خون کو جوش پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بولے
لوگوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔

مقدار خوراک : ایک ٹکیہ

طریقہ استعمال : رات کو سوئے وقت دودھ یا چائے سے
کھائیں۔

قرص خراطین کثرت جماع کے نتیجے میں جو
ضعف باہ لاحق ہو، اس کو دور
کرنے کے لیے خاص طور پر مفید ہیں، کلام صمبی میں
تحریک پیدا کر کے عضو خصوص میں جوش اور طاقت پیدا
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک : ۲ قرص

طریقہ استعمال : صبح کو لیوب کیر ۵ گرام میں رکھ کر
کھائیں، لوہے سے دودھ پکائیے، صرف دودھ کے ساتھ بھی
یہ قرص کھا سکتے ہیں۔

کشتہ سم الفار اطلاع درجہ کا معوی باہ ہے، بھوک
لگاتا اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے
دودھ پکائیے کو ہضم کرتا ہے۔

مقدار خوراک : ۳۰ ملی گرام یا ایک قرص۔

طریقہ استعمال : یہ کشتہ مکھن یا ملائی ۲۵ گرام میں رکھ
کر کھائیں، لوہے سے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پکائیے۔

کشتہ شنگرف عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا
ہے، اعصاب کو طاقت دیتا

ہے، قوت باہ کو بڑھاتا ہے، بھوک خوب لگاتا ہے، معوی
و مرغن غذاؤں کو ہضم کرتا ہے، خون کی پیدائش کو بڑھاتا
ہے، ہلکی کھانسی اور دسم میں مفید ہے۔ چاڑوں میں اس کا
استعمال مناسب ہے۔

مقدار خوراک : ۶۰ ملی گرام یا ۲ قرص

طریقہ استعمال : یہ کشتہ شد ۱۰ ملی لیٹر میں ملا کر کھائیں یا
مکھن یا ملائی میں ملا کر کھائیں، لوہے سے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ
پکائیے۔

لیوب اعظم یہ لیوب دماغ و اعصاب کو طاقت
دیتا ہے، مردانہ اعضاء کو غذا بھرت
دے کر انہیں تقویت بخشتا ہے، قوت باہ کو بڑھاتا ہے اور
بادہ تولید (مٹی) کی اصلاح کرتا ہے۔

طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے۔

لیوب الاسرار دل و دماغ اور اعصاب کو طاقت
دیتا ہے، بادہ تولید کو زیادہ کرنے

قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔

مقدار خوراک : ۱۰ گرام

طریقہ استعمال : یہ لیوب صبح کو کھاکر ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ
پکائیے۔

میں بہت تیزی سے اپنا زرد کھاتا ہے۔
 طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔
 معجون پاسبند سوختنی معوی ہادہ مک ہے، معوی
 میں تختی پیدا کرتی ہے۔
 مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک
 طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو دودھ کے ساتھ
 کھائیں۔
 معجون پنبہ دانہ معوی ہادہ سولہ سی ہے۔
 مقدار خوراک: ۱۰ گرام
 طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ کے
 ساتھ کھائیں۔
 معجون پیاز ہادہ تولید (سی) کو زیادہ کرتی اور قوت
 ہادہ کو بڑھاتی ہے۔
 مقدار خوراک: ۱۰ گرام
 طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ
 پکھیں۔
 معجون ثعلب یہ معجون ہادہ تولید (سی) کو
 بڑھانے اور قوت ہادہ کو تحریک
 دینے والی مشہور معجون ہے، جربان اور رقت سی کی
 شکایتیں بھی اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہیں۔
 مقدار خوراک: ۵ گرام
 طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ کے
 ساتھ کھائیں۔
 معجون جالینوس لولوی یہ معجون عام معوی
 جسم، معوی امصاب
 اور معوی ہادہ ہے، طون صانع پیدا کرتی اور چرے کا رنگ
 کھارتی ہے، ہر معوی کمزوری کو دور کر دیتی ہے۔
 مقدار خوراک: ۵ گرام

لیوب بارد قوت ہادہ کو بڑھاتا ہے، گرم حرج
 لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔
 مقدار خوراک: ۱۰ گرام
 طریقہ استعمال: یہ لیوب صبح کو کھاکر ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ
 پکھیں۔
 لیوب صغیر ہادہ تولید (سی) کی پیداوار کو زیادہ
 کرتا اور قوت ہادہ کو بڑھاتا ہے۔
 مقدار خوراک: ۱۰ گرام
 طریقہ استعمال: یہ لیوب صبح کو کھاکر ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ
 پکھیں۔
 لیوب کبیر دماغ و امصاب کو طاقت دیتا ہے، ہادہ
 تولید کی پیداوار کو زیادہ کرنے اور
 قوت ہادہ کو بڑھانے کے لیے لاجواب اثر رکھتا ہے، اگر دونوں
 کو طاقت دیتا ہے، ہادہ عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔
 مقدار خوراک: دوا کے ساتھ ہے
 لیوب معتدل دماغ اور گردہ مثانہ کو طاقت دیتا
 ہے، ہادہ تولید (سی) کو زیادہ
 کرتا اور قوت ہادہ کو بڑھاتا ہے۔
 مقدار خوراک: ۱۰ گرام
 طریقہ استعمال: یہ لیوب صبح کو کھاکر ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ
 پکھیں۔
 لیوب ہن چالیس اہم اجزاء کا مرکب مرق ہے
 جن سے انسانی جسم کو بے پناہ قوت ملتی ہے
 ہے۔ لیوب صحت مند زندگی کا سبب بنتا ہے اور ان تمام
 حالتوں میں مفید ہے جو مردوں اور عورتوں میں عام
 کمزوری کے سبب پیدا ہوتی ہیں، جیسے گھریلو زندگی میں
 آکٹاٹ اور کمزوری، کام میں کمی نہ لگنا، صحت مند
 سستی اور طبیعت میں پرمردگی وغیرہ لیوب ایسی شکایتوں

کرتی ہے، بھوک کو بڑھاتی اور غذا کو معجم کرتی ہے۔
 مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک
 طریقہ استعمال: یہ مہون صبح ۱۰ بجے کو سوتے وقت
 ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں

مہون کلاں
 قوت باہ کو بڑھاتی ہے، مردوں کے
 جریبان اور عورتوں کے سیلان میں
 فائدہ دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک
 طریقہ استعمال: یہ مہون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ
 سے کھائیں۔

مہون مومیاٹی
 یہ اطلاع دہ کی مقوی اعصاب
 اور مقوی باہ ہے، مباشرت
 کے بعد کی کمزوری اس کے کھانے سے دور ہو جاتی
 ہے، حرارت غریزی کو بڑھاتی اور عام جسمانی کمزوری کو
 دور کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام
 طریقہ استعمال: یہ مہون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے
 کھائیں

ہمد و جین
 محرک، مقوی اور مؤثر ادویہ کا ایک ایسا
 مخصوص مرکب ہے جو نظام جسم انسانی
 کی کھوئی ہوئی طاقت کو دوبارہ واپس لاتا ہے اور جنسی صحت
 بحال کرتا ہے۔ اس سے مادہ کی اور تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔
 ہمد و جین مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے اور ضعف
 اعصاب کو دور کرتا ہے۔ صحت مند مردوں میں جنسی
 دوکائف میں بحالی پیدا کرتا ہے۔ ہمد و جین اپنے دواوی
 خواص کی وجہ سے جوان اور عمر رسیدہ مردوں کے لیے
 ایک مثالی ٹمک ہے۔ اسے کسی نقصان کے احتمال کے بغیر
 عرصہ دراز تک استعمال کیا جاسکتا ہے۔

طریقہ استعمال: یہ مہون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ کے
 ساتھ کھائیں۔

مہون جلالی
 اطلاع دہ کی مقوی باہ مسک ہے،
 اعصاب کو تقویت بخشتی اور عام
 جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے، مادہ تولید کو پیدا کرتی اور
 اسے بڑھاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام
 طریقہ استعمال: یہ مہون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ کے
 ساتھ کھائیں۔

مہون شباب آور
 ضعف باہ طوہ کسی وجہ سے
 ہو، اس مہون کے استعمال
 سے دور ہو جاتا ہے۔ دماغ و اعصاب پر اس کی نہایت
 زبردست محرک تاثیر ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ قوت
 لہساہ بھی پیدا کرتی ہے، عام جسمانی کمزوری کو دور
 کرنے میں حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے۔

طریقہ استعمال: مکمل ترکیب استعمال دوا کے ہر دہ ہے۔
مہون طلاء
 کثرت جماع، جریبان یا کسی عام
 بیماری کی وجہ سے ضعف باہ ہو تو
 اس کے استعمال سے دور ہو جاتا ہے، عضو میں کامل
 لہساہ کی پیدا کرتی ہے، دل کو قوت و فرحت بخشتی اور عام
 جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام
 طریقہ استعمال: یہ مہون مادہ اللہم دودھ ۶۰ ملی لیٹر
 ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ کے ساتھ کھائیں۔

مہون فلاسفہ
 یہ مہون اعصاب کو طاقت دے
 کر اور مادہ تولید کی پیداوار زیادہ
 کر کے قوت باہ کو بڑھاتی ہے، مرد و ستانہ کو طاقت دیتی اور
 شباب کی کثرت کو روکتی ہے، کھانا اور کمر کے درد کو دور

دوائے ڈپٹی صاحب دلی جریان مٹی کی منہد

منہد دوا ہے۔
مقدار خوراک: ۱۲۵ سے ۲۵۰ ملی گرام تک یا ایک قرص

طریقہ استعمال: یہ دوا کھن۔ اگر م میں ملا کر کھائیں۔

سرفوف مولف جریان، رقت و سرعت اور کثرت احتلام کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ سرفوف صبح کو دودھ سے کھائیں۔

جریان، رقت اور احتلام شربت سلاجیت میں منہد ہے۔

مقدار خوراک: ۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت صبح و شام پئیں۔

قرص جریان کثرت، بھار، جلی اور جریان کی دوسری لاد کارپوں کی وجہ سے

اعضائے قائل کی ذکات حس بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے جریان مٹی، جریان مٹی اور کثرت احتلام کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں قرص جریان کے استعمال سے یہ شکایتیں بہت جلد دور ہو جاتی ہیں۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

جریان مٹی، جریان مٹی اور جریان مٹی میں منہد ہیں۔ یہ

تیار ہوا ان کے استعمال سے بہت جلد دور ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ عشاب کی زیادتی کو روکتے ہیں اور عام جسمانی کمزوری میں منہد ہیں۔

مقدار خوراک: ۲۰ مکلیں

طریقہ استعمال: صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔

مقدار خوراک: ایک سے ۲ مکسول
طریقہ استعمال: صبح و شام دودھ پیلانی سے کھائیں۔

عرق حمر، عرق باہ، عرق حمری، کشت

طلاء کلاں، کشت نقرہ بھی ضعف باہ میں

منہد ہیں۔ یہ "ضعف قلب" میں درج

ہیں۔ بھون سہاری پاک بھی ضعف باہ

میں فائدہ دیتی ہے، "جریان" کے زیر

حوالہ لکھی گئی ہے۔

جریان و کثرت احتلام

بلوطی ہر قسم کے جریان کی اکسیر دوا ہے، جریان مٹی، جریان مٹی اور جریان مٹی کی

کا جریان اس کے استعمال سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوا گردوں اور مثنہ کو طاقت پہنچاتی ہے۔ عشاب کی زیادتی کو روکتی ہے، مگر کے درد کو دور کرتی ہے، بچوں کے ہست پر عشاب کرنے کی عادت بھی اس دوا کے استعمال سے مٹ جاتی ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے

جریان مٹی یہ دوا اعضائے قائل کی بڑھی ہوئی

حس (ذکات حس) کو دور کر کے جریان مٹی، جریان مٹی اور جریان مٹی کو روک دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آسوں میں تحریک پیدا کر کے دائمی قبض کو رفع کرتی ہے۔ مستقل فائدے کے لیے اسے دیتے لگا کر استعمال کرنا ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

ہے اور اس کے نتیجے میں احتکام کی شکایت طواریکی سی
شدید ہو رہی ہوتی ہے۔

مقدار خوراک: ایک قرص

طریقہ استعمال: صبح و رات کو سوتے وقت ۲۵۰ ملی لیٹر
سے کھائیں۔

معجون آرد خرما: یہ معجون جریان دور رکت و
سرعت کو دور کرتی ہے۔

وقت ہا کو بڑھاتی ہے

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کے وقت قرص قلی
ایک عدد کے ساتھ کھائیں اور لوہے سے ۲۵۰ ملی لیٹر
دودھ پئیں۔

معجون جریان خاص: جریان کے لیے نصاب
منہ ہے ۔ اور تولید
(مٹی) کو پیدا کرتی اور اسے نکالتی ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو کھا کر ۲۵۰ ملی لیٹر
دودھ پئیں۔

معجون مغناطی: جریان میں منہ ہے ، اور تولید
(مٹی) کو نکالتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو کھا کر ۲۵۰ ملی لیٹر
پئیں۔

معجون مغناطی جو اہر والی: یہ معجون رکت و
سرعت اور جریان کے

لے نصاب منہ ہے ۔ اور تولید (مٹی) کو نکالتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو کھا کر ۲۵۰ ملی لیٹر
دودھ پئیں۔

جریان دور رکت و سرعت کی شکایت
کشتہ جست کو دور کرتا ہے۔ سیان ارم میں

ہی منہ ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام

طریقہ استعمال: یہ کشتہ کھن میں رکھ کر کھائیں۔

جریان دور رکت و سرعت میں منہ
کشتہ سرب ہے اور سیان ارم کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ایک قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ کھن میں ملا کر کھائیں یا کسی
مضبب معجون میں رکھ کر استعمال کریں۔

مردوں کے جریان دور عورتوں کے
کشتہ صدف سیان میں منہ ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ایک قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ کھن ۲۵ گرام میں رکھ کر
کھائیں۔

رکت و سرعت ، جریان دور کثرت
کشتہ قلعی احتکام کی شکایت دور کرتا ہے۔ ضعف

ہا (یوم جریان) میں بھی منہ ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام یا ۲ قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ ، معجون آرد خرما ۱۰ گرام میں
رکھ کر کھائیں اور لوہے سے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پئیں۔

جریان ، رکت و سرعت اور کثرت
کشتہ مثلث احتکام کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ۲ قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ ، معجون آرد خرما ۱۰ گرام میں
رکھ کر کھائیں ، اور لوہے سے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پئیں۔

مثالی: احتکام حاصل ، عصب کی نالی اور رکت و سرعت کی
شکایت میں کشتہ کر کے حالت احتکام برپا کرتی

مقدار خوراک: ۴ گلیاں

طریقہ استعمال: صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔

معجون مروح الارواح: یہ معجون قوت
اساک پیدا کرتی

اور قوت باہ کو بڑھاتی ہے۔ اس کے علاوہ اعصاب کو قوت
دیتی اور عام جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے، نیز
دل، دماغ، معدہ اور جگر کو تقویت بخشتی اور ذہن و
حافظہ کو بڑھاتی ہے۔

مقدار خوراک: ایک گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ کے
ساتھ یا ۶۰ ملی لیٹر رومالہم کے ساتھ کھائیں۔

معجون مقوی و مسک: یہ معجون قوت
اساک پیدا کرتی

اور قوت باہ بڑھانے میں نہایت مؤثر ہے۔

مقدار خوراک: ڈیڑھ گرام

طریقہ استعمال: مباشرت سے دو گھنٹے پہلے جب کہ کھا
ہم ہو چکا ہو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ کے ساتھ کھائیں۔

ملذذ عجیب: بعض لوگات طریقین فعل مباشرت
سے لذت حاصل نہیں کرتے یا ایک

فرق لذت اندوز ہوتا ہے اور دوسرا محروم رہتا ہے، اس
دوا کا استعمال اس نقص کو دور کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

مسک بے نظیر: یہ دوا قوت اساک پیدا کرنے
میں بے نظیر ہے، اساک کے

ساتھ کینہ سرور پیدا کرتی ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

میٹھو سین: مردوں کے نظام جسمانی کمزوریاں،
جیسے سرعت انزال، غیر ملوی طور پر

سرعت

حب مسک سرخ: یہ گولیاں قوت اساک کو
بڑھاتی ہیں اور مقوی باہ ہیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: یہ گولی مباشرت سے دو گھنٹے پہلے ۲۵۰
ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔

حب مسک طلائی: قوت اساک کو بڑھاتی
ہیں، اعصاب کو قوت

دیتی ہیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: مباشرت سے دو گھنٹے پہلے جب کہ غذا
ہم ہو چکی ہو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔

حب مسک عنبری: یہ گولیاں اعلا درجہ کی
مسک ہیں، سرعت کی

فکایت کو دور کرتی ہیں اور جسم کو طاقت دیتی ہیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: مباشرت سے دو گھنٹے پہلے جب کہ غذا
ہم ہو چکی ہو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔

حب نشاط: یہ گولیاں مقوی باہ و مسک ہیں، ان
کے نگار استعمال سے رقت و سرعت

کی فکایت دور ہو جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۲ گولیاں

طریقہ استعمال: غذا کے ہم ہونے کے بعد مباشرت
سے دو گھنٹے پہلے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔

قرص ابیض: یہ قرص مادہ تولید (ملی) کی
رقت اور کثرت احتلام میں

منہد ہیں، کچھ دنوں کے نگار استعمال سے سرعت کی
فکایت کو دور کر دیتے ہیں۔

دوائے مالش یہ دوائے گور سے پہلے استعمال کی جاتی ہے، اس سے رگوں پلوں میں نرمی آتی ہے اور عضو کی ساخت کے بدلنے میں مدد ملتی ہے۔
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

ڈائنامول (طلاء) یہ مرکب آزمودہ اور تجربہ خدگی مرکب، گردش خون کو تیز کرنے والی دوا ہے۔ ڈائنامول طلاء عضو مخصوص کی اسٹینجی ہالتوں اور خلیات کو تقذیب پہنچا کر عضو کی کھوئی اور خواہیدہ مردانہ طاقت کو بحال کر کے فطری اور مکمل ایستادگی پر آمادہ کرتا ہے۔ عضوی نقص کو دور کرنے کے لیے ڈائنامول کی مالش بہت زور اثر ثابت ہوتی ہے۔ ڈائنامول طلاء سے عضو مخصوص میں گردش خون تیز ہو جاتی ہے۔ سستی اور کچی دور ہو جاتی ہے۔ نیچوں اور ہالتوں میں دوران خون کی بھرپور گردش بحال ہونے کی وجہ سے ان کو تقذیب ملتا ہے۔ خواہیدہ اور غیر متحرک جنسی مراکز میں بیداری پیدا ہو جاتی ہے جس سے فطری ایستادگی بحال ہو کر آدمی جنسی فعل سے لطف اندوز ہوتا ہے۔

طریقہ استعمال: ڈائنامول طلاء اکثر سے مردانہ عضو پر دن میں ایک بار آہستہ آہستہ مالش کریں۔ اگر طلاء مسلسل استعمال سے دانے اگل آئیں یا جلن محسوس ہو تو طلاء کا استعمال روک دیں اور اس کی بجائے روغن ناریل لگائیں۔ یہ وقتی تکالیف دور ہونے پر طلاء بدستور سابق استعمال کریں۔ مکمل اور مستقل فائدے کے لیے طلاء کم از کم تین تا چار مہینے ضرور استعمال کریں۔

ڈائنامول (کریم) موجودہ طرز معاشرت کی وجہ سے پیدا ہونے والے جسمانی اور دماغی کاؤ، ناقص

ہونے کا اثر لاج یا زیادہ عمر کے سبب عام کمزوری اور فہم بڑی کے سبب دوسری جسمانی کمزوریاں میٹرو سین کے بکار استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں۔ میٹرو سین تاسلی نظام پر مسکن اثر ڈالتی ہے اور بہت رو لیہار بٹری کے سالہا سال سے تجربہ سے اس کی افادیت ثابت ہو چکی ہے۔ میٹرو سین جنسی خطا کو دور مست کرتی ہے اور مردوں میں بھرپور زندگی گزارنے کی خواہش کو بیدار طائے رکھتی ہے۔ میٹرو سین زہر لیے بیچیدگی پیدا کرنے والے اثرات سے پاک ہے۔

مقدار خوراک: دو کچھنل

طریقہ استعمال: دن میں دو یا تین بار پانی، دودھ یا چائے کے ساتھ کھائیں۔ اس کے بعد ہر رتج مقدار خوراک کم کی جاسکتی ہے۔

عضو خاص کی نرمی اور لاغری و کچی

جینٹول عضو خاص کی رگوں اور پلوں کو طاقت دیتا ہے اور اس میں دوران خون کو تیز کرتا ہے، جو عضو خاص کی ساخت میں جذب ہو کر اس کی پرورش کرتا اور اخیلے اور مرجھانے ہوئے پلوں میں نیا جوش اور نئی طاقت پیدا کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

دوائے ٹکڑور عام طور پر کسی طلاء کے استعمال سے پہلے دوائے گور استعمال کی جاتی ہے، اس کے استعمال سے عضو کی اسٹینجی ساخت میں پھلنے اور بدلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے اور جوبلی کی خطا کا رہوں سے عضو میں جو نقص پیدا ہو جاتے ہیں انہیں دور کر کے آئندہ استعمال ہونے والے طلاؤں کی تاجر کے لیے زمین ہموار کرتی ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

تین دھار بننے استعمال کریں۔

روغن پیر بسوئی اس روغن کی مائع سے
عصو خاص میں لوتہ

حرارت پیدا ہوتی اور فری آتی ہے۔

طریقہ استعمال: عصو پر مائع کر کے گرم پان
باندھیں۔

روغن خراطین عصو میں طاقت پیدا کرتا اور
سازشیں دھاتا ہے۔

طریقہ استعمال: عصو پر مائع کر کے گرم پان
باندھیں۔

روغن زفت عصو میں خون جذب کرتا اور
اس کو فرج کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: مائع کر کے لوہے سے گرم پان
باندھیں۔

طلاء اعظم اس طلاہ کے استعمال سے عصو
عصوس کی حالت میں دوا بن

خون تیز ہو جاتا ہے۔ اور اس کی کمزوری، لاغری، آبی
اور کوتاہی وغیرہ شکایتیں دور ہو جاتی ہیں اور اس میں

پورے طور پر ترقی اور جوش پیدا ہونے لگتا ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

طلاء سرخ جلیق اور دوسری بری
عادتوں کی وجہ سے عصو

عصوس میں جو عراہوں مثلاً کھجور، لاغری وغیرہ پیدا
ہو جاتی ہیں، وہ سب اس طلاہ کے استعمال سے دور

ہو جاتی ہیں۔

طریقہ استعمال: ۵۰۰ ملی گرام یہ طلاہ لے کر عصو
عصوس کی پشت اور دائیں بائیں حصہ پر مائع کریں۔

سین اور حلقہ کو چھانیں، لوہے سے پان گرم کر کے

نقدہ اعلیٰ ہوتی مرد غیرہ ایسے اہم اسباب ہیں جو

انسانی زندگی پر مگر اثر ڈالتے ہیں۔ جس کا نتیجہ مردانہ
کمزوری اور ناقصی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے

جنسی بے رغبتی اور بے کھلی، عصو عصبوس کی
ایستادگی میں جڑی کی ہو جاتی ہے۔ دماغ سے جنسی

مرکز کی جنسی نظام رسانی اور حرکت پذیری مدیم
پڑ جاتی ہے۔ اس کیفیت اور نقص کو دور کرنے کے

لئے ضروری ہے کہ مردانہ عصو اور ملحقہ عضلات کی
خارجی مائع کر کے ان میں حرکت پیدا کی جائے۔

دوا کا مول کریم ان قلام نکھس کا کامیاب علاج ہے۔
دوا کا مول کریم کی مائع سے عصو عصبوس اور دیگر

جنسی مرکز کی کھوئی ہوئی اور خواہہ طاقت محدود
آتی ہے۔ اس میں فطری دور ان خون بحال ہو کر مرد

مری دور ہو جاتی ہے۔ عصو عصبوس میں مکمل ایستادگی
کی صلاحیت بحال ہو جاتی ہے۔ قدرتی اسماک بحال

ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوا کا مول کی مائع سے عصو
عصبوس کی اسٹیجی ساخت میں نری اور طاقت پیدا

ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر عصبوس میں کمی ہو تو اس کو دور کر کے
اسے سدھا کرنے میں مدد ملتی ہے جو کہ مکمل مہارت

اور جنسی فعل سے بھرپور لطف اندوز ہونے کے لئے
نمایندہ ضروری ہے۔

طریقہ استعمال: تقریباً ۵۰۰ ملی گرام دوا کا مول
کریم عصو عصبوس پر دن میں ایک بار آہستہ آہستہ

مائع کریں حتیٰ کہ کریم جذب ہو جائے۔ اگر متواتر اور
زیادہ عرصہ استعمال سے دانے گل آئیں یا مٹلی عصبوس

ہو تو کریم کا استعمال روک کر روغن دارلی لگائیں۔
جب یہ دقت طایف دور ہو جائیں کریم کا استعمال شروع

کر دیں۔ مکمل تکمیل کے لئے دوا کا مول کریم کم از کم

بندہ سب ٹریپوں سے دور ہو جاتی ہیں جو جوتی کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے عضو خاص میں پیدا ہو جاتی ہیں۔

طریقہ استعمال : ۵۰۰ ملی گرام یہ طلاء عضو خاص پر (سر اور سینہ بچا کر) مالش کریں، لوہے سے پان گرم کر کے بندہ میں، اگر چند روز کے استعمال سے دانے نکل آئیں تو اس طلاء کا استعمال بند کر کے روغن جنجیلی لگائیں، جب دانے اچھے ہو جائیں پھر طلاء استعمال کریں۔

طلاء مسکن جلق، کثرت، جوار وغیرہ کی وجہ سے اگر عضو خاص میں زکات مس پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے لونی تحریک سے مادہ تولید خارج ہو جاتا ہو اور احتکام کثرت سے ہونے لگے تو اس طلاء کے استعمال سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔

طریقہ استعمال : اس طلاء میں روئی کی پھریری بھگو کر سارے عضو اور فوطوں پر لگائیں۔ روزانہ اسی طرح کریں۔

طلاء مقوی خاص کثرت، مباشرت، جلق اور دوسری بری عادت کی وجہ سے عضو مخصوص میں جو خرابیاں (مثلاً عضو کا ڈھیلا پن، کچی، لاغری وغیرہ) پیدا ہو جاتی ہیں، یہ طلاء ان کا مکمل علاج ہے۔ اس کے استعمال سے عضو مخصوص کے رکوں پٹوں میں نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوران خون کے میز ہو جانے سے عضو کی فعالیت بڑھ جاتی ہے جس سے عضو فربہ ہوتا اور اس میں پوری طرح نئی ہونے لگتی ہے۔

طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے۔

بندہ میں۔ جب اس کے استعمال سے دانے نکل آئیں یا آبد پڑ جائے تو طلاء کا استعمال بند کر کے روغن جنجیلی لگائیں۔ جب دانے اچھے ہو جائیں، پھر طلاء استعمال کریں۔ اسی طرح کئی بار کریں، یہاں تک کہ عضو خاص کی خرابیاں دور ہو جائیں۔

طلاء شیب آور یہ طلاء عضو خاص میں تحریک و تقویت پیدا کرنے کی زبردست تاثیر رکھتا ہے، یہ عضو خاص کے رکوں پٹوں میں خون کے دوران کو بڑھا کر ان میں نئی زندگی اور نیا جوش پیدا کرتا ہے۔ بوڑھے لوگوں میں اس کے استعمال سے جوتی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ عضو کی نرمی نئی سے بدل جاتی ہے۔

طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے۔

طلاء عجیب عضو مخصوص کی تمام خرابیوں کو دور کر کے اس میں طاقت اور نئی پیدا کرتا ہے۔

طریقہ استعمال : ۵۰۰ ملی گرام یہ طلاء عضو خاص پر (سر اور سینہ بچا کر) مالش کریں، لوہے سے پان گرم کر کے بندہ میں

طلاء عروسک بری عادتوں کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ سب اس طلاء کے استعمال سے دور ہو جاتی ہیں۔ رکوں پٹوں میں نئے سرے سے طون تیز ہو کر عضو میں جوش پیدا ہوتا ہے۔

طریقہ استعمال : عضو پر مالش کر کے پان گرم کر کے بندہ میں۔

طلاء کیسیا تاثیر اس طلاء کے استعمال سے نہ پاؤں ہوتا ہے اور نہ جلن ہوتی ہے،

عورتوں کی مخصوص بیماریاں

سر کو تسکین دیتی اور چہ پید اٹھانے کے بعد کی کمروری
کو رفع کرتی ہے۔

مقدار طور اک : ۱۰ گرام

طریقہ استعمال : یہ بیون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے
کھائیں۔

بیون زنجبیل بھی عورتوں کی کلی بیماریوں میں مفید
ہے جو آئندہ صفحات میں درج ہے۔

درم رحم۔ سختی رحم

مرہم داخلیوں کو رحم اور متعلقات رحم کے درم
نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے رحم کی سختی بھی دور
ہو جاتی ہے نیز سولیاں اور گٹھیاں اس کے نگاہار استعمال
سے کھل جاتی ہیں۔

طریقہ استعمال : یہ مرہم ۵ گرام لے کر اس میں ہری
کودہ کا پانی ۵ ملی لیٹر ملائیں اور اس میں روئی تھپو کر دایہ
سے اندام نہانی میں رکھوائیں اگر ہری کودہ بے قوتھا
مرہم استعمال کریں۔

مہلول یہ اندام نہانی کے درم اور اس کی دوسری
خراہوں کو دور کرنے والی خاص دوا ہے،

متعد بیماریوں میں مفید دوائیں

مستورین ماہواری کی کلیخوں، ایام کی
بے قابوگیوں، سیانہ رحم، غصہ
ارحم کی بیماریوں اور رحم (بچہ دانی) کے دوسرے عوارض
کو دور کرنے والی تجربہ دوا ہے۔ ان کلیخوں کی وجہ سے
عورت کی زندگی بگڑ جاتی ہے، شاداب و حسین چہرہ
گھٹا کر بے رونق و بد نما ہو جاتا ہے، لیکن مستورین تمام
کلیخوں کو دور کر کے صحت کی بحالی میں معاون بنتی ہے۔
طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے۔

مہجون مقوی رحم یہ بیون رحم کو حالت دینی
ہے اس کی تیاری میں
غصہ ارحم کے لئے افضل کا خاص خیال رکھا گیا ہے، اس لیے
جو عہد عرصہ وقت سے پہلے یوزمی معلوم ہونے لگتی ہیں، ان
کے ہرے پر جھریاں پڑ جائیں اور ان کی جلاہیت قطع
ہو جاتی ہے مابقی صورت میں یہ خاص طور پر مفید ہے۔
طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے۔

مہجون سہاگ سوٹھ عورتوں کے اکثر امراض
میں مفید ہے، رحم کو
ماتحت دیتی اور اس کی کلی خراہوں کو دور کرتی ہے، مورد

ہو کر رحم اور حفاظت رحم کا درم دور ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال کے بعد عروسک کا استعمال ضروری ہے۔
طریقہ استعمال: نندہ ماہواری ایام سے فراغت کے بعد رات کو سوتے وقت دو تھیاں اندام نہانی میں خوب اندر تک رکھیں۔

قرص سیلان سیلان الرحم میں مفید ہیں اور رحم کو طاقت دیتے ہیں۔
مقدار خوراک: ایک قرص
طریقہ استعمال: یہ قرص صبح وشام ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔

معجون موچرس سیلان الرحم کے لیے مفید ہے، رحم کی خراب رطوبتوں کو خشک کرتی اور رحم کو طاقت دیتی ہے۔
مقدار خوراک: ۱۰ گرام
طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔

منوف خاص "جو کثرت حیض" میں درج ہے، سہول اور مستورین "دورم رحم" میں تحریر ہے، سیلان میں بھی مفید ہیں۔

کثرت حیض

سفوف حابس کثرت حیض کو روکتا ہے۔
ماہواری کی بے قاعدگی کو دور کرتا ہے۔
بے مردوں کے جہین اور عورتوں کے سیلان میں مفید ہے۔
ماہون بواسیر بھی اس کے استعمال سے رک جاتا ہے۔
مقدار خوراک: ۵ گرام
طریقہ استعمال: یہ سفوف صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے پانی سے کھائیں۔

اندام نہانی کی سوزش ہو کہن اور اس سے رطوبت کا بہاؤ (سیلان مہلی) کو طبع کر دیتی ہے، اندام نہانی کے دورم کو تحلیل کرتی ہے اور اس کی صفائے حاصلی (اندرونی حساب دار مہلی) کو اصلی حالت میں لے آتی ہے۔
طریقہ استعمال: دو تھیاں اندام نہانی میں رات کو سوتے وقت رکھی جائیں۔ پانچ دن لگاتار استعمال کر کے دو دن کا وقفہ دینا مناسب ہے۔

خلو جالندس بھی رحم کے دورم اور خفی کو دور کرتے ہیں اور یہ "دورم جگر" کے زیر عنوان لکھے گئے ہیں۔

سیلان الرحم

حب سروارید عورتوں کے مرض سیلان میں مفید ہیں۔ اعصاب کو قوت دیتیں اور عام جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہیں۔
مقدار خوراک: ایک گولی
طریقہ استعمال: صبح اور شام دودھ سے کھائیں۔

سیلانول یہ دوا سیلان مہلی کے لیے (بس میں ۵۰ فی صدی عورتیں جتنا ہوتی ہیں) آسیری دوا ہے، اس مرض میں اندام نہانی میں بھی خارش اور جھن ہوتی ہے اور دو وحیارت کی سفید رطوبت خارج ہوا کرتی ہے، اس دوا کے استعمال سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی جسمانی کمزوری بھی رفع ہو جاتی ہے، بھوک خوب لگنے لگتی ہے اور خون کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ایک قرص
طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت دودھ یا پانی سے کھائیں۔

فہر زین سیلان الرحم میں مفید ہے۔ اس کے استعمال سے رحم کی فضول رطوبتیں خارج

جڑو نے لگتا ہے، بھروسے میں شدہ درد اور بے چینی ہوتی ہے، حیض کھل کر نہیں آتا۔ اس دوا کے استعمال سے حیض کھل کر اور باقاعدہ آئے لگتا ہے اور مریضہ کو ان تمام تکلیفوں سے نہایت مل جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ایک قرص

طریقہ استعمال: ایام مقررہ کے دو تین دن پہلے صبح و شام دونوں وقت دودھ پانی سے کھائیں۔

اس معجون کے استعمال سے
معجون زخمیکل

ایام ماہواری بے قاعدگی سے
آئے اور درد سے آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے، سیانہ میں فائدہ ہوتا ہے، وضع حمل کے بعد کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ مردوں کے لیے معوی و مسک ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔

.... کشادگی

عروسک
اس کے استعمال سے اندام نہانی کو
تکیرنے والے اعضاات اور اس کی

دوسری ساریں مضبوط ہوتی ہیں، اندام نہانی کی زائیدہ رطوبت خشک ہو جاتی ہے اور وہ لاجلی چمکی ہو یا کشادہ ہو گئی ہو تو صحیح حالت میں آجاتی ہے۔ سیانہ کی شکایت جاتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر رحم (بچہ دانی) نیچے ہو گئی ہو یا باہر نکل آئی ہو تو وہ بھی درست ہو جاتی ہے اور غلہ پیدا ہو جاتی ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

سقوط خاص
کھوت حیض میں مفید ہے، ایام
ماہواری کی بے قاعدگی کو دور کرتا
ہے، سیانہ الرحم کو روکتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پانی سے کھائیں۔

قرص بندش خون اور شربت انجمار بھی
کھوت حیض میں مفید ہیں، جو خف الدم
(خون قنکنا) میں تحریر ہیں۔

بندش حیض

حب مدر
ان گولیوں کے استعمال سے حیض کھل
کر آئے لگتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: ایام ماہواری شروع ہونے سے تین دن پہلے یہ گولیاں صبح دوپہر اور شام کو پانی کے ساتھ گل جائیں، ماہواری شروع ہونے کی صورت میں ان کا استعمال مناسب نہیں ہے۔

شربت مدر
ایام حیض بند ہوں یا کسی کے ساتھ
آتے ہوں تو اس شربت کے

استعمال سے جاری ہو جاتے ہیں، اگر خون نکلاں بند ہو تو وہ بھی جاری ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت، عرق بادیان ۱۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر صبح اور شام دونوں وقت پئیں۔

اکثر مستورات کو رحم کی کمزوری یا خف الدم
ماہواری
ایام کے قبل کی گزرتی ہے ایام حیض
میں شدہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسم کا جوز

مجنون سپاری پاک

جن مستوریت کو حمل پاک نہ آتا ہو،
جب حمل چھن کسی اندرونی غلطی کی وجہ سے
مستور حمل نہ ہو تا ہو، ان گلیوں کے استعمال سے وہ
غلطی دور ہو کر حمل قریب پایا جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ مجنون مچا کو دودھ سے کھائیں۔

مجنون حوی رحم جو پچھلے صلاحات

میں گھسی گئی ہے، استقرار حمل میں

درد دیتی ہے۔

استقاط حمل

مجنون حمل جنبری طوی خانی
جن مستوریت کو حمل پاک نہ آتا ہو،

ساقط ہو جاتا ہو یا بچہ زچہ نہ رہے ہوں، سوکھ سوکھ کر

مر جاتے ہوں، اس مجنون کے استعمال سے حمل استقاط

سے محفوظ رہتا ہے اور بچہ نکل سکتا ہے اور آتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ مجنون مچا کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے

کھائیں۔

مجنون نشارة عاج والی
جن مستوریت کو حمل پاک نہ آتا ہو،

محل کی مادی ہوتی

ہیں، تیسرے چرچے میں ان کے حمل ساقط ہوتے رہتے

ہیں، اس مجنون کے استعمال سے ان کا حمل محفوظ رہتا ہے

اور گجرات پر نکل سکتا ہے اور آتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ مجنون مچا کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ

سے کھائیں۔

استقرار حمل

جن مستوریت کو حمل پاک نہ آتا ہو،
جب حمل چھن کسی اندرونی غلطی کی وجہ سے
مستور حمل نہ ہو تا ہو، ان گلیوں کے استعمال سے وہ
غلطی دور ہو کر حمل قریب پایا جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: لپا ہا ہوری سے فارغ ہونے کے بعد

صبح اور شام ہر گولی ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔ تین دنوں

کھانے کے بعد چوتھے دن مہارت کریں۔ اسی طرح

دوسرے اور تیسرے مہینے استعمال کریں۔

حلوائے سپاری پاک

جو مرد و عورت

اولاد سے محروم

ہوں اور ان میں کوئی عضوی غلطی نہ ہو، وہ دونوں اس

طوبے کو ۴۰ دن استعمال کریں، اگر خدائے ہا ہا تو ان کی

امید پوری ہوگی۔ مردوں کا جرمانہ رقت و سرعت

اور عورتوں کا سیلان میں بھی اس کے استعمال سے دور

ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ حلوائے پاک صبح سویرے نہ

۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔

دوائے ابیض

اگر رحم کی کمزوری سے حمل

قرآن پاک ہو تو یہ دوا استقرار

حمل کی اسفند فوید کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰۰ ملی گرام

طریقہ استعمال: یہ دوا مجنون حمل جنبری یا مجنون سپاری

پاک ۵۰ گرام میں ۵۰۰ گرام دودھ سے کھائیں۔

لیڈیز کٹ خواتین کی نسائی تکلیف کے لیے تین دو لاکھ دوا ہے خصوصاً پیکٹ چر کیا گیا ہے۔ ان تین دو لاکھ کو استعمال کرنے کی صورت میں خواتین کا جسمانی نظام قدرتی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ ضعف اعصاب، مائے گی و تنکوت دور ہو کر توانائی اور چستی پیدا ہوتی ہے، اس میں "قرص سپر پاک" کھانے کے لیے مہول طور "ڈولفون" تیرہویں استعمال کے لیے ہیں۔ پرچہ ترکیب استعمال پیک کے ساتھ ہے۔

خارش اندام نہانی

ہینکو لین یہ زہد اعصابی عامل کی خارش کے لیے اسیری مریم ہے، خارش طول اندام نہانی کے باہر کے حصہ میں ہو یا طول اندرونی حصہ میں، اور یہ طول کی غلطی سے ہو یا ہالوں میں جو نمی پڑ جائے ہے، ان سب حالتوں میں اس کا استعمال مفید ہے۔ پرانی سے پرانی تکلیف جس کی وجہ سے رات کو نیند حرام ہو اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔ طریقہ استعمال: ہوا کے ساتھ ہے۔

اگر خون کی حدت اور گرمی اس مرض کا سبب ہو تو "صافی" استعمال کریں یا شربت صاب ۲۵ ملی لیٹر میں عرق شامہ ۱۲۵ ملی لیٹر ملا کر لیں۔

دودھ کی زیادتی

اگر کسی عورت کی بچاؤں میں دودھ کی پیداوار ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو میمون یا غزلہ کے استعمال سے متدل ہو جاتی ہے۔

عوارض حمل

قرص حوامل حمل کے زمانے میں مکی اور تے طبیعت کا گرے گرے رہتا، بچاؤں کا آنا دور دیر، بھوک کی کمی بھی شکایتیں حاملہ کو اکثر ستاتی رہتی ہیں اور ان کی وجہ سے حمل گر جانے کا اندیشہ بگا رہتا ہے۔ قرص حوامل ان تمام عوارض کا کامیاب علاج ہیں۔ ان کے استعمال سے یہ سب عوارض دور ہو جاتے ہیں اور بچہ میں بچہ صحیح و سالم رہتا اور وقت مقررہ پر نکل دیتا اور آتا ہے۔

مقدار خوراک: ایک قرص
طریقہ استعمال: صبح اور شام شربت اور ۱۰ ملی لیٹر میں ملا کر لیں۔

میون حمل جبری طوی خانی اور
میون طوی رحم بھی عوارض حمل
میں مفید ہیں ان کا ذکر گزشتہ صفحات
میں درج ہے۔

پر سوت

عرق دسمول عورتوں کے مرض پر سوت میں مفید ہے جس میں درامدی لگنے بلانی کے پھینے پڑنے سے بخار ہو جاتا اور تمام بدن میں درد ہونے لگتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق صبح و شام لیں۔

شریعت بخاری متدل اور عرق نکو
مرض پر سوت میں درق کے طور پر
استعمال کیے جاتے ہیں۔

کہتے ہیں
طریقہ استعمال: پھلوں پر کاٹیں۔

پستانوں کا لنگ چلانا

اس صدمہ کے علاج سے ہے
طریقہ شایب: صدمہ پستان کا علاج ہے

بچوں کی بیماریاں

طریقہ استعمال: بچوں کے ہاتھ صاف رکھیں کریں۔

اکسیر لافطال: بچوں کے ہاتھ صاف رکھیں کریں۔
قبل میں ذکر ہے بچوں کے مرض سوکھا
میں منہ ہے۔

جیاس کی زیادتی

عرق بادیہ اور عرق بادشاہ جیاس کی زیادتی میں
منہ ہے۔ من کا ذکر "صدمہ کی بیماریوں" صفحہ
کے قصود رکھ ہے۔

بد ہضمی۔ قبض

اکسیر لافطال: بچوں کے ہاتھ صاف رکھیں کریں۔
جیاس کا علاج ہے

دق الاطفال۔ سوکھا

نومال ہے بلی تا تک اس نوزل میں صدمہ
دوسری مثال ہے جو
کمزور بچوں کو صدمہ دلاتا ہے۔ بچوں کی مام
ہستہ کمزوری، سوکھا (سوکھا سلت) بچوں کی زہری اور
فوق کا علاج ہے، بچوں کی سوجن، سوجنوں کی
سوجن، جلد کا کمزور ہونا، صدمہ کا خزانہ کام کی نوبت سے
سب صدمہ نوزل ہے لیکن صدمہ کے استعمال سے صدمہ
بہت ہے۔

طریقہ استعمال: صدمہ کے ساتھ ہے۔

بہر و دلال تھل: بچوں کے ہاتھ صاف رکھیں کریں۔
بچوں کی بھرپور علاج ہے
بچوں کو لچک کر صدمہ کے علاج میں صدمہ
قزور رکھ ہے۔

کھل کھائی

وہاں سے صرف چھ ماہ کے لیے کہ تو دل سے حسبِ سرفہ، اسوقت
آپ تریزہ و ملازم اسوقت کھان خیر عمری بچوں کی کالی
کلائی میں فاکہ دیتی ہیں۔ اس سب سے ان کا ذکر کرنا
مستطیع نہیں ہے۔

وہی ہے جس کا نام

قبر و ملی آرڈر کر سکتے ہیں۔
میں اپنے باپ کی جگہ پر
طریقہ استعمال : ضمیمہ کے مطابق یہ قبر و ملی لے
کر گرم کر کے مالقہ کر سکتے ہیں۔

جوڑوں کی بیماریاں

وقع مناسل۔ گھیا

لو جاعی جوڑوں کے درد (گھٹیا) کی لپا پٹ منہ دوا ہے۔ گھٹیا کے صحت خرابی (گھٹیا) میں لگی لافہ دیتی ہے۔ دل کے کسی مرض کے بعد یا آٹک، سوزاک کے بعد جوڑوں میں جو درد ہونے لگا ہے اس کے استعمال سے دور ہو جاتا ہے۔
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

حسب اسکند تجلی خود کرد گری منہ جید ۔
 حقدار خوراک : خاک ہیں
 طرح استعمل : زلف کہانی کا نہیں۔

حب سور فحجان
جڑوں کے درد کے لیے۔
خصوصیت سے مفید ہیں۔
عضلات و اعصاب کے درد کو دور کرتی ہیں، قبض کو
رفع کرتی ہیں۔
مقدار خوداک : ۳۳ گرام
طریق استعمال : دلت کو سوتے وقت پانی سے کاشمیر۔
حلوائے گھیکوار
تھپا ہر کمر کے درد کو دور کرتا
ہے، کاشی اور درد میں مفید
ہے۔ جڑوں میں اس کا استعمال خاص طور پر مفید ہے۔

مقدار خوراک : ۵۰ گرام
طریقہ استعمال : یہ طوامج سے دوا لیت کر سوتے
وقت کھانا پورے ۵۰-۶۰ منٹ بعد کھیں۔

چوہدری رفیع الرحمن کی مدد سے سید سرفراز
ماٹھی، مہمان مشہور، مہمان خاص اور
مہمان خصوصی بھی منتخب ہوئے۔

روح حاصل (تجلیا) کے لیے جو دوائیں لوہے کی کسی بھی
 تھا، وہ سب عرق افسا، عقرس اور درد کر میں بھی
 کا کر دیتی ہیں۔

میعون لوجیاں : میعون ہر قسم کے رنجی و دروں میں مفید ہے، خصوصاً عتیا اور عقرس کے پرانے دروں کے لیے اکسیر ہے، قبض کو دور کرتی ہے۔

امراض عامہ

بخار

مفرلوی بخاروں میں
سبب بن بزواری مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لٹر سے ۵۰ ملی لٹر تک

طریقہ استعمال: عرق بادیان ۱۲۵ ملی لٹر یا پانی میں
لا کر پئیں۔

مفرلوی بخاروں میں صفراء کی
شربت نیلو فر تیزی کو کم کرتا اور پیاس کو بجھاتا
ہے، البتہ بخار کے بھی بڑھی ہوئی گرمی کو تسکین دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۴۰ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت عرق نیلو فر ۱۲۵ ملی لٹر یا پانی
میں ملا کر وقت ضرورت پئیں۔

شربت خاکسی موتی جھرو، چمک، خسرہ اور
میعادی بخار میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت نیم گرم پانی یا عرق گاؤزہاں
۱۲۵ ملی لٹر میں ملا کر صبح اور شام پئیں۔

عرق اجوائن پر اسے بخار کو دور کرتا ہے۔
بھوک لگاتا اور پیاس کو
خارج کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۷۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق صبح و شام پئیں۔

عرق نیلو فر صفراء کی تیزی کو کم کرتا اور گرمی کو
تسکین دیتا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق شربت نیلو فر ۲۵ ملی لٹر میں
ملا کر پئیں۔

قرص زر شک تپ عرق میں مفید ہیں، سوسہ
اور جگر کو طاقت دیتے ہیں۔

مقدار خوراک: ۲۰ قرص

طریقہ استعمال: صبح و شام عرق گاؤزہاں ۱۲۵ ملی لٹر
سے کھائیں۔

قرص حمی جدید بخاروں کو روکتے ہیں، سوسہ
میں بھی مفید ہیں۔

مقدار خوراک: ایک قرص

طریقہ استعمال: جب بخار اتر جائے یا ہلکا ہو جائے
تو یہ قرص ۲۵۰ ملی لٹر دودھ یا عرق ماء الحیات ۶۰
ملی لٹر سے کھائیں۔

لرزین چالا بخار (لیریا) کے لیے بہترین دوا
ہے۔ حفاظت م کے طور پر بھی اس کا

میٹھاوی بخار

میٹھاوی بخار میں شربت خاکسی مفید ہے جو "بخار" کے تحت جان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فیرہ مردارید، فیرہ مردارید خاص اور فیرہ مردارید بہ لٹو کاں میٹھاوی بخار میں دل کو طاقت دینے اور عام جسمانی کمزوری میں مفید ہیں۔ یہ "ضف قلب" کے تحت درج ہیں۔

خسرہ۔ چچک

خسرہ اور چچک میں شربت خاکسی کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ پچھلے صفحات میں "بخار" کے زیر عنوان درج ہے۔ اس کے علاوہ فیرہ مردارید، فیرہ مردارید خاص اور فیرہ مردارید بہ لٹو کاں کا استعمال بھی مفید ہے۔ یہ سب "ضف قلب" میں لکھے گئے ہیں۔

مشاپا

مشاپا کو دور کرتا ہے۔ کچھ سفوف مہزل دونوں تک لگاتار استعمال کرتے رہنے سے آہستہ آہستہ وزن کم ہو جاتا ہے اور بدن صحیح حالت میں آ جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: صبح و شام عرق زیرہ ۲۰۰ ملی لیٹر پانی کے ساتھ کھائیں۔

عرق زیرہ: مٹاپے کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے، بواسطہ کو خدج کرتا اور بھوک لگاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۷۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق صبح اور شام پئیں۔ اگر سفوف مہزل کھاکر لوہے سے یہ عرق پئیں تو زیادہ بہتر ہے۔

معجون مہزل: مٹاپے کو دور کرنے کے لیے نہایت مفید ہے، کچھ دنوں تک

لگاتار استعمال کرنے سے بدن صحیح حالت میں آ جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون کھاکر لوہے سے عرق زیرہ ۷۵ ملی لیٹر پئیں۔

جوارش کوئی، جوارش کوئی مسلسل، معجون

فوجی اور معجون ناغونہ بھی مٹاپے کو دور کرنے

کے لیے بہتر ہیں۔

فساد خون اور جلد کی بیماریاں

خارش - کھجلی

اس طریقہ استعمال : ۱۰ گرام یہ دوا درغن چنبیلی ۶۰ ملی لیٹر
میں ملا کر مالش کریں۔ ایک گھنٹہ کے بعد نیم گرم پانی سے
لٹائیں۔
خوبل اور پھوڑے پانیوں میں مفید ہے۔ آٹک میں
بھی فائدہ دیتا ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک
طریقہ استعمال : یہ طریقہ صبح و رات کو پانی سے
کھائیں۔

جربین
خارش (کھجلی) کی بھرین دوا ہے۔
خارش کے علاوہ یہ دوا سر کی کھجلی دور
کرنے کے لیے اور جو کھجلیوں کے لیے بھی بہت مفید
ہے۔ آٹک جگہ پر بھی اسے لگا سکتے ہیں۔ اس کے لگانے
سے کسی طرح کی تکلیف ملے گی۔
طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے۔

دوائے خارش جدید
یہ کھجلی کی نہایت مفید
دوا ہے۔

طریقہ استعمال : ۱۰ گرام یہ دوا درغن چنبیلی ۶۰ ملی لیٹر
میں ملا کر مالش کریں۔ ایک گھنٹہ کے بعد نیم گرم پانی سے
لٹائیں۔

خوبل اور پھوڑے پانیوں میں مفید ہے۔ آٹک میں
بھی فائدہ دیتا ہے۔

طریقہ استعمال : کھجلی پر مالش کریں اور زخموں پر
لٹائیں۔

شربت عشبہ خاص
یہ شربت اعلا درجہ
کا معلی خون ہے۔

فساد خون سے پیدا ہونے والی تمام بیماریوں مثلاً کھجلی، دوا
وغیرہ میں فائدہ دیتا ہے۔ آٹک اور سوزاک میں بھی
مفید ہے۔

مقدار خوراک : ۲۵ ملی لیٹر سے ۵۰ ملی لیٹر تک
طریقہ استعمال : یہ شربت صبح کو پانی میں ملا کر پیئیں۔

شربت عناب
خون کو صاف کرتا اور خون کے
جوش اور گرمی کو تسکین دیتا ہے۔

مقدار خوراک : ۲۵ ملی لیٹر سے ۴۰ ملی لیٹر تک
طریقہ استعمال : یہ شربت پانی میں ملا کر پیئیں۔

لا کر صبح کے وقت بخلیں۔

عرق عشب خون کو صاف کرتا ہے، آتھک میں مفید ہے، آتھک سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق شربت عشب ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر بخلیں۔

عرق مرکب مصفی خون املا درجہ ۲ صلی خون ہے، پھوڑے پھسیوں کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق، شربت صاب ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر بخلیں۔

عرق منڈی خون کو صاف کرتا ہے۔ بھائی کو قوت دیتا ہے، اعصاب رنجور ارواح کو طاقت دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق، شربت صاب ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر بخلیں۔

معبون عشب مصلی خون ہے، آتھک، جذام، کھجلی وغیرہ فساد خون کی تمام بیماریوں میں مفید ہے۔ کھجلی میں بھی فائدہ دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح و رات کو پانی سے کھائیں۔

قرص اصفر یہ قرص خون کو صاف کرتے ہیں، فساد خون سے پیدا ہونے والی تمام بیماریوں مثلاً خارش (کھجلی) دلوں پھوڑے

شربت مرکب مصفی خون فساد خون کی تمام بیماریوں مثلاً کھجلی،

دلوں پھل وغیرہ میں مفید ہے، آتھک، جذام اور سوزاک میں بھی فائدہ دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت، عرق مرکب مصلی خون ۱۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر صبح کو بخلیں۔

صافی یہ خون کو صاف کرنے والی لاجواب دوا ہے۔ خون کی خرابی سے پیدا ہونے والی تمام

بیماریوں کے لیے اکسیر ہے۔ خارش (کھجلی) سندھی ہونے تمام بدن پر دلوں پھل پیدا ہو گئے ہوں، ماسوں نے چرے کو بد نما بنا دیا ہو، پھوڑے پھسیاں نکلتی ہوں، بچی تکلیف دیتی ہو، یہ سب بیماریاں اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہیں۔ آتھک، سوزاک، معذور جیسی بیماریوں میں بھی اس کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔ مرد و عورت، بچے اور جوان سب کے لیے یکساں مفید ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

عرق چرایتہ خون کو صاف کرتا ہے، خون کی خرابی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق صبح و شام دونوں وقت بخلیں۔

عرق شاہترہ فساد خون کی تمام بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے، خون کی

کمری اور جوش کو تسکین دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: اس عرق میں شربت صاب ۲۵ ملی لیٹر

دور کرتی ہیں۔ بچے ہوں یا بڑے، دونوں کے لیے یکساں مفید ہیں۔

مقدار خوراک: بچوں کو ۴ کوپیاں، بچوں کو ایک سے ۲ کوپی۔

طریقہ استعمال: یہ کوپیاں صبح کو پانی سے کھائیں۔ بچوں کو تو می گولی سے ایک گولی تک۔ ماں کے دودھ میں مکھول کر دیں۔ اس سے بڑے بچوں کو ایک سے دو گولی تک دودھ میں مکھول کر دیں۔

سلوب شاترہ، سفوف معلیٰ خاص، شربت حبہ خاص، صانی، قرص اسطر، میون چوب گز، میون حبہ، میون معلیٰ خاص، یہ سب پھوڑے پھنسیوں میں خون کی صفائی کے لئے استعمال کی جاتی ہیں، گز شدہ صلات میں درج ہیں۔

ہماتے۔ چھپ

عازہ حسن افزا ہرے کے دانوں، جھانچوں، چھپ اور ہماوں کو دور کر کے ہرے کو نکھارنا اور اس میں جلا بیت پیدا کرنا ہے۔ طریقہ استعمال: رات کو ۵ گرام یہ عازہ تھوڑے پانی میں ملا کر ہرے پر لگائیں اور صبح کو پانی سے منہ دھو ڈالیں۔

زخم

مرہم رال ہر جسم کے زخموں کو بھرتا ہے، زخموں کو میل نکیل سے صاف کر کے صحت جلد بھر لاتا ہے۔

پھنسیوں میں مفید ہیں۔

مقدار خوراک: ایک قرص

طریقہ استعمال: یہ قرص صبح اور شام پانی سے کھائیں۔

مرہم خارش جدید کھلی تر ہو یا تنگ، دونوں کے لیے مفید ہے۔

طریقہ استعمال: کھلی کی جگہ پر اس مرہم کو لیں۔

داؤ۔ چنبیل

مرہم ابیض دلو کھلی اور پھنسیوں میں مختلف جلدی بیماریوں کی مفید دوا ہے۔ طریقہ استعمال: دلو، کھلی اور پھنسیوں پر تھوڑا تھوڑا لگائیں۔

مرہم قوبا اس مرہم کے استعمال سے دلو پورے طور پر جاتا رہتا ہے۔

طریقہ استعمال: دلو کو کپڑے سے رگڑ کر یہ مرہم لگائیں۔

اگر دلو اور چنبیل تمام جسم پر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہوں تو مذکورہ بالا صفائی دونوں کے علاوہ اطریل شاترہ، شربت حبہ خاص، شربت مرکب معلیٰ خون، صانی اور قرص اسطر بھی کسی دوا کا ضرور استعمال کریں۔ خارجی استعمال کے لیے مرہم خارش جدید لگائیں۔

پھوڑے پھنسیاں

حب مصفی خون لہو خون میں مفید ہیں، پھوڑے پھنسیوں اور کھلی کو

طریقہ استعمال: نیم کے چوں کو پانی میں جوش دے کر اس سے زخموں اور پھسیوں کو دھو لیں۔ اس کے بعد یہ مرہم کپڑے پر لگا کر زخم پر چپا دیں، روز مرہ اسی طرح کریں۔

پتی

پتی کا حالت میں صافی، اور آکسیرقہ کا استعمال بھی مفید ہے۔ زخم کا زخم کافور لگانے سے جلد دور ہو جاتی ہے۔

طریقہ استعمال: پہلے نیم کے چوں کے جو شامہ سے زخموں کو دھو لیں، اس کے بعد یہ مرہم کپڑے پر لگا کر زخم پر چپا کر لیں۔ اگلے روز پھر یہی عمل کریں۔

مرہم کافور یہ مرہم ایسے زخموں کے لیے مفید ہے جن میں درد اور جلن ہو، یہ ان

میں تسکین بخشا اور جلدی بھر لاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان جلدیوں کو بھی فائدہ دیتا ہے جن سے زرد رنگ کا پانی سا بہتا رہتا ہے۔

امراض خبیثہ

حب لیموں یہ کوئل آتک میں مفید ہیں۔ صحت کے بعد استعمال کرنے سے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں، آتک کی وجہ سے پیدا ہونے والا گھٹیا اور دوسرے عوارض بھی اس کے استعمال سے دور ہو جاتے ہیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: صبح اور شام صحت سے بیمار لیں، صبح کی دہل اور گھٹیا (کوئی) سے پرہیز کریں۔

اس مرہم کے استعمال سے مرہم آتک آتک زخم سے جلد خشک

آتک

جوہر مٹلی آتک اور آتک کی وجہ سے پیدا ہونے والے گھٹیا اور غرس میں لاپتہ مفید ہے، پرانے سوزاک میں بھی فائدہ دیتا ہے، بدن میں سولوی مادہ کی وجہ سے اختلاج قلب اور گھبراہٹ رہتی ہو تو یہ بھی اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۳۰ ملی گرام

طریقہ استعمال: مٹلی میں یہ جوہر مٹلی کی جگہ رکھ کر گولی یا مارگلہ جائیں (چائیں نہیں) اور پھر ۵۰ ملی لٹر دہن لیں۔

طریقہ استعمال: یہ دوا کھاکر لوہے سے شربت بزدوری
۲۵ ملی لیٹر یا ۲۵ ملی لیٹر دودھ پانی میں ملا کر پیئیں۔

روغن بسرورہ سوزاک میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۳۰ قطرے

طریقہ استعمال: یہ روغن ناش یا تھوڑی جینی پر وال کر
کھائیں لوہے سے دودھ پیئیں۔

سقوط صندل سے لور پرانے سوزاک میں
مفید ہے، پیشاب کی جلیں کو

دور کرنا اور پیشاب کی نالی کے زخم کو بھرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ سفوف صبح کو دودھ کی لسی سے
کھائیں۔

سقوط کشتہ قلعی سے لور پرانے سوزاک میں
مفید ہے، سوزاک کی وجہ

سے جریان ہو تو اس کے استعمال سے دور ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ سفوف پھانک کر شربت بزدوری
۳۰ ملی لیٹر پانی میں ملا کر پیئیں۔

قرص سوزاک سوزاک کی مفید دوا ہے، ان
قرصوں کے استعمال سے

پیشاب کھل کر آتا ہے اور پیشاب کی نالی کا زخم بچھڑ
سالت ہونے کے بعد جلد ہی بھر جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۳ قرص

طریقہ استعمال: صبح اور شام یہ قرص پیچھے دودھ
سے کھائیں، گرمیوں میں دہی کے ساتھ پانی سے

استعمال کریں۔

ہو جاتے ہیں، دوسرے طبیعت زخم بھی اس کے لگانے
سے اچھے ہو جاتے ہیں۔

طریقہ استعمال: زخموں کو پہلے نیم کے پانی یا معمولی گرم
پانی سے دھو کر یہ مرہم لگائیں۔

معجون مصطفیٰ خاص آنکھ میں مفید ہے،
آنکھ کے علاوہ جذام،

دلو، خارش پرانے سوزاک اور پھوڑے پھنسیوں میں بھی
فائدہ دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو شربت مشہ خاص
۳۰ ملی لیٹر پانی میں ملا کر پیئیں۔

شریعت مشہ خاص، عرق مرکب مصطفیٰ طون،

معجون مشہ، معجون مصطفیٰ خاص، یہ سب

مرض آنکھ میں مفید ہیں، "لساد طون"

کے زیر عنوان درج ہیں۔

سوزاک

دوائے صندل سوزاک کی مفید دوا ہے،
پپ کو روکتی اور جلیں کو دور
کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ سفوف صبح و شام ۲۵ ملی لیٹر دودھ
کے ساتھ کھائیں۔

دوا کڑھائی والی سوزاک نپا ہو یا پرانا، اس کے
استعمال سے اچھا ہو جاتا ہے۔

قرص بھی اس دوا سے جاتا رہتا ہے۔

مقدار خوراک: ایک گراہیا ایک قرص

برص۔ پھلھری

برص (پھلھری) کے روغن برص جدید لے منہ ہے۔ اس کے لگا کر لگاتے رہنے سے برص کے سفید داغ صحت میں آجاتے ہیں۔

طریقہ استعمال: پھریری سے داغوں پر لگائیں۔
برص صحت اگر برص کا مرض زیادہ پرانا اور بدن پر زیادہ پھیلا ہوا ہو تو برص کے استعمال سے اچھا ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام
طریقہ استعمال: ناشو کے بعد دو رات کو سوئے وقت کھائیں۔

روغن بانجی برص (پھلھری) کے لے منہ ہے۔

طریقہ استعمال: برص کے داغوں پر لگائیں۔
سفوف برص برص (پھلھری) کے داغ اگر زیادہ دنوں کے نہ ہوں تو اس سفوف کے استعمال سے اچھے ہو جاتے ہیں۔

طریقہ استعمال: ۵ گرام یہ سفوف رات کو ۱۲۵ ملی لیٹر پانی میں بگو کر رکھیں، صبح کو صاف پانی تیار کر نہیں اور پھوک کو نہیں کر داغوں پر لگائیں۔

خنزیر (کٹھ مالا) رسولیاں

اٹریفل غدودی خنزیر (کٹھ مالا) میں منہ ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام
طریقہ استعمال: یہ اٹریفل رات کو پانی سے کھائیں۔
روغن اکسیر خنزیر خنزیری گھنٹیوں کو تحلیل کرنے کے لیے نایاب منہ ہے۔

طریقہ استعمال: تھوڑا سا یہ روغن چپے میں لے کر آگ پر گرم کریں پھر اس کو گھنٹیوں پر لگا کر انگلی سے ہلکے ہلکے ماتش کریں، اس کے بعد پانی یا تھیل یا لڑکا چار رکھیں اور دیر سے روٹی رکھ کر باغ میں۔

مرہم جدوار خنزیری گھنٹیوں اور دوسری گھنٹیوں اور رسولیوں کو تحلیل کرتا ہے اور زخموں کو بھرتا ہے۔

طریقہ استعمال: گھنٹیوں پر یہ مرہم گرم کر کے لگائیں اور نوپ سے پانی، تھیل یا لڑکا چار گرم کر کے رکھیں اور پھر روٹی رکھ کر باغ میں۔

بھگڈر۔ ناصور

مرہم خدش جدید بھگڈر اور ناصور میں ناصور دیتا ہے۔
اس کا ذکر گزشتہ صفحات میں درج ہے۔

بالوں کی بیماریاں

میٹیکل فیمینٹ فم کر رہے ہیں۔ یہ سر کی فنگی کو دور کرتا ہے۔ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اور نکل کر وقت بالوں کو سفید ہونے سے بچاتا ہے۔
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

بھارو دھیر آئل سیلا رنگ کے ملائم اور ہلکے دار بال خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ ہر دو ہیر آئل صابن یا کیزہ طر شہو دار تل ہے جو بالوں کو گرنے سے بچاتا ہے اور ان کو سیلا، ملائم اور ہلکے دار رکھتا ہے، ہر موسم میں اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے اسے استعمال کیجئے۔
طریقہ استعمال: سر کے بالوں میں لگا جاتا ہے۔

بے نظیر ہیر آئل ہالوں کے لیے لاجواب تل ہے۔ گرتے ہوئے بالوں کو روک دیتا ہے اور جس جگہ کے بال اڑ جاتے ہیں وہاں سے سر نوے بال پیدا کرتا ہے، اس کے علاوہ بالوں کو بڑھاتا اور ان کو سیلا پختے چمک دار بناتا ہے اور ساتھ ہی مداح کو حالات بھی دیتا ہے۔
طریقہ استعمال: سر کے بالوں میں لگا نہیں۔

بالوں کا گرنا

روغن آملہ سادہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا اور ان کی سیاسی کو محفوظ رکھتا ہے۔

طریقہ استعمال: سر کے بالوں میں لگا نہیں۔
روغن آملہ خاص یہ تل سر میں لگانے سے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا اور ان کو گرنے سے محفوظ رکھتا ہے، نیز بالوں کی سیاسی کو قائم رکھتا اور ان کو ملائم چمک دار بناتا ہے، اس سے سر کی فنگی دور ہو جاتی ہے، اور یہ بالوں کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔

طریقہ استعمال: سر کے بالوں میں لگا نہیں۔
زلزالہ زلالہ میں آملہ کے ساتھ ساتھ ملائی، سرسوں اور دوسری جڑی بوٹیوں بھی شامل ہیں۔ زلالہ بالوں کو دھوئی فیمین جگہ بالوں کی پرورش بھی کرتا ہے۔ زلالہ بالوں کی جڑوں میں چکنائٹ کی قدرتی صلاحیت کو قائم رکھتا ہے، جسے عام صابن اور

تو اگر وہ عمل کو وقت سفید ہو جائی تو اس کے بعد ۱۵ دن
سے مکی حالت پر لوٹ آئے ہیں۔

بال خورہ

روغن ذرہ طرح بال خورہ جس میں سرور
دوسری سرور کے بال گر کر
پختہ پختہ ہو جاتے ہیں اس میں سفید ہے۔
طریقہ استعمال چھوٹی پٹی پر مکی ہے۔

کنج

روغن چدر سرور روغن ذرہ طرح کنج کے لیے سفید
ہے۔ من کا ذکر لو پر آچکا ہے۔

سر کی جوئیں

جوئیں بھی جوئیں کو دیتی ہے۔ "خداش" کے زیر عنوان
نہ ہے۔

بالوں کا نہ لکنا

روغن بیضہ مرغ جس تک ہل نہ چکے ہوں،
اس روغن کی سرور تک
روغن بال کر کے سے بال لگ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ
چھوٹی بالوں کو بڑھا کر روغن کو وقت سے پہلے سفید ہو لے
کو دیتا ہے۔
طریقہ استعمال جس تک بال لگنا چاہیں وہاں اس کی
روغن بال کر کے۔

بالوں کا قبل از وقت سفید ہو جانا

بالوں کے عمل کو وقت سفید ہو لے کی صورت میں
اگر بال اسطو سرور کا اس روغن استعمال مناسب ہے۔ یہ
"دوسر" کے زیر عنوان مذکور ہے۔
خداش طور پر زلفہ، روغن آبلہ خاص اور روغن
چدر مرغ کے لگانے سے بالوں کی سیاہی بھڑک اُٹتی ہے

عام جسمانی کمزوری

سنگارا یہ ایک نہایت عیس جزل ٹانگ ہے جو دھکی جڑی بوٹیوں کے جوہر خوردن سب دماغوں سے تیار کیا جاتا ہے، جو انسانی جسم کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے استعمال سے بھوک بڑھتی ہے، ہضم درست ہوتا ہے، بدن میں جستی اور توانائی زیادہ پیدا ہوتی ہے، وزن بڑھتا ہے، ہڈیاں دبیر فوس اور مضبوط ہوتی ہیں، معدہ اور ہجر کا فعل درست ہو کر اچھے خون کی پیداواری بڑھ جاتی ہے، دماغ تروتازہ رہتا ہے۔ کام میں خوب جی لگتا ہے اور سستی اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ طوائف کے لیے حمل کے نالے میں اور بچوں کو دودھ پلانے کے دنوں میں اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ اس سے نہ صرف بدن کی صحت اور طاقت قائم رہتی ہے بلکہ بدن کے جسم سے غذا حاصل کرنے والے بچہ کی صحت پر بھی اس کا شائد اثر پڑتا ہے۔ بیماری کے بعد کی کمزوری دور کرنے اور طاقت حاصل کرنے کے لئے یہ لازم واجب ٹانگ ہے۔ نفع یہ کہ کی اور جملہ خرابیوں میں مفید ہے۔

طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے۔

شریت فولاد عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے عیب الاثر ہے، جو بیماریوں خون سے فولاد کے اجزاء کو کم کر کے اس کا کمپوڈی حساب بگاڑ دیتی ہیں، اور عام جسمانی کمزوری پیدا کر دیتی ہیں، ان کے بعد اس شربت کا استعمال مدد دے۔ مفید ثابت ہوتا ہے یہ خون کی رقت کو دور کرتا ہے اور اس

کی سرخی میں اضافہ کر کے ہرے کو سرخ بنا دیتا ہے۔

طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے۔

شریت اکسیر خاص خون کی سرخی اور اس قدر کو بڑھا کر رقت لدم (خون کی کی اور رقت لدم (خون کا پتلا پن) کو دور کرتا ہے، جسم کی پورش کر کے اس کی عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا اور قوت و انصاف (نچرل پاور) کو بڑھاتا ہے، دماغ و اعصاب کا نفع یہ بڑھا کر انہیں طاقت دیتا ہے۔ فریڈک اس طرح عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے میں عجیب اثر رکھتا ہے۔ ہر موسم اور ہر عمر میں مرد و عورت استعمال کر سکتے ہیں۔

طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے۔

حرق ماء اللحم غبیری بہ نسخہ کلاں دل دماغ، ہجر و دوسرے معادہ کو طاقت دیتا ہے، فرحت بخشا ہے، قوت پاؤ کو بڑھاتا ہے، نہایت زود اثر اور لطیف دھیس چیز ہے۔

مقدار طور اک : ۸۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال : روزانہ صبح کو یہ عرق، شربت اور شیریں ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر پییں، اگر دواہلک مسئلہ جو ابھرے گا کہ کر لوہے سے یہ عرق بخشن تو زیادہ بہتر ہے۔

کشتہ طلاء کلاں عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے، دل، دماغ اور ہجر و اعصاب کو طاقت دیتا اور خون کی پیداواری کو بڑھاتا ہے۔

ایلا اور چھ کا مقوی باد ہے۔

مقدار خوراک: ۳۰ ملی گرام ایک قرص

طریقہ استعمال: دو بار ہلکے معتدل جوہر دلی ۵ گرام یا
لوہ کبر ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں لوہے سے ۲۵۰ ملی لیٹر
دودھ پئیں۔

اس کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ جگر
گاموں کو تحریک دے کر خون کی پیدائش کو
بڑھاتا ہے۔ اور اس طرح خون کی کمی کو دور کر کے عام
جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اس میں اچھے اجزاء شامل
ہیں جو نقصان سے پیدا ہونے والی تمام بیماریوں کا
بہترین طاق ہیں۔ پیچیدہ لورڈوزوں کو طاقت دیتا ہے
اور بیماری سے اٹھے ہوئے مریضوں کے ضعف و کھٹکت کو
دور کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

ماء الحکم دو آتشہ دل کی وقت انتہائی کو
بڑھاتا ہے، دماغ و اعصاب

میں تسکین پیدا کر کے ان کی قوت میں اضافہ کرتا ہے،
جگر اور معدے پر بھی محرک اثر ڈالتا ہے اسی لیے اس کے
استعمال سے بھوک بڑھ جاتی اور کھائی ہوئی غذا اچھی طرح
ہضم ہونے لگتی ہے اور خون کی پیدائش بڑھ جاتی ہے اور
بڑھاپے میں بھی جوانی کی انگلیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ عام
جسمانی و عصبی کمزوری دور ہو کر ضعف باور ہو جاتا ہے۔
مردیوں میں ہر عمر کے مرد و عورت استعمال کر سکتے ہیں۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

منڈوزا جب بدن میں عیلم کی کمی ہو جاتی ہے تو
عام جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے،
دانت غراب ہو جاتے ہیں، بچوں میں ہڈیاں نرم پڑ جاتی
ہیں، ہر وقت زلزلہ رہنے لگتا ہے، ان حالات میں اس کے

استعمال سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے
والی عورتوں کو اس کی شدید ضرورت ہے۔ یہ دوا اقرصوں کی
شکل میں ہے اور یہ بہت جلد خون میں جذب ہو جاتے ہیں۔
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

ماء الصحت گرمی جیسے سخت موسم میں جگر،
گردوں اور جسم کی ٹھنک (خرد)
گلیوں کو بہت جلدی اور قوت سے مسلسل اپنا کام جاری
رکھ کر انسانی زندگی کو بچانے کا فرض انجام دیتا پڑتا
ہے، زندگی تو بیک ٹی جاتی ہے لیکن مسلسل کام
جاری رکھنے کی وجہ سے ان اعضاء کی قوت حیات
میں کمی آ جاتی ہے۔ ماء الصحت کے استعمال سے یہ قوت
حیات صحیح حالت میں واپس آتی اور محفوظ رہتی ہے۔ اس
سیل کے سطح سے اترنے سے تمام اعضاء کو نئی توانائی
حاصل ہوتی ہے اور وہ دستور اپنے افعال کو جاری رکھتے
ہیں۔ اگر پھر آتے ہوں، دل دھڑکتا ہو، طبیعت طحال
رہتی ہو تو یہ سب شکایتیں دور ہو جاتی ہیں اور طبیعت
ہشاش پیش رہنے لگتی ہے۔ مرد، عورت، جوان،
پولیس، بچے سب کے لیے یکساں مفید ہے۔
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

مطرح شکلیں بھی جسمانی کمزوری کے لیے
مفید ہے۔ یہ "ضعف دماغ" میں تحریک
ہیں۔ جواہر مرہ، طہیرہ امہ، عیلم حکیم ارشد
والا، طہیرہ مردارہ خاص، دواء الملک
معتدل سادہ، دواء الملک معتدل جواہر
والی، مطرح بلع الرئیں، یہ سب دوائیں
بھی عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے
لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ "ضعف قلب"
کے ذریعہ عنوان درج ہیں۔

درویشی دواخانہ (درجہ) کی دوائیں

گیس کٹ (درویشی چورن) : ریاضی گیس کی تمام تکالیف، پیٹ پھولنا، پیٹ کا درد، پیٹ میں جلن، دست آنا، پیش، مردانہ گیس خارج نہ ہونے کے لئے اکسیر دوا۔

درویشی امرت رس : دروس کی تحقیق کے بعد درویشی دواخانہ نے دل دماغ اور عام جسمانی کمزوری کے لئے بہترین دوا "درویشی امرت رس" پیش کی ہے۔ یہ اسکندھ دار چینی، آملہ، برہمی، الا پٹی، مصری، شند وغیرہ دس جڑی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ امرت دل دماغ، جگر، نسوں، پھٹوں میں نیا خون پہنچا کر ان کو طاقت عطا ہے۔ یادداشت کو تیز کرتا، مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے، نئی امیگ اور نیا جوش پیدا کرتا ہے۔ چالیس دن استعمال سے حیرت انگیز فائدے حاصل ہوتے ہیں۔
۵ گرام ایک چمچ صبح و شام دودھ یا پانی سے کھائیں۔

درویشی بھکر آمل : دلی جڑی بوٹیوں اور پھولوں سے تیار کر گدہ "درویشی بھکر آمل" تباہوں کو مضبوط کرتا، سفید ہونے سے روکتا اور ان کو کالا اور ملائم رکھتا ہے۔ نزلہ، زکام، سردی، دماغی کمزوری کے لئے لاجواب ہے۔

درویشی منجن : روغن لوبک والا ۲۳ جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ بھارت کا واحد منجن ہے، جو رانٹوں کے درد، سوزھوں کے درد، پانی، منہ سے بد بو آنا، ہر طرح کی رانٹوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ رانٹوں کو مضبوط اور چمکدار بناتا ہے۔

درویشی مرہم : یہ مرہم کھلی پھوڑے، پھسی، مسائے، جلنے، کٹنے، جانوروں کے کاٹنے، بواسیر وغیرہ کے لئے اکسیر صفت ہے۔ یہ زخموں کو بھرتا ہے درد کو تسکین دیتا ہے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ وقت پر کام آنے والی ہر گھر میں رکھنے والی چیز۔ درویشی مرہم آزما کر دیکھئے۔

بدنی فارمولے : دردی مشہور دواؤں سے تیار کردہ فوری آرام پہنچانے والا بدنی فارمولہ سردی، پھر آنا، کیزے کاٹنا، نمونیہ، سردی، گھٹیا، موج، چوٹ، چوٹ درد کے لئے لاجواب دوا۔ دانت کے درد، کیزا لگنے میں فوری فائدہ کرتا ہے۔ آنکھ اور کھلے زخم پر یہ دوا لگائیں۔

درویشی تیل : صرف بدنی استعمال کے لئے۔ دیدوں اور ٹیکسوں کے تجربات کا نمونہ، بھارت کا مشہور تیل ۲۵ جڑی بوٹیوں، سورنجان، تل، ہلدی، دار ہلدی، کاسحل دیوار، لوبان، کھلہ، ونگ، زکچور، چھریلہ، بہاوند، سوتھ، مال کٹنی، رالی، عم قرطم، ہالچور، لوبک، دار چینی، اک، سنبھالو، عرق، لسن، کافور، حنا وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے۔

پرانے سے پرانے درد، درم، موج، چوٹ، گھٹیا، کمر کا درد، پیٹھ اور کھٹوں کا درد، جلنے، کٹنے، زخم پھوڑے، کان کا درد، کمزور اور سوکھے مریضوں کی مالش، کھلی، خارش، ہاتھ پیروں کا پھٹنا، ہاتھ پیروں کی انٹھن، کیزے، کھوڑے اور بھوکے کاٹنے پر، سردی، نمونیہ، پیٹ کے درد جانوروں کے خراب زخم، کمر پکنا، کیزے پڑ جانے، کمزوری، بلا، فالج، لقوہ، گردن کا اکڑ جانا، رینڈ کے درد میں اس کا استعمال مفید ہے۔

درویشی دواخانہ

نسخوں میں لکھنے والے اشارے

اشارات	تشریح	اشارات	تشریح
GR	گرین	a a	برابر۔ برابر
G	گرام	a.c	کھانے سے پہلے
H S	سوتے وقت	Ad.	شامل کرو
in-D	روزانہ	ad-lib	مرضی کے مطابق ملاؤ
INJ	انجکشن کی دوا	Aqua	سادہ پانی
I.M	عضلاتی انجکشن	Aqua dist	کشید کیا ہوا پانی
I.V.	وریدی انجکشن	alt.hor	ایک گھنٹہ بعد
S.U B CUT	زیر جلد	alt	ایک دن چھوڑ کر
I U	انٹرنیشل یونٹ	B.I.D.	دن میں دو بار
OMN-BID	ہر تیسرے دن	B P.	پرنس فارما کوپیا
OMN B I H.	ہر ۲ گھنٹہ بعد	C°	سینٹی گریڈ
O.M.N NOCT	ہر رات کو	cum-or-c	ساتھ میں
Pro-rat eat	عمر کے مطابق	MIXT	مکسچر
P C	غذا کے بعد	Dil	ہلکا کر کے
Q S	بقدر ضرورت	FORT	تیز
R _x	لیجے	F°	فارن ہائیٹ
SIG	ہدایات	F.M	مکسچر بناؤ
S O S	بوقت ضرورت	F PILL	گولی بناؤ
TR	تکچر	S.S	آدھا حصہ

تشریح	اشارات	تشریح	اشارات
فورا	STAT	مرہم	UNG
نکمیہ	TAB	ہدایت کے مطابق	e.m.p.
بڑا چھو بھر کر	Table.S.F	پودر	PULV
پائے کا چھو بھر کر	Tea.S.F.	دن میں تین بار	T.D.S.
برگھنٹہ	Q.H.		

بچوں کی مقدار خوراک

بچوں کی خوراک کبھی گنی ہے۔ بچوں کو دو اجویز کرتے وقت ان کی عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ بچے کی عمر میں ۱۲ جمع کر کے اس کی عمر کے سال سے تقسیم کر دیا جائے جو حاصل نکلے اتنا حصہ پوری خوراک کا بچے کو دیا جائے۔ مثلاً چار سال کے بچے کے لئے۔

(۱۶ = ۳ + ۱۲ + ۳) — (۴ = ۳ ÷ ۱۶) یعنی پوری خوراک کا چوتھائی حصہ بچے کو دیا جائے۔ آسانی کے لئے بچے ہم عمر کے مطابق خوراک دینے کا طریقہ لکھ رہے ہیں اس سے بھی مدد لی جاسکتی ہے۔

ایک سال کے عمر کے بچے کے لئے پوری خوراک کا بارہواں حصہ	($\frac{1}{12}$)
دو سال " " " "	($\frac{1}{6}$)
تین سال " " " "	($\frac{1}{4}$)
۴ سال " " " "	($\frac{1}{3}$)
۵ سال " " " "	($\frac{1}{2}$)
۶ سال " " " "	($\frac{2}{3}$)
۷ سال " " " "	($\frac{3}{4}$)
۸ سال " " " "	($\frac{4}{5}$)
۹ سال " " " "	($\frac{5}{6}$)
۱۰ سال " " " "	($\frac{2}{3}$)
۱۱ سال " " " "	($\frac{3}{4}$)
۱۲ سال " " " "	($\frac{4}{5}$)
۱۳ سال " " " "	($\frac{5}{6}$)
۱۴ سال " " " "	($\frac{2}{3}$)
۱۵ سال " " " "	($\frac{3}{4}$)

ادویہ کا ری ایکشن، علاج و تدابیر

DRUG - REACTION

ایلوپیتھک ادویہ میں جہاں یہ خصوصیت ہے کہ وہ فوری اثر کرنے والی خطرناک اور مہلک بیماریوں سے مریض کو نجات دلانے والی ہیں، وہاں ان میں یہ نقص بھی ہے بعض اوقات ان کا رد عمل اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، عام طور سے مشہور یہ ہے کہ مینسی لین اور نے نے نس کے انجکشن کاری ایکشن ہوتا ہے۔ حالانکہ اسٹریپٹومائی سین، وٹامن پی او، کلوروکوئن، لورایکسٹریکٹ، ہر قسم کی ویکسین اور گلوکوز سیلائن کی بوتل چڑھاتے وقت بھی ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ ایک معروف معالج کے لئے یہ بہت مشکل ہے کہ ہر انجکشن کو پہلے ٹسٹ کرے اور پھر لگائے لہذا ری ایکشن کے ازالہ کی تدابیر سے ہر معالج کو آگاہ ہونا چاہیے، بوتل چڑھاتے وقت مریض کو جاڑا آ جانا۔ کچلی ہونا عام بات ہے اس کے لئے سب سے بہتر میرے تجربے میں بوتل کے ساتھ ہی یا فوراً بعد ڈیکسی میٹھا سون ایول آئی ڈی زون یا ڈیکاڈرون کا انجکشن لگا دیا جائے اس سے مریض بوتل کے ری ایکشن سے محفوظ رہتا ہے، اسٹریپٹومائی سین۔ اور کلوروکوئن کے شدید ری ایکشن کے کیس بھی تجربے میں آئے۔ ایک مریض کو اسٹریپٹومائی سین کا انجکشن لگاتے ہیں جسم میں کھلی۔ ہاتھ بیروں میں آگ لگتا۔ سانس کی قفل، پسینے کی کثرت، چکر، تے، متلی وغیرہ کی شکایت پیدا ہو گئی فوراً مریض کو اسے دل، ڈیکاڈرون، ایڈری ٹالین دیا گیا ساتھ ہی گلوکوز کی بوتل چڑھائی گئی اس کے بعد ہی اسٹریپٹومائی سین کا رد عمل ختم ہوا۔ کلوروکوئن کا بچوں پر بہت خراب رد عمل ہوتا ہے ۵ سال سے کم عمر بچوں کو کلوروکوئن کا انجکشن نہ لگائیں۔ اس کے لئے بھی ڈیکاڈرون ۱۵۰۰ ملٹی سال بہترین چیز ہے۔ لہذا ہر معالج کو چاہئے کہ اپنے مطب میں ری ایکشن پر قابو پانے والی ادویات ضرور موجود رکھے ورنہ بعض وقت بڑے خطرناک نتائج بھگتتے پڑتے ہیں۔

حمل کے ایام میں دواؤں کے اثرات

قدرت نے عورت کے اندر ایسے اعضاء کی تخلیق کی ہے جس سے حمل فطری طریقے سے انجام پزیر ہونا چاہیے اس کے باوجود بعض ایسی تبدیلیاں بھی اس حالت میں پیدا ہوتی ہیں جس سے کچھ غیر معمولی کیفیات مثلاً تھکائی، غلٹی، نفاہت وغیرہ جیسی تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان علامتوں کے لئے اور دوسری عام بیماریوں کے لئے حاملہ کو اگر دوا دینا ضروری ہو تو ڈاکٹر کی نگرانی میں اور خوب سوچ سمجھ کر دوا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ جو دوا حمل کی حالت میں استعمال کرائی جاتی ہے ماں کے خون کا جز بن کر بچے کے جسم میں سرایت کرتی ہے۔

رحم میں پرورش پانے والے بچے کے نظام مکمل ہوتے نہیں ہیں اس لئے ان دواؤں کے معر اثرات کا ازالہ نہیں کر سکتا۔

تجربات و تحقیقات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ بعض دوائیں پیٹ میں پرورش پانے والے بچے اور حاملہ عورتوں پر تباہ کن اثرات ڈالتی ہیں۔ ۱۹۶۱ء میں امریکہ میں دوا "تھالیدومائڈ" جو کہ ممکن اعصاب اور بے خوابی کے لئے استعمال کی جاتی تھی اس دوا کو جب حاملہ عورتوں نے استعمال کیا تو اس سے بچوں کی خلقت پر اثر پڑا اور ایسے بچے پیدا ہوئے جو جسمانی اور دماغی لحاظ سے ناقص تھے ان کے ہاتھ پیر بھی چھوٹے رہ گئے اس وجہ سے اس دوا کو وہاں خلاف قانون قرار دینا پڑا۔

حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں بچے کے دل، پٹھے، رگیں نشوونما پانے لگتی ہیں ان ایام میں اگر ایسی دوائیں حاملہ کو استعمال کرائی جاتیں جو بچے کی نشوونما میں خلل ڈالنے والی ہوں تو ان کا جنین کی ساخت پر بہت برا اثر پڑتا ہے خاص طور پر دافع کینسر دوائیں حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں بہت معر ثابت ہوتی ہیں، اس بات کا ثبوت مل چکا ہے کہ اس حالت میں دافع کینسر دوائیں دینے سے پیروں کا خیر حال ہونا، دماغ میں فتور اور گردوں کا غائب ہونا پایا گیا۔ کارٹی سون کے مرکبات حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں استعمال کرنے سے بچے کے تالو، ہونٹ کٹے ہونے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ حمل کے ایام میں سگریٹ، تمباکو اور

شراب نوشی کے خراب اثرات کے ثبوت ملے ہیں سگریٹ پینے والی حاملہ عورتوں کے ہونے والے بچے دل کے امراض میں مبتلا اور شراب نوشی کرنے والی حاملہ کے بچوں کو سست، کامل اور دل کے امراض میں مبتلا پایا گیا ہے۔

حمل کے دوسرے تین ماہ اور آخری تین ماہ میں جو دوائیں استعمال کرائی جاتی ہیں وہ بھی جنین (بچے) پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اگر ان کو احتیاط سے استعمال نہ کرا جائے تو بچے کی جسمانی ساخت تک متاثر ہوتی ہے جس سے زندگی وبال جان بن جاتی ہے۔ ان ایام میں شراب، سائیکلین، کانڈرین، حادہ استعمال ہڈیوں میں زہریلے اثرات اور دانٹوں کو پیسلے رنگ میں تبدیل کرتا ہے۔ اسٹروئیدی سین کا زیادہ استعمال ہونے والے بچے کو بہرہ کر سکتا ہے، منوم دواؤں Hypnotics کا زیادہ استعمال بچے کے نظام تنفس اور اعصاب کو نقصان پہنچاتا ہے، مرخی عضلات ادویہ بچے کی ساخت کو متاثر کرتی ہیں، اسپرین یا اس کے مرکبات سے بچے کو ہیپوفیلیا (خون کا پتلا پن) اور یرقان جیسی تکالیف ہو سکتی ہیں، دافع بلند پریشادویہ بھی حاملہ کے لئے بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ جنسی بارمون کے بے جا استعمال سے بھی بچوں کے اندر کینسر اور ان کی جنس پر خراب اثر پڑ سکتا ہے۔ مانع حمل خوردنی گویاں (Contraceptive) کے استعمال سے جدید تحقیقات کے مطابق بچوں کی جسمانی ساخت متاثر ہوتی ہے۔

حمل کے ایام کے علاوہ دودھ پلانے کے ایام میں استعمال کی جانے والی ادویہ بھی بچے پر اثر انداز ہوتی ہیں، منوم دوائیں (Hypnotics) دودھ کے ذریعہ بچے کے جسم میں پہنچ کر اعصاب و تنفس کو متاثر کرتی ہیں، لہذا مرضہ کو بھی دوا دیتے وقت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔

کہنیوں کی پلہنی سے متاثر ہو کر ایک عام فیشن بن گیا ہے کہ ایام حمل اور ایام رضاعت میں کمیٹیم اور فولاد کے ٹانگ استعمال کرائے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایام حمل و رضاعت میں طاقت بخش اجزاء کی ضرورت بڑھ جاتی ہے اس کمی کو مقوی اور وٹامن سے بھرپور غذاؤں سے پورا کیا جاسکتا ہے اور اگر شدید ضرورت ہو تو ڈاکٹر کے مشورے اور نگرانی کے بغیر ٹانگ کا استعمال مناسب نہیں۔ کیونکہ جنین اور نومولود کے نرم و نازک جسم کے لئے بے ضرر دوا بھی مضر ہو سکتی ہے۔ ذیل میں ہم ان ادویات کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں جو حمل کے دوران ماں اور بچے کے لئے مضر ثابت ہوتی ہیں۔

نام دوا	حاملہ پر اثرات	احتیاطی تدابیر
• ایپس سیلین کے مرکبات مثلاً روسی لین، بروسل وغیرہ	• تجربات سے ان ادویہ کا استعمال دوران حمل محفوظ نہیں۔	• لہذا بہت احتیاط کے ساتھ ان کا استعمال کیا جائے۔
• ایما سی سیلین کے مرکبات مثلاً سائی ٹوموکس اموکسائی لین وغیرہ	• دوران حمل ان کا استعمال معرت سے خالی نہیں۔	• بہت احتیاط اور ڈاکٹر ہدایت کے تحت ہی استعمال کریں۔
• کلورم فینی کال کے مرکبات مثلاً رک لور، پراکسن انبرومائی سین کے مائی شین وغیرہ	• جنین پر زہریلے اثرات مرتب ہوتے ہیں حرکت قلب متاثر ہوتی ہے جلد اور غصہ خفاقی پر فیلے دھبے پڑ جاتے ہیں۔	• شدید ضرورت کے تحت ڈاکٹر کی نگرانی میں پوری طرح احتیاط سے استعمال کرائیں۔
• ڈاکسی سائیکلین کے مرکبات مثلاً وی دو سائیکلین، ٹرائی ڈوکس ڈیوراسائیکلین ٹرڈاکس وغیرہ	• حمل کے نصف ایام یعنی ساڑھے چار ماہ بعد ان کے استعمال سے بچے کے دانت پیلے یا بھورے رنگ کے ہو جاتے ہیں۔	• احتیاط سے ڈاکٹر کی نگرانی میں ہی استعمال کرنا چاہیے۔
• ارائی تھرومائی سین کے مرکبات مثلاً ارائی سٹر۔ آل تھرو سین، رحمہ مائی سین، تھرومائی سین وغیرہ۔	• یہ مرکبات بھی حاملہ کے لئے پورے طور پر محفوظ نہیں پائے گئے۔	• ان کے استعمال میں بھی احتیاط رکھنی چاہیے۔

نام دوا	حاملہ پر اثرات	احتیاطی تدابیر
• جنٹامائی سین کے مرکبات، مثلاً جیرامائی سین۔ جنٹی سین وغیرہ	• یہ بھی دوران حمل معذرت سے خالی نہیں۔	• احتیاط سے استعمال کرائیں
نیو مائی سین کے مرکبات، مثلاً سلواکول۔ ڈایکب وغیرہ	دوران حمل اس کا استعمال معذرت سے خالی نہیں۔	احتیاط سے استعمال کریں
پینی سیلین کے مرکبات، مثلاً ہائیڈر۔ کرسٹاچین۔ فونو سین وغیرہ	اس گروپ کی دواؤں کے دوران حمل بے ضرر ہونے کی تحقیق نہیں ہوئی۔	احتیاط سے استعمال کریں۔
ریٹام پنی سین کے مرکبات، مثلاً رمین۔ نبرن۔ لپوسن وغیرہ۔	جنین کی ساخت میں خرابی ہونے کا امکان ہے۔	بہت احتیاط اور شدید ضرورت کے تحت ہی استعمال کریں اور دوا کے اثرات پر دھیان رکھیں۔
ایس پو مائی سین کے مرکبات مثلاً اسٹریپٹو نیلس۔ کومائی سین۔ اینیسٹرین وغیرہ	بچے میں بہرہ پن پیدا ہو سکتا ہے۔	ڈاکٹر کی نگرانی میں کافی احتیاط سے استعمال کرائیں۔
نٹراسائیڈ کلین کے مرکبات، مثلاً نیرامائی سین ہوسٹاسائیڈ۔ ایڈرمائی سین۔ سائیکلین۔ ال سائیکلین غیر مائی سین وغیرہ۔	دوران حمل ان ادویہ کے استعمال سے بچے کے نکلنے والے دانت مستقل طور سے پہلے، بعد سے اور بد رنگ ہو جاتے ہیں اور نمونہ پیریدین	اس لئے ان مرکبات کا استعمال انتہائی ہوشیاری سے اور ڈاکٹر کی نگرانی میں ہی کرانا چاہئے۔ آگے بند کر کے اندھا دھند استعمال مناسب نہیں۔

نام دوا	حاملہ پر اثرات	احتیاطی تدابیر
	<p>میں زہریلے اثرات سرایت کر جاتے ہیں خاص طور سے جب کہ حمل کے آخری نصف ایام میں استعمال کر لیا جائے۔</p>	
<p>دافع درد دوزیم (NSAID) مثلاً اسپرین فینائل بوتازون امیڈوپائی رین انڈومیتھاسین اسکی فن بوتازون سلی سیلانیڈ ابوپروفن الوپری نال وغیرہ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspirin • Ibuprofen, Naproxen, Fenopufen, • Oxyphenbutazone • Metamizol • Propyphenazone • Indomethacin • Auranofin • Phenacetin • Nefopam • Carbamazepine • Ketorolac • Mephenamic • Piroxicam • Piroxicam- • Tenoxicam • Meloxicam • Diclofenac Sodium • Diclofenac Potassium • Nimesulide • Nimesulide • Sulphasalazine 	<p>اسپرین کا استعمال حمل کی حالت میں خطرے سے خالی نہیں زیادہ مقدار میں دینے سے جریان خون کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور نوزائیدہ بچان کا خطرہ ہوتا ہے۔ امیڈوپائیرین کے استعمال سے جنین میں خون کے سفید ذرات کی شدید کمی ہو جاتی ہے، فینائل بوتازون سے رحم مادر میں زہریلے اثرات مرتب ہوتے ہیں دودھ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، سلی سیلانیڈ۔ انڈومیتھاسین کے مرکبات کا استعمال حالت حمل میں خطرناک ہے۔</p>	<p>اسپرین کی معمولی مقدار احتیاط سے دی جاسکتی ہے، لیکن زیادہ مقدار اور عرصہ تک اس کا استعمال من سب نہیں۔ امیڈوپائیرین، فینائل بوتازون، اسکی فن بوتازون، سلی سیلانیڈ، وغیرہ شدید ضرورت کے وقت ڈاکٹر کی نگرانی میں احتیاط سے استعمال کرائی جاسکتی ہے، مگر ابوپروفین اور انڈومیتھاسون کے مرکبات حاملہ کو ہرگز استعمال نہ کرائیں کیونکہ ان کے زہریلے اثرات چھاتیوں میں جمع ہو جاتے ہیں</p>

نام دوا	حاملہ پر اثرات	احتیاطی تدابیر
<p>مسکن اعصاب۔۔۔تے۔۔۔حلی۔ آبکائی۔ چکر دور کرنوالی ادویات مثلاً لار جیکلیل۔ سیری نہیں۔ اسٹی سے ٹل سی کوئل اسکازائٹم وغیرہ</p> <p>Anti emetics</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prochlorperazine • Metoclopramide • Promethazine • Trifluoperazine • Trifluopromazine • Mecizine • Domnamid with V80 • Metahistline 	<p>چوہوں پر لار جیکلیل کے تجربات سے پتہ چلا ہے کہ یہ جنین پر زہریلے اثرات مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ مہلک صلاحیت رکھتی ہے۔ نوزائیدہ میں امکانی طور پر برقان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لار جیکلیل لیے عرصے تک زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے بچنے کی بینائی جانے کا خطرہ رہتا ہے یہی حال تمام مسکن اعصاب دواؤں کا ہے۔</p>	<p>لہذا اس قسم کی دواؤں کو جہاں تک ممکن ہو حالت حمل میں ہرگز نہ دیں اور اگر شدید ضرورت پڑی جائے تو کم سے کم مقدار میں استعمال کرائیں تاکہ نقصان پہنچنے کا کم سے کم امکان رہے۔</p>
<p>مسکن اور منوم ادویات، مثلاً مورفی تیل، نسوئال لومی تیل، Sedatives Hypnotics</p>	<p>ادویات حالت حمل میں خطرے سے خالی نہیں ولادت کے وقت اس کے استعمال سے جنین کے تنفس کے کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ دوائیں ماں کے دودھ میں شامل ہو جاتی ہیں۔</p>	<p>حالت حمل اور ولادت کے وقت یہ دوائیں استعمال نہ کریں دودھ پلانے والی عورتوں کو استعمال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ دودھ میں شامل ہو جاتی ہیں۔</p>

نام دوا	حاملہ پر اثرات	احتیاطی تدابیر
کلورو کوئن ریسوچین، نوا کوئن سیلو برن وغیرہ ANTIMALARIALS • Sulfonamide • Sulfadoxine 500 mg + Pyrimethamine • Chloroquine • Mefloquine • Quinine Sulphate	حمل کی حالت میں اس سے بچے کو بہرہ پن کا خطرہ اور ایگر خلقی بد وضعی کا اندیشہ ہے، حمل کے ابتدائی ایام میں استقاط کا خطرہ ہے۔	اسی لئے حالت حمل میں کلورو کوئن خطرے سے خالی نہیں حتی الامکان اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔
پرائی ما کوئن • Primaquine	حالت حمل میں اس کا استعمال نوزائیدہ کو یرقان یا خون کے اجزا متفرق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔	لہذا اس کو حالت حمل میں کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
آئی سوئیس آئی سوکن وغیرہ	حالت حمل میں اس کے مخالف اثرات پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔	اس کا استعمال حالت حمل میں خاص طور سے آخری تین ماہ سے قبل استعمال کرنا مناسب نہیں۔
ای تھمبوٹال، تھمبوٹال وغیرہ Ethambutol Combunex Combutox Inambutol Forte Myambutol Mycobutol Myconex 600	اس کے استعمال سے بچے میں خلقی بد وضعی پیدا ہونے کا خطرہ ہے	احتیاتی شدید ضرورت کے بغیر اس کو حالت حمل میں استعمال نہ کریں۔
میٹری ناؤ یا بول لئے جل، میٹرو جل ار شو جل وغیرہ Metronidazole Entamizole Entrozyme-M Susp. Flagyl Flagyl-F Inseptin-MF Kaltin MF Metrogyl/GelF Microneg Monizole Negadix-M Ougyl Unimezol	حالت حمل میں اس کا استعمال جنین کی بد وضعی کے خطرے سے خالی نہیں اور اس دوا کے استعمال سے کینسر کے خفیف اثرات بھی ملے ہیں۔	اس کا استعمال حالت حمل میں خاص کر ابتدائی ۳ ماہ میں برتر نہ کریں ایام رضاعت میں بھی یہ خطرہ سے خالی نہیں۔ نرائی کو مونس کی سرایت میں بھی اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔

نام دوا	حاملہ پر اثرات	احتیاطی تدابیر
<p>زمانہ مردانہ جنسی ہارمون کے حرکات، مثلاً نارسٹرین۔ مانع حمل گولیاں۔ کلی نسرول اور ایسائی کلین۔ سیکروڈاکل پرولووان۔ ٹشو سٹرون ڈیکا ڈیورابولین۔ ہرالی مولٹ ایکوایران وغیرہ۔</p> <p>•Oestrogen •Estrodel •Ethinyltestradel •Norethisterone Enemate •Tibolone •Progesterone •Norethindrone Acetate •Hydrogesterone •Hydroxyprogesterone •Lynestrol •Testosterone •Mestosterone •Danazol •Athyloestrol</p>	<p>حمل کی حالت میں مانع حمل گولیاں جنین میں خللی بد وضعی پیدا کر سکتی ہیں، کلی نسرول کے حاملہ کو استعمال سے جنین میں لڑکی ہے تو اس پر مردانہ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں، ایکوایران، ٹشووران ڈیکا ڈیورابولین وغیرہ بھی انہی خصوصیات کا حامل ہیں ایکوایران چھاتیوں میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس کو دودھ پلانے والی عورتوں کو کبھی استعمال نہ کریں۔</p>	<p>تمام قسم کی جنسی ہارمون کو حالت حمل میں کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے خاص طور سے مردانہ جنسی ہارمون مثلاً ٹشو-سٹران، ایکوایران تو کسی بھی حالت میں حاملہ کو ہرگز ہرگز نہ دیں۔</p>
<p>ای تھوٹائیڈ مثلاً ری جن سڈ۔ ٹریس کا مکمل وغیرہ۔</p>	<p>اس کے استعمال سے جنین کے اندر خللی بد وضعیاں پیدا ہو جاتی ہیں خاص طور سے اگر اس کو ابتدائی حمل کے ۳ ماہ میں استعمال کر یا جائے۔</p>	<p>اس دوا کو دوران حمل استعمال کرنے سے حتی الامکان پرہیز کریں۔</p>
<p>نارٹو فورن ٹائٹن مثلاً فورٹون ٹین فوری ٹک پائی بی بی کال وغیرہ۔</p>	<p>دوران حمل یا دودھ پلانے کے زمانے میں اس دوا کا استعمال غیر محفوظ ہے۔</p>	<p>ڈاکٹری کی زیر نگرانی احتیاط کے ساتھ ہی حمل کے دوران استعمال کر سکتے ہیں۔</p>

پھر ازین، اتنی پار ہیل ہانڈ وغیرہ	اس کا استعمال ایام حمل میں مضرت سے خالی نہیں۔	ضرورت پڑنے پر احتیاط سے استعمال کرائیں۔
پائی ری میٹھا من ڈیرا ہم (طیرا سے حفاظت کے لئے)	دوران حمل اس کا استعمال جنین میں خلقی بد وضعی پیدا کر سکتا ہے۔	انتہائی شدید ضرورت پر ہی اس دوا کو دوران حمل استعمال کرائیں اور وہ بھی ڈاکٹر کی ذمہ دہرائی۔
فیورڈولیزین کے مرکبات مثلاً، فیورڈوکسون لوموفین وغیرہ	حالت حمل میں اور ایام رضاعت میں اس کا استعمال مضرت سے خالی نہیں۔	ضرورت شدیدہ پر ڈاکٹر کی ذمہ دہرائی اس کو استعمال کریں
سلفا گروپ کی دویہ مثلاً سلفا ڈی ڈین میڈری لون وغیرہ	سلفا گروپ جنین کے خون میں تیزی سے پہنچ کر گردش کرنے لگتے ہیں اس لئے ذہریلے اثرات پیدا ہونے کا خطرہ ہے	بہت احتیاط سے اور ضرورت شدیدہ پر ہی استعمال کریں۔
پھر ازین، اتنی پار ہیل ہانڈ وغیرہ	اس کا استعمال ایام حمل میں مضرت سے خالی نہیں۔	ضرورت پڑنے پر احتیاط سے استعمال کرائیں۔
پائی ری میٹھا من ڈیرا ہم (طیرا سے حفاظت کے لئے)	دوران حمل اس کا استعمال جنین میں خلقی بد وضعی پیدا کر سکتا ہے۔	انتہائی شدید ضرورت پر ہی اس دوا کو دوران حمل استعمال کرائیں اور وہ بھی ڈاکٹر کی ذمہ دہرائی۔
فیورڈولیزین کے مرکبات مثلاً، فیورڈوکسون لوموفین وغیرہ	حالت حمل میں اور ایام رضاعت میں اس کا استعمال مضرت سے خالی نہیں۔	ضرورت شدیدہ پر ڈاکٹر کی ذمہ دہرائی اس کو استعمال کریں۔

<p>بہت احتیاط سے اور ضرورت شدید پر ہی استعمال کریں۔</p>	<p>سلفا گروپ جنین کے خون میں تیزی سے پہنچ کر گردش کرنے لگتے ہیں اس لئے زہریلے اثرات پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔</p>	<p>سلفا گروپ کی ادویہ مثلاً بالکون۔ میڈری بون وغیرہ</p>
<p>احتیاط سے استعمال کرائیں۔</p>	<p>حالت حمل میں یہ ادویہ بچے میں خلقی بد وضعی پیدا کر سکتی ہے۔</p>	<p>ٹراموکسازول، میتھاپرم کے سرکبات مثلاً سپران، بیسی ٹرم سائی نس، ہیٹ وغیرہ۔</p>
<p>ان دواؤں کے ایام حمل میں استعمال سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہئے۔ اگر ضرورت پڑی جائے تو بہت احتیاط سے اور کم سے کم مقدار میں</p>	<p>کارنی سون کے دوران حمل استعمال سے ہونے والے بچے کے تالو میں دراڑیں</p>	<p>کارنی کو ٹھرا پیڈ مثلاً کارلن بائی ڈرہ کارنی سون۔</p>
<p>استعمال کرائیں تاکہ نقصان کا امکان کم سے کم رہے۔</p>	<p>پڑ جاتی ہیں ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح پریڈنی سولون کے استعمال سے بچہ پیٹ میں مردہ ہو جانے اور جنین کے جسمانی اور ذہنی طور پر معذور ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو عورتیں دوران حمل پریڈنی سولون یا کینا کارٹ وغیرہ استعمال کرتی رہی ہوں ان کو تھائی رائیڈ ہارمون کی شدید</p>	<p>پریڈنی سولون ٹرائم سی لون بیٹا میتھاسون۔ ڈیکامیتھاسون وغیرہ</p>

	<p>کی ہو جاتی ہے۔</p> <p>بنا میٹھا سون، اور ڈیکسا میٹھا سون بھی ان ایام میں معضرت سے خالی نہیں۔</p>	
<p>دوران حمل خاص طور سے ابتدائی ۳ ماہ میں ذیابیس جیسی پیشاب آور ادویہ بالکل نہ دیں۔</p> <p>لاسٹس سے بھی پرہیز کریں باقی دوائیں بھی شدید ضرورت پر ڈاکٹر کی نگرانی میں کم مقدار میں استعمال کرائیں، اگر دودھ پلانے والی ماں ہائی تھاٹان اور کینا کامب میں سے کوئی دوا استعمال کر رہی ہو تو بچے کو دودھ پانا بند کر دے، کیونکہ یہ دونوں دوائیں دودھ میں تحلیل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔</p>	<p>دوران حمل ذیابیس کے استعمال سے جنین میں خلقی بد وضعی کے علاوہ جنین کی موت کا بھی خطرہ رہتا ہے۔</p> <p>یہی حال لاسٹس اور الڈکٹون کا بھی ہے ہائی تھاٹان استعمال سے نوزائیدہ بچے میں یرقان اور خون کے ذرات میں شدید کمی کا خطرہ رہتا ہے یہی خطرہ کینا کامب میں بھی ہے یہ دونوں ماں کی چھاتیوں میں موجود دودھ میں شامل ہو جاتی ہے۔</p>	<p>مدرات بول (ڈایورٹک) ادویہ، مثلاً ذیابیس لاسٹس ہائی تھاٹان الڈکٹون کینا کامب اور بانی تھاٹرین وغیرہ</p> <p>DIURETICS</p> <ul style="list-style-type: none"> •Furosemide •Spironolactone •Triamterene •Hydrochlorothiazide •Clopamide •Chlorthalidone •Acetazolamide •Xipamide

کئی دوائیں ایک ساتھ استعمال کرنے کے نتائج

آج کل اکثر ڈاکٹر عموماً اپنے نسخوں میں کئی دوائیں ایک ساتھ تجویز کر دیتے ہیں۔ متعدد دوائیں ملا کر دینے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرض پر جلد قابو پا لیا جائے دوا کے بد اثرات کو دور کیا جائے اور دوا کو زیادہ منوثر بنا کر مریض کی صحت بحال کی جائے، لیکن یہ افسوسناک حقیقت بھی ہے کہ اس طرح کئی دوائیں ایک ساتھ دینے سے جہاں اس کے مفید نتائج برآمد ہوتے ہیں وہاں بعض اوقات اس کے برعکس اور معضرات بھی مرتب ہوتے ہیں اور بجائے فائدے کے نقصان پہنچتا ہے۔ ایک معالج کے لئے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ دواؤں کے باہمی ربط اور ان سے پیدا ہونے والے اثرات سے واقف ہو۔ بد قسمتی سے اس طرف کم توجہ دی گئی ہے حالیہ چند برسوں میں یورپی ممالک میں اس پر تحقیق ہوئی اور اب اس کے نتائج ہندوستان میں بھی شائع ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک شاید اردو زبان میں دواؤں کے باہمی ربط کے بارے میں کوئی معلومات شائع نہیں ہو سکی۔ ہم نے انگریزی لٹریچر کی مدد سے یہ معلومات فراہم کر کے اردو داں حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ دواؤں کے باہمی ربط اور اس کے اثرات کی اسی صرف ڈاکٹروں تک ہی محدود نہیں۔ بلکہ دوا ساز کمپنیاں جو دواؤں کی ریسرچ پر کافی روپیہ صرف کرتی ہیں ایسی دوائیں باہم ملا کر مارکیٹ میں پیش کرتی ہیں جن سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا مثلاً ٹیرامائی سین اور وٹامن سی کے ملانے سے ٹیرامائی سین کا اخراج گردوں کے ذریعہ تیزی سے ہونے لگتا ہے اور اس کا مانع جراثیم اور دافع ورم اثر بہت جلد ختم ہو جاتا ہے اس طرح اس سے مطلوبہ فوائد پوری طرح حاصل نہیں ہوتے اسی طرح کی بہت سی مثالیں آگے پیش کی جا رہی ہیں ہمیں امید ہے کہ یہ مضمون ڈاکٹروں کے لئے بہت مفید اور نتیجہ خیز ثابت ہو گا۔

کئی دواؤں کو ایک ساتھ دینے کے اثرات

مندرجہ ذیل ادویہ کس ساتھ	اگر یہ دوائیں دی گئیں	کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟
<ul style="list-style-type: none"> • سلفونامائڈ مثلاً الکلوسن (سیلینڈر کائن (سائی ٹائڈ) تھ، ازلول، سلفاڈایازین سلفاڈیمی وین وغیرہ کے ساتھ۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • دافع تیزابیت دوائیں مثلاً۔ جیلوسل۔ • الکارب۔ ڈائی جین دینے پر۔ • ڈیابیطیس دور کرنے والی ادویات مثلاً۔ ڈایا بے نیز۔ ٹالہوٹامائڈ وغیرہ کھلانے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • سلفونامائڈ کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس لئے ان کے ساتھ دافع تیزابیت دوائیں نہیں دینا چاہئے۔ • ڈیابیطیس دور کرنے والی دواؤں کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔
<ul style="list-style-type: none"> • ہینسی لین جی۔ پوڈ کرسٹین۔ ہسٹرین ڈائی کرشا سین، کبائی ٹک وغیرہ کے ساتھ۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • دافع تیزابیت جیلوسل، ڈائی جین وغیرہ دینے پر۔ • کلوروم فینی کال دینے پر • ٹراسائیکلین دینے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ہینسی لین کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس لئے ہینسی لین کے ساتھ دافع تیزابیت Antacid نہیں دینا چاہئے۔ • ہینسی لین کا اثر ختم ہو جاتا ہے • ٹراسائیکلین کی وجہ سے ہینسی لین کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ • لہذا ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دینا چاہئے۔
<ul style="list-style-type: none"> • ایوکسی سیلین مثلاً سائی ٹائڈ (سارابھائی) لاموکسی (ایکاکا) ایوکسی ایم کے ساتھ 	<ul style="list-style-type: none"> • دافع تیزابیت مثلاً جیلوسل۔ • ڈائی جین وغیرہ دینے پر۔ • ارائی تھرومائی سین دینے پر 	<ul style="list-style-type: none"> • ایوکسی سیلین کا اثر ختم ہو جاتا ہے لہذا اس کے ساتھ دافع تیزابیت نہیں دینا چاہئے

<ul style="list-style-type: none"> • ایسوسی سیلین کا اثر تیز ہو جاتا ہے۔ • ایسوسی سیلین کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • نثر اسائیکلین دینے پر 	<p>Amesyltin Amlo Amoxil Amoxiben Augmentin Bicidal Plus Bumex Carbomex Comday Demol Dexam Flamox Hpen Hpende Idamox</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ایسوسی سیلین کا اثر کم ہو جاتا ہے اس لئے ان کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ • ایسوسی سیلین کا اثر محدود ہوتا ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • دافع تیزابیت جیلوسی۔ ڈائی جین وغیرہ دینے پر۔ • کلورومفنیکل کال کے دینے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • امی سیلین مثلاً البر سیلین (البرٹ ڈیوڈ) کھکی سیلین (بیزا) بروسل (I.D.P.L.) وغیرہ کے ساتھ
<ul style="list-style-type: none"> • ایسوسی سیلین کا اثر تیز ہو جاتا ہے۔ • ایسوسی سیلین کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ہیفی لین استعمال کرنے پر • عضلات کو دھیرا کرنے والی دوائیں مثلاً مایانے سین۔ پیرافون وغیرہ دینے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • غذائی سین کے مرکبات مثلاً انٹرومیک (ایک ڈیپیک وغیرہ کے ساتھ۔
<ul style="list-style-type: none"> • خون کی انجمادی کیفیت دور کرنے کا عمل رک جاتا ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • انجماد خون کو روکنے والی ادویہ مثلاً یونی وارلین وغیرہ دینے پر 	<ul style="list-style-type: none"> • پیڈینی سولن کے مرکبات سے سولون ڈیلنا کارٹرل وغیرہ کے ساتھ۔
<ul style="list-style-type: none"> • ان ادویہ کا جسم میں تحلیل ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور ان کا اثر جلد ختم ہو جاتا ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • انٹی ہشامین مثلاً فرکان۔ فورسٹل وغیرہ دینے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • جینامیٹھاسون کے مرکبات مثلاً جینی ان (گلیکسو) جینا کارٹرل (غیر) وغیرہ کے ساتھ
<ul style="list-style-type: none"> • ڈیکسامیٹھاسون کا عمل رک جاتا ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • دافع۔ ٹی۔ بی ادویات مثلاً۔ آئی سوٹیکس۔ پاس یونی تھائی مین وغیرہ دینے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ڈیکسامیٹھاسون کے مرکبات مثلاً ڈیکازون (MSD) سلی کارٹن (سیا) آئی

<ul style="list-style-type: none"> • معدہ آنتوں میں زخم بننے کا اندیشہ رہتا ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • اسپرین۔ اسے پی۔ سی کوڈوپائی رین وغیرہ دینے پر 	ذی زون وغیرہ کے ساتھ۔
<ul style="list-style-type: none"> • کارٹی سون کے جسم سے تحلیل ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ • اور وہ جلد اپنا اثر ختم کر دیتے ہیں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • فینو ہاربی ٹون کے مرکبات مثلاً گارڈیٹال وغیرہ استعمال کرنے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • کارٹی سون۔ • سی۔ ٹی۔ ایچ وغیرہ کے ساتھ۔
<ul style="list-style-type: none"> • ہائیڈرو کارٹی سون کے مرکبات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ • ہائیڈرو کارٹی سون کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ • پوٹاشیم کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ لہذا پوٹاشیم دینا چاہئے۔ • انسولین کا شکر گھٹانے کا عمل رک جاتا ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • دافع مرگی ادویات مثلاً اسے پی ٹی لان۔ ڈائی لن ٹین ایپ سولین وغیرہ دینے پر۔ • اسٹروجن کے مرکبات دینے پر۔ • فروسی مائیڈ۔ لاسکس وغیرہ دینے پر۔ • انسولین دینے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ہائیڈرو کارٹی سون کے مرکبات کے ساتھ۔ • Hydrocortisone • Allopurinol • Wycont
<ul style="list-style-type: none"> • سانس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے لہذا ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال نہ کریں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • جسم کو ڈھیلا کرنے والی ادویات مثلاً ملیانا سین، پرافون وغیرہ دینے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • جتنا مائی سین مثلاً جیرامائی سین (فل فورڈ) جیٹی سائن (کو اس) وغیرہ کے ساتھ۔
<ul style="list-style-type: none"> • نٹراسائیکلین کی قوت ختم ہو جاتی ہے لہذا اس کے ساتھ انٹاسڈ دافع تیزابیت دینے سے پرہیز کرنا چاہئے۔ • نٹراسائیکلین کے اثر سے 	<ul style="list-style-type: none"> • دافع تیزابیت مثلاً جیلوسل، ڈائی جین وغیرہ دینے پر۔ • مینسی لین کے مرکبات 	<ul style="list-style-type: none"> • نٹراسائی کلین مثلاً ریسیٹی کلین (سارابھائی) ٹیرامائی سین (فزر) (لیڈرمائی سین) (دکارٹ) (او پی سم) (I.D.P.L) وغیرہ کے ساتھ۔

<p>• ہٹسی لین سے اثر ہو جاتی ہے۔</p> <p>• فولاد کے مرکبات مثلاً</p> <p>• فولاد کے مرکبات جسم میں</p> <p>• جذب نہیں ہو پاتے لہذا ان کو</p> <p>• ایک ساتھ نہیں دینا چاہئے۔</p> <p>• نٹراسائیکلین جسم سے جلد</p> <p>• خارج ہو جاتی ہے اس کا پورا</p> <p>• فائدہ نہیں ہوتا۔</p>	<p>• دینے پر۔</p> <p>• فولاد کے مرکبات مثلاً</p> <p>• رابرٹون، ٹونافیرون وغیرہ دینے</p> <p>•</p> <p>• وٹامن سی۔ سی لن۔</p> <p>• ریڈاکسن۔ کسی وغیرہ دینے پر</p>	<p>•</p> <p>Tetracycline Achromycin Dicycline Nostacycline-500 Idilin Ractecin Subamycin prep. Thiacycline</p>
<p>• ہٹسی لین کا جراثیم کش اثر</p> <p>• بہت کم ہوتا ہے۔</p> <p>• ڈاکسی سائیکلین کی جراثیم</p> <p>• کش تاثیر ختم ہو جاتی ہے</p> <p>• ڈاکسی سائیکلین کی تاثیر</p> <p>• ختم ہو جاتی ہے۔</p> <p>• ڈاکسی سائیکلین کے جراثیم</p> <p>• کش تاثیر کم ہو جاتی ہے۔</p> <p>• اینٹی کاولیٹ کی تاثیر بڑھ</p> <p>• جاتی ہے اور خون دیر میں جمتا</p> <p>• ہے۔</p>	<p>• ہٹسی لین کے مرکبات اس</p> <p>• کے استعمال کرنے پر۔</p> <p>• دافع تیزابیت جیلوسل ڈائی</p> <p>• جن وغیرہ دینے پر۔</p> <p>• سوڈائی کارب دینے پر</p> <p>• فولاد کے مرکبات دینے پر</p> <p>• خون جمنے کی صلاحیت کم</p> <p>• کرنے والی دوائیں۔</p> <p>(ANTICOAGULANT)</p> <p>• مثلاً ڈی پی وان بذریعہ دہن</p> <p>• دینے پر۔</p>	<p>• ڈاکسی سائیکلین مثلاً وی</p> <p>• ڈاکسی سائیکلین لائی ڈوکس (لایکا)</p> <p>• ڈیور سائیکلین (پونیکم) لا۔</p> <p>• (بی۔ بی) نٹراڈاکس، (رین</p> <p>• بخشی) وغیرہ کے ساتھ۔</p> <p>•</p> <p>Doxycycline Biodox Doxyl-1 Doxypal-DR Durecyclin Lydon Vibazine OT Vivocycline</p>
<p>• ہٹسی لین کا اثر ختم ہو جاتا</p> <p>• ہے</p> <p>• دافع مرگی ادویات کا اثر ختم</p> <p>• ہو جاتا ہے۔ لہذا ان کے ساتھ</p>	<p>• ہٹسی لین کے مرکبات</p> <p>• دینے پر۔</p> <p>• دافع مرگی ادویات مثلاً ڈائی</p> <p>• لیٹن (بی۔ ڈی) ایپ لپ ٹن</p>	<p>• کلورم فینی کال مثلاً رک لور</p> <p>• (سارابھائی) کیٹی لان (ہائیسٹ)</p> <p>• پر آسان (نال) کلورومائی سین</p> <p>• (بی۔ ڈی) وغیرہ کے ساتھ۔</p>

<p>ایپ ٹون (بونس) وغیرہ دینے پر۔</p> <p>• دافع ذیابیطس دوائیں ساتھ دینے پر۔</p> <p>• اینٹی کالمولیٹ مثلاً ANTICOAGULANT یونی وار افین۔ اور ہپارن دینے پر۔</p> <p>• کلو روم فینی کال کے مرکبات استعمال نہیں کرنا چاہیے۔</p> <p>• ذیابیطس کو دور کرنے والی دواؤں کا اثر تیز ہو جاتا ہے</p> <p>• کلو روم فینی کال کے اثر سے خون کو جمانے کی تاثیر کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔</p>	<p>• گرائی سوفلوین مثلاً گرائی سوڈین (گلیکسو)</p> <p>• آئی ڈی فلوین (I.D.P.L.) وغیرہ کے ساتھ۔</p> <p>• خون کو جمنے کی صلاحیت کم کرنے والی دوائیں دینے پر۔</p> <p>• ہارپی ٹون۔ گارڈینال وغیرہ دینے پر۔</p>	<p>• ایڈومیٹھاسین کے مرکبات مثلاً ایڈوسڈ (MSD) آئی ڈی سن (I.D.P.L.) استعمال کرنے پر۔</p> <p>• پاس (P.A.S.) کے مرکبات مثلاً پاسونیکس کبونیٹکس وغیرہ استعمال کرنے پر۔</p>
<p>• ایڈومیٹھاسون کا دافع درد ورم اثر ختم ہو جاتا ہے لہذا ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔</p> <p>• پاس (PAS) کے زیرِ لیے اثرات بڑھ جاتے ہیں لہذا ان دونوں کو ایک ساتھ کبھی استعمال نہ کریں۔</p>	<p>• کارنی سون کے مرکبات مثلاً پیڈی سولون۔ وے سولون</p>	<p>• لیسرین اور اس کے مرکبات مثلاً اسپرین لیسرہ۔</p> <p>• تاسین کوڈوپائی رین۔ مائیکروپائی رین۔ اے پی ڈین (I.D.P.L.)</p> <p>• اے۔ پی۔ سی وغیرہ کے ساتھ۔</p>
<p>• ایڈومیٹھاسون کا دافع درد ورم اثر ختم ہو جاتا ہے لہذا ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔</p> <p>• پاس (PAS) کے زیرِ لیے اثرات بڑھ جاتے ہیں لہذا ان دونوں کو ایک ساتھ کبھی استعمال نہ کریں۔</p> <p>• معدہ میں زخم بننے اور معدہ سے خون آنے کا خطرہ بڑھ جاتا</p>	<p>• کارنی سون کے مرکبات مثلاً پیڈی سولون۔ وے سولون</p>	<p>• لیسرین اور اس کے مرکبات مثلاً اسپرین لیسرہ۔</p> <p>• تاسین کوڈوپائی رین۔ مائیکروپائی رین۔ اے پی ڈین (I.D.P.L.)</p> <p>• اے۔ پی۔ سی وغیرہ کے ساتھ۔</p>

<p>• گرائی سو فلوین کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ فیکس پر اثر نہیں کرتیں۔</p> <p>• مرگی کے دورے روکنے کا اثر ان ادویہ میں ختم ہو جاتا ہے۔</p> <p>• فینائل بوتازون کا دفاع درد ورم دافع گھٹیا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</p> <p>• نظام عصبی کمزور ہو جاتا ہے لہذا ان دونوں کو ملا کر استعمال نہ کریں۔</p>	<p>Anti Coagulant دینے پر۔</p> <p>• گرائی سو فلوین (بی پی) گرائی سووین (گلیکسو) وغیرہ دینے پر۔</p> <p>• دافع مرگی ادویات مثلاً ڈائی لن ٹین (P.D.) اور جیروٹن (M.B.) وغیرہ دینے پر۔</p> <p>• فینائل بوتازون کے مرکبات مثلاً ارگاپائی رین۔ بوتارین وغیرہ دینے پر۔</p> <p>• ٹرائیکولائی زر مثلاً کالپوز وغیرہ دینے پر۔</p>	<p>بیماری سن (M.B.)</p> <p>بیشائین (B.W)</p> <p>ہارزین (")</p> <p>فور شال (سیا)</p> <p>کالٹین (اتھنور)</p> <p>وغیرہ کے ساتھ۔</p> <p>• "</p> <p>• "</p>
<p>• ہاربی ٹون کا اثر خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے لہذا ان دونوں کو نہ ملائیں۔</p> <p>• ہارفین کا اثر بڑھ جاتا ہے لیکن فیورازولی ڈین کا جراثیم کش ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی دورے بھی پڑنے لگتے ہیں، لہذا ان دونوں کو نہ ملائیں۔</p> <p>• آئی سوٹیکس کے بد اثرات</p>	<p>• ہاربی ٹون - مگروڈی ٹال دینے پر۔</p> <p>• فیورازولیڈین کے مرکبات مثلاً فیوروسون S.K.F. لوموفین (سیرلے) دینے پر۔</p> <p>• آئی سوٹیکس کے مرکبات مثلاً آئی سوٹیکس۔ آئی سوکن وغیرہ دینے پر۔</p>	<p>• ہارفین کے مرکبات مثلاً ہارفین۔</p> <p>• میڈیڈین (M.B.) کلوروڈین وغیرہ کے ساتھ۔</p> <p>• "</p> <p>OPIOID ANALGESICS</p> <p>• Dextropropoxyphene</p> <p>• Pentazocine</p> <p>• Suprenorphine</p> <p>• Morphine Sulphate</p> <p>• Tramadol Hydrochloride</p>

<ul style="list-style-type: none"> • پیدا ہو جاتے ہیں۔ • نظام عصبی میں خطرناک ضعف پیدا ہو جاتا ہے اس لئے افیون اور شراب کو ہرگز ایک ساتھ استعمال نہ کرائیں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • الکوحل۔ شراب دینے پر۔ 	
<ul style="list-style-type: none"> • فینائل بیوٹازون کا دافع ورم و درد اثر ختم ہو جاتا ہے۔ • فینائل بیوٹازون کا ورم و درد ورنے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ • خون میں دافع مرگی دواؤں کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ • جنسی ہارمون کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • انٹی ہسٹامین ادویات مثلاً ہٹڈرل (P.D.) آنٹھی سان (M.B.) دینے پر۔ • ہارپی ٹون۔ گارڈینال لوی نال وغیرہ دینے پر۔ • دافع مرگی ادویہ، ذہنی لین ٹین (P.D.) ایپ ٹون اپنی لپٹن I.D.P.L. دینے پر • ایسٹروجن پروجسٹرون کے مرکبات دینے پر 	<ul style="list-style-type: none"> • فینائل بیوٹازون کے مرکبات مثلاً اسکاپائی رین (S.G) بیوٹارین (تھے مس) زولنڈین (کیگی) الیجے سین۔ (الیک) • تھلوپائی رین (یونیک) • بی پی زولین (B.P.L.) ساتھ
<ul style="list-style-type: none"> • دافع درد ادویہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ • ان ایسٹرائیڈ کا جسم میں جذب ہونے کا عمل بڑھ جاتا ہے اور دافع ورم اثر ختم ہو جاتا ہے۔ • مرکزی نظام عصبی (C.N.S) میں خطرناک قسم کا ضعف پیدا 	<ul style="list-style-type: none"> • انا لجن، نووالجن وغیرہ دینے پر۔ • کارٹی کوسٹرائیڈ مثلاً پردنی سولون۔ • ڈیکسامیٹھاسون، ڈیکازون دینے پر۔ • انٹی ہسٹامین ادویہ مثلاً 	<ul style="list-style-type: none"> • فینو ہارپی ٹون کے مرکبات مثلاً گارڈی نال (M.B.) پھابارب (کیگی) سہالجن (اسیا) • سوئٹل (ایٹ) • سوزمان (ایم۔ بی) وغیرہ کے ساتھ

<p>ہو جاتا ہے۔</p> <ul style="list-style-type: none"> • مانع حمل ادویہ جلد تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ • ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ • ان کے ساتھ فینوباریٹون بذریعہ انجکشن نہ دی جائے۔ • ہارپی ٹون کا مسکن اثر ختم ہو جاتا ہے۔ • فینائل ہیڈازون کا دافع ورم و درد اثر ختم ہو جاتا ہے۔ • ہارپی ٹون کا مسکن اثر خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے۔ • مرکزی نظام عصبی (CNS) انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ 	<p>الہول، بنڈرل، فورسٹال دینے پر۔</p> <ul style="list-style-type: none"> • مانع حمل ادویہ مثلاً لودین۔ • انڈولرپرائی موڈلر۔ وغیرہ دینے پر۔ • دافع مرگی ادویات مثلاً ڈائی لین ٹین اپٹائن وغیرہ دینے پر۔ • دافع دیابیطس مثلاً ریسی نائ۔ ڈائل وغیرہ دینے پر۔ • فینائل ہیڈازون کے مرکبات مثلاً اسگاپائی رین۔ • ہیڈازین دینے پر۔ • نشہ آور ادویہ مثلاً شراب۔ • افیم۔ وغیرہ دینے پر۔ 	<p>HYPNOTICS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barbiturates • Nitrazepam • Diazepam • Flurazepam • Triclofos
<ul style="list-style-type: none"> • اسٹروئڈ جسم میں تیزی سے تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے ان کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ • ایسٹروجن۔ اسٹروئڈ کا اثر بڑھا دیتے ہیں۔ • کارٹی کو سٹروئڈ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • اینٹی ہشامین مثلاً الہول • فزکان وغیرہ کے دینے پر • ایسٹروجن مثلاً • ادوسایکلین، کلی نسرول وغیرہ کے دینے پر۔ • دافع مرگی ادویات مثلاً • ڈائیلین ٹن۔ اپی لمپٹن دینے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • کورٹی کو سٹروئڈ مثلاً پریڈن سولون ڈیکسامیٹھاسون۔ • لائیڈروکارٹی سون (رسل) جینی سال (گلکسو) کیناکارٹ (سارا) ایف کارلن وغیرہ کے ساتھ۔

<p>• اسٹرائیڈ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</p> <p>• دافع ذیابیطس دواؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اسٹرائیڈ خون میں شکر کی مقدار بڑھا دیتے ہیں۔</p> <p>• پونا شیم کا اخراج بڑھ جاتا ہے اس لئے پونا شیم ساتھ میں دینا چاہیے۔</p> <p>• انڈومیجھاسین کے اثر سے اسٹرائیڈ کا اثر تیز ہو جاتا ہے۔</p> <p>• اعصابی شکایات اور شدید بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔</p>	<p>• دافع ذیابیطس دوائیں دینے پر۔</p> <p>• فروسی مائیڈ کے مرکبات مثلاً لاسکس۔ ایسی ڈریکس سلی ٹیکس دینے پر۔</p> <p>• انڈومیجھاسین کے مرکبات مثلاً۔ انڈوسڈ۔ آئی ڈی سین D.P.L. دینے پر۔</p> <p>• ویکسین دینے پر۔</p>	<p>CORTICOSTEROIDS</p> <p>•Hydrocortisone Acetate •Dexamethasone •Betamethasone •Prednisolone •Triamcinolone •Hydrocortisone Sodium</p>
<p>• ڈیجی ٹلیس کے زہریلے اثرات میں اضافہ ہو جاتا ہے پونا شیم کا اخراج شدت سے ہونے لگتا ہے۔</p> <p>• خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور دافع ذیابیطس دواؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</p> <p>• کان کے اندر تکالیف مثلاً بہرہ ہن۔ جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔</p>	<p>• ڈیجی ٹلیس کے مرکبات مثلاً لے ناکس (B.W.) کا رڈاکسن (سینڈوز) دینے پر۔</p> <p>• دافع ذیابیطس ادویہ مثلاً ریسی نال۔ ڈائل دینے پر۔</p> <p>• اسٹروئیدی سین۔ جنٹامائی سین۔ کنٹامائی سین دینے پر۔</p> <p>• ہلڈ پریشر کم کرنے والی</p>	<p>• ڈیورٹکس (مدارات) مثلاً لاسکس (پلاٹ) سلی ٹیکس (I.D.P.L.) ڈیورال (الہک) ایسی ڈریکس (اسیا) انڈل (فزر) ڈائی ایڈن (سارامائی) (بی۔ پی۔ ایلم) (بی۔ پی۔ ڈی) (بی۔ پی۔ ڈی) (بی۔ پی۔ ڈی) (بی۔ پی۔ ڈی)</p>

امی تھ کریں۔ (لائنڈیکا)
لائنڈیکون (سیرے)
و غیرہ کے ساتھ

دوائیں مثلاً الڈوسٹ وغیرہ
دینے پر۔
• دافع ہلڈ پریشر دواؤں کی
تاثير بڑھ جاتی ہے۔
• کارٹی سون کے مرکبات
مثلاً پریڈی سولون۔ ڈیکاڈرون
وغیرہ دینے پر۔
• پیشاب میں تیزابیت پیدا
کرنے والی ادویہ۔ مثلاً ایسوسٹم
کلورائیڈ وغیرہ دینے پر۔
• پیشاب میں کھاری پن پیدا
کرنے والی دواؤں مثلاً سوڈا ہائی
کارب الکا سول وغیرہ دینے پر۔
• پیشاب زیادہ آنے کا عمل
تیز ہو جاتا ہے۔
• ہارپول (ڈایورٹک) اثر
رک جاتا ہے۔

• ڈیجی ٹلیس کے مرکبات
مثلاً لے تاکسن (BW)
کارڈیو کسن (سینڈوز)
سینڈی لائڈ (سینڈوز)
ایسٹری لائڈ ("")
وغیرہ کے ساتھ۔

• ڈیجی ٹلیس کے زہریلے
اثرات بڑھ جاتے ہیں اس لئے
ان دونوں کو ساتھ نہ دیں۔
• ڈیجی ٹلیس کے جسم میں
تحلیل ہونے کا عمل تیز ہو جاتا
ہے جس کی وجہ سے اثر میں کمی
آ جاتی ہے۔
• نبض کی حرکات ست دل
دوبنے Bradicardia کی
شکایت ہونے لگتی ہے۔ دل کے
مریضوں کو یہ دونوں دوائیں
• میلشیم گلوکونیٹ انجکشن
لگانے پر۔
• فینوباربی ٹون۔ گارڈیٹال
وغیرہ دینے پر۔
• دل کی حرکات کو درست
کرنے والے مرکبات مثلاً سپار
(سپلا) کارڈی ٹیب انڈی رال۔
وغیرہ دینے پر
• ہلڈ پریشر کم کرنے والی
دوائیں مثلاً انڈوپاسیر پاسل
سرپی روٹین دینے پر۔

<p>ایک ساتھ برگزندہ دیں۔</p> <p>• دل کی حرکات بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔</p>		
<p>• ہلڈ پریشر کم کرنے کی صلاحیت ان دواؤں سے بڑھ جاتی ہے۔</p> <p>• میٹھاگل ڈوپاک ہلڈ پریشر کم کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔</p>	<p>• نیرل جیسی پیشاب آور دوائیں دینے سے۔</p> <p>• ایم فیما میں کے مرکبات مثلاً بنڈرین S.K.F. دینے سے۔</p>	<p>• میٹھاگل ڈوپاک (ہلڈ پریشر کم کرنے والی) والڈوسٹ (M.S.D) ایم ڈوپاک (I.D.P.L.) ساتھ</p>
<p>• ڈپ سون کا دافع جذام اثر بڑھ جاتا ہے۔</p>	<p>• گردوں کی رہا عطی لین کے اخراج کو روکنے والی دوائیں جو پرانے گھٹیا میں دی جاتی ہیں مثلاً بنڈرین (MSD) دینے سے</p>	<p>• دافع جذام ادویہ مثلاً ڈپ سون نوو فون (B.C.) وغیرہ کے ساتھ</p>
<p>• ایڈریٹالین کا اثر تیز ہو کر دل کو نقصان پہنچتا ہے۔</p> <p>• خون میں شکر کی مقدار کم کرنے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</p> <p>• ایڈریٹالین کا محرک قلب اثر ختم ہو جاتا ہے اس لئے دونوں کو شامل نہ کریں۔</p>	<p>• اتنی ہشامین ادویہ مثلاً ایول فور سال۔ سی پی ایم دینے پر۔</p> <p>• دافع ذیابیطس دوائیں مثلاً ریستیٹان۔ ارنون وغیرہ دینے پر۔</p> <p>• دل کی بے ترتیب حرکات کو درست کرنے والی ادویات مثلاً سپار۔ کارڈی ٹیب وغیرہ دینے پر۔</p>	<p>• اور پتالین کے ساتھ۔</p>

<ul style="list-style-type: none"> • تصبوقائی لین کے اثر کو خطرناک حد تک بڑھاتی ہیں جس سے زہریلے اثرات اور ری ایکشن کا اندیشہ ہوتا ہے۔ • دافع گھٹیا اثر کم ہو جاتا ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • دیگر دوسرے دور کرنے والی دوائیں مثلاً ایڈرین۔ امیتوفاک لین وغیرہ دینے پر • دافع گھٹیا ادویات دینے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • تصبوقائی لین، ڈیری قائی لین وغیرہ کے ساتھ
<ul style="list-style-type: none"> • تخس کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے اس لئے میڈ سلف کے ساتھ ڈیازی پام کبھی نہ دیں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ڈیازی پام۔ کالپوز وغیرہ دینے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • میڈ سلف کے ساتھ۔
<ul style="list-style-type: none"> • سکون کا اثر کم ہو جاتا ہے اس لئے اس کے ساتھ اناسٹن نہ دیں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • اناسٹن۔ ڈیاجین جیلوسل دینے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ٹرائی فلور و مازین مثلاً سی کوئل (سارابھائی) وغیرہ کے ساتھ۔
<ul style="list-style-type: none"> • دافع تشنج ادویات کا اثر تیز ہو کر نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ • دورہ روکنے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ • دافع تشنج دواؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ • گرائی سولون کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ • دافع تشنج دواؤں کے زہریلے اثرات بڑھ جاتے ہیں اور 	<ul style="list-style-type: none"> • لیسرین کے مرکبات دینے پر۔ • باربلیٹون دینے پر • کلورم فینی کال دینے پر • گرائی سولون کے مرکبات دینے پر۔ • آئی سوٹکس دینے پر • ٹرائیکولائی زر، کالپوز۔ • لبریمید دینے پر • انجی کوکولکٹ مثلاً 	<ul style="list-style-type: none"> • دافع تشنج ادویات مثلاً • ڈائی لینٹین (P.L.) • کوئی مال (بار) • تیرونین (M.B.) • وغیرہ کے ساتھ • فولاد کے مرکبات مثلاً • ربر ہیکس (سارابھائی) • ربر انون ("") فی فول (S.K.F.) • ایسی ران (TF) وغیرہ کے ساتھ۔ • "

<p>نقصان دہ اثرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔</p> <ul style="list-style-type: none"> ایسٹروجن دافع تشنج اثرات کو بڑھا دیتے ہیں۔ دافع تشنج دواؤں کے مخالف اثر کرتا ہے اور درد روکنے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ 	<p>کوہڈین وغیرہ دینے پر۔</p> <ul style="list-style-type: none"> ایسٹروجن مثلاً کلی نسرول دینے پر۔ فونک ایسڈ دینے پر۔ 	<p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p>
<ul style="list-style-type: none"> فولاد کے مرکبات کا گردوں سے اخراج بڑھ جاتا ہے اور خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو پاتا۔ فولاد کے مرکبات کی تاثیر میں دیر نکلتی ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> دافع تیزابیت مثلاً جیلوسل ڈالی جین وغیرہ دینے پر۔ کلورم فینیل کال دینے پر 	<ul style="list-style-type: none"> فولاد کے مرکبات مثلاً ریر ہیکس (سارا بھائی) ریر اٹون (") ٹی فول SKF اٹمی ران TF وغیرہ کے ساتھ۔
<ul style="list-style-type: none"> انڈومیتھاسین کا دافع مٹھیا درد دور دور اثر ختم ہو جاتا ہے۔ انڈومیتھاسین کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ انڈومیتھاسین کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ انڈومیتھاسین کا اثر تیز استعمال کرنے پر۔ خون کے جمنے کی صلاحیت کم کرنے والی ادویہ (Anti Coagulant) دینے پر 	<ul style="list-style-type: none"> ایسپرین کے مرکبات دینے پر۔ فینائل بیوٹازون کے مرکبات دینے پر۔ ڈیکسایمیتھاسون۔ پرنیڈنی سولون دینے پر۔ سیلی سیلیٹ کے ہر دنی خون کے جمنے کی صلاحیت کم کرنے والی ادویہ (Anti Coagulant) دینے پر 	<ul style="list-style-type: none"> انڈومیتھاسین کے مرکبات مثلاً انڈوسٹ (M.S.D.) آئی ڈی پی لن (I.D.P.L.) کے ساتھ Indomethacin Klon Indocap/SPV

<ul style="list-style-type: none"> • میٹیم سالت مثلاً میکل • (سینڈوز) • میٹیم گلو کو میٹ وغیرہ کے ساتھ۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ڈیجی ٹیلس کے مرکبات • مثلاً ڈی جاکسن لے ناکسن دینے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • میٹیم کے نمکیات ڈیجی ٹیلس کے زہریلے اثرات کو بڑھا دیتے ہیں اس لئے ان کو ساتھ ساتھ کبھی نہ دیں۔
<ul style="list-style-type: none"> • ٹائٹرو فورن ٹائٹ کے مرکبات مثلاً فیوراؤن ٹین (S.K.F.) پائی راکا سل (اتھنور) ٹیرو سٹ (رپ ٹکاس) کے ساتھ 	<ul style="list-style-type: none"> • دافع تیزابیت مثلاً ڈائی جین۔ سلومیک۔ مک سل دینے پر۔ • گرامونیک دینے پر 	<ul style="list-style-type: none"> • ان دواؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے لہذا ان دواؤں کو نہ ملائیں۔ • گرامونیک کے مخالف اثر ہوتا ہے اور وہ بے کار ہو جاتا ہے۔
<ul style="list-style-type: none"> • ریٹام پی سن (دافع ٹی بی) کے مرکبات مثلاً ٹی بی رام (رین بخش) رام پن (لائی کا) ریٹاپان کے ساتھ 	<ul style="list-style-type: none"> • پاس PAS کے ساتھ دینے پر • مانع حمل خوردنی دوائیں مثلاً سیکروڈائل، اٹالر اوولین وغیرہ دینے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ریٹام پی سن دیر میں خون کے اندر جذب ہوتا ہے۔ • حمل کے روکنے والی ادویات بالکل بے اثر ہو جاتی ہیں۔
<ul style="list-style-type: none"> • آئی سوئیٹس وغیرہ کے ساتھ 	<ul style="list-style-type: none"> • وٹامن بی ۱۲ دینے پر 	<ul style="list-style-type: none"> • وٹامن بی ۱۲ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔
<ul style="list-style-type: none"> • مقامی تسکین پہنچانے والی ادویات مثلاً نوو کیکن (ہائسٹ) زائی لو کیکن (S.G) بنو کیکن (الہک) انٹی حصین (گلیکو) وغیرہ کے ساتھ۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • سلفونامائیڈ مثلاً سلفا ڈایازین، سلفا ڈی ڈین دینے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • سلفونامائیڈ کا جراثیم کش اثر ختم ہو جاتا ہے۔
<ul style="list-style-type: none"> • گلوکوز کی بوجھل چھانے کے ساتھ۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ڈیجی ٹیلس کے مرکبات دینے میں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ڈیجی ٹیلس کے زہریلے اثرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

<ul style="list-style-type: none"> • خون میں شکر کی مقدار تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • انسولین دینے پر 	<ul style="list-style-type: none"> • پوٹاشیم سالٹ مثلاً پالاکال • پ پ نکاس پاٹ کمر (M.H.) کے ساتھ
<ul style="list-style-type: none"> • خون میں شکر کی مقدار تیزی سے کم ہونے لگتی ہے اور ذیابیطس کو ماکا خطرہ رہتا ہے۔ • انسولین کا اثر ست کر دیتے ہیں۔ • انسولین کی مقدار زیادہ لینی پڑتی ہے کیونکہ اس کا اخراج جلد ہو جاتا ہے۔ • انسولین زیادہ مقدار میں لینا پڑتی ہے۔ • خون میں شکر کی مقدار بہت زیادہ گھٹ جاتی ہے۔ • دافع ذیابیطس دواؤں کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ • انسولین کی خون میں کم کرنے کی صلاحیت گھٹ جاتی ہے۔ • انسولین کا شکر گھٹانے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ • خون میں شکر کی مقدار تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • دسیرین کے مرکبات دینے پر۔ • کارٹی سون کے مرکبات مثلاً پریڈنی سولون۔ • ڈیگازون وغیرہ دینے پر • مدرات مثلاً فروسی مائیڈ لاسکس وغیرہ دینے پر۔ • ٹیڑا سائیکلین دینے پر • کلورم فینی کال دینے پر • دافع ذیابیطس دواؤں دینے پر • ایسی نوزولامائیڈ کے مرکبات مثلاً ڈیا سوکس، ڈان ریگس دینے پر • سلفونامائیڈ دینے پر۔ • فینائل بوتازون کے مرکبات مثلاً اسکاپائی رین وغیرہ دینے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • انسولین کے مرکبات کے ساتھ۔ <div data-bbox="1069 660 1284 963" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Insulin Actraphene Actrapid Human Actraphene Human Actrapid Human Monotard Lentard Monotard MC Rapidica Rapimis Zinulin Insuline Insuline-Boots</p> </div>

<p>• وٹامن بی ۱۲ کے جذب ہونے کا عمل سست ہو جاتا ہے اس لئے ان کے ساتھ بی ۱۲ زیادہ مقدار میں دیں۔</p> <p>• ان وٹامن کے خون میں جذب ہونے کا عمل سست ہو جاتا ہے اس لئے ان کے ساتھ یہ وٹامن زیادہ مقدار میں دینا چاہئے۔</p>	<p>• وٹامن بی ۱۲ دینے پر</p> <p>• وٹامن K.D A.E. وغیرہ دینے پر۔</p>	<p>• خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم کرنے والی دوائیں مثلاً لوپڈ۔ (رین جمنشی) لوپڈ (سپلا) کے ساتھ۔</p> <p>HYPOLIPIDAEMIC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemfibrozil • Bezafibrate • Lovastatin • Simvastatin • Atorvastatin • Gugulipid (Guglip)
<p>• کوہنی سین کے اثر سے وٹامن بی ۱۲ کے خون میں جذب ہونے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔</p>	<p>• وٹامن بی ۱۲ دینے پر</p>	<p>• کوہنی سین کے مرکبات مثلاً کوہنی سن ڈان وغیرہ (دافع قفس) کے ساتھ</p>
<p>• فولک ایسڈ جسم میں جلد تحلیل ہونے لگتا ہے لہذا اس کے ساتھ فولک ایسڈ کی مقدار بڑھائیں۔</p> <p>• ان وٹامن کے جسم میں تحلیل ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور ان کی زیادہ مقدار کھلائی پڑتی ہے۔</p>	<p>• فولک ایسڈ دینے پر۔</p> <p>• وٹامن D وٹامن K دینے پر۔</p>	<p>• دافع تشع لادویات مثلاً ڈاکیٹین (پی ڈی) کوہنل (بار) وغیرہ کے ساتھ۔</p> <p>ANTICONVULSANTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carbamazepine • Sodium Valproate • Hydantoin • Primidone • Clonazepam • Clobazam • Gabapentin • Lamotrigine

• الکوحل

• ہنسی جن رم پیڑ
• بوڑکا۔ وغیرہ کے ساتھ۔



scotch



WHISKY

• لیسرین کے مرکبات
• استعمال کرنے پر۔

• پیرایٹا مول کے مرکبات
• دینے پر۔

• فیٹاکنوٹازون کے مرکبات
• دینے پر۔

• ہنسی لین استعمال کرنے پر۔
• واقع ذیابیطس ادویات دینے

پر۔
• ٹراکولائی زر مشا کا پیوز۔ لبریم

• دینے پر۔
• میٹری ٹائی ڈازول کے

• مرکبات مثلاً فلے جل، مشروجل
• دینے پر۔

• کوڈین دینے پر
• آئی سونیکس دینے پر

• بلڈ پریشر گھٹانے والی
• ادویات مثلاً الیومٹ ایم ڈوپا

• وغیرہ دینے پر۔
• ان دواؤں کا بلڈ پریشر کم

• کرنے کا اثر بڑھ جاتا ہے۔

• گردوں کے ناکارہ ہونے کا
• خطرہ ہے

• غفلت، بے ہوشی، مرتبزی
• نظام عصبی کے انتہائی سخت

• ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔
• ہنسی لین کی طاقت گھٹ

• جاتی ہے۔
• خون میں شکر کی مقدار

• تیزی سے گھٹنے لگتی ہے۔
• ٹراکولائی زر کا عمل تیز

• ہو جاتا ہے۔
• الکوحل کے جسم میں جذب

• ہونے کا عمل رک جاتا ہے۔
• کوڈین کا کھانسی روکنے کا

• عمل تیز ہو جاتا ہے۔
• آئی سونیکس کے ٹی بی کے

• جراثیم کو ختم کرنے کی مدت کم
• ہو جاتی ہے اور جس سے یہ جلد

• خارج ہو جاتی ہے۔
• ان دواؤں کا بلڈ پریشر کم

• کرنے کا اثر بڑھ جاتا ہے۔

غذاؤں کے ساتھ دواؤں کے اثرات

مندرجہ ذیل ادویہ استعمال کرتے وقت	ان چیزوں کا استعمال کیا گیا	کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟
• ڈاکسا سائیکلین مثلاً • دوو سائیکلین زائی ڈوکس لائی • ڈوکس کے ساتھ۔	• پانی یا دودھ استعمال کرنے پر۔	• غذا کی نالی میں خراش یا زخم نہیں ہوگا
• انٹی پارکنوزم مثلاً مایائے سن۔ گلیکسو سہینی پاسی ڈائل (امیڈیکا) پاسی نمین (سائی ٹائڈ) کے ساتھ۔	• وٹامن بی ۱۲ والی دوائیں یا غذائیں مثلاً کلیجی، گوشت پھل، سبزیاں وغیرہ دینے پر۔	• انٹی پارکنوزم یعنی ریشہ۔ کچکی دور کرنے کا اثر رک جاتا ہے اس لئے وٹامن بی ۱۲ کے مرکبات یا اس سے بھرپور غذا استعمال نہ کریں۔
• دافع ذیابیطس ادویہ مثلاً ڈایا بے نیز ڈائل۔ ٹالیو مائیڈ کے ساتھ۔	• شکر اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذائیں استعمال کرنے پر	• شکر کو کنٹرول کرنے ذیابیطس دور کرنے کا عمل رک جاتا ہے۔
• دافع درد اور دافع بخار ادویہ مثلاً۔ آدین (سارابھائی) سرینڈون نائی لی ٹال (اتھنور) وغیرہ کے ساتھ۔	• شکر۔ نشاستہ اور کاربو ہائیڈریٹ والی غذائیں استعمال کرنے پر۔	• دافع بخار ادویہ کا عمل دیر میں ہوتا ہے۔ ان ادویہ کے ساتھ کاربوہائیڈریٹ والی غذائیں کم دیں۔

<ul style="list-style-type: none"> • ذہن کو سکون دینے کا عمل • ست ہو جاتا ہے لہذا ان کے ساتھ چائے کافی کا استعمال بند کر دیں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • چائے کافی استعمال کرنے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • عصبی نظام کو سکون بخشنے والی دوائیں مثلاً لار جیکل (M.B) کلور پرلین (B.P.) کے ساتھ۔
<ul style="list-style-type: none"> • پیر ایٹا مول کے جسم میں جذب ہونے کا عمل ست ہو جاتا ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذائیں۔ مثلاً شکر نشاستہ کے استعمال کرنے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • پیر ایٹا مول کے مرکبات مثلاً کاپول (B.W) سینا سین (تھ) مس (کرو سین) (ڈوفر) وغیرہ کے ساتھ۔
<ul style="list-style-type: none"> • ان دواؤں کا اثر جلد ختم ہو جاتا ہے جراثیم کش اثر بھی بہت کم ہو جاتا ہے لہذا ان کو صرف پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ترش پھلوں کے رس سوڈا واٹر وغیرہ استعمال کرنے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • جینسی لین اور کلاکسا سیلین کے مرکبات مثلاً پوڈ (سارا) بھائی کلاکس (لائی کا) کلاکسا سیلین وغیرہ کے ساتھ۔
<ul style="list-style-type: none"> • ٹھنڈا سا کھین پوری طرح جسم میں جذب نہیں ہو پانی اس لئے ان کو دودھ کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ • ٹھنڈا سا کھین جسم سے جلد تحلیل ہو جاتی ہے اور پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء استعمال کرنے پر • ترش پھلوں کے رس استعمال کرنے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ٹھنڈا سا کھین کے مرکبات مثلاً ٹھنڈا سا کھین ویری مائی سین ٹھنڈا سا کھین وغیرہ کے ساتھ۔

<ul style="list-style-type: none"> • یہ دوائیں تیزی سے تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اور کم فائدہ ہوتا ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ترش پھلوں کے رس سوڈا وائز استعمال کرنے پر 	<ul style="list-style-type: none"> • ارائی تھرو مائی سین کے مرکبات مثلاً ارائی تھرو سین ای مائی سین وغیرہ کے ساتھ
<ul style="list-style-type: none"> • ترش پھلوں کے رس سے فولاد کے مرکبات تیزی سے تحلیل ہونے لگتے ہیں جس سے کسی اثرات قے، مٹی، ابکائی وغیرہ پیدا ہونے لگتی ہے۔ دودھ انڈے وغیرہ سے گاڑھے ہو کر دیر میں ہضم و جذب ہوتے ہیں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ترش پھلوں مثلاً لیموں، نارنگی کے رس۔ دودھ، انڈے، مکئی کا آٹا وغیرہ دینے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • فولاد کے مرکبات مثلاً ریر ایون نوٹوفیرون بے فوجن ریزی ٹیلیس وغیرہ کے ساتھ۔
<ul style="list-style-type: none"> • ڈیازنی پام کا جذب ہونے کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • غذا کھانے کے دوران یا غذا کے فوراً بعد لینے پر 	<ul style="list-style-type: none"> • ڈیازنی پام کے مرکبات مثلاً کالپوز، کالموڈ وغیرہ کے ساتھ۔
<ul style="list-style-type: none"> • ڈیجی ٹیلیس کے فوائد ختم ہو جاتے ہیں۔ حرکات قلب بے ترتیب ہو جاتے ہیں لہذا دودھ بند کر دیں دوا خالی معدہ دیں غذا کے بعد دیں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • دودھ یا میٹھیم سے بھرپور دیگر غذائیں استعمال کرنے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ڈیجی ٹیلیس کے مرکبات مثلاً اے ٹاکس (BW) ڈی جاسن وغیرہ کے ساتھ

<p>• فردسی مائیڈ کے جذب ہونے میں دیر لگتی ہے اس لئے ان کو خالی پیٹ پانی کے ساتھ استعمال کرائیں۔</p>	<p>• غذا کے ساتھ یا بعد غذا استعمال کرنے پر۔</p>	<p>• فردسی مائیڈ کے مرکبات مثلاً اڈسٹس (ہائسٹ) سالی ٹکس (I.D P L) وغیرہ۔</p>
<p>• پیشاب آور دوا کا جذب ہونے کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ اس لئے ان کو غذا کے ساتھ یا فوراً بعد استعمال کرنا چاہئے۔</p>	<p>• غذا کے ساتھ یا کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنے پر۔</p>	<p>• ہائیڈروکسور ایتھیزا کے مرکبات مثلاً ایسی ڈریکس نفزل وغیرہ۔</p>
<p>• گرائی سو فلوین پوری طرح جسم میں جذب نہیں ہو پائی ہذا اس کے ساتھ پانی غذا میں تھی دودھ تھیں زیادہ کھلا میں۔</p>	<p>• کم چربی والی غذاؤں کے ساتھ استعمال کرنے پر۔</p>	<p>• گرائی سو فلوین کے مرکبات مثلاً گرائی سوڈن آئی ڈی فل دن وغیرہ کو</p>
<p>• ان کے جذب ہونے میں دیر ہوتی ہے اور زبردی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ پھنٹی کا استعمال روک دیں۔</p>	<p>• زیادہ چربی والی غذاؤں کے ساتھ دینے میں۔</p>	<p>• نٹراکسوروا تھسکی لین کے مرکبات مثلاً نٹراکپ (B W) وغیرہ کو</p>
<p>• اثر کم ہو جاتا ہے یہ تجربہ معدہ میں خراش ہو جاتی ہے۔</p>	<p>• دودھ اور کھاری پن پیدا کرنے والی غذاؤں کے ساتھ دینے پر۔</p>	<p>• ہب کوڈائل، ڈل کوٹیکس وغیرہ قبضہ شدہ غذاؤں کو</p>

• آئی سو نیازو کے مرکبات مثلاً آئی سہ نیس (فزر) آئی سو ن (وارنر) وغیرہ کو	• خالی معدہ یا پانی کے ہمراہ استعمال کرنے پر	• بہت جلد خون میں جذب ہو جاتے ہیں۔
• انڈومیتھاسن کے مرکبات مثلاً اڈوسڈ (MSD) آئی ڈی سن I.D.P.L. وغیرہ کو	• غذا کے ساتھ کھلانے پر	• متلی تے نہیں ہوتی معدہ اور آنتوں پر بھی کوئی خراب اثر نہیں ہوتا۔
• مینہ نی نائی ڈا زول کے مرکبات مثلاً میٹرو جل (یونیک) فلی جل (MB) وغیرہ کو	• غذا کے ساتھ یا غذا کے فورا بعد استعمال کرنے پر	• معدہ اور آنتوں میں خراش پیدا نہیں کرتے۔ متلی تے کلیجے کی جلن بھی نہیں ہوتی۔
• کوٹرائی موکسازول کے مرکبات مثلاً سپران (BW) سائی ناس مٹ (رسل) سمروال (تھے مس) وغیرہ کو	• غذا کے ساتھ یا غذا کے بعد استعمال کرنے پر۔	• ان کے جذب ہونے کی رقدار بڑھ جاتی ہے اور معدہ آنتوں میں خراش بھی نہیں ہوتی۔
• ای تھم بیو ٹال کے مرکبات مثلاً مائی کو بیو ٹال (ایڈا) آئی بیو ٹال (لائی کا) ای بی ٹال (لوپن) ایڈی ٹال I.D.P.L. وغیرہ کو	• غذا کے ہمراہ یا غذا کے بعد استعمال کرنے پر۔	• ان دواؤں کے جسم میں جذب ہونے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔

<ul style="list-style-type: none"> • غذا کی نالی معدہ آنحوں میں خراش پڑنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اسی طرح لیٹال بیوٹازون کے مرکبات کو بھی خالی پیٹ نہیں استعمال کرنا چاہئے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • غذا کے ہمراہ یا ایک گلاس پانی کے ساتھ استعمال کرنے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • آکسی فن بیوٹازون کے مرکبات مثلاً آکسی مائیڈ (کینڈلا) آکسی فن (BPL) لینا بیڈ (I.D.P.L) وغیرہ کو۔
<ul style="list-style-type: none"> • اس کے جذب ہونے کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور یہ دوائیں زیادہ زود اثر ہو جاتی ہیں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • خالی معدہ یا پانی کے ساتھ استعمال کرنے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ریٹام پی سن کے مرکبات مثلاً رسپاسن (کینڈلا) ہیرم (رین بخش) وغیرہ کو
<ul style="list-style-type: none"> • معدہ میں خراش زخم اور خون آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ غذا کی نالی معدہ آنتیں خراش اور زخم سے محفوظ رہتی ہیں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • خالی معدہ پر دینے سے بعد غذا یا پانی پینے یا دودھ پینے کے بعد استعمال کرنے پر 	<ul style="list-style-type: none"> • مسکن درد ادویہ مثلاً اسپرو، انا سین اسپرین اے پی ڈین I.D.P.L. کو ڈوپائی رین (گلیکسو) وغیرہ کو
<ul style="list-style-type: none"> • غذا کی نالی معدہ، آنتیں خراش اور زخم سے محفوظ رہتی ہیں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • پانی یا دودھ کے ہمراہ استعمال کرنے پر۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • ڈاکسی سائیکلین کے مرکبات مثلاً وی و سائیکلین I.D.P.L. اینڈ دس (ای کی کا) وغیرہ کو
<ul style="list-style-type: none"> • وٹامن ڈی کا جسم میں جذب ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • چکنی اور زیادہ چربی والی غذائیں استعمال کرنے پر 	<ul style="list-style-type: none"> • وٹامن ڈی کے مرکبات ایلسی رال (کینڈلا) منائیکس (گلیکسو) کے ساتھ

OXYGEN THERAPY

آکسیجن تھیراپی

زندگی قائم رکھنے کے لئے آکسیجن لازمی چیز ہے۔ زمانہ قدیم سے بے ہوش اور آکسیجن کی قلت کے شکار مریضوں کو لٹھلکھ سوگھانے۔ ہوا کرنے، اور تازہ ہوا پہنچانے کی افادیت سے لوگ آگاہ تھے سائنس کی ترقی کی بدولت خالص آکسیجن کو محفوظ رکھنے کا علم ہو جانے کے بعد ایسے مریض جو آکسیجن کی کمی کے باعث موت کا شکار ہو جایا کرتے تھے ان کے علاج و تدابیر میں بہت سہولت ہو گئی ہے۔ بے ہوشی، کوما، مرگی، لوہنڈ پریشروغیرہ میں جہاں مریض زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا ہو آکسیجن پہنچانے سے حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔

طریقہ استعمال: آکسیجن پہنچانے کے چار طریقے مروج ہیں۔

(۱) نازل کیونڈا

(۲) نازل کیٹھنڈر

(۳) فیس ماسک

(۴) ٹی یو سسٹم۔ ان سب میں سب سے آسان اور آرام دہ طریقہ فیس ماسک یعنی

چہرے پر کپڑا چڑھا کر آکسیجن پہنچانے کا طریقہ ہے۔

احتیاط: آکسیجن تھیراپی کے دوران سب سے زیادہ خطرہ آگ سے ہے کیونکہ آکسیجن بہت جلد آگ پکڑ لیتی ہے لہذا جہاں آکسیجن پہنچانے کا عمل جاری ہو وہاں سگریٹ، بیڑی سے پرہیز رکھنا چاہئے آگ کو اس مقام سے دور رکھنا چاہئے، آکسیجن تھیراپی کے دوران بلغمی رطوبات خشک ہو جاتی ہیں اس لئے اگر بس تنفس کی شکایت محسوس ہو تو یہ عمل روک دینا چاہئے۔ بعض اوقات زیادہ مقدار میں آکسیجن جسم میں پہنچ جاتی ہے جس کے خراب اثرات نمودار ہونے لگتے ہیں، مثلاً سانس میں دشواری، عروق میں تناؤ جسم میں ابھار پیدا ہونا وغیرہ ایسا حالت میں آکسیجن کی مقدار کم کر دینا چاہئے۔

ملنے کا پتہ: آکسیجن تھیراپی کا سامان بھارت میں ”اٹلس سرجیکل کمپنی

۳۷۷ لاچپت رائے مارکیٹ دہلی میں مل سکتا ہے۔

EQUIPMENTS

میڈیکل آلات ان کے ملنے کے پتے

CARSEN & TOUBRO LIMITED
INDIAN CANCER SOCIETY
BUILDING
C/6 BANDRA-KURLA
COMPLEX

P.O. BOX. 8119, BANDRA (EAST),
 BOMBAY 400 085. PRICE E. N/A

PATIENT MONITORING SYSTEM

Wide screen under friendly and elegantly designed monitors to monitor E.C.G. peripheral pulse, temperature etc. Monitors for monitoring multi parameters is also available. Combined multibed ECG and multiparameter, central station ideal for 6, 12 and 18 beds are available. Note: This equipment is supplied on agency product basis (i.e. these products are manufactured by the company after the sale).

ELECTRO CARDIOGRAPH MACHINE

I. & T. medical manufactures ECG machine with the total technology transfer from Biocardia Biomedical Ltd. The I. & T. ECG machine has superior performance and is sleek, sophisticated and portable. More over it is light weight and impact proof making it ideal for Indian Conditions.

ULTRASOUND EQUIPMENT KONTRON INSTRUMENTS FRANCE

High performance, upgradeable and versatile scanners from Kontron instruments France. Sector scanners, linear array scanners, for multi disciplinary application with extensive calculation packages and good resolution. Company offers a range of indigenously manufactured transducers the range includes mechanical sector, dynamically focussed linear, curved linear array transducers and intra cavity probes like transvaginal and transrectal black and white doppler system for cardiac operations with adequate calculation.

ULTRASOUND SYSTEM MONITORS

Ultrasound machines, patient Monitoring

Systems, ECG and Electrosurgical Units
BOEHRINGER MANNHEIM
INDIA LTD

54-A, MATHI RADAS VASANJI
 ROAD, CHAKALA, ANDHERI (EAST),
 BOMBAY-400 093. Price N/A.

AUTOCLIX WITH LANCET

Instrument for obtaining droplet of blood. The lancet for use in the Autoclix, the simple way of obtaining a blood droplet for home monitoring of blood glucose.

REFLOLUX

Instrument for blood glucose measurement. Reflectance photometer is a blood glucose measuring instrument. It offers easy, convenient and accurate determination of the blood glucose in the range 10-500 mg/dl.

BM HITACHI 717

A discrete fully selective analyser designed for use in larger laboratories and offering:

- * sample identification on primary tubes
- * 32 chemistry plus ESF for routine and non-routine tests
- * average through put of 750 tests/hour
- * automatic re-runs
- * high memory capabilities

PHOTOMETTER 4010

The photometer is an interference filter photometer for both the colorimetric and U.B. range. All enzymes and substrates assays can be done using 5 microprocessor controlled programmes.

MALES INDIA LIMITED

569, SAVAJI PURA, AJWA ROAD,
 VARODA 390 019. Price: N/A.

GLUCOMETER GX BLOOD GLUCOSE METER

Glucometer Gx blood glucose meter each complete with battery, cheek paddle, user guide and warranty in formation. Glucostat automatic lancing device with lancets and end caps, normal control product information. Single button operation, self training guide included, compact portable system, 50 second test procedure, result within minute, high accuracy and precision, dry-blot procedure, painless finger pricking device provide battery life 15,000 tests.

virtually no maintenance. Up to 10 results stored in memory, average recall facility (fluorox can either be read on the meter (25-400 mg dl) or visually 20-800mg dR reagent strip manufactured in India. One year warranty, all spares and consumables available.

HEMACOMP 70

Instrument for 10 simultaneous measurements with visualisation of RBC, WBC, PLT, histograms- RBC, WBC, Hgb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT MPV and PCT. Easy to operate, calibration in memory, self diagnostic capability, high reliable and accurate, complete self test control facility, automatic wash cycle after every analysis, double transducers for speed and convenience, built threeport capacity, 50 samples per hour automatic platelet threshold adjustment, RBC, WBC, PLT histogram magnification for accurate analysis, display of histograms on LCD and printout of all parameters on preformatted paper.

ANESTHETICS

AMAR IN SINESS CENTRE,
RAM MANDIR ROAD, GORE- GAON
WEST, BOMBAY-400 104

LARYNGOSCOPES

A comprehensive range of laryngoscope sets covering paediatric and adult use in hook on or hinge pin fittings. Shiny or matt finish at affordable prices.

Standard handle-Hook on Rs 150/- each,
Standard handle - Hinge pin Rs 150/- each,
Pentite handle-Hook on Rs 150/- each,
Pentite handle-hinge pin Rs 150/- each,
Macintosh blade English profile Hook on
(Size 0 1 2 3 4 5) Rs 150/- each, Miller
blade Hook on (size 0.1 2.3) Rs 150/- each,
Robert shaw blade Hook on (size 0.1) Rs
150/- each, Dr. Anderson blade-Hook on
(size 1) Rs 150/- each, Oxford blade-Hook
on (Size 1) Rs 150/- each, Spare lamp-
Rs 7.50/- each, Spare pouch for
laryngoscope- set big, small Rs 40/- each.

RAO'S RESUSCITATORS

Available in infant child and adult sizes. Autoclavable, soft to handle foldable bag (adult model only) reading available spares for all parts, economic as compared to imported wonder parts. Standard set comprises: Silicone self inflation bag, non-rebreather valve-with or without blow off, transparent hooded face mask oxygen enrichment tubing, carrying case.

Rao's infant resuscitator Rs 1200/- each,
Rao's child resuscitator Rs 1200/- each,

Rao's adult resuscitator Rs 2900/- each

Optional extras: 30 cm x 11 mm and
30cm x 20mm corrugated hose with ends to
extend the bag from the mask Rs 100/- each
30cm x 11mm and
30cm x 20mm corrugated hose with ends to
connect resuscitator to the vaporizer
Rs 100/- each

SBP MEDICARE SYSTEM,

4/45 HOOP NAGAR,

DELHI 110 007

WRIGHT PEAK FLOWMETER

Accurate, Durable, Inexpensive High
precision instrument for user's respiratory
capability monitoring.

AERMAX NEBULISERS

High performance compressor nebuliser for
aerosol therapy.

WRIGHT PEAK FLOWMETER

This is an accurate, durable, inexpensive
peak flowmeter for hospital, clinic and home
use. It is a high precision respiratory
capability monitor. It permits objective
assessment of clinical course, warns of
bronchospasm prior to onset of clinical
symptoms.

ABL 50 BLOOD GAS ANALYZER

The ABL 50 is an advanced basic blood gas
analyzer.

DRAKE MEDICAL PRODUCTS,

23-A, JUTHI SEN NAGAR,

33-B, JUTHI ROAD,

BOMBAY 400 049

AQUA-PURATOR AND CO2

AQUA-PURATOR THE LUMINOUS INTENSIVE

OPTICS OF WISAP, ACCORDING TO SEMM.

J.L. MORISON (INDIA) LTD.,

"CRYSTAL", 79, DR. ANNIE BESANT
ROAD, WORLI,

BOMBAY 400 018

SURGIFEC SUTURES

A complete range of non absorbable evoked
needled sutures branded SURGIFEC have
been produced by J.L. MORISON in technical
collaboration with pearls sutures.

KALEKARS GIGALS PVT LTD,

305, SHAMALDAS GANDHI MARG,
BOMBAY 400 002.

SPARK SOLID STATE SURGICAL CAUTERY

- A) Spark 50 Bipolar Coagulator
B) Spark 400 Monopolar Cautery
C) Spark 400 B Monopolar Cautery with
bipolar Coagulator

BLUF STAR LTD.

MEDICAL DIVISION, SAHAS,
414/2, VEER SAVARKAR MARG,
PRABHADEVI,
BOMBAY - 400 025.

REVOLUTIONARY ULTRASOUND IMAGING WITH HITACHI EUB-405

Advanced imaging techniques such as fast
sampling, Digital processing, dynamic
focussing with variable apertures and high
density probe designs, helps to provide
excellent image quality. The built in 9°
Monitor, easy to operate control panel with
trackball, makes the system an easy to use,
indispensable diagnostic aid for various
applications.

WIPROGE MEDICAL SYSTEMS,
A-4, GOLDEN ENCLAVE,
AIRPORT ROAD,
BANGALORE 560 017

FLUORILUX - 2000 IMAGING SYSTEMAGE INTENSIFIER WITH TELEVISION

The Fluorilux- 2000 imaging system from
Wipro Gil Medical systems is an advanced
X-Ray image intensifier efficiently coupled
to a video chain for convenient television
fluoroscopy. The system is available for
mounting on a Spot Film Device on over
table X-Ray configuration.

SOUND VISION

With the Wipro GLRT 4200
Advantage II

PEST CONTROL (INDIA)
LIMITED,
SAL COMMERCIAL CENTRE,
504, LINKING ROAD, KHAR
(WEST),
BOMBAY 400 052

GAS STERILISERS & ETHYLENE OXIDE GAS MIXTURES

Disposable medical device manufacturers,
hospitals, clinics, pharmaceuticals.

ANAESTHETICS

AMAR BUSINESS CENTRE,

RAM MANDIR ROAD, GOREGAON
WEST, BOMBAY 400 104.

LARYNGOSCOPES

A comprehensive range of laryngoscope sets
covering paediatric and adult use in hook on
or hinge pin fittings. Shiny or matt finish at
affordable prices.

Standard handle-Hook on Rs. 150 - each.
Standard handle - Hinge pin Rs. 150 - each.
Penlite handle - Hook on Rs. 150 - penlite
handle-hinge pin Rs. 150 - each. Macintosh
blade English profile Hook on (Size
0,1,2,3,4,5) Rs. 150 - Miller blade Hook on
(size 0,1,2,3) Rs. 150 - each. Robert show
blade Hook on (size 0,1) Rs. 150 - each. Dr.
Anderson blade - Hook on (size 1) Rs. 150 -
each. Oxford blade - Hook on (size 1) Rs.
150 - each. Spare lamp - Rs. 750 - each.
Spare pouch for laryngoscope - not big small
Rs. 40 - each.

RAO'S RESUSCITATORS

Available in infant child and adult sizes.
Anticlavable soft to handle foldable bag
(adult model only) lending available spare
for all parts economic as compared to
imported wounder parts. Standard set
comprises: Silicone self inflation bag,
non-rebreather valve - with or without flow
off, transparent hooded face mask oxygen
enrichment tubing, carrying case.

Rao's infant resuscitator Rs. 1200 - each
Rao's child resuscitator Rs. 1200 - each
Rao's adult resuscitator Rs. 2900 - each

ANALYTICAL AUTOMATION

(I) PVT. LTD., 7, SAI NIVAS,
SUDHASH ROAD,
VILE PARLE (E),
BOMBAY 400 057

ABL 520 BLOOD GAS OXIMETRY ANALYSER ABL 50 BLOOD GAS ANALYSER

- Measures pH, PCO₂, PO₂,
Barometric pressure.

EMPIRE INSTRUMENTATION,
414, SENAPATI BAPAT MARG,
LOWER PARELI,
BOMBAY 400 013.

MERKUR 4000 THE SMALL URODYNAMIC SYSTEM WITH GREAT POTENTIAL

Compact, light weight, including all
necessary measuring capabilities.

- Flexible in application • Based on modular
design principle, allows future system
expansion.

NEW STANDARD OF MAMMOGRAPHIC IMAGING

ARK DIAGNOSTICS PVT LTD.,
292/1, PRABHU SANDESH,
SHREE-PUNJAB SOCIETY, ANDHERI
(E) BOMBAY 400 093.

NEW LOW COST ELECTOLYTE ANALYZER

MEDICO IMAGING CO.,
2, BRAZE BUILDING, N.M. JOSHI
MARG, LOWER PAREI,
BOMBAY 400 013.

TRULY COMPACT PORTABLE X-RAY UNITS

Medico imaging company manufactures 3
models of compact, handy, portable box
type X-ray units Medico P-20, Medico P-30
and Medico P-50

ALPHA X-RAY TECHNOLOGIES
(INDIA) PVT LTD. 748/2,
RAVIDEVI, 10TH ROAD, KHAR,
BOMBAY - 400 052.

IMAGE INTENSIFIER TELEVISION SYSTEM

INDIA PHOTOGRAPHIC CO.,
222, D.N. ROAD,
BOMBAY 400 001.

BIG VALUE SMALL PACKAGE

KODAK EKTASCAN 1120

J.F. ENTERPRISES, A/10, ANAND
NAGAR, FORJETT STRETT,
BOMBAY 400 036

VALVE MODEL NEW SOLID STATE JF ESU MODELS

Trade in your old conventional Valve Model
for a New Solid State JF ESU Models for all
purpose at an attractive discount and create
prestige with efficiency and satisfactory
performance SS 202, SS 303, SS 404, SS 505
and Introduction of Ophthalmic Bipolar and
Monopolar Digital Units. Select Model from
Rs. 10000/- to Rs. 45000/-

ESPEE DYNAMIC MEDICAL
EQUIPMENTS PVT. LTD.
(MEDICAL ELECTRONICS
DIVISION),

208, CHARISMA CENTRE, 69-A, 19TH,
ROAD, CHEMBUR, BOMBAY-400 071

COMPUTERIZED BODY PLETHSMOGRAPH/DIF- FUSION SYSTEMS

This multi purpose unit provides an all
round transparent chamber to reduce patient
anxiety and improve communication. A
provocation testing module can also be
added to maximize accuracy in using
provocative pharmaceuticals.

BRAD INTERNATIONAL, INC.,
53, FREE PRESS HOUSE,
NARIMAN POINT,
BOMBAY 400 021

ANGIOGRAPHIC WIRES, ANGIOGRAPHY INTRODUCERS, ANGIOPLASTY BALLONS, OXYGENATORS, CARDIOPULMONARY SUPPORT SYSTEM, UTERINE MANIPULATOR, STENTS

Brad offers a wide range of products in
cardiovascular urological and surgical
specialties

MEDITRIN INSTRUMENTS,
MADHUBAN, MALAYANI
CHURCH,
NEAR AKASHWANI RADIO
STATION,
MARVE ROAD,
MALAD (WEST),
BOMBAY 400 095

BABY CARE

A planned approach to new born
management

- * premature baby incubators,
- * Resuscitation Trolley
- * Halogen Phototherapy
- * Thermo Mattress
- * Transport incubator
- * Oxygenhood
- * Radiant Heat Warmer
- * Phototherapy Crib
- * Infant Care Trolley
- * Temperature Monitors
- * Infantometer
- * Digital Weighing Machine
- * Slow suction unit

LIST OF MANUFACTURERS**Abbott Laboratories (India) Pvt. Ltd.**

Jahangir Bldg.
133, Mahatma Gandhi Road,
Mumbai- 400 023

Aca Laboratories Ltd.

x-24 Phase-II, Okhla Industrial Area
New Delhi - 110 020
Ph 6846178/6821242 Fax-6841084

Agrowmed Private Limited

702 A, Poonam Chambers
Dr A B Road, Worli,
Mumbai- 400 018

Albert David Ltd.

15, Chittaranjan Avenue,
Calcutta - 700 072

Alambic Chemical Works Co. Ltd.

Alambic Road, Industrial Area,
Vadodra - 390 003

Ph 330550 Fax 0265-337125/330834

Alidac Genetics & Pharmaceuticals

244 Godhasar, Maninagar,
Ahmedabad - 380 000

Ph 354852(22Lines)

Alkem Laboratories Ltd.

Phoenix Mills Complex, 3rd floor,
462, Senapati Bapat Marg,
Mumbai - 400 013

Ph. 4952789/90/4952851/52 Fax-495 2955

Allenbury's A Divn of Glaxo (I) Ltd

Dr Annie Besant Road,
Worli, Mumbai- 400 025

Allergan India Pvt. Ltd.

9th Floor, North Block, Manipal Centre

47, Dickenson Road,

Bangalore-560042

Ph 558 4242

Alpine Industries

A-67 Naraina Ind Area Phase-I

New Delhi-110028

Ph 5795703Fax-5432706

American Remedies

124, L B Road, (Adyar)

Madras-600 020

Anand Synthokem Pvt.Ltd.

101, Kalpita Enclave,

Kalpita Co-op Housing Society,

Swami Nilayanand Marg,

Mumbai-400 059

Andre Laboratories Pvt.Ltd.

28, Sunil Shopping Centre

J.P. Road, Andheri (W)

Mumbai-400 058

Ph.6281847 Fax-621225

Anglo-French Drugs & Industries Ltd.

41, 3rd Cross, 881 Area V Block

Rajajinagar Bangalore-560010

Ph 358767/354770

APT Labs Ltd.

6-8-32, 5/2, Arundelpet

Guntur-522002

Ph 233395 Fax 351481

Arlato Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Mercantile Chambers, 3rd Floor,

12, J N. Heredia Marg, Ballard Estate,

Mumbai- 400 001

Ph: 2617909/2618921 Fax :2615604

Astra- IDL Ltd.

32/1-2, Crescent Towers,

Bangalore - 530 001

Ph 2256941/2/3/4 Fax 0802252894

Bayer (India) Ltd.

Bayer House, Central Avenue,

Hiranandani Gardens, Powai

Mumbai- 400076

Ph 5779300 Fax 5770418

BDH Industries Ltd

Nair Baug, Akurli Road,

Kandivli (East)

Mumbai- 400 101

Ph 6871370.6870082,83.6870834 Fax 6870856

Beil Pharma

Shivaji Service Industries

119/7 Mahim, Talkalwadi Road,

Mumbai- 400 016

Bharat Serum & Vaccines Pvt. Ltd.

52, Mittal Chambers, Nariman Point,

Mumbai-400 021

Biddle Sawyer Ltd.

25, Dalal Street, Fort, Das Chambers

Mumbai- 400 023

Ph 2670244/2670036

Biochem Pharma Industries

'A' Aidun Building Ist Dhoobi Talao

Mumbai- 400 002

Ph 2085534/2085457/2085430 Fax 2870044

Biological - E Ltd

18/1 & 3, Azamabad

Hyderabad - 500 020

Ph 7617831(3Lines)/7615134

Bliss Chemicals & Pharma India Ltd.

Sky pak House Annexe

Off Vassanji Road, Marol

Mumbai- 400 059

Ph 8368181 Fax 8365890

Blue Cross Laboratories Ltd.

3, IAN House, Mahakali Caves Road,

Andheri (East)

Mumbai-400 093

Ph 8390202(4Lines) Fax. 8363740/8380617

Boehringer Ingelheim (I) Ltd.

54-A, M. Vasar Road, Chakala, Andheri East,

Mumbai- 400 094

Ph 8376794 Fax 8379906

BPL Pharmaceuticals (P) Ltd.

380/82, J Sankarseth Smriti,

Chitra Bazar, Mumbai- 400 002

Brown & Burk Pharmaceutical (P)Ltd.

303, 11th Floor A'Wing, Queen Corner Apart-

ments, 3, Queens Road,

Bangalore- 560 001

Ph 2269609,2268785Fax 080 2281627

Burroughs Wellcome (India) Ltd..

Leo House, 88-C, Old Prabhadevi Road,

Mumbai- 400 026

Ph 4304210/4304279/4304434Fax 4304069

Cachet Pharmaceuticals (P) Ltd.

518, Shah Nahar,

Worli, Mumbai- 400 018

Ph 4927526/4936801/4952613Fax-4931121

Cadila Health Care

Khemka House, Drive In

Ahmedabad- 380 052

Ph: 446639/446649 Fax (079)446659

Cadila Pharmaceuticals Ltd.

B.D. Patel House, Near Sardar Patel Colony,

LIST OF MANUFACTURERS

Naranpura, Ahmedabad- 380 014
Ph: 7410843-49 Fax(079)7410850
Camlin Ltd.
(Pharmaceutical Division)
Camlin House, J B Nagar
Andheri (E) Mumbai-400059
Ph 836 8635 (4 lines) Fax 836 8578
Cassella Med, A Div. of Hoechst India Ltd
Hoechst Centre, 54A,
Sir Muthuradas Vasanji Road,
Chakala Andheri (E).
Mumbai-400 093.
Centaur Laboratories Pvt. Ltd.
279, New Ashirwad No 5
Ram Mandir Road, Goragao (W)
Mumbai - 400104
CFL Pharmaceuticals Ltd.
Regent Chambers, 4th Floor
208, Nariman Point,
Mumbai - 400 021
Ph 2832110/28321148/2025431 Fax 2047053
Chemo Pharma Labs Ltd.
Empire House 214 D.N. Road, Fort,
Mumbai- 400 001
Chowgule & Co. (Hind) Ltd.
Malhotra House, Opp. G P O
Walchand Hirachand Marg,
Mumbai - 400 001
Ciple Ltd.
289 JBB Marg, Bombay Central
Mumbai - 400 008
Ph 3082891/3095521
Citadel Fine
265 TTK Road,
Madras - 600 018
Ph 4992267
Combat drugs Ltd.
126/2RT, S R Nagar,
Hyderabad-500038
Ph 272876, 278950
Concept Pharmaceuticals Ltd.
167, C S T Road Santacruz (East),
Mumbai - 400 098
Ph 8148252/8129605/8142045 Fax 8114501
Core Parenterals Limited
Core House, C G Road,
Near Parimal Garden Ellisbridge,
Ahmedabad 380 006
Ph 448771 Fax, (079) 420239
Croslands
Plot No. 89, Road No. 15
MIDC, Andheri (E)
Mumbai - 400 093
Ph 8393408/8393407/8393409 Fax 8378595
Cyanamid India Ltd.
Nylac House 254-D-2,
Dr Annie Besant Road
Mumbai - 400 025
Ph. 4935211 Fax-4944062
Dabur Pharmaceuticals Ltd.
6, Jain Mandir Marg, Connaught Place,
New Delhi - 110 001
Ph 343844/3748048 Fax: 3732579/3320613
Deepharma Ltd.
1497, Sharda Bhawan, Shisham Pitamah Marg
Opp. P T College, Defence Colony
New Delhi 110 003.
■ 4842920/21/22/23
Dey's Medical Stores Ltd.

62, Bondel Road,
Calcutta - 700 020 Ph 295512-13/298490
Dolphin Laboratories Ltd.
41/28 Sarat Bose Road
Calcutta - 700 020
Duphar Interfran Ltd.
F - 5 Shivasagar Estate,
Dr Annie Besant Road, Worli,
Mumbai - 400 018
E-Merck (India) Ltd.
Shivasagar Estate,
'A' Block Dr Annie Besant Road,
Worli, Mumbai - 400 018
East India Pharmaceuticals Works Ltd.
6 Little Russel Street,
Calcutta - 700 071
Ph 3041/40-2262
Elder Pharmaceuticals Ltd.
11-B Dhanraj Mahal Apollo Bunder
Mumbai - 400 039
Ph 2851937/2835802/2835803 Fax 2871888
Eli Lilly Ranbaxy Ltd.
8 Batapi Estate Kalkaji,
New Delhi - 110 019
Emcare Pharmaceuticals Ltd.
Dapodi, Pune-411 012
Ethnor Ltd
30, Forrell Street
Mumbai - 400 036
Euphoric Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
205, Skylark Building, 80 Nehru Place,
New Delhi-110019
Ph 6414734/6415405 Fax. 6445539
FDC Ltd.
142-48 Swami Vivekananda Road,
Jogeshwari, (West)
Mumbai - 400 002
Ph 8247657/53/56 Fax 8236393
Franco Indian Pharmaceutical Ltd.
20 Dr E Moses Road,
Mumbai - 400 011
Ph 4934026 Fax-4950557
Fullford (India) Ltd.
11th Floor Oxford House, Apollo Bunder,
Mumbai - 400 039
Ph 2026440 Fax: 2043223
Genesis (Division of Dr. Reddys Labs Ltd.)
Ameerpet, 7-1-27, 203, 2nd Floor
Block C, Srinivasa Complex
Hyderabad - 500 018
Ph, 291948 Fax 291955
Geno Pharmaceuticals Ltd.
6/6 Navjivan Society, Lamington Road,
Mumbai- 400 008
Geoffrey Manners & Co. Ltd.
Udyog Bhawan, Walchand Hirachand Marg,
Mumbai - 400 038
German Remedies Ltd.
Shivasagar Estate, A Block,
Dr Annie Besant Road, Worli,
Mumbai - 400 018
Ph 4935528 Fax: 4950327
Gland Pharma Limited
8-3-862, Ameerpet
Hyderabad- 500016
Ph 312415/312157 Fax 312229
Glaxo Pharma India Limited
Dr. Annie Besant Road, Worli
Mumbai - 400 025

Ph 493 3671/493 3514 Fax-493 6358
Glat(A Div. of Croslands)
 Croslands House, Plot No 89, 15 1h Road,
 Phase II, MIDC, Andheri (E)
 Mumbai-400093
 Ph 8393408/07/09 Fax 8378595
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
 B/2, Mahalaxmi Chambers
 22, Bhulabhai Desai Road
 Mumbai-400 028
 Ph. 4922850/4922830/4920828
Guardian (A Div. Croslands)
 18, Steelmade Ind Est,
 Marol, Andheri (E) Mumbai-400059
 Ph 8348824/8363470/8378598
Gufic Ltd.
 Subhas Road-A, Vile Parle (East),
 Mumbai - 400 057
 P 8341521/22, 8344523, 8348188 Fax 8369008
Haffkine BioPharmaceuticals Co(p). Ltd.
 Acharya Dande Marg, Parel
 Mumbai- 400 012
Himalaya Drug Co.
 Tumkur Road,
 Bangalore-562 123
Hindustan Antibiotics Ltd.
 Punpri, Pune - 411 018
Hindustan Ciba-Geigy Ltd.
 Royal Insurance Building,
 14, J. Tata Road,
 Mumbai - 400 020
 Ph 221213/2851111 Fax 2029170
Hoechst Marion Roussel Ltd.
 Hoechst House, Narman Point
 193, Backbay Reclamation,
 Mumbai-400 021
 Ph 8216822 Fax 8370937/8370939
ICI Pharmaceuticals India Ltd.
 Khalsell Centre, 149, Montlieh Road, Egmore,
 Madras - 600 008
 Ph. 8262682/8269235/8269243 Fax 8255713
Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.
 IOPL Complex, Delhi-Gurgaon Rd.
 Kapashera New Delhi- 110 037
 Ph 5563427/5563078
Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd.
 117, T.V. Industrial Estate, Worli
 Mumbai - 400 025
 Ph 4923016/4923868
Indo Pharma
 Mahla Mahal, Mathew Road,
 Mumbai-400 004
 Ph 361 4375/3611376 Fax-3614547
Indoco Remedies Ltd.
 10-A, Mahal Estate, Mahakali Caves Road,
 Andheri (East), Mumbai - 400 093
 Ph 8383449/82/64/85 Fax 8383502
Ind-Swift Ltd.
 123, Industrial Area, Phase-I,
 Panchkula 134109,
 Haryana
Infar (India) Ltd.
 38, J.L. Nehru Road,
 Calcutta-700 071
INGA Laboratories (P) Ltd.,
 Inga House, Mahakali Road,
 Andheri (East)
 Mumbai - 400 093
IPCA Labs (P) Ltd.

63-E, IPCA House
 Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West)
 Mumbai - 400 067
 Ph 8087678/8086098/8013430 Fax-8727119
Intas Labs. Pvt. Ltd.
 Chinubhai centre, 2nd floor, Ashram Road,
 Ahmedabad 380009
 Ph 837009, 79052, 78365 Fax 079 - 78862
Jagsonpal Pharmaceuticals
 P Box No 4545, T-210 J, Shahpurjat
 New Delhi - 110 016
 Ph. 8213519-24 Fax : 8473708
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.
 Unique Group of companies
 Neelam Centre, B-Wing, 4th Floor
 Hind Cycle Road, Worli,
 Mumbai- 400 025
 Ph 4930918(14 Lines) Fax-4930534/4939833
Jenburkt Pharmaceuticals
 Nirmala Apartments
 93, Jayaprakash Road, Andheri (West)
 Mumbai - 400 058
J.K. Pharmaceuticals
 53, Community, Centre, New Friends Colony,
 New Delhi-110 065
 Ph 6821248/6821285/630233
John Wyeth (India) Ltd.
 Apesjay House,
 Dinshaw Wacha Road,
 Mumbai - 400 020
Juggat Pharma (P) Ltd.
 27, Bull Temple Road
 Bangalore 560004
 Ph 608310 620944 Fax:080-6812489
Kamron Laboratories Ltd.
 25 Bth Floor Urvesh Apartment,
 Mithakhali Six Road Ellisbridge,
 Ahmedabad 380 006
 Ph 446328 Fax 403676
Kee Pharma Ltd.
 2nd floor, Payal cinema Building, Naraina
 New Delhi-110 028
Khandalwal Laboratories Ltd.
 79/87, D Lad Path,
 Mumbai 400 033
Knoll Pharmaceuticals Ltd
 3 & 4, Corporate Park
 Sion Trombay Road, Chembur
 Mumbai-400 022
 Ph 5246901, 5246902, 5246903, 5246904
Kopren Ltd.
 Parijat House 1076, Dr E Moses Road, Worli,
 Mumbai-400018
 Ph 4984480-1-2-3 Fax-4984480/4984481
Kramer Pharmaceuticals (P) Ltd.
 Parijat House
 1076, Dr E. Moses Road, Worli,
 Mumbai - 400 018
 Ph 4922669, 4922455/4922726 Fax:4950363
LA Pharmaceuticals.
 485, GIDC Estate Phase-II, Vatva,
 Ahmedabad - 382445
Lederle Labs Div. of Cyanamid I Ltd
 Nyloc House 254-02, Dr. Annie Besant Road,
 Mumbai - 400 018
Lupin Laboratories Ltd.
 159, C.S.T. Road, Kalina, Santacruz (East)
 Mumbai - 400 098
 Ph 6113391/6102722 Fax : 6114006

LIST OF MANUFACTURERS

Lyka Labs Ltd

77, Nehru Road, Vile Parle (E)

Mumbai 400057

Malladi Drugs & Pharmaceuticals Ltd.

No 27, 7th Avenue Ashok Nagar,

Madras-600 083

Macleods Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

304-310 Allania Arcade, Church Rd Andheri (E)

Mumbai- 400 089

Mac Laboratories (P) Ltd.

Korol, Vidyavihar

Mumbai - 400 086

Mapra Laboratories Pvt. Ltd.

201, Adhyaru Industrial Estate, Sun Mill Comp.

Lower Parol, Mumbai-400013

Ph 4921117/4921119 Fax-4950487

Max India Ltd.

Dr. Jha Marg, Okhla

New Delhi - 110 020

Ph 6828799/80/79/78

Medicamen Biotech Ltd.

10, Community Centre No. 2

Ashok Vihar, Phase II, Delhi-110052

Ph 7240578 7240579, 7240610 Fax 7138171

Medley Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Medley House, D-2, MIDC Area,

Andheri East, Mumbai 400 093

Menarini Raunag Pharma Ltd.

Allahabad Bank Building, 11th Floor,

17, Sansad Marg,

New Delhi-110 001

Ph 3360310

Mejda Marketing (P) Ltd.

A-101, Kalpita Enclave,

Swami Nityanand Marg., Andheri (East)

Mumbai- 400 069

Mercury Laboratories Pvt. Ltd.

Mercury House, R C. Dutt Road,

Vadodra - 390 005

Ph 326486/326586

Merind Ltd

Mulund-Goregaon Link Road, Bhandup

Mumbai - 400 078

Ph 5642583 86 Fax 5684518/5645483

Mesco Pharmaceuticals Ltd.

11, Zamrudpur, Community Centre

Kailash Colony Delhi 110 048

Ph 8425914/8423218/8460495 Fax:8444385

Micro Labs Limited

303, 1st floor, 'A' Wing, Queens Corner Apart-

ments 3, Queens Road,

Bangalore-560 001.

Ph 2269609/2268785/2267705 Fax. 2261627

Modi Mundi Pharma Limited

14th Floor, 1400 Hemkunt Tower

98, Nehru Place

New Delhi-110 019

Ph 6434170/6473019/6473058 Fax 6446678

Montari Laboratories Pvt. Ltd.

78 Nehru Place

New Delhi 110 019

Mount Mettur Pharmaceu-ticals Ltd.

63/1, II Main Road, Gandhi Nagar

Madras - 600 020

Natco Pharma Ltd.

Plot No. 8-2-120/112, A-32

Rd. No. 2 Banjara Hills

Hyderabad - 500 034

Ph 247532 Fax 248243

Neo-Pharma Private Limited

Kasturi Building, 5th Floor

J Tata Road

Mumbai - 400 020

Neon Laboratories Pvt. Ltd.

28 Mahal Industrial Estate, M Caves Road,

Andheri (East)

Mumbai - 400 093

Nicholas Pirammal India Ltd.

Sion-Trombay Rd, Deonar,

Mumbai - 400 088

Ph 5562021/5569703/5568704 Fax 5582064

Novo Nordisk India Pvt. Ltd.

21/15, Landmark Building, 5th Floor,

M G Road, P O Box No. 5243,

Bangalore 560 001.

Noir Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

62, Summer Villa, Bhulabhai Desai Road,

Mumbai 400 026

Panacea Biotech Ltd.

B-1/E -12, Mohan Co op

Industrial Estate Mathura Road,

New Delhi - 110 044

Ph 6847963/684794 Fax 6840199

Parke-Davis (India) Ltd.

Sakinaka,

Mumbai - 400 072

Pfizer Ltd.

Express Towers, Nariman Point,

Mumbai - 400 021

Pfime International Ltd.

4-1-1240, King Kothi Rd

Hyderabad - 500 001

Ph 236749/236754/236762 Fax 237715

Pharmaceuticals Co. of India

Arun Chambers,

J-Dadajee Rd, Tardeo,

Mumbai - 400 034

Pharmacia

Kabi Pharmacia Far East Ltd

India Liaison Office 4008

100ft Road, Hal-II Stage, Indiranagar

Bangalore- 560 008

Ph 5265806/5265806 Fax 5273809

Piramal Healthcare Ltd.

100, Centre Point,

Dr Babasaheb Ambedkar Road

Opp Bharalmata, Parol

Mumbai - 400 012

Ph 4134653/4143885

Plethico Pharmaceuticals Ltd.

A B Rd Mongla - 453 771

Indore (MP)

Procter & Gamble India Ltd.

Tie-con House

Dr E Moses Road,

Mumbai-400 011.

Rallia India

Rallia House 21, D,

Sukhadvala Marg Fort,

Mumbai 400 001

Ph 2048221 Fax 2875980

Ranbaxy Laboratories Ltd.

Devika Towers, 11th Floor,

5-Nehru Place

New Delhi - 110 019

Ph. 8437076-81 Fax-8430833

Raplakos, Brett & Co Ltd.

47, Dr. Annie Besant Road, Worli,

Mumbai - 400 026
Ph 4934251 Fax-4950341
Reckitt & Colman of India Ltd.
8 Palm Marg, Ring Road, Vasant Vihar
New Delhi - 110 057
Ph 8115827/8115830/8112794/8114197
Recon Limited
429/31, 30th Cross, IV Block Jayanagar,
Bangalore- 560 011
Ph 5633197/5643420 Fax 5635547
Reliance Formulation Pvt. Ltd.
7/2-A, G I D C Estate,
Phase - I, Vatva
Ahmedabad - 382445
Ph 5832826/5830377 Fax 5891769
Remedies (India) Pharmaceuticals
107 Aradhana Bhawan,
Azadpur Commercial Complex,
Delhi - 110033
Ph 7252496
Richie Laboratories Ltd.
5, Devkeran Mansion,
24, Mangaldas Road,
Kalbadevi
Mumbai-400 002
Rhone Poulenc (I) Ltd.
R P House, S K Ahire Marg,
Worli, Mumbai- 400 025
Ph 4934511 Fax-4950479/4932993
Roussel India Ltd.
D Shiv Sagar Dr A B Road,
Worli Mumbai- 400 018
Ph 4964343(4Lines)/4938531 Fax-4933731
Samir Remedies Ltd.
2nd Floor, Sun House opp
Navrangpura Tel Exchange, C G. Road,
Ahmedabad 380 006
Ph 463077
Sandoz India Ltd
Sandoz House
Dr Annie Besant Road,
Worli, Mumbai - 400 018
Ph 4938730 Fax 4923808
Sarabhai Chemicals
1st Floor, Administration Bldg
Gorwa Road
Vadodara 390 007 (Gujarat)
Seagull Labs Pvt. Ltd.
C-10, Community Centre,
Lawrence Road
New Delhi - 110 035
Ph 7102528/7102965
Searle (India) Ltd.
Mehta Mahal, 12th Floor
18, Mathew Road, Opera House
Mumbai - 400 004
Ph 3833510/3830298/3832785 Fax 2047009
Serdia Pharmaceuticals (India) Pvt. Ltd.
Neelam Centre,
A-Wing, Hind Cycle Road,
Worli, Mumbai- 400 025
Ph 4922629 Fax 4937547
Serum Institute of India Ltd.
301, Dalamal Tower
211, Nariman Point,
Mumbai - 400 021
S.G. Pharmaceuticals Ltd.
1st Floor, Administration Building,
Gorwa Road,

Vadodara - 390 007
Shalaka,
Puja House C-3, Karampura Community Centre
Milan Complex, Delhi,
Ph 5431218/5453832
Sigma Labs
43, Wadala
South Mumbai - 400 031
Smith Kline Beecham Pharma (I) Ltd.
Devanahalli Road Off
Old Madras Road Post Box No 2
Bangalore 560049
Ph 8510861 Fax 8510409
SOL Pharmaceutical Ltd
6-3-110 3rd Floor
Amrutha Mall, Bagumpel
Hyderabad - 500 016
Ph 316812/316813 Fax 311539
Spencer Pharma
769 Annasalai, Post Box No. 301
Madras-600 002
Shree Ganesh Pharmaceuticals
542 1/10, Bhula Niwas Dr Ambedkar Road,
P B No. 6817, Matunga (E),
Mumbai - 400 019
Stadmed Private Ltd.
33-A, 11th Jawaharlal Nehru Road,
Calcutta - 700 071
Ph 5560/5434/5437
Stancare
Division of Ranbaxy Laboratories Ltd.
12th Floor, Devika Towers, 6, Nehru Place
Delhi - 110 019
Ph 6444135/5437078-81 Fax 6444135
Stangen Pharmaceuticals
7-1-27 Ameerpet
Hyderabad 500 016
Ph 291946 Fax 291955
Steril Laboratories Ltd.
101 Sterling Chambers
Mogra Village lane Andheri (East)
Mumbai - 400 089
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Synergy House,
Subhanpura, Gorwa Road,
Vadodara-390 007
Ph 337538/341222/330427/330956 Fax332644
Sustime Pharma Ltd
Batlibor House Plot No 25 & 26
Deonar Ancillary Industrial Complex Deonar,
Gavandi West
Mumbai 400 043
Systopic Laboratories Pvt. Ltd.
101, Pragati Chambers
Ranjit Nagar, Commercial Complex
New Delhi - 110 008
Ph 5700336/5701734/5700568
Synokem Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
F-301-302, Friends Tower
Commercial Complex, Paschim Vihar
New Delhi- 110 063
Ph 5683888/5687839 Fax 5687343
Tablote India Ltd.
179 T H Road,
Madras - 600 081
Ph 553283/553284/553265/552706 Fax558767
Tamilnadu Dada Pharma Ltd.
260-262, Royapettah High Road,
Madras - 600 014

LIST OF MANUFACTURERS

Ph 8267815 Fax(044)8266447

Thomis Pharmaceuticals

28, Suren Road, Andheri (East),

Mumbai - 400 093

TATA Pharma

Taj Building, 2nd floor, 210 D N Road

Mumbai-400001

Ph 2651543/544/545 Fax 2671464

Torrent Labs (P) Ltd.

"Torrent House"

Near Dinash Hall, Off Ashram Road,

Ahmedabad - 380 009

Ph (079)405090/443237 Fax 462100

Troika Parenterals

Om Towers, Jodhpur Tekra, Satellite Road,

Ahmedabad - 380 015

Ph 079- 6741538/6743563 Fax 6749956

TTK Pharma

91, Santhome, High Road,

Raja Annamalai Puram,

Madras-600 028

Unicare Remedies Pvt. Ltd.

F/25, Industrial Estate,

Gorwa Road, Vadodra-390 018

Unichem Laboratories Ltd.

Unichem Bhawan S V Road, Jogeshwari

Mumbai 400 002

Uni-Sankyo Ltd.

5-9-24/81, Shapurwadi

Hyderabad- 500 483

Unisearch Labs Ltd.

801 Mahalaxmi Chambers, 22, B Desai Rd.,

Mumbai - 400 025

Universal Medicare Ltd.

Sion-Trombay Road, Deonar

Mumbai-400088

Ph 5563493 6564037, 5555601

Uni-UCB Limited

A-201, Neelam centre, Hind Cycle Road, Worli

Mumbai - 400 025

Ph 4950710/4924116/4964939 Fax 4950014

U.S. Vitamins (I) Ltd.

Poonam Chambers North Wing, Dr A B Road,

Worli, Mumbai-400 018

Ph 4920623/25 Fax 4921381

Wander Ltd

107, Hans Bhawan, Bahadur Shah Zafar Marg,

New Delhi-110002

Ph 3310580/3328068/3322935

Wallace Pharmaceuticals Ltd

Regent Chambers, 4th Floor, 208,

Nariman Point,

Mumbai-400021

Ph 2832110/2832146/2025431 Fax-2840799

Walter-Bushnell Ltd.

Pragati Bhawan, 11th Floor,

Bahadur Shah Zafar Marg,

New Delhi - 110 002

Warner Hindustan Ltd.

Nirlon House, 254-B,

Dr Annie Besant Road, Worli,

Mumbai - 400 025

Warren Pharmaceutical Ltd.

2/10 Jyothi Wire House

23-A Shah Industrial Estate

Veera Desai Rd Andheri (W)

Mumbai - 400 058

Wave International

1007, Bhikaji Cama Bhawan

11, Bhikaji Cama Place

New Delhi-110 066

Ph 6115295/96

Win-Medicare

1400, Hemkunt Tower, 98, Nehru Place,

New Delhi- 110 019

Ph 6434170/6212940 Fax 6445916/6446876

Wockhardt Pvt. Ltd.

Poonam Chambers, North Wing, Dr A B Road,

Worli Mumbai- 400 018

Wyeth Laboratories Ltd.

Apeejay House, Dinshaw Wacha Road

Mumbai - 400 020

Zandu Pharmaceutical Works Ltd.

70 Gokhale Road South (Dadar)

Mumbai - 400 025

Ph 4307021 Fax-4375491

GENERIC INDEX

ACEBUTOLOL 110
 ACENOCOUMAROL 70
 ACETAZOLAMIDE 193-546
 ACLARUBICIN 323
 ACYCLOVIR 373,569
 ADHESIVE TAPES 537
 ADRENALINE 518
 ADRENOCHROME MONO-
 SEMICARBAZONE 80
 AGAR GEL 58
 ALBENDAZOLE 338
 ALBUTEROL 519
 ALGINIC ACID 8
 ALLANTOIN 581
 ALLYLOESTRENOL 482
 ALPRAZOLAM 230
 ALUMINIUM CHLOR-
 HYDROXIDE 351
 ALUMINIUM HYDROXIDE GEL &
 AMANTADINE HCL 209
 AMIKACIN 258
 ALMILORIDE 151
 AMINO ACID INFUSION 479
 AMINO CAPROIC ACID 81
 AMINOCEPTINE HCL 232
 AMINOPHYLLINE 522
 AMINO SALICYLIC ACID 89
 AMIODARONE 134
 AMITRIPTYLINE HCL 232
 AMLODIPINE BESYLATE 145
 AMMOIDINE 583
 AMMONIUM CHLORIDE 529
 AMODIAQUINE HCL 353
 AMOXAPINE 233
 AMOXYCILLIN TRIHYDRATE 260
 AMPHOTERICIN-B 345
 AMPICILLIN 266
 AMYLASE 46
 ANALGIN 217
 ANTI SNAKE VENOM SERUM 81
 ANTI-CATARRAL VACCINE 80
 APROTININ 427
 ASPARTAME 481
 ASPIRIN 71-446
 ASTemizOLE 178
 ATENOLOL 111
 ATRACURIUM
 BESYLATE 436
 ATROPINE SULPHATE 422
 AURANOFFIN 434
 AUROTHIOMALATE SODIUM 435

AZATADINE MALEATE 176
 AZATHIOPRINE 338
 AZITHROMYCIN 272
 BACAMPICILIN HCL 272
 BACLOFEN 426
 BECLMETHASONE
 DIPROPIONATE 397,567
 BENZALKONIUM CHLORIDE 538
 BENZALKONIUM CHLORIDE
 DRESSINGS 538
 BENZHEXOL HCL 210
 BENZTHIAZIDE 407
 BENZYDAMINE HCL 565
 BENZYL BENZOATE 558
 BENZYL NICOTINATE 581
 BEPHENIUM
 HYDROXYAPHTHOATE 338
 BERBERINE HCL 23
 BETA HISTINE DIHCL 201
 BETAMETHASONE 397
 BETAMETHASONE
 DIPROPIONATE 568
 BETAMETHASONE
 SOD. PHOS./BENZOATE 568
 BETAMETHASONE
 VALERATE 569
 BETAXOLOL HCL 546
 BILE SALTS 83-46
 BILE SALTS 83-46
 BIPERIDEN HCL 210
 BISACODYL 58
 BISOPROLOL FUMERATE 116
 BLEOMYCIN 324
 BLOOD BANKING SOLUTIONS 72
 BROMHEXINE HCL 529
 BROMOCRIPTINE 211-484
 BUDESONIDE 522
 BUMETANIDE 407
 BUPIVACAINE HCL 171
 BUPRENORPHINE HCL 219
 BUSPIRONE HCL 231
 CALAMINE 587
 CALCIPOTRIOL 564
 CALCIUM GLUCONATE 82
 CAMYLOFIN DI-HCL 36
 CAPTOPRIL 140
 CARBAMAZEPINE 184
 CARBIDOPA 212
 CARBINAZOLE 404
 CARBOCYSTEINE 579
 CARBOPLATIN 330
 CARBOPROST

TROMETHAMINE 500
 CARISOPRODOL 437
 CEFACLOM 273
 CEFADROXIL 273
 CEFAZOLIN SODIUM 276
 CEFIXIME 274
 CEFOPERAZINE SODIUM 275
 CEFOTAXIME SODIUM 278
 CEFTIZOXIME 281
 CEFTRIAXONE 276
 CEFUROXIME 280
 CENTCHROMAN 508
 CEPHALEXIN 281
 CEPHALORIDINE 284
 CETIRIZINE DIHCL 179
 CHLOMEZANONE 437
 CHLORAMBUCIL 326
 CHLORAMPHENICOL 285, 23
 CHLORDANTION 508
 CHLORDIAZEPOXIDE 257
 CHLORHEXIDINE
 GLUCONATE 536
 CHLOROQUINALDOL 510
 CHLOROQUINE
 PHOSPHATE 23-253
 CHLORPHENIRAMINE
 MALEATE 180-527
 CHLORPROMAZINE HCL 242
 CHLORPROPAMIDE 390
 CHLORTERTACYCLINE 267
 CHLORTHALIDONE 152, 408
 CHLORZOXAZONE 438
 CHLOESTYRAMINE 108
 CHOLINE CHLORIDE 53
 CHORIONIC GONADO TROPIN 4
 CICLOPIROXOLAMINE 510
 CIMETIDINE 37
 CINNARIZINE 181-201
 CIPROFLOXACIN 288
 CISAPRIDE 56
 CISPLATIN 331
 CLARITHROMYCIN 293
 CLEMASTIN 181
 CLIDINIUM BROMIDE 83
 CLINDAMYCIN 551
 CLOBETASOL
 PROPIONATE 568
 CLOBETASONE 399
 CLOBETASONE 17 BUTYRATE 570
 CLOFAZIMINE 351
 CLOFAZINE 352
 CLOFIBRATE 16

CLOMIPHENE CITRATE484
 CLOMIPRAMINE HCL.....234
 CLOMIPRAMINE186
 CLONIDINE HCL147
 CLOMIPRAMINE157-409
 CLOTRIMAZOLE345
 CLOXACILIN SODIUM.....283
 CLOZAPINE.....236
 CODEINE218-528
 CODEINE SULPHATE217
 COERGOCRINE MESYLATE.....226
 COLISTIN SULPHATE.....294
 CONJUGATED GESTROGENS..82
 CORN CAPS.....538
 COTRIMOXAZOLE.....295
 COTTON CREPE
 BANDAGE538
 CUMIN OIL.....47
 CYCLANDELATE181
 CYCLIZINE202
 CYCLOPENTOLATE.....547
 CYCLOPHOSPHAMIDE319
 CYCLOSERINE364
 CYCLOSPORIN.....336
 CYPROHEPTADINE.....182, 565
 CYTOSINE326
 D PENICILLAMINE434
 DANAZOL485
 DAPSONE.....352
 DEHYDROEMETINE.....358
 DEMETHYL CHLOR-
 TETRACYCLINE387
 DESAMINO OXYTOCIN.....500
 DESFERRIOXAMINE.....103
 DESOXY CORTICOSTERONE
 ACETATE383
 DEXAMETHASONE389
 DEXAMETHASONE SODIUM
 PHOSPHATE571
 DEXAMETHASONE TRIMETHYL
 ACETATE571
 DEXCHLORPHENIRAMINE
 MALEATE183
 DEXFEN FLURAMINE
 HCL489
 DEXTRAN427
 DEXTROMETHORPHAN.....328
 DEXTROPROPOXYPHENE...447
 DEXTROSE428
 DEXTROSE ELECTROLYTE INJ. 429
 DEXTROSE INJ.428
 DEXTROSE SODIUM-
 CHLORIDE INJ.428

DIAZEPAM.....175-253
 DICHLOROXYLENOL SOLN 538
 DECLOFENAC SODIUM.....448
 DICYCLOMINE HCL.....53,422
 DENOESTROL488
 DIETHYL CARBAMAZINE
 CITRATE.....337
 DIGOXIN198
 DIHYDRALLAZINE SULPHATE ..182
 DIHYDRO ERGOTAMINE
 MESYLATE188
 DIHYDROTESTOSTERONE GEL 487
 DIODD HYDROXY QUINOLINE .358
 DILAZEP121
 DILOXANIDE FUROATE.....360
 DILTIAZEM122
 DIMENHYDRINATE.....202
 DIMERCAPROL.....104
 DIMETHICONE10
 DIMETHINDENE
 MALEATE183
 DINOPROSTONE.....501
 DIOCTYL SODIUM.....69
 DIOSMIN.....31
 DIPHENHYDRAMINE527
 DIPHENHYDRAMINE HCL 184
 DIPHENYL PYRAZINE530
 DIPHENYLHYDANTION SODIUM 188
 DIPHTHERIA ANTITOXIN.....93
 DIPOTASSIUM HYDROGEN
 CITRATE410
 DIPROPHYLLINE522
 DIPYRIDAMOLE.....73
 DISODIUM HYDROGEN
 CITRATE410
 DISOPYRAMIDE PHOSPHATE 135
 DIOSULFIRAM228
 DOBUTAMINE HCL148,158
 DOMPERIDONE203
 DOPAMINE.....160
 DOTHIEPIN HCL238
 DOXAPRAM534
 DOXEPIN HYDROCHLORIDE 237
 DOXORUBICIN324
 DOXYCYCLINE295
 DYDROGESTERONE487
 EMBRAMINE HCL.....185
 ENALAPRIL11, 141
 ENFLURANE173
 EPHEDRINE HCL.....518
 ERGOLOID MESYLATE228

ERGOTAMINE189
 ERGOTAMINE TARTRATE...130
 ERYTHROMYCIN.....287
 ESTRADIOL488
 ESTRAMUSTINE PHOSPHATE ..331
 ESTRIOL SUCCINATE488
 ETHACRIDINE LACTATE502
 ETHAMBUTOL364
 ETHANESYLATE83
 ETHER.....174
 ETHINYLOESTRADIOL332
 ETHIONAMIDE366
 ETHOSUXIMIDE197
 ETHYL ESTRENOL363
 ETHYL MORPHINE528
 ETHYLBUTAMIDE535
 ETHOPHYLLINE522
 ETOPOSIDE327
 FAMOTIDINE37
 FELODIPINE147
 FENFLURAMINE HCL481
 FERACRYLUM84
 FLAVOXATE.....424
 FLORAFUR.....328
 FLUBIPROFEN SODIUM548
 FLUCONAZOLE348
 FLUCORTOLONE HEXANOATE 481
 FLUNARIZINE188
 FLUOCINOLONE ACETONIDE 571
 FLUCORTOLONE571
 FLUOROCORTOLONE
 PIVALATE32
 FLUOTHANE/HALOTHANE .174
 FLUOXETINE HCL237
 FLUPENTHIXOL.....242
 FLUPHENAZINE HCL.....243
 FLURAZEPAM254
 FLURBIPROFEN461
 FLUOROURACIL327
 FLUTAMIDE318
 FOLLICLE STIMULATING
 HORMONE480
 FRUCTOSE SODIUM CL INJ 438
 FRUSEMIDE411
 FUNGAL DIASTASE46
 FURAZOLIDONE.....23, 369
 GABAPENTIN.....197
 GAMMA BENZENE HEXA-
 CHLORIDE.....538
 GAS GANGRENE ANTITOXIN 93
 GEMFIBROSIL107
 GENTAMYCIN SULPHATE ..299

GINSENG	464	INDAPAMIDE HYDRATE	188	LIDOFLAZINE	118
GLIBENCLAMIDE	391	INDOMETHACIN	465	LIGNOCAINE	513
GLICLAZIDE	382	INSULIN ZINC SUSPEN		LIGNOCAINE HCL	172, 136
GLIPIZIDE	383	ION	368	LINCOMYCIN HCL	301
GLUCAGON	384	INTRAPERITONEAL DIALYSIS		LIQUID PARAFFIN	89
GLUCOMANNAN	489	SOLUTION	417	LISINAPRIL	143
GLYCERYL GUAIACOLATE	534	INTRAVENOUS DMP		LITHIUM CARBONATE	244
GLYCERYL TRI-		SETS	338	LOMEFLOXACIN	302
NITRATE	132	IODAMIDE	379	LOMUSTINE	329
GRISEOFULVIN	348	IODINE COLLOIDAL		OPRAMIDE	20
GUAIAPHENESIN	530	FORM	405	ORATADINE	186
GUGGUL STERONES	108	IODOCHLORHYDROXY		LORAZEPAM	253
GUM KARAYA AND CORTEX	58	QUINOLINE	361	LOVASTATIN	186, 109
HAEMACCEL POLYMER FROM		IODOXYURIDINE	540	LOXAPINE	240
DEGRADED GELATIN	430	IOHEXOL	378	LYNOESTRENOL	492
HAEMATINICS	468	IOPANOIC ACID	380	LYNOESTRENOL ETHINYL	
HAEMOCOAGULASE	84	IOPHENDYLATE	380	ESTRADIOL	508
HALOPERIDOL	250	ISOFLURANE	174	LYSINE ACETYL SALICYLATE	77
HALOPYRAMINE HCL	185	ISONIAZID	368	MAGNESIUM	
HAMYCIN	348-512	ISOPHANE INSULIN		HYDROXIDE	89
HEPARIN	74, 361	CRYSTALLINE PROTAMINE		MAGNESIUM	
HEPATITIS B LATEX AGGLUTN		INSULIN	388	TRISILICATE	8
QUICK TEST	379	ISOPRENALINE	55, 520	MALATHION	562
HEPATITIS B VACCINE	95	ISOPROPYL ANTIPYRIN	456	MANNITOL	413
HERMIN	431	ISOSORBIDE S. MONONITRATE	132	MEASLES VACCINE	87
HISTAGLOBIN	93	ISOSORBIDE DINITRATE	131	MEASLES, RUBELLA, MUMPS	
HOMATROPINE HBR	547	ISOXBUPRINE HCL	163, 502	VACCINE	97
HUMAN ERYTHRO-		ISPAHOL	59	MEBENDAZOLE	341
POIETIN	469	ITRACONAZOLE	350, 114, 178	MEBEVERINE	84
HUMAN NORMAL IMMUNO		KALMEG LIQUID		MEBHYDROLIN	
GLUBULIN	94	EXTRACT	83	NAPADISYLATE	128
HYDRALLAZINE	162	KANAMYCIN	300	MECLIZINE HCL	204
HYDROCHLORTHIA		KETACONAZOLE	348	MEDROXYPROGES-	
ZIDE	412	KETAMINE	178	TERONE	494
HYDROCORTISONE		KETOPROFEN	456	MEFENAMIC ACID	458
ACETATE	30, 572, 401	KETOROLACTROMETHAMINE	457	MEGLUMINE DIATRIZOATE	380
HYDROFLUMETHIA		KETOTIFEN	516	MEGLUMINE	
ZIDE	413	LABETALOL HCL	140	IODIPAMIDE	381
HYDROXY METHYL		LACTIC ACID	500	MEGLUMINE IOTHALMATE	381
NICOTINAMIDE	53	LACTOBACILLUS		MELPHALAN	320
HYDROXY PROPYL METHYL		SPOROGENES	102	MENADIOL SODIUM	
CELLULOSE 2% INJ.	848	LACTOBACILLUS	47	DIPHOSPHATE	88
HYDROXYPROGESTERONE		LACTULOSE	62	MENADIONE SODIUM	
CAPROATE	481	LANSOPRAZOLE	42	BISULPHITE	96
HYDROXYPROPYL METHYL		LEUCOVORIN CALCIUM	376	MENOTROPHIN	493
CELLULOSE	848	LEVAMISOLE	340	MENTHOL	506
HYDROXYZINE	255	LEVODOPA L		MEPACRINE	355
HYOSCYAMINE SUL-		DNHYDROXYPHENYLALANINE	212	MEPHENESIN	439
PHATE	84	LEVONORGESTREL ETHINYL		MEPHENTERMINE	178
IBUPROFEN	492	ESTRADIOL	508	MEPYRAMINE	
IFOSFAMIDE	319	LEVONOROGESTREL	482	MALEATE	527
IMIPRAMINE HCL	238	LEVULOSE	58	MERCAPTOPYRINE	328

MESALAZINE... 50
 MESNA... 321
 MESTEROLONE... 403
 METFORMIN... 304
 METHILAZINE HCL... 157
 METHENAMINE MANDELATE... 418
 METHOCARBAMOL... 439
 METHOTREXATE... 320
 METHOXSALEN... 584
 METHYL DOPA... 140
 METHYL ERGONOVINE... 504
 MALEATE... 57
 METHYL HESPERIDIN... 586
 METHYL NICOTINATE... 586
 METHYL POLY-
 SILOXANE... 10
 METHYL SALICYLATE... 584
 METHYLERGOMETRINE
 MALEATE... 503
 METHYLPREDNISOLONE
 ACETATE... 402
 METOCLOPRAMIDE... 205
 METOPROLOL... 115
 METRONI-
 DAZOLE... 10, 513, 551
 MEXILETINE... 135
 MIANSERIN HCL... 240
 MICONAZOLE... 350
 MICONAZOLE NITRATE... 514
 MINOCYCLINE HCL... 303
 MINOXIDIL... 164, 562
 MISULBAN... 321
 MITOMYCIN-C... 325
 MITOZANTRONE... 330
 MODIFIED GELATIN POLY
 PEPTIDE... 50
 MORPHINE SULPHATE... 221
 MUCOPOLYSACCHARIDE
 POLYSULFATE... 583
 MUPIROCI... 554
 MUSTINE HCL... 322
 N.BENZOLY SULFANILAMIDE... 514
 NALIDIXIC ACID... 23-410
 NALOCONE HCL... 377
 NANDROLONE DECANOATE... 304
 NANDROLONE PHENYL-
 PROPIONATE... 304, 332
 NAPHAZOLINE
 NITRATE... 549
 NAPROXEN... 450
 NATAMYCIN... 517
 NEOMYCIN PHTHALYL

SULPHATHIAZOLE... 23
 NEOSTIGMINE (METHYL
 SULPHATE)... 445
 NICOTINAMIDE... 342
 NIFEDIPINE... 124
 NIKETHAMIDE... 535
 NIMESULIDE... 450
 NIMODIPINE... 140
 NITRAZEPAM... 256
 NITRENDIPINE... 127
 NITROFURANTOIN... 419
 NITROGLYCERIN... 133
 NITROUS OXIDE... 175
 NITROXAZEPINE HCL... 241
 NONOXYNOYL... 400
 NONYL PHENORYPOLY
 ETHOXYETHANOL... 400
 NORTHETERONE ACETATE... 494
 NORFLOXACIN... 304
 NORGESTREL... 495
 NORGESTREL ETHINYL
 ESTRADIOL... 500
 NORTRYPTILINE HCL... 241
 NOSCAPINE... 520
 NYLIDRIN... 105
 NYSTATIN... 351-515
 OCTINUM MUCTATE
 AMIDOSULPHONATE... 424
 OESTRADIOL... 495
 OESTRADIOL DIPROPIONATE... 496
 OIL OF SANDAL WOOD... 420
 OMEPRAZOLE... 43
 ONDANSETRON HCL... 206
 ORAL ELECTROLYTES... 433
 ORAL POLIO VACCINE... 99
 ORCIPRENALINE... 520
 ORPHENADRINE
 CITRATE... 440
 ORPHENADRINE HCL... 213
 OXAZEPAM... 257
 OXETHAZINE... 15
 OXYMETHOLONE... 305
 OXYPHENBUTAZONE... 400
 OXYPHENONIUM BROMIDE... 44
 OXYTETRACYCLINE... 207
 OXYTOCIN... 505
 P. PIPERIDINOETHOXY
 O.CARBOMETHOXY
 BENZOPHENONE HCL... 425
 PANGREATIN... 47
 PANCURONIUM
 BROMIDE... 411, 423

PANTANK... 220
 PAPAIN... 47
 PARA AMINO BENZOIC ACID... 544
 PARA AMINO SALICYLIC ACID... 300
 PARACETAMOL... 323
 PEFLOXACIN... 308
 PENFLURIDOL... 245
 PENICILLAMINE... 105
 PENICILLINS... 307
 PENTATHAL SODIUM-
 THIOPENTONE SODIUM... 170
 PENTAZOCINE... 221
 PENTOXIFYLINE... 185
 PEPsin... 47
 PERINDOPRIL... 144
 PERMETHRIN... 550
 PETHIDINE HCL... 223
 PHENAZOPYRIDINE... 420
 PHENFORMIN HCL... 295
 PHENINDIONE... 75
 PHENIRAMINE
 MALEATE... 187
 PHENOBARBITONE... 190-257
 PHENOLPHTHALEIN... 50
 PHENTOLAMINE... 130
 PHENYL BUTAZONE... 401
 PHENYL EPHRINE
 HCL... 180-547, 549
 PHENYL PROPANOL AMINE
 HCL... 180-530
 PHENYTOIN SODIUM... 100
 PHOLEDRINE
 SULPHATE... 170
 PHTHALYL SULPHATHIAZOLE... 23
 PILOCARPINE NITRATE... 540
 PIMOZIDE... 245
 PINDOLOL... 110
 PIPENZOLATE
 METHYLBROMIDE... 60
 PIPERACILLIN... 309
 PIPERAZINE CITRATE... 342
 PIPERCURONIUM BROMIDE... 441
 PIRACETAM... 220
 PIRIBEDIL... 217-227
 PIROXICAM... 402
 PITOFENONE HCL... 420
 PODOPHYLLINE... 500
 POLICRESULEN... 32
 POLYESTRADIOL... 333
 POLYMXIN B
 SULPHATE... 300
 POLYTHIAZIDE... 414

POLYVINYL POLYMER SPRAY...338
 POTASSIUM CHLORIDE...431
 POTASSIUM CHLORIDE &
 DEXTROSE...431
 POTASSIUM GUAICOL
 SULPHONATE...531
 POVIDONE IODINE...515-537
 PRALIDOXIME
 CHLORIDE...378
 PREDNISOLONE...402
 PREPARED ERGOT...508
 PRETHECAMIDE...535
 PRIMAQUINE
 PHOSPHATE...355
 PRIMAXIN...310
 PRIMIDONE...199
 PROCAINAMIDE HCL...137
 PROCHLORPERAZINE...246,207
 PROCYCLIDINE HCL...214
 PROGESTERONE...497
 PROGUANIL...356
 PROMAZINE HCL...247
 PROMETHAZINE HCL...189
 PROMETHAZINE THEOCLATE...208
 PROPAFENONE HCL...137
 PROPANTHELINE...57-35
 PROPOFOL...177
 PROPRANOLOL...319
 PROPYLBUTAMIDE...535
 PROPYLIODONE...381
 PROTEIN
 HYDROLYSATE...374
 PSEUDOEPHEDRINE
 HCL...531
 PSORALEN...585
 PYRANTEL PAMOATE...343
 PYRAZINAMIDE...368
 PYRIDAZINE...314
 PYRIDINE ALDOXIME
 METHIODIDE...377
 PYRIMETHAMINE...369
 PYRITINOL DIHYDRO
 CHLORIDE MONOHYDRATE...227
 PYRVINUM PAAATE...343
 QUINIDINE PHENYLETHYL
 BARBITURATE...138
 QUINIDINE SULPHATE...137
 QUININE SULPHATE...139
 QUINODOCHLOR...382
 RABIES VACCINE...85
 RAMIPRIL...145
 RANITIDINE...37

RESERPINE...150
 RIBAVIRIN...378
 RIBOFLAVIN TETRABUTYRATE...310
 RIFAMPICIN...369
 RINGER LACTATE SOLUTION...432
 RITRODRINE HCL...508
 ROSOXACIN...310
 ROXITHYROMYCIN...311
 RUTIN...88
 SALBUTAMOL...520
 SALICYLIC ACID...580
 SALMETEROL
 XINAFOATE...521,52
 SANTONINE...344
 SECNIDAZOLF...362-518
 SELEGILINE HCL...215
 SENNOSIDES...57
 SERRATIO PEPTIDASE...463
 SILVER SULPHADIAZINE...553
 SILYMARIN...58
 SIMETHICONE...10
 SISOMYCIN...311
 SODIUM BICARBONATE...8
 SODIUM BICARBONATE
 INJ...432
 SODIUM CHLORIDE...433
 SODIUM COLISTIN METHANE
 SULFONATE...294
 SODIUM CROMO-
 GLYCAT...55-550
 SODIUM HYALURO-
 ...550
 SODIUM IODINE+MONOBACIS
 CALPHOSPHATE...550
 SODIUM IOTHALMATE...382
 SODIUM LACTATE
 INJ. I.P...433
 SODIUM VALPROATE...199
 SOLUBLE NEUTRAL INSULIN...387
 SOMATOSTATIN...88
 SOTALOL HYDROCHLORIDE...120
 SPARTAME SUCCHARINE...481
 SPIRAMYCIN...312
 SPIRONOLACTONE...414
 STANOZOLOL...386
 STERILE MILK
 PROTEIN...103
 STILBOESTROL...334
 STREPTOKINASE...75
 STREPTOMYCIN...313-372
 STREPTOMYCIN SULPHATE...23
 SUCCNYL CHOLINE CL...442

SUCRALFATE...45
 SULFADOXINE...357
 SULFAMOXOLE...313
 SULFISOXAZOLE...313
 SULPHA-SOMIDINE...314
 SULPHACETAMIDE...514
 SULPHADIAZINE...313
 SULPHADIMIDINE...313
 SULPHADOXINE...313
 SULPHAGUANIDINE...313
 SULPHAMERAZINE...314
 SULPHAMETHIZOLE...421
 SULPHAMETHOXAZOLE...314
 SULPHAMETHOZINE...314
 SULPHAMETHOZY PYRAZINE...314
 SULPHAMETHOXY
 PYRIDAZINE...358
 SULPHAPROXYLINE...314
 SULPHASALAZINE...89
 SULPHATHIAZOLE...514
 SULPHINETHOX
 YPYRIDAZINE...314
 SULPHINYRAZONE...167
 SULPHOSUCCINATE...59
 SULPHONAMIDES...313
 SULPHUR...551
 TAMOXIFEN CITRATE...334
 TERBUTALINE
 SULPHATE...321
 TERCONAZOLE...518
 TERFENADINE...190
 TESTOSTERONE PROPIONATE...497
 TETANUS ANTITOXIN...86
 TETANUS TOXOID...101
 TETRA ETHYL THIURUM
 DISULPHIDE...229
 TETRACYCLINE HCL...288
 TETRAMISOLE HCL...344
 THEOPHYLLINE...523
 THIACETAZONE...373
 THIOPROPERAZINE...248
 THIOPROPERAZINE...247
 THIOTEPA...322
 THYROGLOBULIN...403
 THYROXINE SODIUM...408
 TICLOPIDINE HCL...77
 TIMOLOL MALEATE...548
 TINIDAZOLE...516
 TISSUE PLASMINOGEN
 ACTIVATOR...168
 TZANIDINE HCL...443
 TOLBUTAMIDE...385

TRAMODOL HCL 224
 TRANS RETINOIC ACID 551
 TRAZODONE HCL 251
 TREPENE HYDRATE 531
 TRETINOIN 551
 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 403-573
 TRIAMTERENE 415, 154
 TRICHOLINE CITRATE 53
 TRICLOFOS SODIUM 250
 TRIFLUOPERAZINE 240
 TRIFLUOPERIDOL 250
 TRIFLUOPROMAZINE HCL 249-200
 TRIHEXYPHENIDYL HCL 215
 TRIMEPAZINE TARTRATE 191
 TRIMETHADIONE 200
 TRIMETHOPRIM 315
 TRIMETHYL PSORALEN 569
 TRIMETHOPRIM 243
 TRIMETHOPRIM 565
 TRIPROLIDINE HCL 192, 532
 TRITHIO PARAMETHOXY PHENYLPROPENE 53
 TROPICAMIDE 547
 TUBERCULIN PURIFIED PROTEIN DERIVATIVE 382
 TUBOCURARINE CHLORIDE 443
 TYPHOID VACCINE 101
 TYPHOID VACCINE 101
 UROKINASE 78
 URSODESOXY CHLIC ACID 53
 VALETHAMATE BROMIDE 444-507
 VANCOMYCIN 317
 VASOPRESSIN 416
 VERAPAMIL 126
 VINCRISTINE 323
 VITAMIN A 471
 VITAMIN B COMPLEX 472
 VITAMIN B12 474
 VITAMIN C 475
 VITAMIN D 473
 VITAMIN E 476
 VITAMIN K 50
 WARFARIN SIDIUM 79
 XANTHINOL NICOTINATE 186
 XIPAMIDE 155-415

XYLOCAINE 173
 ZIDOVUDINE 376

ALPHABETICAL INDEX

A C D SOLUTION A 72
 A C D SOLUTION B 72
 ABACT 289
 ABACT INFUSION 289
 ABDEC DROPS 476
 ABDGYL-N 17
 ABDGYL-N SUSP 17
 ABORTIL 502
 ABURIL 315
 ABURIL SULP 315
 ABZ 339
 ABZ SUSP 339
 ABZORB DUSTING POWDER 534
 ACEMIZ 176
 ACEMIZ SUSP 176
 ACETEN 141
 ACEZIDE 141
 ACHROMYCIN 287
 ACIDIN 10
 ACIDIN-MPS 10
 ACIDIN-MPS GEL 10
 ACIGON 9
 ACIGON SUSP 9
 ACILOC 38
 ACILOC INJECTION 38
 ACIPEP 38
 ACITROM 70
 ACNESOL 551
 ACNEX 551
 ACREDIN 38
 ACTIFED 192
 ACTIFED PLUS/DM 192
 ACTILYSE 188
 ACTIMOL 461
 ACTIMOL-F 453
 ACTIMOL-F-SUSP 463
 ACTRAPID 380
 ACTRAPID-MC 380
 ADALFOND 123
 ADELPHANE 150
 ADELPHANE-ESIDREX 160
 ADHESIA 539
 ADLOX 286
 ADV-1/2/3/4 539
 ADIVATE 500
 ADRIAMYCIN 325
 ADRIM 325
 ADROYD 326

ADVANTAC 34
 ADVENE 34
 AEROCORT INHALER 523
 AEROSPORIN 310
 AFLOX EYE/EAR DROPS 542
 AGAROL 60
 AIRYFEN 518
 AIRYFEN SYRUP 514
 ALBENDOL 339
 ALBENDOL SUSP 339
 ALBERCILIN 260
 ALBERCILIN DROPS 266
 ALBERCILIN INJ 266
 ALBEZOLE 339
 ALBEZOLE 339
 ALBUCID 344
 ALCEPHIN 282
 ALCEPHIN DRY SYRUP 282
 ALCIPRO 289
 ALCIPRO I.V. 289
 ALCOPAR 336
 ALCIZON 277
 ALDACTIDE 413
 ALDACTONE 415
 ALDARONE 135
 ALDAY 160
 ALDEZOLE I.V. 17
 ALODIAGRAM 24
 ALODIAMYCIN 17
 ALERZOLE 178
 ALERZOLE SUSP 178
 ALESTOL 178
 ALEX COUGH FORMULA 189
 ALEXIN 262
 ALEXIN DRY SYRUP 262
 ALFLOX 304
 ALFLUCOZ 347-512
 ALFUMET 17
 ALGIRIL TABS 461
 ALKACITATE 411
 ALKALISER 413
 ALKANIL 413
 ALKANIL INGA SYRUP 410
 ALKANIL-P SYRUP 411
 ALKASOL 411
 ALKERAN 321
 ALLERGAM 94
 ALLERGAM INJ 94
 ALLERZINE 180
 ALLUJEL DF 11
 ALMACARB 11

ALMAGEL 11
ALMINTH 339
ALOTEN 112
ALPHADINE 552
ALPHADINE
MOUTHWASH 541
ALPHADINE OINT 552
ALPHADINE POWDERS 552
ALPHADINE SCRUB 537
ALPHADINE SOLUTION 552
ALPHADINE VAGINAL 575
ALPHADOPA 149
ALPRAX 230
ALSPORIN 252
ALTHROCIN 297
ALTHROCIN
CHEWABLE 297
ALTHROCIN FORTE LIQUID 297
ALTHROCIN LIQUID 297
ALTHROCIN PEARL
DROPS 297
ALUCINOL 11
ALUCINOL SUSP 11
ALUDROX 9
ALUDROX GEL 9
ALUDROX-MH 9
ALUDROX-MH GEL 9
ALUPENT 523
ALUPENT SYRUP 523
ALUPROGEL FORT SUSP/TABS
ALUPROGEL 11
ALUPROMATE TABS 45
ALUPROMATE TABS 45
ALUPROMATE-D TABS 45
ALZAD 339
ALZAD SUSP 339
ALZOLAM 230
ALZOLAM 230
ALZOPAX 230
AMANTREL 210
AMBISTRYN-S 273
MBROX 260
AMCARD 146
AMCLOX 266
AMCLOX INJ 266
AMDEPIN 146
AMEBIS FORTE 21
AMIBACTIN-BD 21
AMIBEX NA 24
AMIBEX NA SYRUP 24
AMIBIOTIC INJ
500/250/100 259

AMICIN 259
AMICLINE 24
AMICLINE PLUS 24
AMID 383-516
AMIFRU-40 412-15,163
AMIKACIN INJ 259
AMILNE 233
AMIMIDE 181
AMINOCORE-35 486
AMINODRIP 479
AMINOZYME 47-470
AMINOZYME TABS 47-470
AMIRON 259
AMITONE 233
AMITROL 233-252
AMITROL-DS 233-253
AMIXIDE 233-253
AMIXIDE-S 253
AMIXIDE-H 233
AMIXIDE-S 233
AMLODAC 146
AMLOGARD 146
AMLOPIN 146
AMOKID 260
AMONATE 260
AMOTID 260
AMOTID BR 260
AMOXIL 260
AMOXIVAN 260
AMOXIVAN DRY SYRUP 260
AMOXIBID 260
AMOXIBID DRY SYRUP 261
AMOXICILLIN CAPS 261
AMPICILLIN 260
AMPIDR 260
AMPIDIL SYRUP 260
AMPIKENT 260
AMPLIN 266
AMPLIN DRY SYRUP 266
AMPLIN INJ 266
AMPLIN KID TABS 266
AMFLOX 267
AMFLOX DRY SYRUP 267
AMFLOX DS INJ 267
AMPILOX INJ 267
AMPILOX KID TAB 267
AMFLOX NEONATAL
INJ 267
AMPILOX PEDIATRIC
INJ 267
AMPIPEN 267
AMPIPEN DRY POWDER 267

AMPISYN 267
AMPISYN CAPS 267
AMPISYN SYRUP 267
AMPITUM 267
AMPITUM 750 INJ 267
AMPLUS 267
AMPLUS INJ 267
AMPOXIN 267
AMPOXIN 250/500/IG INJ 267
AMPREZ-8/10 146
ANADEX 220-447
ANABELL CREAM 552
ANAFEBRIN 244
ANAFORTAN 37
ANAFORTAN INJ 37
ANATENSOL 244
ANATENSOL INJ 244
ANAWIN HEAVY 169
ANAWIN INJ 171
ANDRACTIM 487
ANEKET INJ 50/10 176
ANEMIDOX 466
ANESTHAL 177
ANEUDOX 12 TABS 472
ANEUDOX-12 INJ 472
ANGIBLOC 125
ANGIBLOC RETARD 125
ANGICOR 132
ANGIGAURD 146
ANGIOGRAFIN 65% 381
ANGIOPREL 141
ANGISED 133
ANGISPAN SR 133
ANGISPAN TR 133
ANGITOL 112
ANGITOL PLUS 112
ANGITRIT 132
ANGIZEM 122
ANGYL 17
ANIN 492
ANN INJ 491
ANOVTE 30
ANOVATE OINT 30
ANTADICT 229
ANTIBIOTICS 267
ANTIDEP 239
ANTIPAR WITH
LAXATIVE 342
ANTIHISTAMINE VINOL

POLYVALENT INJ.....	81, 82	EXPECTORANT.....	824	BACTRIM I.M./V INJ.....	318
ANTRENYL.....	48	ASTHALIN INHALER.....	524	BACTROBAN.....	854
ANTRENYL DUPLEX.....	45	ASTYER.....	488	BANOCIDE.....	337
ANTRIMA.....	316	ASTYFER LIQUID.....	468	BANOCIDE PAED SYRUP.....	337
ANXIPAR.....	231	ASTYMIN C DROPS.....	478	BANOCIDE SYRUP.....	337
ANXIT.....	230	ASTYMIN FORTE.....	478	BARALGAN.....	423-428
ANXOL.....	293	ASTYMIN LIQUID.....	478	BARALGAN INJ.....	423
ANXOL INJ.....	293	ASTYMIN-3.....	480	BARDASE.....	85
ANXYL.....	230	ATARAX DROPS.....	255	BASITON FORTE.....	478
APITAMINE LIQUID.....	488	ATARAX INJ.....	255	BASOQUIN SUSP.....	353
APYRIN.....	223	ATARAX SYRUP.....	255	BATRAFEN.....	518
AQUAMIDE.....	412, 158, 415	ATARAX TABS.....	255	BATRAFEN CREAM.....	534
AQUAMIN.....	478	ATCARDIL.....	112	BATRAFEN SOLN.....	555
AQUAPLAT.....	331	ATECARD.....	150, 112	BAXIN.....	268
AQUASOL A CAPS.....	472	ATECARD-D.....	152, 112	BAXIN INJ.....	268
AQUASOL A PARENTRAL.....	472	ATECOR.....	112	BAXIN SYRUP.....	268
AQUAVIRON.....	488	ATELOL.....	158	BAYCIP.....	289
ARDUAN.....	442	ATELOL-D.....	158	BAYCORT.....	587
ARFLUR.....	452	ATEN.....	112	BD-ROX.....	311
ARGENEX CREAM.....	552	ATEN-78.....	112	BEC NM CREAM.....	568
ARINAC.....	483	ATENEX 25/80/100.....	112	BEC-FORTE CREAM.....	567
ARISTOCILLIN.....	267	ATENOVA.....	112	BEC-N CREAM.....	567
ARISTOCILLIN INJ.....	267	ATIVAN.....	258	BECELAC.....	472
ARISTOGLYL PLUS.....	17	ATROPINE EYE OINT.....	548	BECLATE.....	587
ARJET SPRAY.....	568	AUBRIL.....	316	BECLATE AQUANASE.....	540
ARKACIN.....	259	AUNATIV.....	84	BECLATE FORTE.....	587
ALKAMIN.....	148	AUTRIN.....	486	BECLATE INHALER.....	524
ARKAMIN-H.....	148	AVACAN.....	37	BECLATE NASAL SPRAY.....	540
ARLIDIN TABS/INJ.....	185-83	AVIL 25/50.....	188	BECLATE ROTACAPS.....	387
ARMIX TABS.....	453	AVIL EXPECTORANT.....	188, 532	BECLOTRIM.....	588
AROVIT.....	472	AVIL INJ.....	188	BECNET.....	588
AROVIT DROPS.....	472	AVOMINE.....	208	BECMET-N.....	588
AROVIT INJ.....	472	AVON EXPECTORANT.....	532	BECOPLUS.....	48
ARTHOZOLIN TABS.....	451	AZITHAL.....	272	BECOSULES CAPS.....	472
ASA 50 GR.....	71	AZIMOK.....	272	BECOSULES SYRUP.....	472
ASCABIOL.....	558	AZOLIN.....	277	BEETAL.....	198
ASCORBIC ACID.....	475	AZORAN.....	338	BEETRION.....	478
ASCH.....	327	B-LACT CAP.....	48	BEKAYCIN.....	289
ASMANH.....	523	B-LONG.....	473	BELL HOMATROPINE.....	648
ASMAPAX DEPOT.....	523	B.A.L. INJECTION.....	108	BELLADENAL-IN.....	85
ASMATIDE-BR.....	523	B.G.PROT.....	473	BELLE CREAM.....	582
ASNOTONE.....	523	BACIGYL TABS/SUSP.....	17	BELLINO-ATRIK.....	548
ASOMERIDE.....	480	BACIPEN.....	267	BENADRYL.....	184
ASPASWEET.....	481	BACIPEN INJ.....	268	BENADRYL COUGH FORMULA.....	532
ASPICOT.....	71	BACITRAN DS TABS.....	318	BENADRYL SYRUP.....	184
ASTELONG.....	178	BACITRAN SUSP.....	318	BENALGIS.....	473
ASTELONG SUSP.....	178	BACTIGEN EYE/EAR.....	542	BENDEX.....	339
ASTEM.....	178	DROPS.....	542	BENDEX SUSP.....	339
ASTHAFEN.....	518	BACTOMET TABS/SUSP.....	25	BENDOL TABS/SUSP.....	339
ASTHALIN.....	524	BACTOMET 'C' TABS/.....	25	BENEURON.....	472
ASTHALIN.....	524	SUSP.....	25	BENEURON FORTE.....	472
		BACTRIM DS.....	318	BENICORT INJ.....	388

BENICORT ORAL DROPS...398
 BENICORT TABS...398
 BENICORT-EYE/EAR DROPS 542
 BENSPAR...213
 BENYLET LOZENGES...541
 BENYLIN LOZENGES...541
 BENZO SCAB...358
 BENZOCENOL
 EMULSION...558
 BENZYDOL...210-250
 BENZYDOL-15...250
 BENZYDOL-10...260
 BENZYDOL-5...210
 BEPAMOL SYRUP...223
 BEPAMOL TABS...223
 BEPARINE...581
 BEPARINE CREAM...74
 BEPARINE INJ...74
 BEPLEX FORTE...472
 BEPLEX FORTE ELIXIR...473
 BEPLEX FORTE INJ...473
 BEPLEX INJ...473
 BERIN INJ...473
 BERIN TABS...473
 BERIRAB...98
 BESTOPHEN-I...453
 BESTOPIC...588
 BESTOPLEX LIQUID...473
 BESTOZYME CAPS...48
 BESTOZYME PAED...48
 BESTOZYME SYRUP...48
 BETA 50/100...113
 BETA BIDIURET...113
 BETA-BIDIURET...153
 BETA-NICARDIA...125
 BETA-XIPAMID...157-119
 BETABLOC...119
 BETACARD...113
 BETACORTIL...398
 BETADINE
 MOUTHWASH...541
 BETADINE OINT...552
 BETADINE POWDER...552
 BETADINE SCRUB...537
 BETADINE SOLUTION...537
 BETADINE VAGINAL...515
 BETADINE-AD...537
 BETAGEL...588
 BETALOC...117
 BETALOC DURULES...117
 BETALOC INJ...117
 BETAMAP...268

BETAMAP ORAL...268
 BETAMIL...558-588
 BETAMIL GM...548
 BETANACTEN...113-126
 BETANABE...392
 BETANIF...113,125
 BETANOL...113
 BETASPAN...130
 BETASPORE...282
 BETASPORE DRY SYRUP...282
 BETATOPIC...125,113, 588
 BETATROP...125-113
 BETAVITE FORTE...473
 BETEN...113
 BETHADOXIN-12...473
 BETHADOXIN-12 INJ...473
 BETNELAN...398
 BETNESOL...398
 BETNESOL EYE/EAR...542
 BETNESOL INJ...398
 BETNESOL ORAL
 DROPS...398
 BETNESOL-N NASAL
 DROPS...540
 BETNOR EAR...542
 BETNOVTE SCALP
 APPLICATION...589
 BETNOVATE-N...589
 BETONIN...473
 BETONIN...473
 BEXOL...218
 BEZALIP...106
 BEZALIP RETARD...108
 BI-MOTIC...548
 BICEF...282
 BICLOPEN CAPS...288
 BICLOPEN INJ...288
 BID...274
 BID DRY SYRUP...274
 BIDANZEN...483
 BIDIURET...413-151
 BIDIURET-L...151
 BIDLAX-S...80
 BIDOPAL...213
 BIDURET...155
 BILACTAM DRY SYRUP...268
 BILACTAM FORTE...268
 BILAMIDE...54
 BILIGRAFIN LB. FORTE 50%381
 BIOCIP...268
 BIOCILIN DRY SYRUP...268
 BIOCILIN INJ...268

BIOCIP INFUSION...268
 BIOCIP TABS...268
 BIOCLOX...294
 BIOLCOX INJ...294
 BIODOXI...298
 BIOFLOXIN...304
 BIOGARACIN...298
 BIOMOX CAPS...261
 BIOMOX DRY SYRUP...261
 BIOMOX PEAD DROPS...261
 BIOPARIN...74
 BIOPENCE...273
 BIOPRIL...143
 BIOSPIRIN...77
 BIOTAX...279
 BIOTREXATE...329
 BIOVITAL...484
 BISTREPEN...308
 BIVINAL FORTE WITH
 VIT C...473
 BLEOCIN...334
 BLOCACID...38
 BLOSYN...484
 BLOSYN LIQUID...484
 BLUCEF TABS...282
 BLUCEF-TM...278
 BLUCILLIN INJ...268
 BLUCILLIN TABS...268
 BLUCLOX-250/500 INJ...268
 BLUMOX 250/500...261
 BLUMOX BH...261
 BLUMOX BH DT 250/500...261
 BLUTICIN-P...261
 BOTROPACE...84
 BREN...453
 BREN PX...220-447
 BREN SUSP...453
 BRENED...453
 BRENAX...438-483
 BRICANYL...462
 BRICANYL DURULES...524
 BRICANYL INHALER...524
 BRICANYL SYRUP...524
 BRICAREX EXPECT-
 ORANT...524-532
 BRICAREX TABS...524-532
 BRINALDIX...157-408
 BRINERDIN...157
 BRO-ZEDEX 4/8...532
 BROACIL...268
 BROACIL DRY SYRUP...268

BROACK INJ 269
 BROADICLOX 269
 BROM-INGA 211-484
 BROMOLIN CAPS 261
 BROMOLIN D T 261
 BROMOLIN SYRUP 261
 BROMOXYL FORTE 261
 BRONCOPHYL PLUS 524
 BRONCORDIL ELIXIR 524
 BRONCORDIL PLUS
 SYRUP 524
 BRONCORDIL-P ELIXIR 524
 BRONCORDIL-S TABS 524
 BRONCORDIL-30 TABS 524
 BRONCORDIL-XL 524
 BRONKO PLUS FORTE 524
 BRONKO SYRUP 532
 BRONKOTAB-4 EX 524
 BRONOLAX 532
 BRONTALINE 524
 BROXYNOL 532
 BRUDESIC 453
 BRUFEN 453
 BRUFEN JUNIOR SYRUP 453
 BUCTOCIN 501
 BUMET 408
 BUSACTIL 231
 BUSCALM 231
 BUSCOPAN 65
 BUSCOPAN INJ 65
 BUSON 231
 BUSPIDAC 231
 BUSPIN 231
 BUTA PROXYVON 220-461
 BUTADEx 461
 C P D SOLUTION 72
 C-FLOX EYE DROPS 544
 C-FLOX INJ 269
 C-FLOX TABS 269
 C K P TABS 88
 CADIPHYLATE 525
 CADIPHYLATE ELIXIR 525
 CADISPER C 85, 87
 CALADRYL CREAM 587
 CALADRYL SOTION 587
 CALAPTIN 129
 CALAPTIN 120/240 SR 129
 CALAPTIN INJ 129
 CALBETA 113, 125
 CALBLOC 125
 CALBLOC RETARD 125

CALCIGARD 125
 CALCIGARD RETARD 125
 CALCILUVIN 189
 CALCILUVIN SYRUP 189
 CALCIROL 478
 CALMCOLD SUSP 189
 CALMOCOLD TABS/ CAPS 189
 CALMESE 256
 CALMESE INJ 256
 CALMOD 254
 CALMPOSE 254
 CALMPOSE INJ 254
 CALMPOSE SUSP 254
 CALPRO SYRUP 470
 CALPRO ZE CAPS 468
 CALRON 478
 CAMOQUIN 353
 CAMPICILLIN 269
 CAMPICILLIN DRY
 SYRUP 269
 CAMPICILLIN INJ 269
 CAMRELEASE-TR 254
 CANCRYPT 347
 CANDIBIOTIC 542
 CANDID 555
 CANDID B LOTION 555
 CANDID EAR DROPS 542
 CANDID LOTION 555
 CANDID MOUTH PAINT 541
 CANDID POWDER 555
 CANDID TV SUSP 555
 CANDID V GEL 345-511
 CANDID V6/V3/V1 511
 VANDID-B 555
 CANDIDERMA 555
 CANDINIL-100 511
 CANDISTAT 555
 CANESTEN SOLN 555
 CANESTEN
 VAGINAL 511, 348
 CANESTIN-8/3/1
 VAGINAL 511
 CAPNIF 125
 CAPOTRIL 141
 CAPOTRIL-H 141
 CAPOSTAT INJ 81
 CAPSIDOL 568
 CAPSOVIT CAPS 468
 CAPTOTRIL-H 155
 CARACOL EYE DROPS 550
 CARBAMYL FORTE 337
 CARBAMYL SYRUP 337
 CARBATOL 184
 CARBOMOX 261
 CARDACE 145
 CARDICAP-TR 132
 CARDIF 128
 CARDIF BETA 128
 CARDILATE 130
 CARDIOLONG 126
 CARDIOXIN TABS 159
 CARDIPIN 128
 CARDIPIN RETARD 128
 CARDWELL PLUS 73
 CARDULES 71
 CARDULES PLUS 113
 CARDULES PLUS 10/20 113
 CARDULES RETARD 126
 CARISOMA 437
 CARISOMA COMPOUND 437
 CARMAZ 100/200 194
 CARMICIDE 48
 CARMICIDE ADULT 48
 CARMINOL LIQ 432
 CARMIPHOS SYRUP 465
 CARMIPLES SYRUP 473-478
 CARMIZYME SYRUP 48
 CARMIZYME-A 48
 CARPO-MIOTIC 546
 CATAPRES 158
 CATAPRES OIU 469, 152
 CATAZYME SYRUP 48
 CATENOL 113
 CATILAN 286
 CATOXYMAG-O GEL 15
 CEBION 475
 CEBION DROPS 475
 CEBRAN EYE DROPS 544
 CEBRAN INFUSION 269
 CEBRAN-250/300 269
 CEDROX 274
 CEDROX DRY SYRUP 274
 CEFADUR 274
 CEFADUR DT 264
 CEFADUR SUSP 274
 CEFAMAX 282
 CEFAMAX DRY SYRUP 282
 CEFAMAX PAED DROPS 282
 CEFAMEZIN 278
 CEFATOX-1GM 278
 CEFATOX-250 278

CEFA CAPS 282
 CEFAX SYRUP 282
 CEFAXONE I.M./V 276
 CEFAZID 276
 CEFF 283
 CEFF DRY SYRUP 283
 CEFF KID TABS 283
 CEFF 250 D.S. 283
 CEFZIX 281
 CEFOGEN 280
 CEFSPAN 275
 CEFTX INJ 279
 CEFTROX INJ 276
 CEFTUM 280
 CELESTONE 398
 CELESTONE INJ 399
 CELESTONE PEDIATRIC
 DROPS 398
 CELIN 475
 CELLOGNOST HB₂Ag 97
 CELLUBRIL 60
 CENOLCID GEL 11
 CENOLFERRUM SYRUP 478
 CENOLGIN SYRUP 223-218
 CENOLPLEX 468
 CENOLPRIM 316
 CENOLPRO POWDER 470
 CENOLQUINE SYRUP 354
 CENTRON 508
 CEPHADIL 283
 CEPHALKEM 283
 CEPHALKEM DRY
 SYRUP 283
 CEPHAXIN 283
 CEPHAXIN DRY SYRUP 283
 CEPHAXIN INJ 283
 CEPORAN 285
 CERECETAM 227
 CERELOID 226
 CERVIPRIME 501
 CESPOR DRY SYRUP 283
 CETIRIZ 180
 CETRIZET 180
 CETZINE 180
 CEYZINE SYRUP 180
 CEZIN, CEZIN SYRUP 180
 CEZOLIN 278
 CFX 289
 CHANNEL 122
 CHESTON
 EXPECTORANT 532
 CHLORAMPHENICOL 585

CHLORANTON PLUS
 TABS 532
 CHLORANTON TABS 532
 CHLORANTON-S 532
 CHLORFORMIN 391-395
 CHLOROMET 300 354
 CHLOROMET SYRUP 354
 CHLOROMYCETIN 288
 CHLOROMYCETIN EARDROPS 543
 CHLOROMYCETIN I.M. 288
 CHLOROMYCETIN SUCCINATE
 INJ 288
 CHLOROMYCETIN SUSP 288
 CHORIOMON 483
 CHROMERGEN TABS 504
 CHROMOSTAT INJ 89-89
 CHROMOSTAT TABS 89-89
 CIDAL 316
 CIDOMEX 261
 CIDOMEX DRY SYRUP 261
 CIDORESP 250/500 261
 CIFOMED 289
 CIFRAN 290
 CIFRAN INFUSION 290
 CILAMIN-250 105
 CILFER 12F ORAL 466
 CINARYL DROPS 188
 CINARYL LIQUID 188
 CINARYL TABS 188
 CENEPAR 227
 CINICILLIN 288
 CINICILLIN INJ 289
 CINTIGO 181,202
 CINZAN 161,202
 CINZAN 75MG 202
 CIPAD 280
 CIPIC-250,500 290
 CIPLACTIN 182-485
 CIPLACTIN TABS 182-485
 CIPLAR 120
 CIPLAR-H 120,186
 CIPLIN 316
 CIPLOX 280
 CIPLOX I.V. INFUSION 280
 CIPRIL 143
 CIPROBID 280
 CIPROBID I.V. 280
 CIPROBID INFUSION 280
 CIPROBID TABS 280
 CIPRODAC 280
 CIPRODAC INFUSION 280
 CIPROFLOX 280

CIPROFLOX INFUSION 280
 CIPROFLOXACIN TABS 280
 CIPROGLEN 290
 CIPROLET 290
 CIPROLET INFUSION 280
 CIPROMYCETINE 281
 CIPROQUIN 281
 CIPROSOL 281
 CIPROSOL INFUSION 281
 CIPROVA 281
 CIPROXAN 281
 CIPROXAN I.V. INJ 281
 CISADE 57
 CISADE MPS 57
 CISANORM 57
 CISAPID 57
 CISAPID-MPS 57
 CISAPID-MPS SUSP 57
 CISAPRO TABS/SUSP 57
 CISPIL 57
 CISPIL SUSP 57
 CISPLATIN 331
 CISTOBIL TAB 380
 CISTOBIL TABS 380
 CITAL 411
 CITRALKAL LIQUID 411
 CITRAVITE 475
 CITRAZAN 180
 CIZA 57
 CIZA MPS 57
 CIZA SUSP 57
 CIZA-S 57
 CLACIN 289-294
 CLACIN INJ 294
 CLAFLORAN 278
 CLAMP CAPSULES 289
 CLARIBID 283
 CLAVUNATE 281
 CLENDAL 182
 CLINDAC-A 882
 CLINUM 118
 CLISTIN EXPECTORANT 532
 CLO-KIT 384
 CLOMID 536
 CLOMIDIN 568
 CLOSEQUAD 555-578
 CLOBETAMIL 578
 CLOBETAMIL-H 566
 CLOBETAVATE 578
 CLOBETOL 578
 CLOFERT 486

CLOFODAP ..	362	CONVIRON-TR.....	468	CYCLOGIC EYE DROPS.....	540
CLOFOZINE ..	363	COMPANIDE	391	CYCLOMINOL	34
CLOFRANIL ..	238	COPEN.....	269	CYCLOPAM DROPS.....	34
CLOMIFRIL ..	238	CORARONE	135	CYCLOPAM INJ.....	423, 34
CLOMIN	423	CORBETA.....	120	CYCLOPAM SUSP.....	423, 34
CLOMIN DROPS ..	423	CORBETAINE	163, 120	CYCLOPAM TABS	34, 423
CLOMITROP ..	485	CORBUTYL	229-447	CYCLOPINE	364
CLOMOZIL ..	235	CORDARONE	123	CYCLOSERINE	364
CLOMYCIN CREAM ..	555	CONRDARONE X I.V	125	CYCLOSERINE TABS	162
CLONIL ..	235	CORDARONE-X	125	CYCLOVIR	374
CLONOTRIL	198	COREX.....	533	CYCLOVIR CREAM	360
CLOQUIN	384	CORFLAM	453	CYCLOVIR OINT	374
CLOSTAGEN CREAM	570	CORFLAM PAED SUSP	453	CYCLOXAN INJ	316
CLOTHALTON ..	150, 409, 148	CORGEN EYE/EAR		CYCLOXAN TABS	316
CLOXACILLIN INJ	294	DROPS.....	543	CYDINE	162-465
COBADIX FORTE ..	473	CORICIDIN-F	189-533	CYNOMYCIN-50/100	303
COBEDERM-H	346	CORION 1000 INJ	483	CYP-L	485
CODINOL SYRUP ..	532	CORMELIAN	121	CYPON CAPS	485
COFAMOL SUSP	223	CORT-S	401	CYPON SYRUP	485
COLDIFF	525	CORTIL	389	CYPROWAL	162-465
COLIMEX DROPS ..	34	CORTILATE	555	CYTARABINE KOREA	326
COLIMEX TABS	423, 34	CORTILATE-N	555	CYTOCRISTIN AQUEOUS	323
COLIZOLE	316	CORTO QUINOL	572	CYTRABIN	326
COLLOSOL IODINE ..		CORTOLA-M	544	D-ALER	181
ORAL	405	COSAVIL	533	DABCILOX	269
COLOSPA ..	66	COSCOPIN BR	533	DAYONEX	564
COLSIPAN	572	COSCOPIN LINCTUS ..	533	DAKTACORT GEL	555
COLSIPAN-N	572	COSOME	189-533	DAKTARIN	555
COLSPRIN	448	COSTINI	517	DAKTAXORT GEL	572
COLSPRIN 100/325 ..	448	COSULF-DS	318	DAMOXY DRY SYRUP	261
COMANTRIN	343	COSYP	525	DAMOXY PAED DROPS.....	261
COMBIDOL	216-251	COTARYL	560	DANEMOX FORTE	262
COMBIDOL 1 B ..	216	COVERSYL	144	DANEMOX-KID	262
COMBIDOL-S/10 ..	216	COXIDE INH	370	DANOGEN	486
COMBIFLAM TABS ..	453	COXRID	367	DANOL	362-486
COMBIGESIC	447-481	COZY PLUS	525	DAONIL	382
COMBUNEX ..	385	CREMAFFIN	60	DAPSONE	352
COMBUTOL	385	CREMAFFIN PINK	60	DANAPRIM	357
COMPAIN TABS	218	CREMAFFIN-FS	60	DARDANT	539
COMPEBA	513	CROCIN IBU	453	DASLIN	525
COMPLAMINA	167	CROMAL-S INHALER	518	DBI	386
COMPLAMINA RETARD	167	CROTORAX	555	DBSTD	386
COMPLAMINA TAB ..	167	CROTORAX LOTION	555	DE-NOL	46
COMSAT	318	CROYDOXIN FM	388	DEBORIN SKIN	580
COMYCIN SYRUP	373	CRYSTAPEN V TABS	386	DECA-NEUROPHEN INJ	384
CONCOR	110	CTM CREAM/LOTION	535	DECA DURABOLIN	333-384
CONFLOX	291	CUPRIMINE	195	DECA NEURABOL	384
CONRAY-250/420 INJ	382, 381	CURAMOL	525	DECDAN INJ	400
CONSEC	38	CUT/CUT-N	571	DECDAN N EYE/EAR DROP ..	543
CONTACT-CC	188	CUTISTAT-G	570	DECDAN TABS	400
CONTRAMAL	225	CYBAN 8.5% LOTION	582	DECLOT	74
CONVERTEN	142	CYCLASYN	162	DECON NASA DROPS	540

DEFERON LIQUID	447	DESENT	539-541	DICLOGESIC	449
DEHYDROEMETINE	350	DESFERAL	104	DICLOMAX	449
DELAMIN	262	DETTOLIN	539-541	DICLOMAX GEL	449
DELAMIN DIS TABS	262	DEWORMISIN/150	340	DICLOMAX INJ	449
DELAMIN ORAL SUSP	262	DEXONA EYE/EAR	543	DICLOMOL GEL	449
DELETUS TABS	102	DEXONAM INJ	400	DICLOMOL INJ	449
DELETUS-A	525-533	DEXONA ORAL DROPS	400	DICLOMOL TABS	449
DELETUS-D	102	DEXONA TABS	400	DICLOMOL-SR TABS	449
DELFIN	499	DEXORANGE PLUS CAPS	487	DICLONAC	449
DELPHICOL	54	DEXOSYN-C	544	DICLOTAL D.T	449
DELTACORTIL	403	DEXTRAN 70	429	DI CLOTAL-CR	449
DEMBUTOL 200/400/800	355	DEXTROLYTE-G	429	DICOFEN-50	449
DEMOLOX 50/100	234	DEXTROSE 5% & SODIUM		DICRYSTICIN-3 FORTE	308
DENTAL	539	CHLORIDE 0.2,0.33,0.45,0%.	429	DICYNENE	83
DENTICIDE MOUTH		DEXTROSE INJ 2.5%/5%/10%/20		DICYNENE INJECTION	83
WASH	539		429	DIENOSTROL	487
DENTICURE PAINT	639	DEYPLES CAPS	473	DIFEN	449
DEPENDAL-M	17	DHE	169	DIFEN GEL	449
DEPICOR	126	DI-CALCII-FLEX	478	DIFEN INJ	449
DEPICOR SR	126	DIABEND	393	DIFEN-SR	449
DEPIDOL	251	DIABINESE	391	DIFISAL	449
DEPIDOL DROPS	251	DIACILLIN DRY SYRUP	269	DIGEPLEX	49
DEPIDOL L.A.	251	DIACILLIN PEAD DROPS	269	DIGEPLEX DROPS	49
DEPIN	126	DIACILLIN PLUS	270	DIGOX	159
DEPLIN CAPS	269	DIAFLOX	21	DIGOXIN PAED ELIXIR	159
DEPLIN DROPS	269	DIALOX	21	DIHYDERGOT	169
DEPLIN SYRUP	269	DILMIT	193-547	DILANTIN SUSP	196
DEPNON	240	DIAPHAGE	395	DILCAL	122
DEPO MEDROL	402	DIARLOP	29	DILCAL SR	122
DEPRANIL	239	DIARLOP PLUS	29	DILCARDIA SR 90	123
DEPRANIL PLUS	239	DIARLOP PLUS SUSP	29	DILCONTIN	123
DEPRYL-25/50/100	252	DIASIG INJ	445	DILGARD	123
DEPSOL	239	DIABACT CREAM	552	DILGINA	123
DEPSOL FORTE	239	DIBETA	113,149,155	DILIGAN	205
DEPSOL PLUS	239	DIC INJ	448	DILITISYN	123
DEPSONIL	239	DIC TOP GEL	448	DILOSYN	
DEPSONIL-DZ	239	DIC-FA	448	EXPECTORANT	533
DEPSONIL-DZ FORTE	239	DIC-SR	448	DILOSYN TABS/SYRUP	187
DEPSONIL-PM	239	DICALCII-PLUX	478	DILTOL	123
DEPTEN	126,114	DICARB INGA MITIS	337	DILTIME SR	123
DEQUADIN LOZENGES	541	DICARB INGA TAB	337	DILZEM	123
DEQUADIN PAINT	541	DICARB-50/100/150	338	DILZEM INJ	124
DERIPHYLLIN	525	DICARD	123	DILZEM-SR	124
DERIPHYLLIN RETARD	525	DICARD SR	123	DIMIRIL	184
DERIPHYLLIN SYRUP	525	DICICYCLINE	287	DIMOL	11
DERIPHYLLIN TABS	525	DICIMOX	282	DIMOL SUSP	11
DERMICORT	544	DICIMOX KID	282	DINDEVAN	75
DERMILITE II	538	DICIPRIM	316	DINTE SUSP	17
DERMOQUINOL	550	DICLOFAM TABS/INJ	448	DIONOSIL	382
DEROBIN HC	573	DICLOFEN INJ	448	DIOVOL FORTE DGL	11
DEROMONORM TABS	348	DICLOFEN MR	448	DIOVOL FORTE TABS/	
		DICLOFENAC SOD. INJ	448	SUSP	12

DIPFORM	568	DOXY-24	296	EBEXID	478
DIPGENTA	568	DOXPAL	296	ECANOL VIGINAL	346
DIPHThERIA ANTITOXIN	92	DOXYTERA CAPS	296	ECANOL	346
DIPLENE	568	DRAMAMINE	203	ECLOSPAN	568
DIPOSOL	410	DRAMAMINE LIQUID	203	ECODAX-G	346-568
DIPROMOL	448	DRISTAN NASAL DROPS	540	ECOPROT PLUS	470
DIPROVATE	568	DROGENIL	318	EFCINOL PLUS CREAM	571
DIPROVATE LOTION	568	DROSYN EYE DROPS	550-548	EFCORLIN INJ	401
DIPROVATE RD	568	DROXIBID	274	EFCORLIN NASAL	
DIPROVATE-MF	568	DROXYL	274	DROPS	540
DIPSALIC LOTION	568	DROXYL SUSP	274	EFCORLIN PELLETS	401
DISILOX MPS	12	DTM	124	EKON-D.T.	180
DISILOX MPS SUSP	12	DUALTACK	316	ELCION CR	254
DISOGEL TABS/SUSP	12	DUALTACK SUSP	316	ELCLOX	270
DISPEPTAL	49	DUBLACTIN-MR	438	ELCLOX INJ	270
DISPIRIN C V 100	71	DUBOGEN	484	ELDEPRYL	215
DISPRIN	448	DULCOLAX	60	ELDERM CREAM	555
DISTENIL	12	DUOCLOX	270	ELDERVIT CAPS	473
DISULFIRAM	229	DUOCLOX DRY SYRUP	270	ELDERVIT-12	474
DUOCONTIN-K CONTINUOUS	412	DUOCLOX INJ	270	ELECTRAL	433
DIZEP	254	DUOCLOX-250	270	ELEGELIN	215
DIZEP-P INJ	254	DUODIL	438	ELIWEI	233
DIZIRON	181-202	DUOFLAM	453	ELOCON OINT	558
DIZYTONE	148	DUOFLAM GEL	449	ELSOMA	473
DOBUCIN	180	DUOLUTON-L	490-492-496	ELSORBIN	54
DOBURAN INJ	180	DUPHALAC	60	ELTOCIN	287
DOBUTREX	180	DUPHASTON	488	ELTOCIN LIQUID	298
DOCABOLIN	333-383-385	DURABOLIN	333-385	ELTOSIN SUSP	297
DOFLEX	449	DURACYCLIN	298	ELTROXIN	406
DOLAC	457	DUVADILAN	184-502	ELUGIN	298
DOLONEX	462	DUVADILAN INJ	184-502	ELUCIN SUSP	298
DOLONEX IM	463	DUVADILAN		EMBOKINASE	78
DOLOPAR	218	RETARD	184-503	EMBRU	453
DOLOPAR SYRUP	218	DWANEX	238	EMOICILLIN	270
DOMPERON	203	DYMIC	222-223	EMDILLIN DRY	
DOMPERON DROPS	203	DYNACAL	73	SYRUP	270
DOMSTAL	203	DYNACARD	73	EMDIL	124
DOMSTAL SUSP	204	DYNACREPE	538	EMDOPA	149
DOPAGYT	148	DYNAPAR	448	EMENIL	205
DOPAMET	148	DYNAPAR-EC	448	EMESET	207
DOPAMINE HCL INJ	180	DYNAPLAST	538	EMESET INJ	207
DOPAMYL	296	DYNASPIRIN ENCO TAB	71	EMETIL	218
DOPINGA ING	180	DYSFUR-M	17	EMETIL DS	218-242
DORFEX	453	DYSFUR-M SUSP	17	EMETIL PLUS	218-242
DORMIN-5/10	256	DYSKINON	211	EMFLAM	453
DOXAPRAM	534	DYSKINON INJ	211	EMPLOX-400	304
DOXETAR	237	DYSMEN	34-458	EMDOXYN	207-246
DOXETAR FORTE	237	DYSMEN FORTE	458	EMQUIN	354
DOXORUBUCIN	325	DYSMEN INJ	34	EMQUIN DS-TABS	354
DOXORUBUCIN MEJI	325	E-MYCIN	298	EMTHROCIN	298
DOXT	298	E-MYCIN DRY SYRUP	298	EN-ACE	142
DOXY-1	296	E-PRIN	71-448		

EN-ACE-D 142
 ENAM 142
 ENAMATE 142
 ENAPRIL 142
 ENAPRIL LD 142
 ENAPRIL-HT 142
 ENCARDIL 142
 ENCEPHABOL 228
 ENCEPHABOL INFUSION 228
 ENCEPHABOL SUSP 228
 ENCORATE 200
 ENDAR TABS/SUSP 17,18
 ENDOPACE 204
 ENDOPACE SUSP 204
 ENITIS 49
 ENDOXAN ASTA 319
 ENDOXAN-ASTA INJ 319
 ENDRINE NASAL DROPS 540
 ENERJAL 470
 ENGERIX-B 97
 ENIOAZOL 21
 ENOX EYE/EAR DROPS 544
 ENPRI 140
 ENSAMYCIN 312-344
 ENSAMYCIN CREAM 553
 ENTAMIZILE 18
 ENTERO QUINOL 362,25
 ENTERODIX 25
 ENTERODIX SUSP 25
 ENTEROMYCETIN 286
 ENTEROMYCETIN INJ 286
 ENTEROMYCETIN QTC SOLN 543
 ENTEROMYCETIN
 SYRUP 286
 ENTEROMYCETINE EYE
 544
 ENTEROZYME TABS/
 SUSP 25
 ENTROPURAN-M CAPS 26
 ENTROLATE TABS 21
 ENVAS TABS 142
 ENZAR FORTE 40
 ENZIDE 142
 ENZYSTAL 54
 EPHEDRESX 533
 EPHEDREX-M 533
 EPIDOSIN 68-444-687
 EPIDOSIN INJ 88
 EPILEX 200
 EPILEX ORAL
 SOLUTION 200
 EPITOL 194

EPITOL SYRUP 194
 EPICELIN 281
 EPSOLIN 188
 EPSOLIN INJ 188
 EPTOIN 187
 EQUAGESIC 448
 EQUATE 253,83
 EQUIREX 253
 ERBAZIDE 367
 ERGACAP CAPS 506,503
 ERGOPHEN 169
 ERGOTAB 506
 ERGOTAB FORTE 506
 ERO B SYRUP 298
 ERO-B 250/500 298
 EROATE SUSP 298
 EROATE 250/500 298
 ERYACNE 553
 ERYBEST-250 298
 ERYBEST-P 298
 ERYC 298
 ERYC 50 298
 ERYC DRY SYRUP 298
 ERYMER SUSP 298
 ERYMER TAB 298
 ERYNATE 298
 ERYSAFE 298
 ERYSTER 298
 ERYTAL-TR 166
 ERYTHROCIN DROPS 298
 ERYTHROCIN DRY
 SYRUP 298
 ERYTHROCIN
 GRANULES 298
 ESGIPYRIN 462
 ESGIPYRIN TABS 462
 ESIDREX 413
 ESKAMEL OINT 550
 ESKOLD 188-533
 ESKOLD EXPECTORANT 188
 ESORID 58
 ESPERAL 220
 ESSENTIALE 34
 ESTRACYT 332
 ESTRADERM 25,50,100 488
 ESTRADURIN 334
 ET-401100 365
 ETHAMSYL 34
 ETHOCID 368
 ETHNORUB 568
 ETHOSUXIMIDE 187
 ETO-SALMETOL 525

ETOSID 327
 ETOSID CAPS 327
 EUCARD 114
 EUDYNA 562
 EUGLUCON 392
 EUMOSONE 570
 EUMOSONE-G 570
 EUMOSONE-M 570
 EVABOLIN 333-365
 EVACEF INJ 279
 EVACUOL 80
 EVALON 488
 EVALON CREAM 488
 EVATOCIN INJ 505
 EYION 476
 EXEL 570
 EXITAL POWDER 50
 EXPENT 343
 EXPERGESIC 222
 FABIZOL 21
 FACICAP 467
 FACICAP CAPS 467
 FACID 38
 FACID AC 38
 FACID INJ 38
 FACTOARD 283
 FACTAGARD DRY
 SYRUP 283
 FADINE 38
 FAIRGENOL 553
 FAIRGENOL PLAIN 537
 FAKTU 32
 FAL 650 223
 FALBITONE PLUS CAPS 467
 FALBITONE PLUS
 TONIC 467
 FALCLOX CAPSULES 270
 FALMADOL 223
 FALMADOL SUSP 223
 FALMASPAS 34
 FALMENDAL TABS 25
 FALMOGYL TABS/SUSP 18
 FALMOX 262
 FALMOX DISTAB 262
 FALMOX DRY SYRUP 262
 FALPLEX CAPS 473
 FALPLEX S 'RUP 473
 FALTENOL TABS 114
 FALTIDIN 38
 FAMCIN 370
 FAMCIN-H 370
 FAMOCID 37

FAMOFAST 39
 FAMONITE 39
 FAMOPRIL 20/40 39
 FAMOTIN 39
 FAMOTIN 20 39
 FAMOTIN SUSP 39
 FAMOWAL 39
 FAMTAC 39
 FARIZYM FORTE 54
 FARLUTAL 405
 FASIGYN-500/DS 21
 FAZEPINE TABS 194
 FEBRAFEM 453
 FEBREX 224
 FEBREX 250 SUSP 224
 FEBREX PLUS 189-224
 FEBREX PLUS SYRUP 189
 FEBREX SUSP 224
 FEBRINIL INJ 224
 FECONTIN-2 467
 FEFOL Z SPANSULE 467
 FELOGARD-ER 147
 FENACON 450
 FENACON GEL 450
 FENAPLUS 450
 FENCETA 453
 FENCETA SUSP 453
 FENLONG 400 453
 FENOX NASAL DROPS 540
 FENSAIDE 450
 FENSAIDE GEL 450
 FENSAIDE INJ 450
 FERBON KOREA 376
 FERINOVA CAPS 467
 FERINOVA DROPS 467
 FERINOVA SYRUP 467
 FEROTABS 25 405
 FERRADOL 467
 FERROSTAN LONGULES 467
 FERROUS FUMARATE TABS IF 467
 FERRUM FOL 467
 FERTO TAB 485
 FENTOMID 485
 PESOFOR-Z SPANSULE 467
 PESOVIT ELIXIR 467
 PESOVIT SPANSULE 467
 FESTAL 50
 FETUGARD 482
 FEVASTIN SUSP 224
 FILIBON 479
 FINTAL EYE DROPS 550

FINTAL INHALER 519
 FINTAL NASAL SPRAY 540
 FLASOLIN-40 481
 FLAGYL 18, 513
 FLAGYL I.V. INJ 18
 FLAGYL SUSP 18
 FLAGYL-DP 18
 FLAGYL-F TABS/SUSP 18
 FLAMAR CREAM 400, 439
 FLAMAR-P 439
 FLAMAREST TABS 453
 FLAMARIN TABS 450
 FLAMFORT 453
 FLANZEN 453
 FLAVOXATE 424
 FLEMICLOX 262
 FLEMIPEN 262
 FLEMIPEN DROPS 262
 FLEMIPEN DRY SYRUP 262
 FLEMOXIN 262
 FLEXINOL 440
 FLEXITAL 166
 FLEXITAL INJ FOR INFUSION 166
 FLEXON 453
 FLOCY 201
 FLOCY INFUSION 201
 FLOWPENT 186
 FLOWPENT INFUSION 186
 FLOKADAY 302
 FLOXAQUIN-C 291
 FLOXETIN 238
 FLOXIGARD 543-544
 FLOXIP 201
 FLUANXOL 243
 FLUANXOL DEPOT INJ 243
 FLUCOLD 181
 FLUCORT 571
 FLUCORT LOTION 571
 FLUDAC 238
 FLUDECAN INJ 244
 FLUFAN 238
 FLUGEN 238
 FLUMAP 245
 FLUNARIN 170
 FLUNIL 238
 FLUOTHANE 174
 FLUTHAN HALO THAN 174
 FLUOURACIL INJ 328
 FLUPAR 238
 FLURACIL 328
 FLURACK ORAL 328

FLURID 181
 FLUROFEN 452
 FLUZON 347
 FLUZON INFUSION 347
 FOETABORT 502
 FORACET 222-224
 FORCAN 541, 547-552
 FORCAN INFUSION 347
 FORISTAL 184
 FORISTAL LONTABS 184
 FORTAGEBIC 222
 FORTENAL 25
 FORTEZOL MF 18
 FORTEZOL MF SUSP 18
 FORTIFIED PROCAINE
 PENICILLIN INJ 308
 FORTRIM-A 310
 FORTUM 276
 FORTWIN TABS 222
 FOXIL 302
 FRAMYCETIN TULLE 553
 FRENAC 450
 FROBEN 452
 FRUCTODEX 430
 FRUCTOSE NaCl INJ 430
 FRUMIL 412, 153
 FRUSELAC 152, 412-415
 FRUSEMIDE 154
 FRUSEMIDE INJ 154
 FRUSENEX 412, 154
 FUCIBET CREAM 553
 FUCIDIN CREAM 553
 FUCIDIN OINT 553
 FUDONE 39
 FUDONE/FUDONE-M 25
 FU INJ 328
 FULTERM 402
 FUMEDIL 25
 FUMIN 555
 FUNAZOLE 360
 FUNGAL TABS 348
 FUNGICIDE 350
 FUNGITOP GEL 358
 FUNGIVIN 345
 FUNGIZONE I.V. 345
 FURADANTIN 420
 FURADANTIN SUSP 420
 FURAMIDE 360
 FURANOL-M SUSP 28
 FURATOR 328
 FUROXIL 280

FUROXONE 28
FUROXONE SUSP. 28
FYBOGEL 80
G-MYCIN EYE/EAR DROPS 343
G-MYCIN INJ. 299
G-MYCIN INJ PAED 299
GAB 538
GAMMALIN H INJ. 95
GAMMALIN INJ. 95
GAMMIMUNE-N 95
GARAMYCIN 299
GARAMYCIN EYE OINT. 544
GARAMYCIN EYE/EAR DROPS 543
GARDENAL 198-257
GAROLIN 197-198
GASTABID-1/2 65,68
GASTRACTIV 204
GASTRIUM 204
GAVISCON 9
GEFRICH 470
GELORA 539, 541
GENMAC 299
GENOPHANE 151
GENOZYME 50
GENTALENE 558
GENTALENE C CREAM 568
GENTAMICIN U. 300
GENTARIL 300
GENTASPORIN 300
GENTASWIFT 300
GENTICYN EYE/EAR 543
GENTICYN INJ. 300
GENTOMIN-D EYE/EAR DROPS 544
GENTOPIC 568
GENTYN 300
GERFREE EYE/EAR DROPS 543
GEROCIN BM E/E DROPS 543
GEROCIN E/E DROPS 543
GEROCIN INJ. 300
GESICAIN 2% JELLY 172
GESICAIN 2% SOLN WITH ADRENALINE 172
GESICAIN 4% TOPICAL 172
GESICAIN OINT. 172, 567
GESICAIN SOLUTION 172
GESICARD 136
GETOSK PLUS SUSP. 12
GNADOX 398
GNSEC 484

GLASEPT 484
GLAUCARE 547
GLAXO SALBUTAMOL INHALER 525
GLENSENG TONIC 484
GLENSENG-500 484
GLENTONA SYRUP 470
GLIBETIC 393
GLIDE 394
GLIZID 393
GLOBAC LIQUID 467
GLOBAC-Z 467
GLOBUNAL 10% INJ & 16.5 95
GLUCAGON 394
GLUCOLIP 394
GLUCOMOL 547
GLUCORED 392
GLUCOTROL 394
GLUFORMIN 395
GLYCI PHAGE 395
GLYCOMET 395
GLYNASE 394
GOCOX 370
GOCOX COMP 367-370
GOLDAR 435
GONABLOK 486
GONADOTROPHIN LH 483
GONOTROP-C 483
GONTROP-M 491
GRAMOGYL 26
GRAMOGYL SUSP 26
GRAMONEG 419, 28
GRAMONEG SUSP 419, 28
GRAMONEG SYRUP 19, 26
GRAVOL 203
GRD 470
GRILINCTUS 525
GRILINCTUS-BM 525
GRILINCTUS-BM SYRUP 525
GRILINCTUS-BM TABS 525
GRILINCTUS-BM TABS/PAEDIATRIC 525
GRISACTIN FORTE 348
GRISOFIL 348
GRISORAL 348
GRISOVIN-FP 348
GROMANE 185, 482
GROMIN 479
GROTHIC 333-388
GUGLIP 189

GUTENFLOX 282
GUTPRO 88
GUTPRO SUSP. 88
GYNAE C V P 88
GYNO-TERAZOL VAGINAL CREAM 510
GYNODAKTARIN 514, 350
GYNODAKTARM OVULE 514, 350
GYNOSAN 510
GYNOSTATUM 511
GYNOTOCIN 505
HAEM UP 467
HAEM UP GEMS 467
HAEMACCEL 431
HAEMATINGA CAPS 467
HAEMATINGA LIQUID 467
HAIREX 185, 582
HALOPLUS 251
HALORAN 50 450
HALORAN GEL 450
HALORID 251
HALTAX 279
HAMYCIN 348-812
HAMYCIN OVULES 513, 349
HANSEPRAN 352
HEALEX SPRAY 538
HEALON 550, 593
HEBALD 185, 582
HELMACID WITH SENNA 343
HELMAZAN 338
HELMINTOL 341
HELMINTOL SUSP 341
HEMATRINE 467
HEMEX 468
HEMFER 468
HEMOCID INJ. 81
HEMOLOK 88
HEMSYNERAL-TD 468
HEPALEX 376
HEPASULES 468
HEPASULFOL 55
HEPASULFOL AA 181-59
HEPATOGLOBIN 488
HEPP FORTE 488
HERMIN 431
HERPERAX OINT. 374, 580
HERPERAX TABS 374
HERPEX CREAM 549
HERPEX OPHTHALMIC 549
HEYHATAN 338

HETRAZAN SYRUP	338	HYPROSOL	649	IMOL	434
HEXIDOL	218-251	HYPROSOL FORTE	649	IMOSEC-F	26
HEXIDOL FORTE	218-251	HYSTALIN	625	IMOSEC-S	26
HEXIDOL PLUS	216-251	HYTHALTON	408-152	IMOX	283
HEXINAL	216	HYTROL	142	IMOX-CLO	283
HICON	503	HZAX TABS	178	IMPRAMINE	238
HICON INJ	503	Hb PLUB	487	IMPRAMINE-75	238
HIPRES	114-155	Hb RICH	467	IMPREL	239
HIPRES-D	114-155	IBEROL	488	IMURAN	338
HIPRIL	1	IBEROL-500 LIQUID	488	INABUTOL FORTE	345
HIRUDOID	583	IBODIK SUSP	454	INAC 50	450
HISNOFIL	180	IBU-PR	454	INAC GEL	450
HISTAC	39	IBU-PROXYVON	447-454	INAC INJ	450
HISTAC INJ	39	IBUACT	454	INAC TR	450
HISTAFEN	180	IBUCLIN	454	INCIDAL TABS	187
HISTAGLOBULIN	94	IBUCON 200/400/800	454	INCREMENTIN SYRUP	468
HISTALONG	178	IBUCON PLUS KID Q3P TABS	454	INDERAL	120
HISTALONG JUNIOR	178	IBUFLAMAR 200/400	454	INDOCAP	454
HISTEESE	178	IBUFLAMAR MX	454	INDOFLAM	454
HISTEESE SUSP	178	IBUGESIC	454	INDOVUNAL	481
HISTERF	180	IBUGESIC SUSP	454	INFARTIN 80	7
HISTERNA TABS/ SUSP	180-181	IBUGESIC-M	410	INFLAPEN CAPS	454
HIZTIGO	180	IBUGIN	454	INFLAVAN 10/20	483
HOLOXAN		IBUPLUS	454	INGAGEN M TABS	504
UROMITEXAN	320	IBURIN	454	INGAGEN-M	504
HONVAN	334	IDIBEND	341	INRAS	143
HONVAN INJ	334	IDICIN	456	INSEPTIN	26
HORMOPIRIN	224	IDICIN-P	456	INSULATARD	380
HOSTACORTIN-H	403	IDIFULVIN	348	INSULIN	388
HOSTACYCLINE	287	IDILIN	287	INSULIN ISOPHANE (NPH)	388
HPC DEPOT	492	IDIMIX	263	INSULIN PROTAMINE	388
HUMAN ACTRAPHAN	387	IDIMOX DRY SYRUP	263	ZINC	388
HUMAN ACTRAPID	388	IDIZONE	400	INSULIN ZINC (LENTE)	388
HUMAN UNSULATARD	388	IFICIPRO LV	281	INTRA PERITONEAL DIALYSIS	
HUMAN MIXTARD	388	IFIPEF	306	LACTATE	417
HUMAN MONOTARD	388	IFIPEF INFUSION	306	INTRAVAL SODIUM	177
HUMAN NORDISULIN	388	IFIRAL	510	INVORIL	142
HUMEGON	491	IFIRAL NASAL DROPS	540	INOZIDE	142
HUMILIN	270	HD 20/40	132	IOBET	547
HUMILIN DRY SYRUP	270	ILDAMIN INJ	134	IOPAC	358
HYCIBEX CAPS	473	ILDAMIN TABS	132	IOQUIN	354
HYCIBEX SYRUP	473	ILETIN-L	380	IOTIM	547
HYCIMOX	282	ILETIN-H	380	IPCACIN KID TABS	387
HYDERGINE	228	ILETIN-R	380	IPCAZIDE LIQUID	387
HYDERGINE INJ	228	INDUR	132	IPCAZIDE TABS	387
HYDROCORTISONE INJ	481	INERGEN INJ	504	IPROSPAN-2	488
HYKATAPASE	43	INFERON	488	ISMO-10/20/40	132
HYKIL	262	INDOL VAGINAL	348-511	ISO-RHPHARMED	378
HYKIL DRY SYRUP	263	INDOL VAGINAL TABS	354	ISOCOR-20	132
HYKIL PLUS CAPS	263	INPAM	239	ISOGEL GRANULES	81
HYPAGE	142	MODIUM	28	ISKIN FORTE	573
		MODIUM LIQUID	28		

ISOKIN TAB 120, 367
 ISOKIN-TF 367
 ISOMACK RETARD 132
 ISONEX 367
 ISONIAZID TABS 366
 ISORDIL 132
 ISORIFAM 367-370
 ISOVAC 61
 ITASPOR 351
 ITEOL-3 537, 553
 IVEMETRO INFUSION 18
 IVIMICIN 259
 J.P. TONE 468
 JAGRIL 461
 JECTALVIL 468
 JECTOFR 468
 JECTOFR PLUS 468
 JENSHENG 484
 JETOMISOL-F 344
 JOHNSON PLAST 538
 JONAC GEL 450
 JONAC INJ 450
 JONAC PLUS TABS 460
 JONAC TABS 460
 JULAX 81
 JUMEX 215
 K-S HAIR TINCTURE 551
 K-GARD 431
 KALPASTIC 86
 KANAMOL 218
 KANAMYCIN 300
 KANCIN 300
 KANORMAL 61
 KANPLEX FORTE TABS 473
 KANPLEX SYRUP 473
 KANSULF 300
 KARPIN LOTION 559
 KARVOL 540
 KARVOL PLUS 541
 KAY-CIEL 432
 KAYPEN 308
 KEFLOR GRANULES 273
 KEFLOR POWDER 273
 KEFLOXIN 274
 KEFLOXIN POWDER 274
 KELAC 457
 KEMADRIN 214
 KEMICETINE 541
 KEMICETINE CAPS 286

KEMICETINE INJ 286
 KEMICETINE OTIC 543
 SOLN 543
 KEMICETINE SUSP 286
 KEMOPLAT 331
 KENACOMB 573
 KENACORT 404-573
 KENACORT INJ 404
 KENALFIN TABS 457
 KENALOG-S SKIN 573
 KENTROQUIN 18
 KERALIN 580
 KERUTIN-C 87
 KETALAR 178
 KETAMAX 178
 KETANOV 457
 KETASMA 518
 KETMIN 178
 KETONIC TABS 457
 KETOTIF 518
 KETOVENT 518
 KETOWIN 457
 KETOZOLE TABS 350
 KEYLYTE 432
 KILPANE CREAM 439, 588
 KINETAL-400 186
 KINETAL-INJ 186
 KINETO 484
 KINETONE 478
 KLARCID 9
 KLASINOMYCIN 324
 KLOX 294
 KLOX DRY SYRUP 294
 KLOX INJ 294
 KOMBINA SUSP 318
 LABORON INJ 505
 LACALM FORTE 218-248
 LACALM PLUS 218-248
 LACTISYN 50
 LACTOBACIL 50
 LACTONE 418
 LALITHIUM 244
 LALITHIUM 244
 LAMKLOX 263
 LAMOXY 263
 LAMOXY DIS. TAB 263
 LAMOXY DRY SYRUP 263
 LAMOXY-BX 263
 LANOXIN INJ 158
 LANOXIN/DIGOXIN 158

LANPRO 42
 LANSOD 42
 LARAP-2/4 246
 LARENASE 251
 LARIAGO TABS/SUSP 354
 LARIDOX 367-388
 LARPOSE 256
 LASILACTONE 50/100 412
 LASIRIDE 412
 LASIX 150, 154, 412
 LASIX 250 INJ 412
 LASIX HIGH DOSE 184
 LASIX HIGH DOSE INJ 184
 LASTET CAPS/INJ 327
 LASTUSS-LA 533
 LATILIN 25/50/75 233
 LAVERAN 358
 LAVIEST 473
 LAXICON 81
 LAXICON ENEMA 81
 LEDERCORT 404-573
 LEDERFLAM PLUS 484
 LEDERMYCIN 287
 LEDERMYCIN OINT 553
 LENAGESIC 458
 LENTARD 389
 LEPROMINE CAPS 352
 LERIN 504
 LERIN INJ 504
 LEUCOVORIN 378
 LEUKERAN 326
 LEVODOPA AND CARBIDOPA 213
 LEVOPA 213
 LIBOTRYP 233
 LIBRIUM 253
 LICAB 244
 LICAB XL 246
 LIGNOCAINE HCL INJ 172
 LIGNOCAINE WITH 173
 ADRENALINE 173
 LIMBICON 233-253
 LIMBICON FORTE 233
 LIMCEE 475
 LINCOCIN 301
 LINCOCIN CAPS 301
 LINCOCIN 333/500 288
 LINVAS 143
 LIRESAL 437

LIPABOL 118
 LIPIGEN 108
 LIPZYL 188
 LIPRI 144
 LISICARD 144
 LISINACE 144
 LISIN 144
 LISORIL 144
 LISTRIL 144
 LITBON 245
 LITHOCAP 245
 LITHOSUN 245
 LITHOSUN-SR 345
 LIVOGEN 470
 LIVOGEN CAPS 468
 LIVOLUK 82
 LIVOTONE LIQUID 55
 LOBAK 438-454
 LOBATE-CM 570
 LOCULA 345
 LODOSPRIN 71
 LOGASCID 12
 LOGASCID FORTE 13
 LOGASCID SUSP 12
 LOMAC 43
 LOMADAY 302
 LOMEF-400 302
 LOMEWON 302
 LOMFLOX 302
 LOMITAS 302
 LOMODEX 428
 LOMODEX-40 90
 LOMODEX-70 90
 LOMOFEN 28
 LOMOTIL 28
 LONAZEP 186
 LONGACILLIN 308
 LONOL 114
 LOPID 108
 LOPRESOR 117
 LOPRESOR INJ 117
 LOPRIN-75 72
 LORESS 43
 LORFAST 188
 LORI INJ 254
 LORIDINE 188
 LORVAS 158
 LOSTEROL 108
 LOTRIDERM 556
 LOVADAC 108
 LOX 2% INJ 173

LOXAPAC 10/25 240
 LOXAPAC-G LIQUID 240
 LOZAPIN 238
 LPL 144
 LUNIGARD 18
 LUNIGARD FORTE 18
 LUMINAL 198-257
 LUMINALETES 198-258
 LUPILIN 270
 LUPILIN INJ 270
 LUPIZYME 50
 LUPIZYME CAPS 50
 LYBUTOL 365
 LYDIN 38
 LYDOX 298
 LYDROXIL 274
 LYDROXIL SYRUP 274
 LYNAMIDE 389
 LYNDIAL 480
 LYNDIOL IMG 493
 LYNORAL 332-480
 LYNX CAPS 301
 LYNX INJ 301
 LYNX SYRUP 301
 LYPRO 281
 LYRAMYCIN 308
 LYRAMYCIN EYE/EAR 543
 LYSIRON 488
 LYZOLIN 278
 M-VAC 94
 MACALVIT INJ 477
 MACSORALEN 584
 MACSORALEN LOTION 584
 MADRIBON 315
 MAFEXIN CAPS 283
 MAFEXIN DRY SYRUP 283
 MAGEL-MPS 13
 MAGNADYN 465
 MAGNINE 8
 MAHAQUIN 302
 MAINTANE 483
 MAINTANE INJ 492
 MALANDIN 355
 MALIDENS 224
 MALOCIDE 358
 MAMOFEN 335
 MAMOT 565
 MANADERM OINT 565
 MANDELAMINE 418
 MANNITOL 5%10%20% 413
 MARZINE 202
 MASOIL 124

MASSE CREAM 881
 MATA-PX 250/500 283
 MATOCOL MPS 205
 MAYTUMIT 318
 MAGRIN SS 318
 MAXERON 205
 MAXERON MPS 205
 MAXIGAN 428
 MAXIGAN INJ 428
 MAXILASE FOTRE 484
 MAXIMOX 263
 MAXREL 450
 MAZETOL 184
 MEASLES RUBELLA MUMPS
 VACCINE 87
 MEASLES VACCINE 98
 MEBAGEN TABS 341
 MEBAZOLE 341
 MEBEX 341
 MEBRYL 185
 MECOLIN 55
 MEDICREME 588
 MEDITHANE 31
 MEFTAL 458
 MEFTAL SPAS 423
 MEGAPEN 270
 MEGAPEN INJ 270
 MEGATIL 242
 MEGATIL INJ 242
 MEGATUSS-P 533
 MEGYL-F 19
 MELALITE 584
 MELANOCYL 583
 MELANOCYL OINT 583
 MELANOCYL SOLN 583
 MELDOPA 148
 MELLERETS 248
 MELLERIL 248
 MELOZINE 248
 MELUBRIN 554
 MENABOL 386
 MENCEVAX 89
 MENDAZOLE 341
 MENINGO COCCAL VACCIE
 A+C 98-99
 MEPHENTINE 170
 MEPHENTINE INJ 170
 MEPRATE 485
 MERGOX INJ 504
 MERIEUX INACTIVAATED
 RABIES VACCINE (HDC) 98
 MERIFLOX 304

MERIGENTA CREAM 553
 MERIGANTA EYE/EAR 543
 MERIGENTA INJ 300
 MERIZYME DROPS 465-50
 MERIZYME ELIXIR 51
 MERIZYME TABS 51
 MESACOL 89
 MESACOLENEMA 89
 MESNA 321
 METABOL 333-385
 METACLOX 263
 METADEC 384
 METAMOL 224
 METAMOL SYRUP 224
 METAMOX 263
 METAMOX DRY SYRUP 263
 METAMYCIN EYE
 DROPS 545
 METHAZIL 543
 METHERGIN INJ 57-504
 METHERGIN TABS 504
 METHERONE 504
 METHERONE INJ 504
 METHYLERGOMETRINE INJ 504
 METMIN 395
 METOCARD 117
 METOCONTIN 208
 METOLAR 208-117
 METOLAR-H 117
 METOPAR 224
 METOPAR SUSP. 208-224
 METOPAR SYRUP 208, 224
 METOZIDE 117-155
 METRINA PLUS TABS 19
 METRINA TABS 19
 METROGYL 19-513
 METROGYL COMP. 19
 METROGYL GEL 552
 METROGYL SUSP. 19
 METROGYL-F TABS/SUSP. 19
 METRON 19
 METRON FORTE 19
 METRON SUSP. 19
 METRON-DF 19
 MEXITIL 137
 MEXITIL INJ 137
 MEXOGL-F SUSP. 19
 MICOGEL 556
 MICOLON 514, 556
 MICOPTIC 345
 MICRODINE OINT/SOLN. 553

MICRODINE SOLUTION 557
 MICRODOX 298
 MICROFLOX 292
 MICROSHIELD 536
 MICROSHIELD PVP-B 537
 MIDARINE 442
 MIGRANIL 169
 MIGRATAN 169
 MIKACIN 259
 MIKAJECT 259
 MILLICORTEN-
 VIOFORM 556-571
 MILLICORTENOL 571
 MINAPHILLIN 525
 MINICAM D.T. 463
 MINICAM GEL 463
 MINILIN 270
 MINILIN SYRUP 270
 MINIPRIL 142
 MINOXIL 270
 MINOXIL DRY SYRUP 263
 MINTOP 165, 562
 MITOMYCIN-C KYOWA 326
 MITS LINCTUS CODEINAE CO. 633
 MITTAVIN 479
 MIXOGEN 490-497
 MIXOGEN INJ 495
 MIXOPEN 270
 MIZOLE 388-389
 MIZOLE CREAM 556
 MIZOLE-F CREAM 556
 MOBINAK 450
 MOCLOX 263
 MOCLOX DRY SYRUP 263
 MODACT-20 463
 MODIPIN 146
 MODUS 2.5/10 495
 MOISOL EYE DROPS 549
 MOLIN 224
 MOLZYME 51
 MONICOR 132
 MONIT 20 132
 MONO SORBITRATE 133
 MONOCEF I.V. 276
 MONOCONTIN 133
 MONOSULIN 388
 MONOTRATE 133
 MONOTRATE OD 133
 MORCONTIN 10/30/60/100 221

MORPHINE INJ 221
 MOTILAX 59
 MOTINORM 204
 MOTINORM SYRUP 204
 MOVON-20 483
 MOVONAC TAB/CREAM/
 SR 480
 MOX 263
 MOX DRY SYRUP 263
 MOX INJECTION 263
 MOXILUM 263
 MOXILUM DRY SYRUP 264
 MOXILUM PAED DROPS 264
 MOXYCARB 264
 MOXYDIL 264
 MOXYDIL INJ 264
 MOXYDIL SYRUP 264
 MOZEP 248
 MTX KOREA 329
 MTX TABS KOREA 329
 MUCAINE 15
 MUCODYNE 533
 MUCODYNE SYRUP 533
 MUCORIS-E 541
 MULTIFUNGIN 556
 MULTIFUNGIN H 556
 MULTIFUNGIN POWDER 556
 MULTIGAIN 165, 562
 MULTIVITE FM CAPS. 479
 MUSLAX CREAM 545
 MUSTINE HCL 322
 MYAMBUTOL 395
 MYCIDEX INJ 400
 MYCIDEX TABS 400
 MYCOCID 556
 MYCOCIN 264
 MYCOCIN DRY SYRUP 264
 MYCOCIN FORTE CAPSULES 264
 MYCODERM 556
 MYCONEX-600/800 365
 MYCOREST 347-512
 MYCOSTATIN 351
 MYCOSTATIN OINT. 556
 MYCOSTATIN VAGINAL 515
 MYOBID 386
 MYOBOLIN 333-384
 MYOGARD 128
 MYOGARD-LA 126
 MYOLAXIN OINT 269
 MYONIT 133

MYOSPAS 439
 MYOSTIGMIN INJ 444
 MYOVIN 133
 MYSOLINE 198
 NAC-60 450
 NAC-PLUS 128
 NACLO INJ 450
 NACLO-TR 450
 NACPOT 461
 NACTEN 128
 NACTIN 128
 NADIX ACUTAB 419-20
 NALIDYS 26
 NALIDYS SUSP 26
 NAPROSYN 468
 NARCOTAN 377
 NASIVON 541
 NATAMOX 264
 NATAMOX PAED DROPS 264
 NATCARDINE 130
 NATUROLAX 61
 NATUROLAX FORTE 61
 NATUROLAX SF 61
 NAUSIDOME 204
 NAUSIDOME SUSP 204
 NAUSIFAR-MPS 208
 NAZALIN NASAL DROPS 541
 NEBASULF 513
 NEBASULF OINT 553
 NEBASULF SPRINKLING POWDER 553
 NEGADIX 418
 NEGADIX KID TABS 26
 NEGADIX M SUSP 26
 NEGADIX-M 20
 NEO-FERRUM INFANTS 468
 NEO-HEPATAX 478
 NEO-MERCAZOLE 406
 NEO-OCTINUM 425
 NEO-OCTINUM DROPS 425
 NEO-OCTINUM INJ 425
 NEOCALM 248
 NEOCALM FORTE 218-242
 NEOCALM PLUS 218-248
 NEOCEF 283
 NEOCURON INJ 441
 NEOFERIN TABS 224
 NEOGADINE ELIXIR 478
 NEOMESMAR TABS 254
 NEOMIN 338
 NEOMOL INJ 224

NEONOX 200 364
 NEOPAM 378
 NEOPEPTINE CAP 61
 NEOPEPTINE DROPS 61
 NEOPRIM SUSP 318
 NEOREX EXPT 585
 NEOSORALEN 585
 NEOSORALEN FORTE 585
 NEOSORALEN LOTION 585
 NEOSPORIN EYE DROPS 549
 NEOSPORIN H EAR DROPS 543
 NEOSPORIN H OINT 553
 NEOTOMIC ENEMA 61
 NEOTREXATE 328-330
 NEOTREXATE TABS 329
 NEPHLEX 125/250/500 374
 NEPHROGESIC 420-421
 NEPRESOL 188
 NEURABOL CAPS 386
 NEURABOL INJ 333, 386
 NEURAP 248
 NEUROBION 473
 NEUROBION INJ 473
 NEURONTIN 198
 NEUROPHEN 438
 NEUROPHEN CREAM 588
 NEUROPHEN FORTE 454
 NEUROPHEN P SUSP 454
 NEUROSPAS 423-34
 NEUROSPAS DROPS 34, 423
 NEUROSPAS FORTE 423
 NEUROSPAS INJ 423
 NEUROXIN-12 INJ 474
 NEWACE 140
 NICARDIA 127
 NICARDIA-CD 127
 NICLOZAN 342
 NIDAGEST 463
 NIDAGYL 21
 NIFEDINE 127
 NIFELAT 127
 NIFELAT RETARD TABS 127
 NIFETEX TR 127
 NIFETOLOL CAPS 127
 NIFUGAL B OINT 542
 NIFUGAL OINT 558
 NILCARIS-80/150 344
 NILOL 127, 114
 NILSEC 43
 NIMESIL 480

NIMIND 480
 NIMODIP 146
 NIMOTIDE 146
 NIMULID 480
 NINDRAL 294
 NIPAM 238
 NITAVAN/5/10 238
 NITENOL 127
 NITRAVET 258
 NITRAVET KID TABS 258
 NITREPIN 128
 NITROCONTIN 131
 NITROCURE 131
 NITRODERM TTS 133
 NITROFIX 133
 NITROMACK 133
 NITROSUN 258
 NIVAQUINE-P FLAV SUSP 384
 NIVAQUINE-P INJ 364
 NIZRAL 388
 NIZRAL SHAMPOO 558
 NODEP 228
 NODINE 457
 NOL VADEX 336
 NOMICRAIN 170
 NOOTROPIL 227
 NOPAR TABS 338
 NOR-U 305
 NORBACTIN 304
 NORBACTIN EYE DROPS 545
 NORBID 305
 NORFLOX 305
 NORFLOX-TZ 21
 NORI-A 488
 NORILET 305
 NORISTREAT 484
 NORMABRAIN 227
 NORMACE 142
 NORMACE-D 158
 NORMADATE 140
 NORMAX 305
 NORMAXIN 84
 NORMETIC 204
 NORMETIC SUSP 204
 NORMODIL 284
 NORMODIL SUSP 284
 NORMOLIP 108
 NORMOLOL 114
 NORMOSPAS 84
 NORMOZYME 61
 NORMOZYME SYRUP 61

NORPACE 135-33
 NORPHIN 219
 NORSWEL 454
 NORZED 305
 NOSOCEF 277
 NOVACLOX 264
 NOVACLOX PAED TABS 264
 NOVAMOX 264
 NOVAMOX DRY SYRUP 264
 NOVAMOX DT 264
 NOVELON 490
 NOVIGAN 426-454
 NOVONIDAGYL TABS/
 SUSP 27
 NOWORM 339
 NOWORM 339
 NOXTIN 21
 NUBEND 340
 NUBEND SUSP 340
 NUFEX 283
 NUFEX DRY SYRUP 283
 NULIP 374
 NUMOX 250/500/1000 264
 NURIL 140
 NURRISH LIQUID 471
 NUTRIFIL 468
 NUTRISAN 479
 NUTROLIN B PED TABS 474
 NUTROSEC 479
 NUTROSEC LIQUID 479
 OBAX 305
 OCCUREST EYE
 DROPS 548-550
 OCID 43
 OCIFRIL 235
 OCIMUM 477
 OCUFUR 548
 OCULOSE 549
 OCUPOL-DEYE EAR
 DROPS 543
 OCUPRES 547
 ODACE 142
 ODAL 340
 ODINOL 114
 ODIROX 311
 ODOXIL 274
 OFRAMAX 377
 OLAMIN 556
 OLD TUBERCULIN 382
 OLIAD BATH OIL 474
 OMALGER 43
 OME-10/20 43

OMEPRAL 10/20 43
 OMEPRAL 10/20 44
 OMEPRAL 10/20 44
 OMEZ 44
 OMEZOL 44
 OMICITE 488
 OMIZAC 44
 OMINATAX 279
 OMINICEF 279
 OMNIGEN C 99
 OMNIPAQUE 380
 140/180/240/300/350
 OMNIPEN 264
 OMNITEL 340
 OMNITEL SUSP 340
 ONCOCARBIN 331
 ONCODEN 207
 ONCODEN INJ 207
 ONCOTRON 330
 ONE-UP 481
 ONIL-2 355
 ONTOP 302
 OPTZE 547
 OPTIMOX 284
 OPTIMOX INJ 284
 OPTIMOX-B 284
 OPTINEURON 474
 ORABOLIN 383
 ORACIP-500 282
 ORAL POLIO VACCINE SABIN 99
 ORAL 248
 ORBITS 13
 ORGALUTIN 480-483
 ORGANETRIL 483
 ORICITRAL 411
 ORIPHEX 283
 ORIPHEX DRY SYRUP 283
 ORIPHEX 316
 ORIPRIM I.M. INJ 316
 ORIPRIM I.V. INJ 316
 ORIPRIM PAED SUSP 316
 ORIPRIM 278
 ORPHAMOL 214-441
 ORPHAMOL FORTE 214
 ORPHIPAL 214-441
 ORPIC 250/500 282
 OSCAL-12 TABS/INJ 477
 OSOL 88-444-507
 OSIFORT-F 488
 OSTEOLAM 481
 OSTEOLAM INJ 451
 OSTOCALCIUM B-12

SYRUP 475
 OSTOCALCIUM TABS 476
 OSTOFEN 456
 OTEK 543
 OTEK AC 543
 OTINA EAR DROPS 543
 OTOFLOUR TABS 543
 OTOGEBIC 543
 OTRIM 317
 OVAFAR 485
 OVRAL 480
 OVRAL-G 480-488
 OVRAL-L 480-482
 OXADEP 238
 OXALGIN 218
 OXYSTECLIN 283
 OXYTET INJ 288
 P-FEBRIN 454
 P-ZIDE 389
 PACITANE 216
 PAKDIA SUSP 20
 PALADAC 474
 PAM-A INJ KOREA 376
 PAM-A TABS KOREA 376
 PANCONUM 441
 PANFLOX 282
 PANIMUN 338
 PANKREOFAT 51
 PANKREON 51
 PANKREON 51
 PANKREON PAED 51
 PANOLASE 51
 PANTELMIN 341
 PANURON 441
 PANZYNNORM 52
 PARABUTAZONE 482
 PARACLOX CAPS 271
 PARACLOX INJ 271
 PARACAL 13
 PARAPLAX 438
 PARAFON 438
 PARAMET 208
 PARAMINOL CREAM 564
 PARAXIN 288
 PARAXIN EAR DROPS 543
 PARBUDOL GEL 438
 PARBUDOL TABS/SUSP 434
 PARKMET 278 213
 PARKIN 218
 PARNON 210-447
 PARVON FORTE 228-447
 PARVON SPAS 228

PARYON-N 220-447
PAVULON INJ 441
PAXUM 284
PAXUM INJ 284
PEACIN 294
PEBACT 306
PEDIA-3 533
PEDIC DROPS 474
PEDITRAL 433
PEFBID 306
PEFCIN 306
PEFLOBID 306
PEFLOBID INFUSION 306
PEFCIN 306
PEFOXAN 306
PEFLOX 306
PEFLOX INFUSION 306
PEFLOX INJ 306
PENCOM 306
PENETRIN 317
PENICILLAMINECAPS 105
PENIDURE AP 348
PENIDURE LA/LA12/LA24 306
PENIVORAL 306
PENIVORAL FORTE 306
PENIXIN 271
PENMIX FORTE INJ 271
PENQUIN 292
PENTADERM CREAM 558
PENTALGIN INJ 222
PENTAVITE 468-474
PENTAVON 222
PENTAWIN 222
PENTAZSOCINE INJ 222
PENTIDS 306
PENTIN 306
PENTOPYL 186
PENTOREL 219
PENZYL 222
PEPGARD 40
PEPTICACIN 13
PEPTICACINE 18
PEPTILGER 44
PERIM 204
PEPRINORM 206
PERINORM INJ 206
PERINORM LIQUID 206
PERIONE 176
PERITOL 182-466
PERITOL SYRUP 182

PERVALAN 603
PERLICE CREAM RINSE 559
PERMITE CREAM 556
PERHOX GEL 552
PERSANTIN 73
PERSOL FORTE 562
PESULIN-O 27
PETRESIN KOREA 416
PFT 13
PH 413
PHARMA LIQUID 52
PHENA INJ 190-206
PHENA KID 190-206
PHENA-P 190-206
PHENABID 461
PHENAMIN INJ 190
PHENERGAN 190
PHENERGAN ELIXIR 190
PHENOBARB 30/60 196-256
PHENOBARBITONE SOD. INJ 268
PHENOL 462
PHENOXYL 285
PHENOXYL DRY SYRUP 285
PHENSEDYL 526
PHENSEDYL EXPECTORANT 533
PHENYTAL 197
PHENYTAL-30/150 197
PHERIMOL TABS 224
PHEXIN 283
PHOSFOMIN 474
PHOSFOMIN IRON 468
PHYLOBID 526
PBIZYME LIQUID 152
PIF 306
PIFLASYN I.V. 306
PIFLASYN TABS 306
PILOCAR 547
PIMAFUCIN EYE DROPS 546
PIMAFUBIN VAGINAL TABS 517
PIODIN 533
PIPCOL 57
PIPRAPEN INJ 309
PIRALDINA 369
PIRATAM 327
PIRICAM 463
PIRITON EXPECTORANT 181-533
PIRITON TABS 181
PIROX 10/20 CAPS 463
PIROX DISTAB 463

PIROX INJ 463
PTOCIN 506
PLACENTREX 468
PLACIDOX 254
PLAXID 230
PLENDIL 147
PLUTAMID 319
PMQ INGA 368
POISE 230
POLARAMINE 183
POLARAMINE PASTE SYRUP 183
POLARAMINE REPEAT TABS 183
POLIO SABIN (ORAL POLIO) 99
POLYBION 476
POLYBION INJ 476
POLYBION SYRUP 474
POLYCOL FORTE 13
POLYCOL FORTE GEL 13
PONSTAN KAPSEALS 466
POTASOL 431
POTTNOL LIQUID 431
POVIDAX SOLUTION 537
POVIDONE SOLUTION 537
POVIDONE MOIST 542
POVIDONE VAGINAL 515
POWER GESIC 451
PRACTIN 182
PRACTIN SYRUP 182
PRACTIN TABS 466
PRAGMATAR 558
PRAGMATAR OINT 558
PRAVIDEL 211-484
PRAZEP 239
PRAZEP-2 239
PREGNIDOXIN 206
PREGNORM 463
PREGNORM 75/150 IU 461
PREGNYL 464
PREGONAL-75/150 463
PREGNOLIN TABLETS 63
PREMEZOL INJ 29
PREMICILLIN INJ 271
PREMOBION 474
PREMOCLOX 250/500 271
PREMOCLOX INJ 271
PREMODEX INJ I.P. 425
PREMOGYL INJ 29
PREMOLYTE-Q 429

PREMOQUIN INJ	364
PREMPOR	263
PREGNATAL CAPS	476
PREPULSID	311
PREPULSAR	116 127
PREZOLIN	278
PRILISA	264
PRILEX INJ	278
PRIMICIN EYE DROPS	345
PRIMICIN INJ	311
PRIMIFLACIN	239
PRIMOLUTIN	494
PRIMOVALAR 30	490 498
PRIMOVAL	241
PRIMPROST	501
PROBAMTHINE	15 47
PROBOPRIL	442
PROBOPRIL CAPS	448
PROCTISA	16
PROCTINAL	211 484
PROCTO QUINOL	33
PROCTO MOYL	33
PROGAL	138
PROGEP	138
PROFAS	484
PROFENO CR	434
PROFENTOL SUSP	455
PROFERON	448
PROFETON	471
PROFLOX	346
PROFLOX EYE DROPS	343
PROLINE	38
PROLALATE INJ	244
PROLID	471
PROLID	488
PROMALGIN	218
PROMASUN	188 398
PROMETHAZINE HCL	
INJ	198
PROMOL	488
PROMPICIN	271
PROMETYL	137
PROMUTRIN	471
PROMUTRIN CAPS	471
PROPAL	129
PROPANO MPS	386 13
PROPANO PMS GEL	386
PROSOVAL	471
PROSTANO	219
PROSTHINE TABS/INJ	443
PROSTODIN	388
PROSUP	471

PROTHADEN	338
PROTHALLES	471
PROTO-BORIC	548
PROTOCOL	44
PROTOPER	471
PROTOSOL	471
PROTOSOL INJ	437
PROTUSSEA PLUS	536 433
PROVERA	488
PROVIRONUM	484
PROXYTAB	226 224 447
PROXYTON	226 447
PUBERGEN	484
PULMICORT INHALER	328
PULMOREST	328
PULMOREST PLUS	
SYRUP	326
PULSID	38
PULSID SUSP	38
PUPLETTO FORTE	346
PURNETHOL	339
PURSENNO	81
PYLOCID	48
PYOPEN	273
PYRALPHIN	367
PYRALPHIN SUSP	367
PYRAPHASE 500/750	368
PYRCONTIN	474
PYRCORT	343
PYRFRON	421
PYRIDESIC	224
PYRMOATE TABS	343
PYROSED	224
PYZINA	388
PZACIBA 500/750	388
Q-BID	363
Q-BID EYE/EAR DROPS	345
QCBH	383
QUADRIDERM	388
QUADRUPLE VACCINE	
INJ	88
QUEN	386
QUEP 25MPORTE	388
QUESTRAN	187
QUOYL	27
QUOYL SYRUP	27
QUET	238
QUIN BGA	367
QUIN BGA INJ	367
QUINONE	137
QUINOBACT	388
QUINOBACT EYE	

DROPS	345
QUINOLON	388
QUINROSS INJ	384
QUINROSS TABS/OS	
TABS	384
QUINTON	262
QUINTON EYE DROPS	345
QUINTON INFUSION	283
R-CIN	378
R-CIN SYRUP	378
R-CINEX	367
R-CINEX 2	378
R.E. TONE	488
RABPUN	88
RAPLOX	383
RAFTACE	8 16
RALCEF	384
RALCREYME	52
RALSWEET	482
RAMACE	145
RAMAL	88
RANTIDINE	88
RANTIN	88
RANTIN INJ	88
RANTAC	88
RANTAC INJ	88
RANTI TABS 150	88
RAPIDICA	388 388
RARICAP FORTE	488
RASH FREE	367
RASTINON	388
REFLEX	188
REFLEX INJ	188
RECLON	388
RECOCIF	283
RECOL	188
REDIFLEX	488
REDITONE PLUS	488
REDUCIN	461
REFLIN	378
REFTACE TABS/LIQUID	16
REGOLAC-S	474
REGLAN	388
REGLAN INJ	388
REGLAN SYRUP	388
REGUREAT	138
REJUN	488
RELAXYL	428 388
RELAXYL TABS	461
RELCEP GEL	14
REMCLON CAPS	271
REMCLON DRY SYRUP	271

RENEDIL 145
REPARIL 481
REPTILASE 84
RESEC 44
RESOCHIN 354
RESPIMOX 285
RESPIRA SYRUP 519
RESPIRA TABS/SYRUP 533
RESPORIDEX 284
RESPOSYRUP 533
RESPREN 528
RESTECLIN 288
RESTIMULEN 535-536
RESTIMULEN PEARLS 535
RESTOREM 258
RETYL 230
RETINO-A 552
RETROVIN 378
REVITAL 484
REVITAL LIQUID 484
REZIPEN 423
RHIZIN 180
RIBUFEN GEL 455
RIDAZIN 248
RIDCER 40
RIDCER INJ 40
RIOCORN 838
RID.NOX DROPS/OINT 548
RIDOL SOLN 30
RIFA 1-8 ADULT 370
RIFACOM 370
RIFACOM EZ 371
RIFACOM-Z KIT 371
RIFADIN-INH 367-371
RIFINEX PLUS 371
RIFLUX 10
RIFLUX FORTE 19
RIFLUX LIQUID 10
RIMACTANE 371
RIMACTANE SYRUP 371
RIMACTAZID 367
RIMACTAZID+Z 371
RIMACTAZID-450 371
RIMEVAX 96
RIMODAR 364
RIMPAZID-400 371
RIMPIN 371
RIMPIN SYRUP 371
RIMPINAH 368-371
RINGER LACTATE
INJ LP 432

RIPHARMED 372
RIPHARMED SYRUP 372
RIVOTRIL 196
ROBIFLAM 440
ROBINAX TABS/INJ 448
ROBINAXOL 448
ROCEPH 284
ROCEPH DRY SYRUP 284
ROLAC 14
ROLAC PLUS 13
ROLOX 308
ROSCILLIN 271
ROSCILLIN INJ 271
ROSCILLIN PAED
INJ 271
ROVACOR 108
ROVAMYCIN 312
ROVAMYCIN FORTE 312
ROXIBID 311
ROXIMOL 311
ROXIN 408
ROXITEM 311
ROXYROL 311
RULIDE 311
RUMANH 455
RYTMONORM 138
SAGENTYL 318
SAGENTYL-DS 383
SALAZOPYRIN 88
SALAZOPYRIN EN 88
SALBETOL 328
SALINEX 154
SALZER 411
SAN-GA-REE ELIXIR 474
SANDOCAL-500 477
SANDOGLOBULIN 85
SANTEVIN 478
SANVITONE 478
SANZYME 53
SANZYME DS TABS 74
SARIL 27
SARDENA 233
SARPLAZINO 181
SATERGIN 804
SCABEX 558
SCABEX-S CREAM 558
SCABINE LOTION
CREAM 558
SCABOMA 368-371

SCABOMA CREAM 368-371
SCALTIX 559
SCOLINE INJ 443
SECNL 383-518
SECNL FORTE 383
SECTRAL-200 111
SECZOL 383
SECZOL DS 383-518
SEFGARD 124
SEFLOX 292
SELCA 114
SELERIN-5 215
SELGIN TABS 215
SELOPRES 117
SELOPRES-50 117-126
SELSUN SUSP 559
SEMBRINA 250 148
SEMI DAONIL 382
SEMI EUGLUCON 382
SENORM 251
SENORM LA INJ 251
SENORM-5 INJ 251
SENSIVAL 241
SENSORCAINE 171
SENSORCAINE
HEAVY 0.5% 171
SENSORCAINE SPINAL 172
SENSORCAINE WITH
ADRENALINE 172
SEPEXIN 284
SEPEXIN DRY SYRUP 284
SEPTAN 317
SEPTAN PAED SUSP 317
SERACCEL 81
SERADOL 251
SERADOL INJ 251
SERADOL PLUS 251
SEREBANTHINE 36, 87
SERENACE 251
SEREPAX 257
SEREPAX 30 TABS 257
SEREPAX 30 TABS 257
SERPA 464
SERVOPRIM PAED TABS/SUSP 317
SETRUDE EYE DROPS 545
SHELCA SYRUP 477
SHELCA-200/500 477
SHELUM 178
SIGMA-CALVIT 477
SIOMADERM 558

SIGMAZINE249
 SIGMAZOL CREAM514-556
 SIGMET206
 SIGMET INJ206
 SII POLYVALENT92
 SILODERM CB CREAM556
 SILODERM MIXI CREAM556
 SILOX FORTE GEL14
 SILOXOGENE14
 SILVER SULPHADIAZINE
 CREAM553
 SIL VEREX CREAM553
 SILVERES-1545
 SILYBON-7056
 SIMECO TABS/SUSP14
 SINIUM CREAM556
 SINIUM V556
 SINIUM VAGINAL511
 SINTAMIL241
 SINUMOL TABS224
 SIOCHROME80
 SIOCITRATE411
 SIOLAN INJ103
 SIOLAN-12 INJ103
 SIORK461
 SIOZIDE368
 SIOZIDE405
 SIQUIL209-250
 SIQUIL INJ209-250
 SIQUIL INJ443
 SISOPTIN-50312
 SIXAPP466
 SIZON180
 SIZON SYRUP180
 SIZOPIN236
 SKINMENT557
 SKIZORIL236
 SLIMERAX481
 SLIMERAX481
 SLIMERAX481
 INJ432
 SODIUM CHLORIDE SOLN
 0.46%, 0.9%, 5%, 20%433
 SODIUM LACTATE INJ433
 SOFRADEX CREAM567
 SOFRAMYCN EYE
 DROPS545
 SOFRAMYCN OPHTHALMIC
 OINT545
 SOFRAMYCN SKIN
 CREAM553
 SOLACID SUSP/TABS14
 SOLACID-O SUSP14

SOLU-MEDROL402
 SOLUBET INJ399
 SOLURET ORAL DROPS399
 SOLUNAC451
 SOPARIN-KID224
 SORBACID14
 SORBACID GEL15
 SORBICAP132
 SORBILINE58
 SORBITRATE132
 SORVICIN475
 SOSECON TABS222
 SOTAGARD121
 SOYAL471
 SPAGYL SUSP27
 SPASMOZOL-K425
 SPASMO PROXYVON35, 220
 SPASRK64
 SPASTHELENE87
 SPECIAL ASTHMA MIXED
 VACCINE100
 SPECIAL ECZEMA MIXED
 VACCINE100
 SPIRACIN312
 SPIRACIN SUSP312
 SPIROMIDE412, 154
 SPORANOX351
 SPOREN 500 CAPS284
 SPOREN CAPS284
 SPORIDEX284
 SPORIDEX SUSP284
 SPORLAC102
 SPORLAC POWDER102
 SPOROSTACIN510
 SSZ APLICAPS545
 STADMED BETA114
 STAFEN818
 STAMINE INJ474
 STAN DS317
 STAPHNIL284
 STAPHNIL INJ284
 STATUM557
 STATUM B LOTION
 CREAM567
 STATUM DUSTING POWDER557
 STATUM LOTION557
 STATUM PLUS557
 STATUM VAGINAL TABS511
 STEDEX INJ406
 SYMETIL207-246
 SYMETIL INJ207-246
 STEMN399

STEMIN ORAL DROPS399
 STEMIZ179
 STEMIZ SUSP179
 STERADENT542
 STERADENT POWDER539
 STERILE CEFOTAXIME279
 STILAMIN89
 STIMULIV55
 STIMULIV TABS55
 STREPTASE76
 STREPTO ERBAZIDE373
 STREPTOMAGMA27
 STREPTOMAGMA GEL27
 STRESS CAPS474
 STYLLIN202
 STUGERON181-202
 STUGERON FORTE181-202
 STYPTOCHROME INJ I.M.61
 STYPTOCID81, 85
 STYPTOCID FORTE INJ81
 STYPTOCID INJ85
 STYPTOMET51-504
 STYPTOVIT81
 SUBAMYCN288
 SUBAMYCN
 CAPLETS500288
 SUBDU220-447-455
 SUCCINYL CHOLINE CL482
 SUCRACE45
 SUDHINOL220-447
 SUGARK461
 SUGAR FREE TABS482
 SULBACIN271
 SULBACIN 750271
 SULFAMINE358
 SULPHADIAZINE313
 SULPHAMETHIZOLE421
 SUMETROL317
 SUNPRAZIN242
 SUPACEF280
 SUPRAFLOX292
 SUPRICORT571
 SUPRIMOX285
 SUPRIMOX INJ285
 SUPRIMOX INJ285
 SUPROX INJ184-503
 SUPROX SR184-503
 SURFAZ557
 SURFAZ DUSTING232
 SURVECTOR232
 SURFAZ SN CREAM557
 SURFAZ VAGINAL TABS345

SURFLOX TABS	309	TENORMIN	115-153	THROMBOSPAIN	72
SURGIDRES	538	TENOCLOL	115-153	THROMYCIN	299
SUSTANON "100"/250	488	TENOFED	127, 115	THROMYCIN DRY	
SWEETEX PELLETS	482	TENOFED CAPS	115	THROM	299
SYLANS	42	TENOLOL	115	THYROZOLE	465
SYMXYL	265	TENORIC	115	TIBICIN SUSP	372
SYMXYL BN	265	TENORIC-50	115-153	TIBIKIT PLUS	372
SYMXYL BR SUSP	265	TENORMIN	115	TIBINES-450	372
SYMXYL DRY SYRUP	265	TENORVATE-G	570	TIBIRIM INH	368-372
SYNASTAT	317	TENORVATE-M	570	TICLOP	77
SYNASTAT PAED SUSP	317	TENSARIL	248	TICLOPIDINE	78
SYNDOPA 110/275	212	TENSICARD	115	TICLOVAS	78
SYNDOPA CR	213	TENSIMIN	115	TIDIGESIC	219
SYNDOPA PLUS	212-213	TERDANE	191	TIDOCOL	69
SYNTOCINON	505	TERDANE SUSP	191	TIDOMET FORTE	212-213
SYSCAN	347-512-842	TERF	191	TIDOMET L.S.	212-213
SYSCAN INFUSION	347	TERF SUSP	191	TIDOMET PLUS	212-213
SYSPRIDE	58	TERFAX SUSP	191	TILODOXON INJ	473
SYSPRIDE MPS	58	TERFAX-80	191	TILSTIGMIN TABS/INJ	473
SYSTACORT	399	TERFED TABS/SUSP	191	TIMOLO EYE DROPS	547
SYSTAFLAM	228-438-447	TERIGON	191	TIMOPTAL EYE DROPS	547
SYSTAFLAM CREAM	451	TERIGON TAB	191	TINADERM	557
BYU	471	TERIN	191	TINADERM CREAM	557
TABALON	455	TERIN SUSP	191	TINI 75/150 SUSP	23
TABROL	317	TERRAMYCIN	288	TINI-300/500	22
TAGERA	363-518	TERRAMYCIN I.M.	288	TINI-500	517
TAGRID	208-22	TERRAMYCIN SF CAPS	288	TINI-F TABS/SUSP	23
TAMOFEN	335	TERRAMYCIN SKIN		TINIBA 300/500/1000	27
TAMLOD	146	OINT	534	TINIBA INFUSION	27
TAMOXIFEN	335	TESTANON 25/50	498	TINIBA-N TABS	27
TAMOXIFEN LYKA	335	TESTOVIRON DEPOT	498	TINIBIO-DS	22
TANCODEP	239	TESTOVIRON INJ	498	TINICIDE	22
TANCODEP-2	239	TETANUS ANTITOXIN	96	TINICIDE FORTE	22
TANTUM CREAM	542	TETANUS TOXOID	101	TINICIDE-V	517
TANTUM ORAL RINSE	542	TETANUS TOXOID I.P.	101	TINIDAFLY	22-517
TAVEGYL	181	TETRACYCLINE HCL	288	TINIDAFLY PLUS	22
TAVEGYL SYRUP	181	TEYAFIL	240	TINIFLOX	22, 27
TAVIST	181	TETRADOX	288	TINOR	22
RAVIST SYRUP	181	TETRAMAC CAPS	288	TINOXIN	22
TAXCEF	278	THEMIBUTOL	385	TIXYLIX	189-553
TAXIM	278, 81	THEMIBUTOL PLUS	385	TOBACIN	546
TAZODA	262	THEO-ASTHALIN	526	TOBAZON	546
TEDIN	181	THEO-ASTHALIN SYRUP	526	TOBUR	41
TEDIN SYRUP	181	THEOMAC	526	TOCOFER	476
TEDRAL LIQUID	526	THERAGRAN-M	474	TODAY	498
TEDRAL SA	526	THIORIL	248	TOFRIN	181
TEEJAL TEETHING GEL	539	THIOSOL INJ	177	TOFRIN SUSP	181
TEFICON	181	THIOTEPA	323	TOLAGIN	218
TEGRETOL 100/200/400	185	THREOCYLINE	288	TOLBET CREAM	568
TEGRETOL SYRUP	185	THROMBONIL	73	TOMID	208
TELOL	118	THROMBOPHOS	74, 861	TONIAZOL	468
TENASE	118	THROMBOPHOS GEL	74	TONOFERON	468

TONOFERON DROPS	488	TRIGAN INJ	428	TYPHIM-VI	182
TOPCEF	278	TRIGLOBE SUSP	318	TYPHOID PARA TYPHOID	
TOPCID	41	TRIGLYD	168	VACCINE	181
TOPIFORT CREAM	570	TRIKA	230	TYPHORAL	182
TOPINATE CREAM	570	TRIMEXOL TABS/SUSP	317	UDCA	89
TORMOXIN	288	TRIMOVAX (MMR)	87	UDLAN	184
TORMOXIN DRY SYRUP	288	TRINERGIC	484	UDLAN INJ	184
TOROCEF	277	TRINEURO SOL	474	UKIDAN	79
TOROLAC	457	TRINEURO SOL DROPS	475	ULBEN	340
TORVIN	457	TRINEURO SOL-H INJ	475	ULBEN SYRUP	340
TOSS GEL	542	TRINICALM	240	ULCEKON	48
TOSS K TOOTH PASTE	539	TRINICALM FORTE	218-242	ULCEREX 150/300	41
TOSS TOOTH PASTE	539	TRINICALM PLUS	218-248	ULCERFATE	48
TOSSEX IMPROVED	534	TRINORM	251	ULCIBAN	41
TPRIM SUSP/FORTE	317	TRINORM-1.5/5/10	218	ULCIMAX	41
TRACRIUM	436	TRIPERIDOL	250	ULCINIL-F	41
TRAMAZAC	225	TRIPERIDOL INJ	250	ULCITAB	41
TRAMAZAC CAPS	225	TRIPHENAZIN	217	ULGEL SUSP/TABS	18
TRANCODOL	251	TRIPLE ANTIGEN	101	ULIX-P	418
TRANCODOL INJ	251	TRIPLE SULPHA	515	ULTAC	41
TRANINOL	230	TRIPRESS	163, 117	ULTIDIN	41
TRAPEX	258	TRIQUILAR	492	ULTIRON TR	489
TRASIC	225	TRISULFA CREAM	318	ULTRA-K	451
TRAZALON	252	TRISULFOSE	317	ULTRACAIN GEL	18
TRAZE 25/50/100	252	TRITOFEN	518	ULTRAGIN SYRUP	218
TRAZINE	248	TRITOFEN SYRUP	518	ULTRALAN	572
TRAZINE-H	218-248	TRIVASTALA	217-227	ULTRAPROCT	32-572
TRAZINE-SO	248, 218-242	TRIVIRATEN	87	SUPPOSITORIES	32, 572
TRAZODEP	252	TRIZ	180	ULTRASPORIN	284
TRAZONIL	252	TRIZ SYRUP	180	ULTROX	315-317
TRENTAL INFUSION	166	TRIZAC	238	ULTROX SUSP	317
TRENTAL-400	166	TROFENTYL	221	ULZOL	44
TRESIVAC	87	TROMAGESIC	451	UNICARBAZAN	338
TRIFLUOR	288	TROMAGESIC INJ	451	UNICARBAZAN	
TREXYDIN	181-534	TROMALGIN	218-481	FORTE 250	338
TREXYL	181	TRONAL TABS/INJ	457	UNIDROL	402
TREXYL SUSP	181	TROPICO EYE DROPS	548	UNIENTZYME MPS	52
TRIBEN DUSTING		TROPISYN EYE DROP	548	UNIMEZOL	513
POWDER	557	TROYCAL	477	UNIPRIDE	86
TRIBEN LOTION	557	TROYCEF	280	UNIWARFIN	70
TRIBEN PLUS CREAM	557	TRYMO	48	UNIZYME SYRUP	52
TRIBEN VAGINAL	511, 348	TRYPTOMER	233	URIBEN	395
TRIBUSYNTH	488	TUSSIVIL	326	URIPAS	424
TRICAIN MPB	18	TWC 30	224	UROKIC	419
TRICAL-D 250/500	477	TWINDIX KID TABS	20	UROFLOX	368
TRICLORYL SYRUP	258	TWINDIX SUSPENSION	20	UROGRAPHIN	361
TRICORT-18/40	404	TWINDIX TABS	20	UROKINASE	70
TRICOX	388	TYOE-8 INJ	288	UROLUCOBIL	318-421
TRICOX FORTE	373	TYKLID	78	UROMINO 34%	
TRIDAZOLE	22, 517	TYLOX-2	30	INFUSION	370
TRIDEP	233			UROVIDEO 78%	381
TRIGAN	428			UTIBID	388

UTIDIX	418	VITAMYCETIN SYRUP	288	XTRAGESIC	458
UTIDIX SUSP	418	VITAPLEX	474	XYLOCAINE	173
UTREGIN	504	VITAZYME	52	XYLOCAINE 2% WITH	
UTREGIN INJ	504	VITAZYME DROPS	52	ADRENALINE	173
UTROGESTAN	487	VITOCOFOL IRON CAP	468	XYLOCAINE 5% HEAVY	173
V.C.R.	323	VITOCOFOL SYRUP WITH		XYLOCAINE JELLY	173
VALBET CREAM	568	IRON	468	XYLOCAINE OINTMENT	173
VALBET SCALP APPLICATION		VITEOLIN	478	XYLOCAINE TOPICAL	173
		VITNEURIN	474	XYLOCAINE VISCOUS	173
VALIUM-2.5, 10	254	VITONEX	471	XYLOCARD INJ 2%	134
VALOSIN	444, 88, 507	VIVIRIL	143	XYMEX	53
VALPARIN	200	VIVIRIL-D	143	XYMEX DROPS	53
VALPARIN ALKALETS	200	VIVOCYCLINE	298	XYTID	285
VALPARIN LIQUID	200	VIZ CAPS	479	XYTID DRY SYRUP	285
VALPROL	200	VEZOL	549	YUTOPAR	507
VANCOCIN-CP	318	VIZYLAC	53, 103	YUTOPAR INJ	507
VANCORID CP	318	VIZYLAC SYRUP	53	ZACTANE	41
VASONIT 10/20/30 TABS	133	VOLINI GEL	481	ZADINE	179
VASONORM-54	143	VIVERAN	451	ZAMOX 250/500	285
VASOPRIL	143	VOVERAN EMULGEL	451	ZAMOX DISPERSIBLE	
VASOPTEN	128	VOVERAN INJ	451	TABS	285
VASOTOP	148	VOVERAN SR	451	ZARONTIN	187
VASOTOP INFUSION	148	WALACORT	398	ZE-SPAS	423-458
VBC-12 INJ	474	WALAGESIC	220-224	ZEDASE	484
VECREDEL	502	WALAMYCIN SUSP	285	ZEDEX	534
VENEX 300/500	31	WALAVIN 250	348	ZEET EXPECTORANT	534
VENPHENICOL INJ	288	WALAVIN-FP	348	ZEFONE	277
VENT	528	WARCILIN	285	ZEN RETARD	185
VENT FORTE	538	WARCILIN DRY SYRUP	285	ZEN-200	185
VENT LIQUID	528	WAXOLVE	548	ZENAO	181
VENTAKOF	528	WINDFT GINSENG	484	ZENAD SUSP	181
VENTORLIN	528	WINDFT GINSENG CAPS	484	ZENAX	231
VENTORLIN EXPT	528	WINTREL	528	ZENOPRAX	231
VERAMIL	130	WOKADINE	554	ZENTEL	340
VERITOL AMPOULES/		WOKADINE GARGLE	542	ZENTEL SUSP	340
LIQUID	171	WOKADINE POWDER	544	ZEPTOL	185
VERMISOL	340	WOKADINE SCRUB	537	ZEROSMA	518
VERSZUR	185	WOKEX-4	372	ZETOP	180
VERTIGON	181-202	WOMIBAN	340	ZEDARM-S	568
VERTIGON-75	202	WORMIN	341	ZIDOVIR	378
VERTIN	201	WORMIN SYRUP	341	ZIL	23, 517
VESPARAX	255	WYCORT	573	ZIMALGIN	218-224
VIBAZINE DT	298	WYCORT INJ	401	ZINAMIDE	58
VICTOPOL DROPS	475	WYGESIC	220-224-447	ZINETAC	41
VICTOFOL INJ	475	WYMESONE	400	ZINGISOL	538
VINCRISTINE	323	WYMESONE INJ	400	ZINULIN	389
VIRAZIDE	376	WYSERIN	292	ZIPCIN	292
VIRAZIDE SYRUP	375	WYSOLONE	483	ZIRLON	180
VISCID	19	XENOBID	458	ZIRTIN	180
VISCOOYNE	534	XERO-SED	180	ZITHROMAX	272
VISKEN	119	XIPAMID	157-417	ZOA FORTE	23
VITAMYCETIN	288	XITMA	528	ZOACIDE DS	23

783

ZOACIDE-500 23
 ZOACIDE-V 517, 557
 ZOCON 347-512
 ZOCON INFUSION 347-512
 ZODIC-P 451
 ZOFEN K 451
 ZOLAM 231
 ZOLANDIN 452
 ZOLAX 231
 ZOLE 514, 557
 ZOLE DUSTING
 POWDER 557
 ZOLE OVULE 514
 ZOLE-F 557
 ZOPTIC EYE DROPS/POINT 557
 ZORAN 41
 ZOROVON 457
 ZOROVON INJ 458
 ZOTER 101
 ZOTER SUSP 101
 ZOVATE 588
 ZOVIRAX I.V. INFUSION 374
 ZOXYN 292
 ZUCOX KIT 372
 ZUCOX PLUS CAP TABS 372
 ZUMIN 341
 ZUPAR 455
 ZYMMUNE 336
 ZYNCEY 180
 ZYRTEC 180
 ZYRTEC SYRUP 180
 ZYTEE TEETHING GEL 539
 pH4 13
 pH4 SUSP 13

AYURVEDIC INDEX

ASANA 584
 ACIDINOL 574
 ADDYZOA 588
 ALARSKIN 588-610
 ALLERIN 588
 ALLERKHAND 588
 ALOES COMPOUND 589
 ALPITONE 589
 ALSAREX 574
 ALURETIC 581
 AMLJEER SYRUP 574
 ANAZYM SYRUP 574
 ANCARE 583
 ARJUN 584
 ARJUNIN 584
 ARSHONYT 575
 ARSOL 576
 ARTHROM 582
 ASMA GARD 588
 AYAPON 583
 AYUR
 B & M PILLS 585
 B H PILLS OR SHILAJIT
 PILLS/FORTE 589
 BACTIMO 510
 BANGSHIL 581
 BANOVIT 589
 BILOVAS TABS 585
 BIO-GAL 575
 BONNISAN 589
 BRAHAMDINE 589
 BRAVOBOL 585
 BRENTO 586
 BRIFRIL 586
 CALCUIROSIN 581
 CALCURY 581
 CARIOTONE-M 584
 CARIOTONE-S 584
 CEA TANGLE TENT
 (C.T.T.) 589
 CEPHAGRAINE 586
 CEVIT 585
 CHESOL 583
 CHINIUMCO 583
 CHIRAKIN 586
 CLAREX 510
 COLICARMIN 575
 CONSTILAX 575
 CORAZAN 588
 CURX COUGH SYRUP WITH

TULSI 587
 CUTFAR OINT 518
 CYSTONE 581
 DANGINE 587
 DEKOPCYN 587
 DENTOBOL 518
 DERMAFEX 588
 DERMAFEX CREAM 511
 DESMA 587
 DETONSY 587
 DIABEGON 588
 DIAREX 576
 DIASYN 576
 DIGEST 576
 DRILL EXPECTORAN 588
 DYGAID 576
 ELPHA 585
 ENTERODARIN 585
 FATOF 586
 FEMIFORTE 589
 FEMIPLEX 589
 FEROLIV 586
 FETEX PASTE 588
 FEUVRIL 586
 FORTEGE 586
 FTX 576
 G 32 511
 GARLILL 577
 GASCUT 577
 GASEX 577
 GASOFIX 577
 GASTREX 477
 GASTROMONE 577
 GERIFORTE 586
 GESTONE 588
 GLUSET 588
 GLYSAN SYRUP 587
 GRANDI CO 584
 GUM TONE 511
 GYNEC 20 588
 H.P. 200 587
 HEMOPLEX 588
 HEPANORM 578
 HEPATOGARD 578
 HERBITARS 578
 HERBO SULPH 588
 HERBOLAX 578
 HIBRIL 586
 HIMCOLIN 588
 HONYMOON GOLD PILL 588
 INFEE 578
 IOBINE 588

J.K. 22 500
 JERIAT 500
 K4 TABLETS 502
 KAMILLOSAN 511
 KAMILLOSAN MOUTH SPRAY... 511
 KASKOL 500
 KAYBEE 502
 KOFLET 500
 KOFLYN 500
 KOFOL 500
 KYNOTOMINE 570
 LA-FORTE CAPS 500
 LA-VIRIL CAPS 500
 LAXAYE & LAXATE
 FORTE 570
 LEPTADEN 501
 LICOGEN 501
 LIPAN 500
 LIV-52 500
 LIVEX 570
 LIVMEGH SYRUP 570
 LIVOMYSN 570
 LIVOSYN 500
 LIVOTRIT 500
 LUCOGLY 501
 LUCOSYNTH-O 501
 LUCOSYNTH-V 501
 LUKOL 502
 LUNAREX 502
 M2 TONE 502
 MAMTONE 502
 MANOLL MANOLL 500
 MEDITAB 500
 MENORIL 502
 MENTAT 507
 MERSINA 500
 MYRKAP 502
 NEO 507
 NEVOSS 507
 OAKAY PILLS 503
 OBENYL 597
 OJUS 507
 ORUCLYN 502
 OVARIN 503
 OVOUTOLINE 503
 PEP CAPS 503
 PEPTARD 500
 PIGMENTO 511
 PILEX 500
 PILZAND 501
 POLYMIX 501
 POSEX 503

POTENZA 507
 POWER PILLS 507
 R-PYRIN 507
 R. COMPOUND 502
 RASGENT 511
 REGULAX 501
 REMITONE 503
 REMORIN 507
 REPEL 503
 RHUMASYL 503
 RHUMAYOG/RHUMAYOG WITH
 GOLD 503
 RINGO 512
 RHIPANTO 512
 ROYAL ELPHA 507
 RUMALAYA 504
 RYMANYL 504
 SAL PHOS 501
 SAPERA 505
 SATAVAREX 504
 SAVOURYN 501
 SENSA HERB 504
 SENSA SPUR 504
 SENZINE 504
 SEPTILIN 500
 SERPINA 505
 SEXTON 504
 SLEDIN 500
 SIX C 512
 SLIMIT 502
 SOOKTYN 502
 SPASMA 500
 SPEMAN 504
 SPEMAN FORTE 505
 SPOLAX 502
 STYPLON 502
 SULPHONAX 500
 SUPERSIC 504
 SUPERGESIC FORTE CREAM 504
 SUPERTINE 507
 SVERGEN 505
 TENTEX FORTE 505
 TRIBANGSHILA 500
 TURAI-CO 502
 ULTRA-LIV SYRUP 502
 UREXYNOL 500
 VEDNIL 504
 VIGOREX 505
 VIGORIT CAPS 507
 VIGOROLL 500
 VIROGEN-G 505
 VIRAFIX 500
 VITALIP 503
 VITESSON 500

VITON 90 500
 VOMITER 500
 VYBRANT 505
 VYSEX 500
 WHOOPEX 500
 ZANDUZYME 502
 ZEFS 500
 ZENIF SYRUP 500

Deleted Products

Cumulative list of deleted products
Brands appearing in bold type have been
deleted from the current issue

ALBUDAG Cadis Pharma
ALDACTIDE RPG Life
ALFAM-400 Albert-David
ALFUMET Albert-David
AM-BACTIN 80 CFL Pharma
AMINOPLASMA PREPS Wallace
AMITROL Torrent
AMLOPIN Lyka
AMPILIN-88 Lyka
ANAFEBRIN Themis Chemicals
ANQUIN USV
AQUASOL A USV
AROVIT Piramal Healthcare
ASMA TERB RPG Life
BACTOMET/C TABS Win-Medicare
BARALGAN Hoechst
BELLADENAL-IN Sandoz
BENOGEN Relis
BETALOC DURULES Astra-IDL
BIOPENCE Biochem
BIOPROT Biochem
BIOSPIRIN Biochem
BISOLPENT German Remedies
BIVINAL FORTE e VIT C Alembic
BRINERDIN Sandoz
BPONCHOPHYL PLUS CFL Pharma
CARBELIN Lyka
CARDIOXIN INJ Novartis
CARDIWELL Torrent
CELLUBRIL Astra-IDL
CELLUMIDE FDC
CEPHACILLIN Biddle Sawyer
CEPHAXIN INJECTION Biochem
CEPORAN Glaxo
CLOMITROP Modi-Mundpharma
CIPR DE Torrent
COLSIPAN German Remedies
COMBANTRIN Pfizer
COMPEBA IDPL
CORBETA-40 D Sarabhai
CORTEC PLUS Torrent
COTARYL-H FDC
CREMMAFIN e
PHENDLPHTHALEIN
CRYS-4 Sarabhai
DEPENAL-M SmithKline
DIABINESE Pfizer
DICRYSTICIN-8 PREPS Sarabhai
DIZYTONE Unichem
DOXETAR Torrent
E-MYCIN DRY
SYRUP Themis Pharmaceuticals
ECZO-BETADINE Win-Medicare
EFCORLIN N EYE/EAR Allenburys
ENCEPHABOL INF Merck
ENTRIOLATE PLUS Stadmed
ERADACIL Win-Medicare
ERGOPHEN Inga
ET-800 Wockhardt
ETINOL Sarabhai
FERRUM-FOL Khendakal
FLAGYL I.V. INJ Rhone-Poulenc
FLAGYL-DF Rhone-Poulenc
FLAMAR-P Indoco
FLUANXOL CFL Pharma
FLUMAP Torrent
FRADE Gilead

FUCIBET Wallace
FUCIDIN-LEO Wallace
FURATOR Biochem
GASTROVISION German Remedies
GESICARD Sarabhai Piramal
GLUCAGON Torrent
GONADOTROPHON L.H. Biochem
HARTEZE Lyka
HS PLUS Torrent
HERPEX OPHTH Torrent
HIXINAL Torrent
HIBITANE CONC ICI
HYPHYLLIN Lyka
HITERF Lyka
HORMO-DUADILAN Duphar
IBUFLAMAR Indoco
IBUFLAMAR-MX Indoco
IBUFLAMAR-P KID Indoco
INABUTOL Themis Chemicals
INCIDAL Bayer
INDERYTH SUSPENSION Indoco
INOCOR Win-Medicare
ISMELIN Ciba-Geigy
ISONACK RETARD Biochem
ISOMERIDE Sandoz
ISOPTIN German Remedies
IVEMETRO Torrent
JAGRIJ Jageon Pal
KANAMYCIN Biochem
KENALOG-S SKIN Sarabhai
LADOGAL Win-Medicare
LAXATIN Alembic
LEDERMYCIN OINT Cyanamid
LIPOFUNDIN 5 10% Wallace
LOGASCID FORTE Astra-IDL
LOMODEX Relis
LY-BUTOL Lyka
LYCORTIN-S Lyka
LYKAPRIM DS Lyka
LYMESAL Walter Bushnell
LYNAMIDE Lyka
LYNDIOL Intra
LYRAMYCIN EYE/EAR Lyka
LYRAMYCIN TOPICAL Lyka
MADRIDON Piramal Healthcare
MANDELAMINE Parke-Davis
MICOGEL-F Cipla
MICRONEG TABS Dabur
MUCORIS-E FDC
MULTIGAIN Torrent
MYCOSTATIN OINT Sarabhai
NALAXYN Lyka
NACPOT Systopic
NEBACORTIL SKIN Pfizer
NEGADIX-M TABS CFL Pharma
NEO-FERILEX Relis
NICHAL Cipla
NIMOTIDE Torrent
NITROMACK/RETARD Biochem
NIVAQUANE P FORTE Rhone-Poulenc
NORBID EYE/EAR Alembic
NUREN GEL Dabur
ONICITE Torrent
ONCOTOR Torrent
ONE ALPHA LEO Wallace
ORABOLIN Intra
ORGALUTIN Intra
ORGAMETRIAL Intra
ORIPRIM-P EYE Cadis Healthcare
ORPHAMOL Torrent
OSSIDOSS Wockhardt
OSTEOFLAM INJ Indoco
OTERK/OTERK-P FDC
OVULEN RPG Life
PANZYNOX German Remedies
PARAMET SUSPENSION Wallace
PARAZOLANDIN Sarabhai Piramal
PENTIDON Jageon Pal

PENTIDS SYRUP Sarabhai
PHENSEDYL EXPECTORANT/ Rhone-Poulenc
DM-LINCTUS Rhone-Poulenc
PIFLASYN Rhone-Poulenc
PLAKICIDE MOUTH WASH RPG Life
PLUTAMIDE Torrent
PROFENID-CR Rhone-Poulenc
PROMPICIN Gano
PRONUTRIN CAPS. CFL Pharma
RALC.DIN-8 Relis
REAFERON Torrent
REPARIL FDC
RESTIMULEN Sarabhai Piramal
RIFAMPILA Albert David
ROXIN Cadis Healthcare
RIMPIN IPZ Lyka
RUBRAGAN-HP Sarabhai
RUBRATON Sarabhai
SECTRAL Rhone-Poulenc
SECTRAL PLUS Rhone-Poulenc
SEFLOX Jageon Pal
SELVIGON German Remedies
SERPASIL Ciba-Geigy
SH HUMAN ALBUMIN Serum Inst
SILOX FORTE Sandoz
SILOCITRATE Albert-David
SILOCOBIN Albert-David
SIOZIDE Albert-David
SOFAMYCIN EYE OINT Roussel
SOOTHEX Win-Medicare
SOSECON Win-Medicare
SPAGYL Indoco
SPEP Indoco
STROMBA Win-Medicare
SUGAFEN Sarabhai Piramal
TAMOFEN Torrent
TEDRAL Parke-Davis
TEFIDON Modi-Mundpharma
TERBUSIN EXPECT Wallace
TERRACORTIL SKIN Pfizer
TESTOVIRON German Remedies
THALAZOLE Rhone-Poulenc
THE REGAN Sarabhai
THYROZOLE Cadis Pharma
TIBICIN SUSP Themis Chemicals
TIBIRIM Ranbaxy
TIDOCOL Torrent
TIDOMET Torrent
TOF RIN Torrent
TOLDIN Torrent
TOLSOL Jageon Pal
TOPCEF Torrent
TORVIDONE Torrent
TORVIN Torrent
TOSSEX IMPROVED Sarabhai
TRAZODEP Torrent
TRIGAN Cadis Pharma
TRIPRES Astra-IDL
ULTRALAN German Remedies
ULTRAPROCT German Remedies
UNI-VITE Unichem
UNIMEZOL SUSP.A.V. Unichem
UROKINASE Win-Medicare
VALIUM INJ Piramal Healthcare
VALLERGAN Rhone-Poulenc
WINHYDRAN Win-Medicare
WINSPRIN Win-Medicare
WYPAL D.S Jageon Pal
ZOLANDIN PREPS Sarabhai Piramal
ZOPIC Corbis

New Entries

ACID	SHILP		
(Clarithromycin 200mg)			
Tab	10	270 00	N.A.
ALA-100 (Alpha-Spect Acid)	ALBEMIC		
Cap	10	N.A.	N.A.
ALERGID (Cetirizine 10mg)	GOODHEALTH		
Tab	10	23 00	N.A.
Susp 5mg/5ml	50ml	24 00	N.A.
ALOPEX	PUREHEALTHCARE		
(Silver sulphadiazine 1% w/w, Chlorhexidine Gluconate 0.20% w/w, Aloe 15% w/w, Allantoin 0.1% w/w per gm)			
Cream	20gm	35 00	N.A.
ALZOLIN (Apremilast)	KEYWEST		
Tab 0.25mg	10	6 24	4 98
0.50mg	10	11 28	9 01
ALTACEP (Captopril)	OLENMARK		
Tab 250mg	4	135 80	112 20
500mg	4	248 00	203 25
Susp 125mg/5ml	20ml	129 70	108 29
Inj 250mg	Vial	45 00	36 52
750mg	Vial	48 00	73 26
AMADAT (Amidopril)	ALANTA PHARM		
Cap 2.5mg	10	6 00	N.A.
5mg	10	9 50	N.A.
10mg	10	17 50	N.A.
AMERODOL-S	ARISTO		
(Acesclofenac Hcl 15mg, Salbutamol 1mg per ml)			
Susp	100ml	28 50	24 43
AMICLOR	SAL/HEALTHCARE		
(Aminophylline Hcl 12.5mg, Chlorzhydrate 5mg)			
Tab	10	8 30	N.A.
AMICLOR DS	SAL/HEALTHCARE		
(Aminophylline Hcl 25mg, Chlorzhydrate 10mg)			
Tab	10	13 20	N.A.
AMLOL	THEMES		
(Amlodipine 5mg, Atenolol 50mg)			
Tab	10	25 14	N.A.
APKEF (Cephalexin)	ALANTA PHARM		
Cap 250mg	10	58 00	N.A.
500mg	10	110 00	N.A.
OT 125mg	10	27 00	N.A.
ARKADOM (Domperidone)	RKG PHARM		
Tab 10mg	10	19 80	16 50
ASPFLAM	RKG PHARM		
(Diclofenac sodium 50mg, Paracetamol 325mg, Chlorzhydrate 500mg)			
Tab	10	50 00	41 50
ASLABRON	RKG PHARM		
(Etiopine 100mg, Bromhexine 8mg, Terbutaline 2.5mg)			
Tab 500mg	4x30	114 00	96 00
ASCAZEN (Zinc Sulphate 220mg)	APEX		
Cap	200	180 00	N.A.

ASCORIL	OLENMARK		
(Sulbutamol 1mg, Bromhexine hydrochloride 2mg, Quateracain 50mg, Marshel 0.5mg)			
Tab	10	6 25	5 38
ASCORIL-D	OLENMARK		
(Dexamethorphen Hydrochloride 10mg, Pseudoephedrine Hcl 30mg, Triprolidine Hcl 1.25mg, Marshel 1.50mg per 5ml)			
Susp	100ml	30 84	26 50
ATORLIP	RANBAXY/INRT SYCIPLA		
(Atorvastatin 10mg)			
Tab	10	210 00	N.A.
ATEEZ (Apremilast)	EAST AFRICAN		
Tab 0.25mg	10	7 00	5 88
0.5mg	10	12 00	10 20
AZELINE-	INCA		
(Azathioprine 50mg)			
Tab	10	80 00	N.A.
BAROZAC (Fluoxetine Hcl)	BARODA PHARM		
Tab	10	18 50	13 20
BENZ-2	SAL/HEALTHCARE		
(Benzhexol Hcl 2mg)			
Tab	10	7 40	5 88
BETALOC 25	ASTRA-ZEL		
(Metoprolol Tartrate 25mg)			
Tab	10	9 80	N.A.
BETAVERT	SILMET		
(Betahistine Hcl 8mg)			
Tab	10	N.A.	N.A.
BROZYME	BARODA PHARM		
(Dialase (1:200) 50mg, Pepsin (1:3000) 10mg per ml)			
Liquid	200ml	38 33	32 20
(Dialase (1:200) 33.33mg Pepsin (1:3000) 5mg Vial B1 1mg, Vial B2 1mg, Vial B6 1mg, Vial B12 1mg, Nicotinamide 10mg per ml)			
Drop	15ml	16 50	13 88
(Dialase (1:200) 50mg, Pepsin (1:3000) 10mg Smethicone)			
Tab	30	16 10	13 52
CALOS	SHALAL		
(Hydroxypatite Providing Calcium 98mg, Phosphorous 48mg, Zinc Sulphate 20mg)			
Tab	20	15 00	12 80
(Hydroxypatite Providing Calcium 98mg, Phosphorous 48mg, Ferrous Fumarate 300mg, Folic Acid 5mg)			
Fora Tab	10	9 40	7 98
CECAPS	NTAS		
(Cephalexin 250mg, Carbocysteine 150mg)			
Cap	4	19 75	N.A.
(Cephalexin 500mg, Carbocysteine 150mg)			
Cap	4	38 25	N.A.

CEFOX (Cefadroxyl)	RKG PHARMA		
DT Tab 125mg	4x30	318.00	285.00
Tab 500mg	5	50.00	41.50
CEFABID (Cefadroxil)	EAST AFRICAN		
Tab 250mg	10	60.00	55.50
500mg	10	120.00	102.00
CIPIN (Ciprofloxacin)	RKG PHARMA		
Tab 250mg	10	34.00	29.30
500mg	10	65.00	54.00
750mg	10	87.50	73.00
CIPIN PLUS	RKG PHARMA		
(Ciprofloxacin, Tinidazole)			
Tab 500+600mg	10	87.50	73.00
CIPROFOX (Ciprofloxacin)	EAST AFRICAN		
Tab 125mg	10	17.50	14.87
250mg	10	37.50	31.87
500mg	10	69.00	58.65
CLAMOX	INGA LAB		
(Amoxycillin 500mg, Clavulanic Acid 125mg)			
Tab	5	135.00	N.A.
CYSTRAN (Oxybutynin)	INTAS		
Tab 2.5 mg	10	N.A.	N.A.
5mg	10	N.A.	N.A.
CZCOLD	LUPIN		
(Cetirizine Di-Hcl 5mg, Phenylpropanolamine Hcl 25mg, Paracetamol 500mg)			
Tab	10	20.00	N.A.
DIALOL	RKG PHARMA		
(Propranolol Hcl 20mg, Diazepam 2.5mg)			
Tab	10	6.75	10.50
DIAZ (Diazepam 10mg)	MANO PHARMA		
Tab	10	9.90	N.A.
DICLOTAB	BARODA PHARMA		
(Diclofenac Sodium 50mg, Paracetamol 500mg)			
Tab	10	12.00	10.08
DOBUM	MANO		
(Calcium Dobesilate Monohydrate 500mg)			
Cap	10	N.A.	N.A.
DOLAMIDE	RANBAXY		
(Nimesulide 100mg, Paracetamol 500mg)			
Tab	10	23.50	N.A.
DYNAPAR (Diclofenac Sodium)	TROIKAA		
Inj 25mg	5x3ml	22.50	18.44
DYNAPAR-EC (Diclofenac Sodium)	TROIKAA		
Tab 50mg	10	71.00	58.18
DYNAPAR-SR	TROIKAA		
(Diclofenac Sodium)			
Tab 100mg	10	131.80	107.85
ELCAB (Lithium carbonate)	BARODA PHARMA		
Tab 300mg	10	10.50	8.40
ELAMIN	BARODA PHARMA		
(Imipramine Hcl)			
Tab 25mg	10	5.80	4.48
75mg	10	12.50	10.00
EMANZEND	EMCURE		
(Serratopeptidase 10mg, Diclofenac Sodium 50mg)			
Tab	10	59.50	N.A.
ENTHRO (Erythromycin)	EAST AFRICAN		
Tab 150mg	10	9.50	8.07
EOUZINE	RKG PHARMA		
(Trifluoperazine Hcl 1mg, Chlorthalidopride 10mg)			
Tab	4x30	7.00	N.A.
ESMOX (Amoxycillin)	ABS REMEDIES		
Cap 250mg	10	N.A.	N.A.
500mg	10	N.A.	N.A.
DT 125mg	10	N.A.	N.A.
250mg	10	N.A.	N.A.
EURYTHMIC (Amiodarone)	TROIKAA		
Tab 100mg	10	40.00	32.78
200mg	10	70.00	57.36
EVION CREAM E	MERCK		
(Tocopherol Acetate 1%w/w, Propylene Glycol 5%w/w, Liquid paraffin)			
Cream	50g	N.A.	N.A.
EZAMPS	PURE HEALTHCARE		
(Cisapride 10mg, Poly Dimethylsiloxane 125mg)			
Tab	10	28.00	N.A.
FELINGEL	PURE HEALTHCARE		
(Diclofenac diethylammonium 1 10%w/w equiv. to Diclofenac Sodium 1%w/w, Oleum Lin (containing predominantly alpha linolenic acid) 3%w/w, Methyl Salicylate 10%w/w, Menthol 5%w/w, Preservative Benzyl Alcohol 1% w/w per gm)			
Gel	30gm	39.90	N.A.
FENCURE	BIO-ETHICALS		
(Diclofenac diethylammonium 1 18%w/w equiv. to Diclofenac Sodium 1%w/w per gm)			
Gel	15gm	16.55	13.64
FENGEL	PURE HEALTHCARE		
(Diclofenac diethylammonium 1 15%w/w equiv. to Diclofenac Sodium 1%w/w per gm)			
Gel	30gm	26.50	N.A.
FENTYL[®]	KEYWEST		
(Tinidazole 300mg, Ofloxacin Furoate 250mg)			
Tab	10	17.95	15.08
FENTYL	KEYWEST		
(Metronidazole Benzoin 100mg, Furazolidone 25mg per 5ml)			
Susp	60ml	13.67	11.48
FLIN (Ofloxacin)	RKG PHARMA		
Tab 200mg	6	81.00	67.50
FLOXIDATE	EAST AFRICAN		
(Ofloxacin)			
Tab 200mg	10	180.00	153.00
FORTACEF	TROIKAA		
(Ceftazidime)			
Inj 250mg	Vial	108.00	88.50
500mg	Vial	188.00	152.43
1gm	Vial	290.00	237.99
G.NIL	MANO PHARMA		
(Gillbenclamide)			
Tab 2.5mg	10	3.90	N.A.
5mg	10	6.70	N.A.

NEW ENTRIES

G-DROX (Cefadroxil)	GOOD HEALTH		
Tab 500mg	10	110.00	N.A.
Kid Tab 125mg	10	28.00	N.A.
GLENTONA	GLENMARK		
(Liver Fraction 1 (derived from 4.167 gm fresh liver having vitamin B12 activity equiv to 1 mcg Cynocobalamin 166.68mg, Riboflavin 1mg, Nicotinamide 18mg, Pyridoxine Hcl 1mg, Calcium Pantothenate 2mg, Ferric Ammonium Citrate 30mg per 15ml)			
Syrup	200ml	29.50	25.27
GLIMER (Glimipride)	NICHOLAS		
Tab, 1mg	10	N.A.	N.A.
2mg	10	N.A.	N.A.
GLYCIGON-M	ARISTO		
(Gliclazide 80mg, Metformin 500mg)			
Tab	10	37.00	30.36
GOCOF	GOOD HEALTH		
(Gualphenasin 100mg, dextromethorphan Hydrobromide 10mg, Phenylpropanedamine Hcl 12.5mg, Chlorphediramine Maleate 4mg per 5ml)			
Syrup	60ml	30.75	N.A.
GOPRIDE	GOOD HEALTH		
(Cisapride 10mg)			
Tab	10	35.00	N.A.
GOPRIDE MPS	GOOD HEALTH		
(Cisapride 10mg, Simethicone 125mg)			
Tab	10	36.00	N.A.
HALIDACE-T	BARODA PHARMA		
(Haloperidol 1.5mg, Trihexyphenidyl Hcl 2mg)			
Tab	10	7.90	6.32
HALIDACE-PLUS	BARODA PHARMA		
(Haloperidol 5mg, Trihexyphenidyl Hcl 2mg)			
Tab	10	18.50	14.80
HALIDACE-FORTE	BARODA PHARMA		
(Haloperidol 10mg, Trihexyphenidyl Hcl 2mg)			
Tab	10	23.00	18.40
HELPIBASE (Serritopeptidase)	EAST AFRICAN		
Tab 10mg	10	57.50	48.67
HISTARIV (Cetirizine)	EAST AFRICAN		
Tab 10mg	10	15.00	12.75
IPAMIDE (Sterile fosamide 1gm)	ADBUR		
Inj	Vial	330.00	N.A.
IPRAVENTROTACAL	CIPLA		
(Ipratropium Bromide 40mg)			
Cap	10	40.00	N.A.
KEFDIL (Cefadroxil)	AJANTA PHARMA		
Tab 250mg	10	50.00	N.A.
500mg	10	87.50	N.A.
LISNOP (Lisinopril)	AJANTA PHARMA		
Tab 2.5mg	10	15.50	N.A.
5mg	10	30.00	N.A.
LISNOP AM	AJANTA PHARMA		
(Lisinopril 5mg, Amlodipine 5mg)			
Tab	10	42.00	N.A.
LYMPOGLOBULINE	AVENTIS PASTEUR		
(Equine Anti-Human Thymocyte Globulin)			
Inj 100mg/5ml	Vial	3660.00	N.A.
MANOCALM FORTE	MANO PHARMA		
(Trifluoperazine 5mg, Trihexyphenidyl 2mg, Chlorpromazine 50mg)			
Tab	10	11.90	N.A.
(Trifluoperazine 5mg, Trihexyphenidyl 2mg, Chlorpromazine 100mg)			
Tab	10	19.50	N.A.
MANOCALM PLUS	MANO PHARMA		
(Trifluoperazine 5mg, Trihexyphenidyl 2mg)			
Tab	10	9.60	N.A.
MANOCALM PLUS H	MANO PHARMA		
(Trifluoperazine 2.5mg, Trihexyphenidyl 1mg)			
Tab	10	5.20	N.A.
MEZAPIN-XR	LAFARMA		
(Cetamazepine)			
Tab 200mg	10	15.00	N.A.
400mg	10	30.00	N.A.
MOBITONE	ADVIK		
(Diclofenac Potassium 50mg, Paracetamol 500mg)			
Tab	10	12.00	9.84
MOBITONE PLUS	ADVIK		
(Diclofenac Sodium 50mg, Paracetamol 500mg, Chlorzoxazone 500mg)			
Tab	10	48.00	39.39
NCA	TROKAA		
(Megaldrate 800mg, simethicone 50mg)			
Tab	10	12.75	10.44
NPOCEF	TTK		
(Cefazidime 1g)			
Inj	Vial	290.00	N.A.
NORMOSPAS-OP	SYSTOPIC		
(Dicyclanide Hcl 20mg, Diclofenac Sodium 30mg, Acetaminophen 325mg)			
Tab	10	16.00	N.A.
NOTTV	EAST AFRICAN		
(Norfloxacin 400mg, Tinidazole 800mg)			
Tab	10	5.81	4.82
NOVACLOX-LB	OKASA PHARMA		
(Amoxycillin 250mg, Cloxacillin 250mg, Lactic Acid Bacillus 80 million cells)			
Cap	6	30.00	N.A.
NOVAMOX-AX	CIPLA		
(Amoxycillin Trihydrate 500mg, Ambroxol Hydrochloride 30mg)			
Cap	6	42.80	N.A.
NOVATEN (Atenolol)	AJANTA PHARMA		
Tab 50mg	10	18.45	N.A.
100mg	10	33.33	N.A.
NOVATEN AM	AJANTA PHARMA		
(Atenolol 50mg, Amlodipine 5mg)			
Tab	10	29.50	N.A.
OCUZINE EYE DROPS	CENTURE		
(Zinc Sulphate 0.1%, Phenylephrine Hcl 0.12% w/v, Naphazoline Hcl 0.05% w/v, Menthol 0.005% w/v, Camphor 0.01% w/v per 10ml)			
Drop	10ml	17.31	N.A.

ORCALMIN (Microcrystalline Hydroxypatite complex (MCHC) equiv to 133mg of Calcium and 66mg of phosphorus)	TTK		
Tab	10	153.89	N.A.
OVISTA (Vit B6 3mg, Vit C12 150mg, Vit E 400mg, Folic Acid 1.5mg, Zinc 20mg, Selenium 100mcg)	DR. REDDY'S LAB		
Cap	10	39.60	N.A.
PIMO (Pimozide)	MANOPHARMA		
Tab 2mg	10	33.50	N.A.
4mg	10	45.50	N.A.
PROLIN (Hydroxyprogesterone caproate 250mg per ml)	LINCOLN		
Inj	1ml	35.00	N.A.
	2ml	58.00	N.A.
PROTILAN (Lansoprazole)	GLENMARK		
Cap 15mg	10	24.00	19.67
30mg	10	44.50	36.43
PYRONIL (Promethazine Hcl 2.5mg, Paracetamol 125mg per 5ml)	KEYWEST		
Susp	50ml	18.95	14.24
	450ml	49.95	41.95
(Promethazine Hcl 10mg, Paracetamol 500mg)			
Tab	10	9.20	8.48
PYRONIL PLAIN (Paracetamol 125mg per 5ml)	KEYWEST		
Susp	50ml	14.75	12.39
REBECT-T (Ciprofloxacin 500mg, Tinidazole 500mg)	EASTAFRICAN		
Tab	10	64.00	71.40
RELENT (Cetirizine Hydrochloride 5mg, Ambroxol Hydrochloride 60mg)	AMERICAN REMEDIES		
Tab	10	24.50	N.A.
RIFIN FORTE (Rifampicin, Isoniazid)	RKG PHARMA		
Tab 450+300mg	10	65.00	54.20
ROXYVIR (Roxithromycin)	EASTAFRICAN		
Tab 150mg	10	9.50	8.07
RUBYL (Vit B1 10mg, Vit B2 10mg, Vit B6 3mg, Vit B12 15mcg, Folic Acid 1mg, Nicotinamide 50mg, Calcium Pantothenate 12.5mg, Vit C 150mg, Zinc Sulphate 54.93mg)	RKG PHARMA		
Cap	10	11.50	9.58
SECKAA (Secnidazole)	TROKAA		
Tab 500mg	4	34.00	27.88
1gm	2	34.00	27.88
SERECTIL (Chlorpromazine)	BARODA PHARMA		
Tab 50mg	20	8.58	7.19
100mg	20	14.28	11.99
SERENTIN (Trifluoperazine Hcl 5mg, Trihexyphenidyl Hcl 2mg)	BARODA PHARMA		
Tab	10	6.50	5.20
SPASML-P (Paracetamol 500mg, Dicyclomine Hcl 20mg)	SHAIMIL LAB		
Tab	10	8.50	6.52
T.ZINE (Thioridazine)	MANOPHARMA		
Tab 10mg	10	9.90	N.A.
25mg	10	19.20	N.A.
50mg	10	31.50	N.A.
TAVANC (Levofloxacin Hemihydrate 512.48mg Equiv. to Levofloxacin 500mg)	HOECHST MARION		
Inj 25mg+5ml diluent Vial	6014.00	N.A.	
THYMOGLOBULINE (Rabbit Anti-Human Thymocyte Immunoglobulin)	AVENTIS PASTEUR		
Tab	10	95.00	N.A.
TINCY (Ciprofloxacin, Tinidazole)	GOOD HEALTH		
Tab 500+500mg	10	95.00	N.A.
TINOM (Ciprofloxacin, Tinidazole)	EASTAFRICAN		
Tab 250mg+300mg	10	46.90	39.88
TRAMADO (Tramadol Hcl)	GOOD HEALTH		
Tab 50mg	10	80.00	N.A.
TRAXAL-O (Cefixime)	INDOPROKEM		
Tab 100mg	10	270.00	N.A.
Susp 50mg/5ml	30ml	98.00	N.A.
TRINEUROSOL (Vit B1 50mg, Vit B6 100mg, Vit B12 1000mg per ml)	INDUS PHARMA		
Inj	2ml	5.15	4.15
TRIPODERM (Clotrimazole 1% w/w, Beclomethasone Dipropionate 0.025% w/w, Gentamicin 0.01% w/w per gm)	PURE HEALTH CARE		
Cream	10gm	25.00	N.A.
VALUCLOX (Amoxycillin 250mg, Cloxacillin 250mg, Lactic Acid Bacillus 60million spores)	AJANTA PHARMA		
Cap	10	42.50	N.A.
WESTEL (Prochlorperazine 5mg)	KEYWEST		
Tab	10	7.84	6.27
WESTO (Diclofenac Sodium 50mg, Paracetamol 500mg)	KEYWEST		
Tab	10	13.95	11.72
WESTOGESIC (Diclofenac Sodium 50mg, Paracetamol 325mg, Chlorzoxazone 250mg)	KEYWEST		
Tab	10	26.95	22.84
XEROPANE (Nimesulide)	GOOD HEALTH		
Tab 100mg	10	23.00	N.A.
Susp 50mg/5ml	80ml	17.00	N.A.
ZEFONE (Ceftriaxone)	ZYDUS ALIDAC		
Inj 250mg	Vial	39.72	N.A.
1000mg	Vial	123.75	N.A.
ZINOSL (Sulphacetamide Sodium 10%, Sodium Chloride 0.85%, Boric Acid 1.8%, Zinc Sulphate 0.1%, Naphazoline Hcl 0.02% per vial)	INDUS PHARMA		
Tab	15ml	16.00	14.10
ZYRTEC-O (Cetirizine 5mg, Pseudoephedrine 120mg)	UCB		
Cap	10	22.00	N.A.

ایک ہی خوراک میں علاج

SINGLE DOSE TREATMENT



ALBEZOLE

ZENTEL

ZENTEL™ An Original Product of Sanofi-Sintelabo



(۱) ال بندازول (پیٹ کی کیڑوں کے لیے)

- زین ٹل

- ال بی زول

(۲) روسوکسامین (سوزاک کے لیے)

- ارڈاسل



(۳) سلفامیتھاپازین پائی رامیتھامین

(ملیریا کے لیے)



(۴) فلوکونازول (لیکوریا، مہلی انفکشن میں)

- ا جی کین

- فورکان

- سیکنی ڈازول

In Vaginal Candidiasis

LOGICAN 150 mg
(FLUCONAZOLE)

A Logical Alternative To Topical Antifungals

Wm-Medicare

SECNIL
(Secnidazole Tabs.)

THE ORIGINAL SINGLE-DOSE
NITROIMIDAZOLE RECOMMENDED FOR
AMOEBIASIS/GIARDIASIS/LEUKORRHOEA

امراض نسوان

اطفال گائیس

آسان اردو

زبان میں عورتوں اور بچوں

کے امراض پر ایک مفید معلوماتی

کتاب سو سے زائد امراض کے اسباب، علامات مجرب

ایلوپیتھی اور یونانی علاج کا بیان۔ بچوں کی تربیت، پیدائش،

مرد و انفری پر قیمتی معلومات۔ استقرار حمل، شناخت، رکاوٹ، حفاظت حمل پر

بیش بہا معلومات، اس فن سے دل چسپی رکھنے والوں، اطباء و ڈاکٹروں کے

لیے بہترین تحفہ۔

صفحات ۱۶۰ با تصویر

قیمت: ۳۵ روپے ڈاک خرچ علاوہ

پتہ: ڈاکٹر عبد الجبار، ڈانگ ضلع پیلی بھیت۔ ۲۶۲۰۰۱

نزلہ کھانسی، دمہ نمونہ

ٹکا بکا گائیڈ

نزلہ زکام، کھانسی، دمہ، نمونہ

اور ٹی بی پر مفصل اور مفید معلوماتی کتاب۔ ان امراض کی حقیقت،

اسباب، علامات، حفاظتی تدابیر، منتخب ایلوپیتھک اور یونانی علاج

اطباء ڈاکٹروں، اور ان امراض میں مبتلا افراد کے لیے بہترین

معلوماتی کتاب۔

قیمت - ۱۲ روپے

پتہ: ڈاکٹر عبدالجبار، ڈانگ ضلع پٹی بھیت - ۲۶۲۰۰۱

تندرستی ہزار نعمت ہے

تندرستی اگرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے

• ہماری خوراک کے ضروری اجزاء • کیا کھائیں کیا نہ کھائیں کس غذا میں کون سے وٹامن پائے جاتے ہیں • پھلوں میوؤں بزیوں کے فوائد • پیاریوں کے پرہیزی کھانے • نزلہ زکام احتیاطی تدابیر و علاج • قبض کا علاج غذا و دوا سے، • موٹاپا احتیاط و علاج • طیر یا بخار بچنے کی تدابیر و علاج • آنکھ ہے تو جہان ہے آنکھ کی روشنی کیسے بڑھے • تندرستی حاصل کرنے کے مفید مشورے • گھر لو کارآمد مفید نسخے • ورزش کے فوائد • صحت کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کے ارشادات • اقوال حکماء • صحت کے ذریعے اصول • زیادہ کھانے کے نقصانات • دل ہی تو ہے، ہارٹ ایک احتیاطی تدابیر و علاج • کارآمد مفید باتیں • خوش رہنے کے گر • پان تمباکو کے مضر اثرات • علاج بالفسل ایک جرمن کی نادر و نایاب قیمتی کتاب کا خلاصہ • ان سب باتوں کو جاننے، پر مسرت اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے تندرستی ہزار نعمت نامی کتابچہ کا مطالعہ کیجئے دریا کوڑے میں بند ہے۔

قیمت صرف ۵ روپے

پیشہ دار، ممبر، اخبار، ذائقہ شائع جلی بھیت۔ ۲۶۲۰۰۱

رہنمائے جنس اور مردانہ امراض

جنس اور مردانہ جنسی امراض کے موضوع پر ڈاکٹر عبد الجبار کی ایک اور مفید اور معلوماتی کتاب، نامردی ضعف باہ، سرعت رقت، جریان احتلام، آتشک سوزاک ایڈزو غیرہ امراض پر تحقیقات کا خلاصہ اسباب علامات مجرب یونانی ڈاکٹری اور ہومیو پیتھک علاج، جنسی معلومات کا خزانہ ۴۰ سوالات کے جوابات، جنسی زندگی کو پر مسرت بنانے کے بیش قیمت راز، مجرب نسخے، مفید غذائیں، جنس کے موضوع پر وہ سب کچھ جس کی آپ کو تلاش ہے۔

قیمت: اردو ۴۰ روپے

ہندی ۳۰ روپے

پتہ: ڈاکٹر عبد الجبار، ڈانگ ضلع پٹی بھیت۔ ۲۶۲۰۰۱

جدید رہنمائے تشخیص

New Diagnosis Guide

علم و فن تشخیص پر لا جواب کتاب، جس میں مریض کے معائنہ کا طریقہ، تشخیص کے قدیم و جدید ذرائع، تشخیص اور علاج کے اسرار و رموز، علامات موت، علامات فارقہ جدید آلات سے تشخیص، ۱۰۰ الیو ریٹریکٹسٹ، پیشاب، پاخانہ بلغم سے تشخیص ۱۰۰ سے زائد مخصوص امراض و علاقے (Syndroms) کی تشخیص و علاج، اردو زبان میں منفرد معلوماتی اور مفید کتاب مریض کی پوزیشن دیکھ کر تشخیص کرنا، آپریشن کے لیے مریض کی پوزیشن علم و فن تشخیص پر آج تک ایسی کتاب شائع نہیں ہوئی ہر طبیب و ڈاکٹر کے لیے قیمتی تحفہ، تصاویر سے مزین۔

صفحات: ۳۲۰

قیمت: -/۱۲۰ روپے

پتہ: ڈاکٹر عبدالجبار، ڈانگ ضلع پبلی بھیت۔ ۲۶۲۰۰۱

دریوشی ہیئر آئل

ویسی جڑی بوٹیوں اور پھلوں سے تیار کردہ

”دریوشی ہیئر آئل“

بالوں کو مضبوط کرنا سفید ہونے سے روکتا اور اوران کو کالا

اور ملائم رکھتا ہے۔ نزلہ زکام سرد درد ماغی کمزوری کے لیے لا جواب ہے

قیمت ۱۰۰ ملی لیٹر - ۲۵ روپے

طیف ہام

صرف ہیرونی استعمال کے لیے

۱۔ درد کی بہترین اور قیمتی دواؤں سے تیار کیا جاتا ہے۔

۲۔ یہ مسلمین اسپرٹ اور رنگ کی خرابیوں سے پاک ہے۔

۳۔ درد کو فوراً آرام پہنچاتا ہے۔ کوئی خراب اثر نہیں کرتا ہے۔

۴۔ سر کے درد میں انگلی سے دوا کو پیشانی پر لگائیں۔

۵۔ سر پھرانے میں دوا کو بار بار سونگھیں اور کنبی اور پیشانی پر لگائیں۔

۶۔ کمرے کوڑے بچھو وغیرہ کاٹنے پر روئی میں بھگو کر درد کے مقام پر رکھیں۔

۷۔ گھٹیا انقرس میں درد کے مقام پر لگائیں۔

۸۔ نزلہ زکام میں دوا کو رومال میں لگا کر سونگھیں چند قطرے اچلتے پانی میں ڈال کر بھپارہ لیں اور

پیشانی پر لگائیں۔

۹۔ نمونیہ اور پلے کے درد میں درد کے مقام پر لگائیں۔

۱۰۔ پیٹ کے درد اور قونچ میں مقام درد پر آہستہ آہستہ لگا کر کپڑا گرم پانی میں بھگو کر رکھیں۔

۱۱۔ دانت کے درد اور کیزا لگنے میں یہ دوا درد کے مقام پر روئی میں بھگو کر رکھیں۔

۱۲۔ چمڑوں سے بچنے کے لیے یہ ہام لگائیے اور آرام سے سو جائیے۔

۱۳۔ کھلے زخم اور انکھ میں دوا نہیں لگانی چاہیے۔

قیمت - ۵ روپے ایجنسی کے لیے خصوصی رعایت

پتہ: ڈاکٹر عبدالجبار، ڈانگ ضلع پیلی بھیت - ۲۶۲۰۰۱

صرف بیرونی استعمال کے لئے

درویشی تیل

دیدوں اور عیسوں کے تجربات کا
نچوڑ، بھارت کا مشہور تیل ۲۵ جڑی
بوٹیوں، سورنجان تلخ، ہلدی، انہہ
ہلدی، دار ہلدی، کاسمبل دیودار،
لوبان، کچلہ، ہنگ، نر پکور، چھریلہ،
بابونہ، سونٹھ، مال گنگنی، رائی تخم قرطم، پالچھڑ، لونگ، دارچینی، آک، سنبھالو، عرق، لہسن، کافور،
حناف وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ پرانے سے پرانے درد، ورم، سوج، چوٹ، گھٹیا، کمر کا درد، پیٹھ اور کولہوں کے درد میں گرم کر کے مالش کریں۔
 - ۲۔ جلنے، کٹنے، زخم، پھوڑے، پھنسی میں اس تیل کو لگا کر پٹی باندھیں۔
 - ۳۔ کان کے درد کان میں کچھ پڑ جانے میں اس تیل کو گنگنا کر کے ڈالیں۔
 - ۴۔ کمزور اور سوکھے مریضوں پر صبح کو روزانہ ایک بار مالش کریں۔
 - ۵۔ کھلی، خارش، ہاتھ پیروں کا پھٹنا، ہاتھ پیروں کی انگلیوں میں مالش کر کے نبھائیں۔
 - ۶۔ کیڑے مکوڑے اور بچھو کے کاٹنے پر اس تیل کو روئی میں بھگو کر رکھیں۔
 - ۷۔ سردی، نمونیہ، چیت کے ورم میں تیل لگا کر سنکائی کریں۔
 - ۸۔ جانوروں کے خراب زخم، کھر پکنا، کیڑے پڑ جانے پر تیل کا پھایہ رکھیں۔
 - ۹۔ کمزوری باہ میں اس تیل کو لگا کر بگلہ پان باندھیں۔
 - ۱۰۔ فالج، لقوہ، گردن کا اکڑ جانا، ریزہ کے درد میں دن میں دو بار مالش کریں۔
 - ۱۱۔ بچوں کے جن جنوں میں مقعد کے اندر پھیری سے لگائیں۔
 - ۱۲۔ پھسروں سے بچنے کے لیے منہ ہاتھ پیروں پر ہلکی سی مالش کر کے آرام سے سوئیں۔
- قیمت:** ۱۰ ملی لٹر -/ ۷ روپے ۲۵ ملی لٹر -/ ۱۵ روپے ۵۰ ملی لٹر -/ ۳۰ روپے
- (انجینی کے لیے خصوصی امانت آج ہی لکھیں)

پتہ: ڈاکٹر عبدالجبار، ڈانگ ضلع پبلی بھیت۔ ۲۶۲۰۰۱



ریاحی و گیس کی تمام تکالیف، پیٹ پھولنا، پیٹ کا درد پیٹ میں
 جلن، دست آنا، بچش، مروڑ اور گیس خارج نہ ہونے کے
 لیے اکسیر دوا، درویشی دوا خانہ کی مایہ ناز ایجاد
 ترکیب استعمال: ایک چمچ صبح و شام تازہ پانی سے کھائیں درود
 قبض کے وقت ایک چمچ گرم پانی سے کھائیں۔
 قیمت: ۶۵ گرام - ۱۲ روپے

فیه شفای للناس

درویشی امرت رس

برسوں کی تحقیق کے بعد درویشی دوا خانہ نے دل دماغ اور عام جسمانی کمزوری کے لیے
 بہترین دوا "درویشی امرت رس" پیش کی ہے یہ اسکند دارچینی، آملہ، برہمی، الہی، مصری،
 شہد وغیرہ ۱۰ اجڑی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ امرت دل دماغ جگر نسوں پخوں میں نیا
 خون پہونچا کر ان کو طاقت بخشتا ہے۔ یادداشت کو تیز کرتا مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے نئی اسٹف
 اور نیا جوش پیدا کرتا ہے۔ ۳۰ دن کے استعمال سے حیرت انگیز فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

قیمت: ۷۵ گرام - ۲۰ روپے
 ۵ گرام ایک چمچ صبح و شام درود یا پانی سے کھائیں۔

پتہ: ڈاکٹر عبدالجبار، ڈانگ ضلع پبلی بھیت۔ ۲۶۲۰۰۱

شاہی ٹانک پلز

عنبر، زعفران، کشتہ فولاد و شکر ف و غیرہ سے تیار

کردہ گولیاں بھوک کی کمی، ضعف باہ، دائمی نزلہ

زکام فالج لقوہ، عام جسمانی و دماغی کمزوری،

گھٹیا و غیرہ میں مفید اور بے نظیر ہیں اس سے

بے انتہا بھوک لگتی ہے دودھ بھی خوب ہضم ہوتا ہے۔

۲-۲ گولی کھانے کے بعد کھائیں۔ کمزور مریض یا بچے صرف ایک ایک گولی کھانے کے

بعد کھائیں۔ قیمت: ۶۰ روپیہ

ہنی مون گولڈن

زعفران، سلاجیت، کشتہ فولاد و غیرہ قیمتی دواؤں سے

تیار کردہ سنہری گولیاں طاقت میں اپنی مثال آپ

ہیں۔ طاقت، لذت اور امساک کے لیے بیش بہا تحفہ

۔ اس کے استعمال سے نئی طاقت نیا جوش پیدا ہوتا ہے۔

پی۔ پی۔

مایوس مریضوں کے لیے امید کی کرن، زندگی کا حقیقی لطف

حاصل کرنے کے "ہنی مون گولڈن پی۔ پی۔" استعمال کر کے

دیکھئے۔ دو گولی سوتے وقت دودھ یا تازہ پانی سے کھائیں۔

قیمت: ۱۲ گولی/- ۶۰ روپے

طلاء درویشی مشکی

نوجوانوں کی غلطیوں اور بد اعمالیوں کے سبب جو کمزوری پیدا ہوتی ہے طلاء مشکی اس کے لیے لا جواب چیز ہے۔ اس کے استعمال سے مردہ رگوں میں دوران خون تیز ہو کر نسوں پٹھوں میں نئی طاقت حاصل ہوتی ہے مایوس اور لاعلاج مریضوں کے لیے لا جواب چیز۔ شب میں عضو مخصوص پر دو قطرے لگائیں۔

قیمت ۵ ملی لٹر - ۳۵ روپے

درویشی منجن

روغن لوگن والا

۳۲ جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ بھارت کا واحد منجن ہے جو دانتوں کے درد، مسوڑھوں کے ورم، پانی لگنا، منہ سے بدبو آنا ہر طرح کی دانتوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ دانتوں کو مضبوط اور چمکدار بناتا ہے۔ ہر شخص کے لیے ہر گھر کے لیے ایک ضروری چیز۔

قیمت ۵ گرام

۱۲/- روپے

پتہ: ڈاکٹر عبد الجبار، ڈانگ ضلع پیلی بھیت۔ ۲۶۲۰۰۱